





C. 55. C.

12  
20  
f  
28





JOHANNIS DOLÆI,

Med. Doctoris,

*Potentissimi Hassiæ Principis Consilarii ac Archiatri ,  
S. R. I. Curioforum Collegæ,*

ENCYCLOPÆDIA  
CHIRURGICA  
RATIONALIS,  
TOMVS SECVNDVS.



*In quo continentur libri quintus, sextus, & septimus, qui est ultimus.*



VENETIIS. M DC XC

Apud Ioannem Iacobum Hertz.

SVPERIORVM PERMISSV, & PRIVILEGIO



TO THE HONORABLE  
MEMBERS OF THE

AMERICAN  
CHIRURGI-  
CAL ASSOCIATION  
HOLDING AN ANNUAL  
MEETING AT  
THE CITY OF PHOENIX  
ARIZONA  
MAY 15-16-17-18-1902

OF THE AMERICAN  
CHIRURGI-  
CAL ASSOCIATION

# INDEX CAPITVM,

Quæ hoc secundo Volumine continentur .

## L I B R I V.

De Morbis Artuum , seu variarum Corporis Partium, tum  
magnitudinem vitiosè augmentibus , tum  
cutem deformantibus.

### C A P V T

1.	<b>D</b> E Corpulentia nimia.	pag. 1
2.	De Inflammatione, Abscessu, & Sinu.	19
3.	De Bubone & Anthrace, seu Carbunculo.	52
4.	De Phlegmatide, Phymate, & Furunculo.	76
5.	De Ecchymomate & Plaga.	87
6.	De Hæmorrhoidibus & Herpete.	97
7.	De Oedemate, & Scirrhus.	117
8.	De Cancro seu Carcinomate.	137
9.	De Scabie, Lepre, Græcorum & Arabum, Impetigine, Al- pho & Leuce.	153
10.	De Phlegmonibus, Sudaminibus, Epiphyseidibus, Termino, Effere, Pydratio, Ficu & Talpa Topinaria.	186
11.	De Tumoribus Glandulis, Ganglio, Abscessu, Meliceride, Steatomate, & Emphysemate.	203
12.	De Aneurismate & Varice.	216
13.	De Verucis, Cornibus, & Fungis.	227
14.	De Cutis Nigredine, Furfuribus, Lentiginibus, Epiphyseidibus, Panno, Nævis maternis, Maculis infantum Volaticis, & Maculis Hepaticis.	241

## L I B R I V I.

De Morbis Artuum , seu variarum Corporis partium, tum ma-  
gnitudinem vitiosè imminuentibus, tum continuita-  
tem dissoluentibus.

### C A P V T

1.	<b>D</b> E Aridura.	pag. 260
2.	De Ulceribus, & Fistulis.	276

3.	<i>De Gangrena, &amp; Spacelo.</i>	320
4.	<i>De Combustione, seu Ambustione.</i>	346
5.	<i>De Vulneribus.</i>	364
6.	<i>De Ligamentorum Stupore, &amp; Laxatione, Nervorum Contusione, Iuncturarum incurvationibus, &amp; Luxationibus.</i>	399
7.	<i>De Ossium Fractura, Carie, &amp; Tophis.</i>	430

## L I B R I V I I.

De Morbis Manuum, & Pedum in specie.

### C A P V T

1.	<b>D</b> <i>E Morbis Manuum Specialibus, nempe fissura Sironibus, &amp; Callo.</i>	pag. 448
2.	<i>De Digitorum Coalitu, Digito Sexto, &amp; Paronychia.</i>	459
3.	<i>De Unguium Inaequalitate, Crassitie, Rugositate, Scabritie, coloris mutatione Curvatura, Fissura, Casu.</i>	473
4.	<i>De Morbis Tibiarum, Roseolis nempe Saltantibus, Zostere, &amp; Thymo.</i>	482
5.	<i>De Pedis Distorsione, Pernionibus, Clauo, Vngue ballucis sub carne se defodiente, Fatore pedum, ac Doloze in Palma, ac Calce pedum.</i>	492



I O H D O L Æ I  
E N C Y C L O P Æ D I Æ  
C H I R U R G I C Æ  
R A T I O N A L I S  
L I B E R V.

De Morbis Artuum , seu variarum Corporis Partium ,  
tum magnitudinem vitiosè augmentibus ,  
tum cutem deformantibus.

C A P V T I.

*De Corpulentia nimia.*

§. I.



Næ nullum artificiosius fingi potest Automatum, nec ulla machina ita accuratè fabricata præ nostro corpore, cuius tot partium sunt particule omnes ut sapientissimè existat, ità mille affectibus obnoxia, ut mirum videatur, vel per horæ minutum integram illam ex toto, citra morbosum defectum subsistere posse. Nihil tamen aquè laedit eandem, ac pro conservatione illarum subministratum nutrimentum, viciatum si fuerit, cuius primarius error est deficiens digestio, quæ ortum habet in ventriculo, reliquisque partibus digestionem dicatis, nihilominus tamen quibuslibet

in assumtis, præter homogeneum nostri Corporis partibus assimilabile, & heterogenei haud parum deprehenditur, cuius sequestrationi maturè incumbendum, cum minus noxium retentum, quàm ingestum vitiosum Oeconomiam turbet nostram. Huic negotio maxime inservit motus partium corporis organicus, cuius ope, dum vehementius agitantur contenta corporis fluida per totum corpus, eo ipso validiori impetu, & nisu subeunt tam intimiores recessus partium nutriendarum, quàm etiam tubuli minutissimi recrementis secernendis apti, per quos penetrant copiosius secernenda, & ita facilius ac ulterius separantur. Cum verò assumptorum excessu, & excernendorum defectu machina nostra nimis repleatur succis, & carne & pinguedine corpus nimis augeatur, Machinæ sepe si non interitus, atramen maximum excitatur incommodum, mole

A sua

sua extraordinaria *Corpulentia* nomine insignita, de quo affectu paucis mentem nostram revelabimus.

*Corpulenta nimia.* Affectus dicitur *Corpulentia nimia*, vel *nutritio corporis aucta*, in quo vitio corpus non quidem in longitudine, sed saltem latitudine & profunditate, sed uno verbo, crassitie excedit, & tales obesi seu corpulenti Germanis dicuntur: dicte fette Menschen. Ejusmodi obessorum hominum exempla exstant hinc inde in monumentis Practicorum: hinc obelis his, quibus

*Pinguis aqualiculus propenso sefquipedale*

annumerari potest ille Germanus, cujus Epitaphium sequens Durlachii inveniri, *Crusius in Annal. Sæv. Par. 3. l. 12. c. 11.* mentionem facit sequentibus verbis: Anno 65. den 4. Nov. starb Frantz Erhard, der fromme, redliche und grosse Stadtschreiber, vvelches Corper gar nahe 6. Centner gevogen hat. Pistor quidam Hannovientis K. 400. libras ponderabat civiles. *Sennertus* mulierem 36. annorum 480. lb. & Virum 600. pendentes refert. Sic nuper Hagæ Comitum vir obesus mortuus est, qui 500. libras incircaponderabat. Qui plura desiderat exempla, conferat *Ephem. Germ. Ann. 2. Obs. 87.* Differentiam plures faciant inter *Corpulentiam nimiam*, & obesitatem: priorem dicunt *musculosarum partium auctiorem*, & posteriozem *pinguedinem nimiam*.

*Parti affe-  
cta.*

§. 2. Machina nostra ex ovo enata ab initio existit parva, successivè verò alimenti ope sustentatur, nutritur ac augmentatur, & corpus per totum vitæ curriculum conservatur tale, quale est, augmentatur verò per ætatem accrescentem, ut partes organicæ machinæ nostræ componentes, debitam magnitudinem acquirant, quæ aptiores sunt ad actiones debitas, quarum sunt instrumenta, persiciendas. Machina verò nostra constat ex partibus fluidis, & solidis, quæ posteriores sunt ejus fundamentalia stamina; partes autem flui-

dæ sunt sanguis, ac succi reliqui plures. Partibus solidis nil nisi canaliculi intelliguntur, adeo ut totus homo unusquidam continuus existat tubulus, instar arboris ex uno quodam trunco inferiori in summitate ramos multos, & varios projicientis, præcipuè hic notandi veniunt peculiæres tubuli membranacei oleosus, & pingues particulas tantum recipientes, qui noviter detecti sunt. Stirps omnium vasorum statuitur Cor. Arteria ubi terminatur in Cerebro, abit in glandulam, ex glandula fit filamentum, ex filamentis nervi, hi verò per musculos, reliquasque machinæ nostræ distribuuntur partes. Tubulorum horum longitudo, & major, minorve extensibilitas quarumvis partium longitudinis, & auctiõis normam præscribit, cum & ipsa ossa ex fibris firmius, & artius tandem junctis & proximè appositis sui compagis rudimenta habeant. Uti ergo textura fibrarum secundum extensibilitatem in longum, partium longitudinis fundamentum existit, ita illarum major, vel minor numerus serè latitudinis, ac profunditatis basin constituit, quam pro eorum copia majori, vel minori simul necessatio, vel amplioribus circumferibatur pars terminis, vel angustioribus coarctetur limitibus. Dein accedit ipsum partium nutrimentum, sui appositione quantitatem fibrarum, ac tubulorum, adeoque & magnitudinem partium, in specie ratione latitudinis, & profunditatis, vel augens sui copiosiore distributione, & retentione, vel imminuens sui defectu. Nutrimentum ergo nihil aliud est, quàm chylus firmius, & uberius circa fibras coagulatus. Sunt præterea, qui carneas partes nonnisi quasdam particulas rubicundas, ac rotundas sanguinis grumfastas, & inclusas membranæ subtili, tanquam tenui vasculo, adeoque mentiri tantum carnosam substantiam, asserunt. Adipem quo-

quoque uberiores, & carnem copiosiores nunc sociata *Corpulentia nimia*, Subiectum proximum statuenda esse, ex jam dictis constat.

*Diagnos.* §. 3. *Signa Diagnostica* hic apponere superfluum esse existimamus, quia per se patula sunt. Facile etiam discernitur hic affectus à Cachexia, Anasarca, ac Leucophlegmatia, quæ signa distinctiva alibi, & quidem suis capitibus peti possunt. Homines corpulenti ad motum tardiores sunt, ut plurimum de difficili conquerantur respiratione, & anhelosi sunt. Rarum est exemplum obesi hominis, qui non ita pridem, Anno nempe 1688. Hagæ Comitris defunctus est, in cujus cadavere pinguedo unum & dimidium pedem æquavit, referente mihi Celeb. Dñ. Kursnero, Amico meo singulari. Plura alia hinc inde exstant exempla obeforum hominum, qui vix de loco se movere poterunt.

*Causa corporulenta nimia secundum Galenicum.*

§. 4. Juxta Veteres, & quidem Antesignanum eorum Galenum, ipsius *Corpulentia* hujus *nimie* continens *Causa* est sanguis propriè sic dictus, aut pinguior, & purior ejus pars: Antecedens est epatis musculorumque temperatura moderata, calida scilicet & humida. Externa autem sunt cibi boni succi quiesque nimia, quod etiam apparet ex lib. 14. *Galen. de morbis curandis*, ubi ita refert: Acuta exercitatio, & tenuans victus, & id genus medicamenta, & animi cogitatio, temperamentum non solum calidius, sed etiam siccus, ac propterea corpus exilius reddunt, confirmatque cum juvene annorum quadraginta, qui oppidò obesus, ac corpulentus, per exercitationem multam, cursum velocem, victum exsiccantem, ac extenuantem, ejusque generis medicamenta fuit curatus.

*Paracelsus.*

§. 5. Ad mentem *Paracelsi* nihil uspiam creatum est, quod non indies suo alimento egeat, imò ipsas stellas ex suo elemento ede-

re, & nutrirì, hominem verò nutrirì terra, de qua est, asserit, atque ex cibo sanguinem suum habere, & carnem. Cibo- rum multitudinem nutrimentum immoedium corpori interre refert, quod deinde in immensum ita excrefcere possit, ac si errorem virtutis digestivæ accusat, juxtaque Auctorem hunc faber, ac opifex in ventriculo habitat, qui carnem ex eo fingit humanam. Is autem duabus naturis instructus creditur, cum coctio tamen saltem unica sit. Altera natura in eo est, ut si in viro operetur, carnem virilem gignat, si operetur in femina, femineam carnem generet. Quod enim alimentum concernit, id domat, ac subigit Archæus in ventriculo, ac ex eo fingit, formatque, quod opus est, siquidem omne, quod edit homo, ipsemet est; hoc est, caro & sanguis, nam illa sumus nos. Corpus enim, quod morbosum est, non augetur, sed minuitur. Ideoque in *Corpulentia nimia*, ac Obesitate corpus cibum laudabilem in majore quantitate pro alimento, quàm par est, suscipit, & faber Archæus in stomacho residens plus partibus dispensat, quàm pro excrementis. Ex succi propterea nutritii abundantia Corpulentiam originem ducere ait, tanquam ex boni superfluo, propter excessum in carnem, & pinguedinem post hujusmodi succi nutritii abundantis separationem ab Archæo factam translato.

§. 6. *Helmontius* demonstrat hinc inde, quod elementorum mystura conflatur creditur, fieri materialiter ex solo aquæ elemento, quod primordially in rebus constitutis cunctis se habet per modum laticis. Cibus ac potum in stomacho assumere materiam chyli asserit, cum retentione qualitate vitæ mediæ ciborum. Destruere quidem, pergit, pristinam ciborum materiam, & approximari ad



materiam latici, five elemento aquae viciniorem; fatagente nimirum ad hoc fermento specifico stomachi, non secus atque fermentum hepatis chylum in cruorem transmutat, ejus comes, ac socius, non item pars, est latex. Fermentum stomachi in homine factus cibos in chylum, quam illorum pinguedines transmutare, eo quod pinguedo remotior sit à latice, five prima materia, quam sit cibis. Quae digestio transmutationis in succos aquosos, eo huc adducta est quò constet, latice facile concepto in nobis peregrino semine, membrorumque fermenta, transmutari in alienam prolem, atque ab abundantia hujus laticis homines obesos, & corpulentos fieri haud dubitat, nec arbitrari potuit unquam, renes suum habuisse munus transmutandi adipem sub pelle distentum in aquam: quin potius credidit, id illic concedendum facultati, quae cruorem in adipem formavit, ut scilicet ejusdem sit facultatis latex, convertere adipem in latice, cuius antea officium fuit, è cruore adipem conficere. Iam autem non esse asserit renem dignitatem, quòd nos pingues, aut macilentos faciant, dum non raro tabilis, ac calculosis renibus pinguescant plures. Saepe namque ( inquit ) occurrat Capucinus longo jejunio gravatus, potuque paucò, & parva cerevisiae saturatus, crasso tamen corporis habitu dotatus. Ex adverso autem, cernuntur edaces, lautoque mangonio educati insigniter macilenti: Ut utrumque casum ruminet, reperit Auctor fontalem stomachi digestionem gubernatricem ceterarum velut sibi subalternarum. At mirum ipsi videtur saltem, quo pacto resolutus adeps oleosus in pristinum aquosum latice, retromigret, imò in venas, ac tandem ad renes per clasticam retrahatur.

*VVilifium.* 5. 7. *VVilifex* fundamentis sequens *Corpulentia* nimirum formari potest aetiologia. Stacis à prima

foetus in Utero formatione contingit quadam in illo iactura ob motum particulis ejus fluidis communicatum, quas resciri ab aliis de novo adventibus necesse est. Sed quum partes debitam quoque magnitudinem assequi debeant, alias adhuc praeter priores illas ipsis apponi opus est. Duo ista à nutritione nominatim pendere statuit Author noster, & utrique huic fini sanguinem satisfacere asserit. Cruor autem universas corporis partes pervagans singulis per arteriosos furculos materiam operi illi parcm perficiendo largitur. Quum verò liquor iste pigrior, hebetiorque existat, quam ut propria virtutemunia sua peragat, alio quodam vegetiore particulisque valde activis donato indiget, quo actuetur, ac debite disponatur. Talis est humor nervosus spirituum vehiculum, qui iisdem pragnans maxima donatur activitate. Generosior itaque succus iste facultate quadam, qua pollet, plastica, cum delectu quodam materiei nutritioni, & accretioni dicatae particulas destinatis usibus disponit, fibrasque spirituum animalium impostero hospitia futuras efformat. A dictorum autem succorum varia diaetesi diversa exsurgit animalium constitutio, & ab eadem causa dependet eorum salus, iique omnes, quibus affliguntur, affectus emergunt. Ab utroque enim rite temperato justa fit dispersita substantiae reparatio, partesque debita proportionem protrahuntur. Sed si sanguis mollioribus scatet particulis, uberiorque succus nervosus spiritibus turgidus in partes diffundatur, maxima facta ab eo liquoris aëbilis in partium substantiam assimilatione, corpus improporcionata mole accrescit, producitque iste affectus, Corpulentia nimia denominatur.

6. & Cum clarissimus *Sylvius* sanguine nutrir corpus statuat, hinc omne nutritionis vitium sanguini vitioso adscribit. Nutritio nem



nem ergo nimiam tum in carnosâ musculorum excrescentia, tum in obesitate, fieri vult à sanguine multo, ac laudabili, concurrente corporis motu, exercitioque moderato, vita curis anxiiis vacua, somno mediocri, vel protractiore, alimentorum multi succi, ac fermentationis facilis assumptione largiore. Sic etiam corpus æquè in habitu, & superficie, ac interioribus pinguius, & magis obesum deducit à sanguine pinguiore, ad cuius productionem iuxta ipsum facit corporis constitutio sana quidem, concurrente tamen succo acido satis copioso, sed blando, temperatoque, bile autem parciore, minusque acri, motu corporis paucio, vita itidem sine curis rodentibus, somno placido, & longiore, alimentorum pinguium assumptione continua, ac multa. Existimat etiam Auctor hic, corpus rarius gravari carne multa vel nimia, frequentius verò pinguedine.

*Cartesiani*  
*nos.*

§. 9. *Cartesiani* ab optima omnium partium nutritione *Corpulentiam nimiam* originem habere referunt, eamque ex redundantia chyli laudabilis emergere. Chylum verò laudabilem eum nominant, qui particulis constat oblongis, ramosis, & paucis leviusculè mucronatis, siue aquosis, oleosis, & parum falsis, optimèque, & ad minimum per duplam fermentationem elaboratum, qui faciliè ad corporis partes transluere, & iisdem assimilari possit. Assimilationem hanc chyli in singulis partibus non ideo promoveri volunt, quòd homines ejusmodi variis vescantur cibis, qui omnis generis consent particulis partibus nutriendis accommodatis, propter homogeneitatem quandam, adeò, ut particulæ ossæ ossibus, musculosæ musculis, pinguiore, & adiposæ pinguedini associentur, eorumque augeant substantiam, sed quòd fermenta quadam in partibus existantia particulas chyli disponant, ut membris alendis adaptentur.

Materiam chyli cum reliquis cibum admittunt, & potum non modò copia assumptum, sed in ventriculo quoque probè digestum, & in substantiam lacteam chylosam in intestinis transversum, ut sacculus chylosus, siue receptaculum penu quodam nutritivo affundò abundet. Ut verò particulæ chyli allabentes membris firmius adhæreant, multum contribuere dicunt vitam desidem, animum curis vacuum, labores intermissos, & somnum diutius protractum, ut non opus sit liquori nervoso magnam præparare, aut ex chylo tribuere materiam, cum laboribus & mentis & corporis non absumatur. Hac enim ratione faciliè oriri posse asserunt, ut particulæ chylosæ membris per quietem firmius adhæreant, nec tam citò abluantur, quod cum in singulis corporis membris aqualiter contingat, habitum ejusdem in crassitie, non modò quoad pinguedinem, sed ipsam etiam carnositatem per quam pronunciant augeri.

§. 10. Nos antequam ad causam *Corpulentia nimia* explicandam accedamus, prius opus nutritionis, & succi nutritii indolem explicemus. Veterum, & quorundam Recentiorum Medicorum sententia est, sanguinem corporis nostri uniuersale esse nutrimentum. Alii duplex corporis nutrimentum statuunt, sanguinem nempe pro nutritione partium carnosarum, & liquorem roscedum per nervos in partes derivatum, pro partibus membranosis, seu nervosis, & ita etiam pro pinguedine, ita ut causa obesitatis nimis futura sit abundantia talis succi per nervos influentis, cuius opinionis defensores sunt Angli plures. *Bilsius* verò rorem suum tanquam succum nutritium agnovit, sed & hujus viri opinio ab Anatomicis hujus sæculi ex exercitatiis rejecta est, quia motus hujus succi rori planè contrarius est, quam uti existimavit *Bilsius*, cum ipsius morte

*Nostri sententia de causa corpulentia nimia.*

ergo & sententia ista sepulta est. Ut verò *Chylificationis* opus examine nostro aggrediamur, observamus eam alimentis solidis fluiditatem conciliare. Ex Physica didicimus, fluiditatem in divisione & vario motu particularum corporum fluidorum positum esse, itaq; oportet ut in hoc opere chylificationis partes alimentorum à se invicem secedant, & diverso motu agantur. Separatio ista, sive texturæ turbatio particularum alimentorum peragi nequit, nisi ab attritione, aut fermentatione. Nihil in Ventriculo novimus, quod par sit alimentis molendis ac terendis æquè ac necesse est, ut in chylum facescant; judicandum est ergo, & versionem istam structuræ partium alimentorum à *fermentatione* induci, sed fermentum constare debet ex principiis fermentationem creare valentibus, à quo solvantur sulphura alcalia & salia. Et cum statuerimus sulphura ab alcalicis, alcalia ab acidis, & salia à phlegmatis dissolvi, necessariò colligere debemus, *fermentum Chylificationis ex acido alcalico & phlegmate* constatum esse. Si fermentum Ventriculi tale fuerit à prima alimentorum cum ipso commixtione, ejus acida in illorum alcalia vires suas exercebunt, & fermentatione, quam in illis excitabunt, totius massæ alimentorum dissolutionem exordientur. Alcalia fermenti sese deinceps insinuantia inter Sulphureas alimentorum partes, ipsas ab invicem sejungit, demum phlegmata dissolutis salibus locum obtinebunt inter cunctas alimentorum partes, quarum unio ab actione acidorum & alcalicorum periit. Quando ergo alimenta in ventriculum descendunt, pondere suo comprimunt minimas glandulas, quæ inter tunicam ejus internam, & mediam sunt conspersæ. Cum enim ex merz sint exiguæ vesiculæ, ubi primum comprimuntur, evacuantur, & in ventriculi cavitatem effundunt satis abundantem

rorem fermenti, quod commiscetur illis, quæ jam in ventriculo continentur, ipsa fermentat & liquefacit, quod jam liquatum fuit, summum petit, & ventriculi motui peristaltico parens per pylorum elabitur. Dum perdurat fermentatio ista, exit aliquid indefinenter, & quando ea absoluta est, animal edere cogitur, vel fami exponitur, quæ oritur ex eò, quòd cum fermentum purum, ac impersmixtum in ventriculo comprehendatur, tunicam ejus interiori vellicet. Fermentum alimentorum partes eorum integrè nunquam dissolvit, quin intemerata aliqua particula evadit, quapropter chylus sub stomachi exitum non percipitur, & quàm plurimis partibus inutilibus confunditur. Ea de causa fuit per oblongam intestinorum fistulam, in quibus miscetur variis in locis cum diversis liquoribus, qui inserviunt separandis iis, quæ bona & utilia sunt, ab illis, quæ nocere possent conservationi corporis animati. Chylus à stomacho prodians in ductum pyloro continuo devehitur, qui intestinorum nomine designatur, qui verò chylus magnæ non est liquiditatis à ventriculo erumpere paulisper æmulatur gluten ex farina coctum cum aqua confectum, subgryseum exhibet etiam, ut illud, colorem, & magnam obtinet visciditatem. Sed diutius non perseverat in tali statu. Præterlapso duodeno ipsi statim admiscetur liquor quidam croceus, summè amaricans, bilis nomine cognitus, qui constat ex multo alcalico fixo, paulo volatili, paucò sulphure, pauciori adhuc terra, & copioso phlegmate: unde concludere licet, bilem cum chylo permixtum alcalicis suis tum fixis, tum volatilibus, excipere partem quandam acidorum, quæ sulphura ejus colligata detinent, & hoc pacto visciditatem illam, quæ in duodeno præditur est, fovet, ità ut deinceps sulphura Chyli

Chyli majore patiantur libertate, & à se invicem longius sint semota; quare inter particulas suas minus phlegmata suscipiunt, quæ integram massam diluunt, majoremque illi fluiditatem conciliant. Bilis à sanguine in Hepate separatur ad chylum in intestinis persiciendum, Sulphura illius alcalicis suis dissolvit, & ipsum phlegmatis suis diluit. Præter hanc bilem liquor adhuc alius tenuis, & limpidus aquæ instar in duodenum depluit, vocaturque *succus Pancreaticus*, qui ad lymphæ indolem ferè accedit, videlicet ex Sulphuribus phlegmatis: & alcalicis volatilibus est conflat. Ubi primum in intestina decidit, cum Chylo miscetur, si occurrat: in Chylo acidis quibusdam, quæ sulphura ejus colligata teneant, alcali illius volatile ea absorbet, & hoc pacto Sulphurum reliquorum principiorum compedes solvuntur, sulphura hæc, quæ in succo pancreatico continentur, inter chyli particulas sese insinuant, & alcalicorum cum acidis fermentationem attemptant, prohibentque ne violentior evadat, tum enim damna plurima inferret, phlegmata viam sternunt alcalicis, ac sulphuribus. Ut eò melius cum omnibus chyli partibus commisceantur. Ex his luculenter satis subsequitur, succum Pancreaticum chylum perficere, illumque liquidorem reddere, cujus acida alcalico suo obdunt, & eadem via sulphura dissolvit. Adeo necessarium est ad hominis conservationem, ut chylus ab acidis suis expurgeretur, ut Summus rerum Opifex quàm multas minimarum glandularum congeries posuerit inter gracilium intestinorum tunicas, quæ in loca ista liquorem succo Pancreatico similem effundunt, qui permixtione sua cum chylo id complet, quod bilis & succus pancreaticus ita prosperè susceperant. Parvi illi glandularum acervi variz sunt crassitie. Quidam ducentas, & am-

plius glandulas complectuntur, quidam verò netriginta quidem continent. Omnes chyli partes apte natæ non sunt subeundis canaliculis, qui *venæ lacteæ* appellantur. Quædam sunt crassiores, & illæ crassâ excrementa constituunt. Chylus abundat particulis venis lacteis subintrandis idoneis, quando à bile & succo pancreatico præparatus fuit, quapropter massa ejus tantoperè in intestino jejuno immittitur; quoniam particulæ illius subtiliores ab ipso discedunt, & in venas lacteas propelluntur. Videmus etiam copiosiores venas lacteas à jejuno proficisci, quàm à reliquis omnibus intestinis. Sub jejuni terminos excrementa quædam cum multis particulis chylosis permixta reperiuntur. Succus glandulosus illis commiscetur, & dissolvit sulphura partium chylosarum, quæ iis insunt. Quod ita paratum fuit, venis lacteis adhuc excipitur. Deinde excrementa illa in ileum protruduntur, ubi adhuc in plurimis locis succo glanduloso adsparguntur, qui eundem, quem antea, edit effectum. Tandem postquam penitus partibus suis chylosis exuta fuere, in crassâ intestina deturbantur. In venis lacteis reperitur lac, quod purus & purus chylus est, qui ab intestinorum cavitate in venas lacteas compulsus est, quod sequentibus probatur argumentis. 1. Lac, quod in venis lacteis comprehenditur, ab intestinis prodit. Ad oculum patet veritas illa, cum venæ lacteæ digitis premuntur, lacte deplentur, & dein videtur illud ab intestinis venire venam vacuum repleturum. 2. Lactantium in venis lacteis conspicitur aliquot horis post cibum animal. 3. Jejunum ferè semper percipitur exinanitum, propter numerosas venas lacteas, quæ ab illo exoriuntur. Denique ex eo, quod reperiantur excrementa pura in ileo, quæ crassiora adhuc sunt illud intestinum percurrando, quoniam plurimæ venæ lacteæ pluribus

bus dunatæ sunt valvulis sibi proximè adjacentibus, ita sunt comparatæ, ut chylo com meatum per venas lacteas in glandulas mesentericas non permittant, sed illius refluxui obstant. Copiosæ ab intestinis proficiuntur, & plurimæ in unum coeunt, prout ulterius progrediuntur. Hoc pacto truncos paulò crassiores componunt, qui chylum effundunt in vesiculas glandularum mesentericarum. Chylus vesiculas harum glandularum subintrat, ut in iis suscipiat spiritus animales, quæ in illas confluunt per plurimos nervos à plexu mesenterico oriundos, spiritus isti chylum subtiliorem atque fluidiorem efficiunt alcalico suo volatili, & si qua adsit in illo aciditas, eam corrigit, alcalicis suis ipsam excipiendo & in sal illam commutando. Chylus prætergestis glandularum mesentericarum vesiculis duos tresve canales ingreditur, ex inferiori earum parte exeuntes. Deinceps pertingunt ad succum quandam membranaceum in lumborum vertebra posittum, *Receptaculum chyli* nominatum, quod idem est, ac lymphæ cisterna. Chylus enim in hoc cumabundanti lymphæ commiscetur, quæ turgescit receptaculum. Ab ipsa diluitur & liquidior fit, ut facilius fluat. Denique à Chyli receptaculo proficiuntur canalis quidam, *Ductus Thoracicus* vocatus, qui aliquoties in furcam diducitur, & rami ejus denuò coalescunt, & sæpè etiam simplex observatur ad vertiturque Canalis hic implantatur venæ subclaviæ, & supra insertionem ejus adest valvula, ita ut sanguis, qui in venâ subclaviâ fuit, super illa transeat, nullo chyli ingressu obice posito. Cum inflatur ductus Thoracicus, copiosæ conspiciuntur valvulæ in illius cavitate. Ex quibus concludendum, chylum ex receptaculo suo, inveniam subclaviam sinistram deferri, ubi sanguini immiscetur. Cursum ejus insequitur & in venam cavam delabitur, quæ ipsum in dextram

cordis auriculam advehit. Auricula illum impellit in dextrum ventriculum, & ut chylus tum temporis sanguinis partem constituit, cum ipso fluit, per totum corpus unâ circulat. Hisce præmissis facile perspectum est, ex omnibus succis corporis nostri solum *chylum* potissimum corpulentos ac succulentos reddere. Corpus enim nostrum ex meris canaliculis constat, quo quis ergò copiam succorum habet abundantior, eò major existit, si enim succi multæ vasa transeant, ea sensim ac sensim dilatant, ut plus succi recipere possint; sic homo qui 280. lb. ponderat, plus quàm centum libras succorum habet, estque ponderosior, quàm alius macris homo. Chylus autem ut genuina & vera lactis est materia, ita idem sanguini in axillari seu subclaviâ sinistra permixtus & aliquoties circulator, non illic in sanguinem mutatur, sed sub lactis suavissimi forma aut sanguini infusus, aut sub gelatina albicantis forma à sero vel nutrimenti vehiculo solutus, mediantibus vasibus sanguiferis in totum corpus distribuitur, omnes ejus latebras percrepat, quia totum corpus ex innumeris & solis tubulis conflatum est partes aque membranosas ac nervosas nutrit, & superfluum paulò à minutissimis membranaceis tubulis receptus per eas transit, & superficie earum hærens in pinguedinem succrescit, imprimis chylus ratione olei, quod abundat, & sic pro amplitudine ac laxitate & constitutione tubulorum pars quasi superflue nutritur, hinc & solum lac nutrit infantes tenellos, eosque impinguat, quod & sæpè videmus in emaciatis, qui sola lactis cura ad obesitatem ac corpulentiam restituuntur. Nam, ut dictum est, butyrosi, seu oleosa lactis, seu chyli substantia os humerosque similis est pinguedini corporis nostri. Massa ergò sanguinea copiosior, & eaque minus salina,

na, acris & aspera, sed suaviter oleosis temperata existens, & simul blando dulci ac fluido chylo, eoque copioso pingui ac oleoso turrida, existentibus simul tubulis amplioribus & laxatis, & præcipue circa extremas corporis partes, homines reddit nimis corpulentos; fluidum chylum hunc esse; ut per vasa minutissima fluere possit, necessarium, & aptitudo partium solidarum respondeat opus est, nempe tubulorum & spatulorum amplitudo inter fibras partium molliores paulò, ac speciatim circa membranaceas partes & cutis glandulas, imprimis verò circa membranas externas intra panniculum carnosum & cutim fibrasque musculorum Trunci & abdominis. Num verò pinguedo hæc medianibus glandulis in solum hunc usum destinatis, à sanguinea massa discernatur, & in peculiare tubulos seu vesiculas defluat, sub cute ejusmodi tubulos maxime in quantitate reperiri quis dubitat? Et membrana carnosâ ut plurimum ex ejusmodi tubulis & glandulis constat, quæ tantum recipit & separat oleosas particulas, & si huic oleo plures acidæ & terrestres particule fuerint commixtæ, fit *pinguedo*. Pingues enim istæ particule non manent in suis cellulis, sed per alios tubulos resuunt in massam sanguineam. Quorum ergo sanguis multo scatet acido & salso, isti homines haud sunt obesi, quia ab acido & salso absumitur oleum: sic & illi, qui laboribus dediti sunt rarò obesi redduntur, quia oleosæ particule avolant, & sanguis ob continuam transpirationem suas perdit particulas subtilissimas. Sunt & alij, qui multum edunt, & tamen manent macri, quia oleum & sulphur in alimentis vix sufficiens est ad acidum, quod in suis succis habent, temperandum, cujus generis hominibus conducent pingua & non acida. In Corpulentia nimia dum chylus massæ sanguineæ permixtus ad par-

tes dictas alluit, earum porulis minutissimis se insinuat, ipsa membrana muscularum aliarumque partium lacteo nutrimento implentur, ejus abundantia externè cutim versus irrigat, quia internè fibræ musculorum sanguine velitis adeo commodè adherere nequit, ipsa verò cutis ex extremitatibus minutissimis arteriarum, venarum & nervorum reticulatim contexta, dum per glandularum minutarum ipsi intertextarum excretoria vasa, ut & si qui sint præterea, poros in specie sic dictos insensibilis transpirationis materiam vaporum forma transire permittit, crassiusculum lacteum nutrimentum cum sanguine allatum externorum pororum angustias cohibet, quod ita introrsum versus coercitum successivè in corporis peristoma adiposum densatur, ceu loquitur beatus D. Etmullerus *Disp. de Corpulentia nimia*. Malè & irritò quodam ausu alij crescendi vim ex cerebro per medullam spinalem derivare conantur. Inter causas remotas referre possumus omnia ea, quæ massam sanguineam lactescentem seu chylosam reddere possunt; huc facit multum optima chylosis & constitutio radicalis succorum & spirituum. Ordinariò quidam ad corpulentiam hanc dispositi sunt, & familiæ reperiuntur, in quibus sunt homines obesi, hoc, me judice, evenit, quia in his à nativitate fibræ ac tubuli extremorum sunt extensiles & ampliores, ob quam causam & fœminæ præ maribus possunt esse magis corpulentæ. Stupenda est ista obesitas pueri recens nati ex imaginatione matris, cujus mentio fit in *Ephem. German. Decur. Ann. 6. p. m. 280*.

Inter res vulgò nonnaturales ita dictas sunt, quæ symbolum suum addunt corpulentia nimia, Aer nempe temperatior, hinc in regione temperata, imprimis nonnihil Boreali, obesiores reperiuntur homines, qualis enim aer, talis

talis massa sanguinea, hinc Galli, & Itali non sunt ita corpulenti, ut nos Germani; sic & Boetii sunt pingues, juxta notissimum illud:

*Botium in crasso jurares aere natum.*

Deinde & potus copiosior & temperatus ingestus, maximè si digestio simul ritè peragatur, necessario homines corpulentiores reddere debet. Panistanquam optimum nutrimentum, & *Helmontio* Theriaca alimentorum audit, multum facit ad corporis auctiorem. *Joel* passulas Corinthiacas pinguefacere dicit, ut & caricas, sic & ob oleositatem, quam habent amygdalæ dulces, pistaciæ, pingues ex eorum usu evadunt homines, quibus annumeranda sunt milium, hordeum, triticum, unde cerevisiæ triticeæ, & hordeaceæ maximè nutriunt. Lac quoque uti infantes imprimis cum Thee paratum, nec non butyrum, quò pertinent omnia alimenta ac potulenta insipida ac crassiora, ut inter alimenta sunt pulli gallinacci, gelatinæ, ova recentia, aliæque carnes temperatæ, & mucilaginosæ, quæ omnia potentius nutriunt & corpulentiam augmentant. Potulentæ etiam multum huc contribuant liquida, aqua enim ceu testatur *Celeb. Malebranche in Explicat. s. ad lib. 3. p. 103.* humores nimis crassos resolvere & circulationem sanguinis per omnes corporis partem faciliorem reddere potest; huc pertinet cerevisia Brunsvicensis, & nostrum Bryhanium. Ut verò laeta & splendida victus ratio incremento corporis multum contribuit, ita quoque otium & quies affectui huic producendo admodum sunt idonea, tempore enim somni & quietis circulatio sanguinis, chyli, aliorumque succorum optimè peragitur, hinc somnus & quies homines impinguare possunt; uti vigilæ & labores succum nutritium attenuant & nimis per sudorem eliminant, & acrimoniam accer-

sunt. Quid enim somnus, & quies faciant, hoc videre est in Uris, Taxis, Muribus, qui tempore hyemali in latebris quiescentes somno sepulti pinguiore evadunt. Hinc

*Martialis:*

*Dormitis nimium glirer, vitulique marini,*

*Nil mirum, si vos crassa Minerva premit.*

Rationem addit *Cl. D. Ettmullerus*, partim quòd intra omentum, aliaque viscera interna collecta pinguedo, de qua suprà successivè attenuata, sub nutritionis partium nervosarum munere, indeque & alia quoque in loca distribuatur, & ibidem sub torpore illo agglutinata aliqualem copiosioris pinguedinis speciem repræsentet, partim quod sanguis eorum ex voracitate prægressæ ætatis chylo crassiore abundans, hunc quantum ejus possibile sibi assimilatum, in nutrimentum partium sanguinearum impendat, crudior & quasi pituitosior ejus parte, partes solidas obsidente & sub habitu plus minus leucophlegmatico, corporis peripheriam occupante, ac speciem corpulentioris habitus repræsentante; id quod facillè fieri potest, dum sub ista quiete, & rara respiratione tardior est motus sanguinis localis, remissior intestinalis, unde tardissima sanguificatio, paucissima transpiratio, paucissima nutrimenti absorptio.

§. II. *Nimia Obesitas*, vel *Corpulentia* non tantum immaturam ætatem senectutem, cum fuerit pinguedo cumulata copiosissimè, & enormi quantitate per univèrsam corpus sparsa, verum etiam repentinè ætatis mortis occasionem dat, unde *Hippocrater* Medicinæ Parens & accuratus omnium rerum medicarum Observator optimè inquit: *Qui à nativitate valde sunt obesi, celerius moriuntur, quàm graciles.* Ceu nos ejusmodi plura, & cheu I novimus exempla, & primò in Cive Hanovienſi K. 46. annos tantum attingente, & pinguedine suffocato; deinde in Aulæ Magistro Schaumburgico

*Prognosis.*



gico *Naurath* dicto 47. anno suæ ætatis apoplexia subito defuncto; aliisque pluribus. Expositi enim sunt ejusmodi homines crassi catarrho suffocativo, paralyti, apoplexiz, Hydropi, &c. Pingues enim non ad longinguos perveniunt annos, aut ut plurimum brevioris sunt vitæ. Nam cum illis paucus sit sanguis, & spiritus ipsis citò, vel minima de causa coagulatur & stagnat, unde mors, quæ nihil aliud est, quàm coagulatio, seu stagnatio omnium succorum circulantium. Exemplo sit Reverendus iste Minister *Iohannes Musinius* Polonus, cujus mentio fit *Ephem. Germ. Ann. 2. Obs. 87.* ubi post Chirurgicam apertionem, in abdomine supra musculosam carnem, satis amplam & robustam, adeps coloris ad citrinum vergentis, octo digitorum transversorum crassitiem superans conspiciebatur. Similem adipem observavi in cadavere *Kochendorferi*, Civis Hanovienfis à me exenterato. Hinc optimè *Plinius* inquit: *Pingua corpora citius senescere.* Et certè Pinguedo muscularis adnascens inter vasa quæcumque, cum multa est, adeò arctè constringit Spirituum & sanguinis vasa, ut libera circulatio plurimum impediatur, unde necessariò angustia & spirandi difficultas, & tandem mors oritur, quod & jam diu agnovit *Galenus* l. 2. *aph. com. 43.* malus esse solet ad crassitudinem excessus, quod in iis angustæ sint cum arteriz tum venæ; atque ob id, qui crassi sunt, paucum omnino sanguinem habent, atque spiritum adeò, ut quàm ætate processerint, citò ipsis, vel parvam obcausam vita destituitur.

*Diatæ.* §. 12. Quantum tum à morbis, tum à morte præservationis virium sit in *Diatæ* regimine, quotidiana docet Experientia, & *Seneca* id inculcat sequentibus, dicens: *Non accipimus brevem vitam, sed fecimus, nec inopes ejus, sed prodigi sumus; sicut amplæ oper, ubi ad malum Dominum pervenerunt, momen-*

*to dissipantur, ut verò licet modice, si bono custodi tradita sunt, crescunt.* Quare & Nos de re in omni vita, maxime verò in cujusvis morbi curatione tam necessaria, de productione, & tractione Corpulentiz nimiz solliciti, non quidem ægimus in genere, sed in specie designabimus, qualem diatam Corpulentiz nimiz conditio postulet. Aer ergo ad imminuendam Corpulentiam nimiam debet esse subtilior, ac calidior & siccior, hujus enim ope succi magis attenuantur & resolventur, hinc plurimæ reliquæ ex chylo in auram avolant, & evacuantur, & pars reliqua non tam in copia apponi potest, quapropter obesi eligant calidiores, imprimis, quæ Tropici propinquiore sunt regiones; huc & referre licet aerem arte calefactum, ut balneum siccum, hypocaustum, &c. Utetiam corpulenti, & pingues facilius macrescant, cibus & potus sit parvus, ac paucus, nam abstinentia plures certè curantur morbi, imprimis verò Corpulentia nimia. Nulla enim res minuit majori celeritate & securitate pinguedinē, quàm subtractio fluidi, solidi ac humidi. Quoad qualitatem, cibus non sit temperatus, sed acris, salinus & acidus, ut incidat, attenuet, & resolvat; sic & ea, quæ vim diureticam habent, multum juvant, ut & omnia asperiora & alcalica, quæ citò sanguinem percurrunt transeuntque, inter quæ sunt acida quæcumque, ut sunt acetum, succus citri, julepi, spiritus salis, spiritus vitrioli, sal nitr. sulphuris, &c. inter acriora aromatica excellent zzyber in India conditum, macis, caryophylli, piper, sinapi, cinamomum, eruca, nasturtium, raphanus, imprimis rusticanum. Et quoniam potus Thæe habet vim diureticam, eximiam & sudoriferam, contra Corpulentiam nimiam optimum erit remedium, instar ordinarii potus assumptus. Quidam commendant aquam chalybeatam aceto temperatam. Quod si acetum à salnitr. cohobetur, &

ita fortificetur, eò convenientius hunc usui futurum esse asserit *B. D. Ettmüller*, quod ipsum obtineret pariter, si sal armoniaci modicum in nitro solvatur. De aceti simplicis, scyllitici, absynthiaci, rutacei viribus in Corpulentia nimia allegat nonnulla exempla modò allegatus Author. Sed me iudice, aurea hic regula observanda est, *Ne quid nimis!* ex acidis enim intempestivè ac nimium usurpatis in alios facillè obesos conjicies affectus periculosos, nunquam amplius curabiles, quare cum cautione hæc sunt intelligenda. Si multum habuerint alcali in primis viis corpulenti, & acida bene ferre possint, tunc res in vado erit. Vigilz nimiz & exercitia vehementiora pro corpore attenuando, & machina atterenda multum faciunt, uti exemplo rusticorum ac artificum patet, qui rarissimè corpulenti observantur, sudor enim maximè emaciat.

Quod exercenda & retinenda concernit, viæ omnes, per quas digestionum excrementa emitti debent, sint patulæ, hinc diuretica, imprimis diaphoretica conducunt, quia per hæc vias sæpè eliminantur ea, quæ aliàs carni ac pinguedini impenduntur. Mensium in scæminis obesis, hæmorrhoidum verò in viris corpulentis semper promoveantur effluxus, hinc crocus, sabina, myrrha, &c. remedia optima sunt in sexu præsertim sequiore auxilia. Rarum est, quòd beatus *Ettmüllerus* viderit mulierem delicatioris texturæ, cui croci, cum mola parva attereretur, odor diuturnior ex fonticulo cruris sanguinem copiosum effluere fecit. Veneris quoque usus hic conducit, absumentis enim spiritibus animalibus, succi nutritii copia absumentorum locum sequi debet. Quod attinet animi passiones, ad corpulentiam nimiam imminuendam multum faciunt mæror ac curæ, quæ inerastrandò succos homines graciles reddunt, quod & fa-

ciunt gaudium magnum & incandescentia concitator, per hæc enim spiritus attenuantur, eorum fluxus concitator sit, & reliqui succi aciores vel falsiores redduntur.

§. 13. *Curatio Pharmaceutico-Chirurgica* hujus affectus ut commòdè instituitur, aliorum prius de eadem percipiendum consilia. Suadent verò *Galenici* ut ad molem corporcam imminuendam frequentiores instituantur purgationes, venæsectiones, scarificationes, ac frictiones, nec non fatigationes per labores continuas, vigilias diutius protractas, balnea, victum tenuem, paucam & exsiccantem laudant, remediaque exhibent amara, calida, sudorifera, diuretica & absumentia, qualia sunt absinthium, centaurium minus, rosmarinus, juli coryli, radices polypodii, gentianæ, aristolochiæ, myrrham, gummi sandaracham, tartarum crudum, nitrum, semen fraxini, petroselinum, alumen, piper, zingiber, zedoariam, ex quibus vel decocta in vino, vel pilulas, vel pulveres parant, quibus adjungunt pulverem viperarum, & acetum aliquoties haurire jubent, potissimum verò oxymel tum simplex, tum scylliticum unà cum speciebus diaspolitici magno habent in pretio.

§. 14. *Paracelsus* curam in eo consistere ait, ut cibus detrahatur, ne in tanta copia succum ex eo confectum nutrimentum Archeus partibus carnosus & pinguibus transferat dispensetque, eaque propinat remedia, quæ portionem non parvam materiæ nutrimento partium destinatæ cito ad ostia excretionis deferant & humiditates absument, ideòque sequentem pulverem assiduò habere vult in usu.

℞. Spec. diatt. Piper. Zij.

Salir acetos.

Sal Nitri pp. aa. ʒß.

M. F. Pulvis.

§. 15. *Helmstius* Pinguedinē si-  
ve Obesitatem observavit unico bi-  
mestri

*Curatio  
Corpulen-  
tia nimia  
secundum  
Galenicos.*

*Paracel-  
sus.*

*Helmon-  
tium.*



mestri per potum diureticum, loco cerevisiæ sumtum, abactum fuisse. Pharmaca autem peregrina chinæ, zarzæ, Guajacæ, &c. quòd laticem per sudores profunderent, siçto mentitoperè titulo exsiccantium nomen acquisivisse statuit. Vidit enim Author ipse corpus, cujus pinguedo tota resoluta fuit in laticem, qui dein per lotium excretus fuit. Omnia proinde diuretica in Corpulentia ac obesitate nimia summo perè commendat. Laudat quoque liquorem acidum Sulfuris, quotidie ad aliquot guttas absumtum, quòd faciliè inferat gratilitatem.

*Vvillifum.* §. 16. *Vvillifur* ad Corpulentiam nimiam imminuendam nutrimenti partium detractionem admodum ducit necessariam, quæ non tantum cibi potusque pariori instituitur usu, sed us etiam remediis, quæ chylum fundunt, & particulis quibusdam salis & acris imbuunt, ne tam faciliè membris assimiletur, nec substantiam eorum aut pinguedinem eadem ambientem augeant; proinde præter exercitia, labores continuos, jejunia, vigiliæ, curas & sollicitudines, sadorifera & diuretica frequentius adhibere jubet, potissimum quæ parantur ex lignis aliisque exsiccantibus, nec non acidulas aliæque acida ex nitro, Vetriolo & alumine, spiritum fuliginis, salis, tincturam tartari, sal viperarum & aronatica quadam acriora ex pipere, zingibere, cinamomo cum sale abstinuit, fraxini, tamarisci, fimi columbini, lapide prunellæ. Sal quoque viperarum in potu tenui sæpius adhibere maximè laudat absque ullis aliis remediis. Alvi eductionem frequentius institutam etiam approbat per pilulas aloeticas vel tartareas, vel tincturam Jalappæ cum guttulis quibusdam paucis spiritus nitri, ut diuresis simul promoveatur. Fonticulos etiam commendat, ut cum hæc simul succus nervosus & nutritius imminuantur, quod quo

facilius succedat, una vice duos simul præcipit effodiendos, in brachio videlicet unius lateris & pede alterius, quæ remedia si studiosè urgantur, nutritionem superfluum impediri posse confidit.

§. 17. *Sylvium* quod attinet, *Sylvium* hic *Corpulentiam nimiam* a augmentum carnis musculolæ curandum vult, 1. minuendo subinde sanguinem secta vena, 2. exercendo valde ac solito diutius corpus ad defatigationem satis notabilem. 3. occupando vexandoque animum curis ac sollicitudinibus gravibus. 4. augendo vigiliæ, detrahendoque aliquid somno. 5. usurpando partem alimentæ multi, optimique succi, horumque loco fumendo, quæ minus nutriunt aut difficilius fermentantur. Corporis verò Obesitatem curat, 1. usurpando sæpius satisque abundanter condimenta quævis acris, tum acida, tum aromatica, hoc est, salsa, vel amara, quæ tam liquores glandulosos præsent acidiores, quàm bilem magis amaram, & acrem; in quem finem commendat acetum, succum citri, Spiritum salis, &c. piper, caryophyllos, sinapi, raphanum quævis, imprimis rusticorum. 2. Corpus movendo multum. 3. Animum torquendo curis. 4. Somno indies aliquid detrahendo. 5. ab alimentis oleosis & pinguis in totum abstinendo; sic enim paulatim non tantum pinguedinem superfluum consumi, sed ejusdem augmentum novum impediri promittit.

§. 18. *Cartesiani* ad imminuendam *Corpulentiam nimiam*, primam *Cartesiani* adhibent curam, ut superfluum non modò, sed consuetum etiam partibus detrahatur nutrimentum. Hoc verò cum chylus sic optimè elaboratus, & hic ex cibo & potu facilis concoctionis & probi succi perficiatur; abstinentiam & jejunia non parum facere ad nutrimenti imminutionem asserunt, siquidem in absumti locum paucum subministratur.

stretur. Si verò detractio hæc alimentorum nondum sufficiat pro liberatione machinæ humanæ vivæ ab onere tam gravi, agilitati membrorum ejus magno existente obstaculo, etiam pinguiore succos partibus firmius adhaerentes & crassitiei augentes, absorbere tentant, attenuando videlicet eosdem, & à quiete ad motum reducendo, ut particula oblongula lubricitate sua per tubulos & poros evadant, ramosiores & molles indurescant & frangantur, paxillares verò, acutæ & cuspidatæ augeantur & in priores dominium adipiscantur, quibus fermenta propria partium è benigno in statum deducantur acriore & acidiorum, sicque per arteriolas advectum liquorem chylosum magis fundant, præcipitent, & potissimum in glandulis lymphæ productionem adaugeant, qua postmodum facilius per poros cutaneos evaporetur, vel ad renes & ureteres delata copiosè eliminetur. Huic scopo maximè accommodatas esse credunt anxias curas & labores, quibus liquor nervosus sive spiritus absorbantur, quibus restaurandis dum major succi chylosi pars massæ sanguineæ sit impendendus, ut ex eadem sufficiens hauriri possit eorum penu, & circulatio liquorum valde sic reddatur concitior, materia nutrimentorum absorbatur, & elaboratio novi chyli non ita ob spirituum defectum peragitur, sed à succo pancreatico non parum eidem communicatur acidi, ad nutritionem augendam satis inepti. Itinera quoque longiora pervectiones, & potissimum navigia instituta imminutioni huic molis corporis admodum credunt proficua, magis verò si cibo & potui consueta simul detrahatur copia, ita enim per successiones in rhedis aut curtibz succos corporis non modò agitari, fundi, & lymphæ fluxum ad ureteres promoveri, aut ratione vaporum ex aqua ascendentium, & inspiratione as-

sumtorum, succos acidos in corpore augeri possunt, & portionem non paucam succi nutritivi absorbunt, sed in absorbti locum parum restitui, ut particula pinguiore in partium nutrimentum facile abire debeant. Promptius verò id peragunt, si medicamenta unà assumantur ramosas particulas frangentia, & unà cum teretibus magna copia ad renes & ureteres pel-lentia, ut per urinam excernantur, & propterea hoc in casu acidulas approbant, aliaque remedia particulis constantia acutis, assimilationem succi inhibentia, qualia sunt nitrosa, viriolacea, arcanum duplicatum, tartarus nitratus, viriololum Martis, nictum crudum, fixum, lapis prunellæ, quibus omnibus diuresis augeatur, cujus gratia lixiviosa etiam copiosius propinant, quibus succi chylosi & glutinosiores inciduntur, resolvuntur & attenuantur, ut in lympham citò facessant & per vesicam evacuentur. Non sufficiente diuresi, etiam salivationem excitant, qua chylus resolutus non minus sub specie salivæ aquosioris copiosè excernitur, eamque mercurialibus faciliè excitant. Pro majori tandem resolutione & attenuatione succorum alibilibum frequentius instituunt sudationes, quibus simul pori cutanei aperiuntur, ut succi resoluti viâ brevissima evaporentur, ideoque decocta & essentias lignorum, quæ simul validè exsiccant, assiduo habent in usu. Sed non prius hujusmodi sudorifera volunt exhibenda, quam post peractam diuresin, tum aliàs succi glutinosiores tam faciliè nequeant resolvi & attenuari, ut exhibitio sudorifero statim eliminentur, & hinc corpulentiores difficulter sudare asserunt, si absque ulla resolutione tam citò ad sudorem cogantur. Resolutis autem succis & attenuatis, simulque poris cutaneis apertis, exhalationem eorum sponte etiam subsequi, per insensibilem transpirationem

tionem confidunt. Purgantia in hoc potius morbo, quam in ullo alio, concedi posse annunt, cum glandulas intestinales fortius irritent, ut lympham contentam effundant, qua amissa, alia ex vicinioribus assiduò affluit, simulque succus chylosus in ipsis intestinis hærens à lymphâ hac glandulari acriori reddita cum scybalis durioribus eliminetur, antequam pervasa lactea ad commune devehatur receptaculum. Per amara quoque diutius usurpata pinguedinem simul absumi, & prohiberi credunt, ne nova tam facillè colligatur, quibus si falsa adjungantur, scopum hunc citius attingi referunt, quapropter, cum essentia abanthii, vel centaurei minoris, vel corticum aurantium, vel tinctura myrrhæ spiritum salis, vel clystum minerali commiscunt, & quotidie serinè ad scrupulum unum vel drachmam dimidiam propinant. In morbo demum contumaciori etiam millepedes & cantharides in usum ducere cum aliis consueverunt.

5. 19. Præmissis his curationem nostram aggredimur, initio facto, secundum triplicem methodi mendum indicationem: à Curatoria malum ipsum respiciente exordientes, & cum contrariis contraria curantur, ut impedimentum & periculum sanitatis ac vitæ, quod sæpe ex Corpulentia nimia impendit, auferatur, eò incumbendum est, ne nimium generetur nutrimentum, vel genitum & superfluum per consuetas vias eliminetur; ut tubuli seu fibræ tanquam solidæ partes nimis laxæ & extensæ, aliquonodo constringantur, & quasi exsiccantur, ut ita contractiones fiant, & ob poros interceptos angustosque nutrimentum excludant. Alimenti copia ut impediatur necesse est, minuendo assumendorum quantitatem, & emendando eorum qualitatem, ne adeò sint temperata, alterando sub digestionem chylum, ne adeò infi-

gniter nutritivus, sed potius sudoriferus ac diureticus generetur, reddendo massam sanguineam ex dulcescente acrem, asperam & salinam, sic enim citius eliminari potest. Genitus enim succus nutritivus seu assimilatus attenuatur, resolvitur sive liquefcit sive evacuat ex corpore, sive per alvum, sive urinam, sive sudorem, sive salivam, sive insensibilem transpirationem. Abundantia enim succorum seu copia uber, redundantia sine tumore vasorum & morte existere nequit, quare hanc expungere oportet, cum ejusmodi tumor, & quæ inde consequeretur vasorum ruptio non appareat. Quid quod succorum indies consumtio tanta sit in transpiratione, sudore, alvi ac urinæ ejectione, ut nulla videatur fames, digestio nulla, nulla denique tam magna ingurgitatio cibi potusque incidere posse, quæ abundantiam vel minimam, taceo eam, quæ per dies aliquot aut menses totumque morbi cursum perseveraret, efficiendo induceret. Addemus ex pleniori victu aut crapula copiam humorum gigni, quamdiu erit? Sanè vix uno vel altero die, & levis inedia eam prorsus dissipabit. Quin imò si copia succorum peccaret, una venæsectione purgationeque, vel una quæ copiose evacuat, morbus protinus tolleretur, cujus tamen rei nullum est inter observationes exemplum, nullum ab omni memoria repertum. Verum opponunt adversarii, suppressi evacuationes, hinc colligi in vasis humores, sed quænam supprimuntur? an transpiratio? Sanè ea non potest sisti absque vitæ extinctione; Jam Urina ubi sistitur? in in una Ischuria sæpe lethali. Alvus fætor, sæpe constringitur, verum quæ hinc evacuantur, nullo numero sunt. At ne quis dubio locus sit, statim dirimit omnem litem, ad pondus enim librati qui in morbum inci-

dunt

Nostra  
ratio cu-  
rândi Cor-  
pulentia  
nimiam.

dunt, suntne ponderosiores, quam erant dum erant sani? Nequaquam, sed leviores reperiuntur, & hoc magis, quo diutius agrotant. Itaque humores abundantes aut nullum habeant pondus, aut nulla sit abundantia, necessum sit. Certe ergo est nostra experientia, de 8. libris assumptorum tandem duas in nutritionem nostram converti, reliquas vero, & quidem potissimum per insensibilem transpirationem ac reliquas vias externi: quia consumtio per cutem, renes & alvum non desinit, aut si alvi intermittit, raro locum, nunquam vero transpiratio supprimitur. Quid quod si ad ea attenderis, quæ agunt ægri, antequam conqueruntur, comperies ira plerumque eos se componere, ut plus consumant, quam instaurent etsi quotidie bibant & vorent, uti deinde clare conficiemus. Tandem pondus ad stateram dubitare nos nequaquam sinit, quia ex victu pleniore vel crapula plurium dierum, imò mensium aut annorum nemo fit ponderosior, omnes vero plus minus leviores. Notum est lippis & tonsoribus, quod corpulentia maximè tollatur sub febribus ardentibus, item in Scorbatica salina atrophia, ubi omnes succi corporis sunt acres ac salini, à calore exedente præsertim febrili liquecere contenta quælibet, & attenuari magis, oleosè plus minus cum sint texturæ, non secus ac ipsa pinguedo nemo facile inficias ibit. Ad Corpulentiam abigendam, ergo proficua erunt quæcumque acriora assumpta medicamentosa ut aromatica, salina, ac acida, ac credo omnis est vel acida, vel salia. Diuretica etiam optima sunt, per urinas enim quosdam omnem suam Corpulentiam exuisse, *Helmontius Tr-jus duumvirat. §. 59.* jam dudum agnovit, & id confirmat diabetes, quæ correpti, emaciari solent: hinc ex pinguedinis aut roris chylosi liquet facti cum salibus urinariis

missi mutua temperata, & in dulcedinem vergente textura urinæ diabeticorum miram dulcedinem derivandam vult *B. Ettmullerus*.

Diaphoretica positiva sic dicta corpulentos emaciant, hinc illi, qui dicta lignorum sudorifera utuntur, extenuantur, ut & illi, qui vehementibus laboribus vel exercitiis corporis sudorem exulando crassiores eviunt habitum, ut & ægotantes, qui valde sudant, macres fiunt. Purgantia vehementiora & aciora maximè corpora attenuant emaciantque, eæ videre est in illis, qui vel diarrhœa & dysenteria diutius laborant. Per pylissimum corpora etiam insigniter emaciari testatur lues Venerea, per Mercurialia crebra salivatione curata, præter summam enim Mercurii per quosvis poros meatusque penetrantiam, acerrimum ejus Sulfur æternum penitus destruere potest & superare Sulfur animale coagulationem nutriti, seu ab ejusdem acrimonia adeo mutari concretum coagulati alimenti mollioris pinguedinis & carnis, & coagulatore destructo concretum resolvatur in liquaminis viscosi consistentiam, hinc per convenientia cribra transcolandum & exedendum. Ad alterandam ergo Massam sanguineam, eamque attenuandam, ac resolvendam, laticem serosum, eiusque contentam gelatinam chylosam fundendam ac evacuandam, & sic Corpulentiam nimiam imminuendam, diximus convenire Purgantia, inter quæ tamen delectus instituendus, ne aciora exhibendo magis lædamus, & pro attenuatione corporis mortem acceleremus obesis; hinc rejicimus helleborina, scammonia, colocynthiaca, elateria, ac ejusmodi venena potius quam medicamenta, quomodo verò hæc corpori nostro nocere possint, vide *Epistolam nostram secundam ad Celeberrimum Dn. F. Waldschmidium datam.*

*datam*. Blandiora tamen aloetica, quæ vim exsiccandi habent, ut sunt pilul. Francosurtenf. aloephang. Classian. &c. in hunc finem concedi possunt cum myrrha mista, quæ uti alia amara, deterfiva quasi sua amaritæ succos attenuare & dissolvere simul, bilem acueret & sic acriorem & amariorem chylum reddere queunt, quo major enim bilis acrimonia, cò nutritio minor est, hinc bilioli raro sunt corpulenti, & pilulæ aloeticæ quæcumque, item ex aloeticis parata Elixiria, Extracta, nec non ex Rhabarbaro, aloë & agarico parata insigne hic præstabunt commodum, unde nemo mirari debet, quòd pilulas ex amaribus paratas ad ßß. singulis matutinis sumendas adeò suadeat *Platerus Prax. T. 3. p. 51.* quæ sequentes sunt.

℞. Rad. aristoloch.

gentian. aa. ʒj.

rub.

Sumit. cent. min. aa. ʒß.

O crud. ʒj. c. succo

Polypod. f. Massa.

Inter Diuretica aliis præferimus Tartarea & nitrosa, hinc conducit Ra Nephritica *Morbii*, & nostra ad Calculum ex Tart. & nitro confecta, ut & arcanum duplicatum, quod sequenti modo parari potest.

℞. Capit. mort. ex destill. Acq. flyg.

q. pl. cum Acq. extraxe Sal.

Vel:

℞. Sal nitri part. iij. vel iv.

Vitrioli Hungar. p. j.

Funde in Crucibulo & initice fl. sulf. ad depurat. tunc refrigeretur, Acq. solvatur, filtretur, & inspissetur.

Vel:

℞. Vitrioli in Acq. solut. q. p.

Sal Tart. v. l. Sal nitri fix.

in Aqua resolut. q. s. ad punctum

saturatæ filtra & evapora.

Sic etiam contra Obesitatem sequens diureticum egregium est.

℞. Sal volat. succini part. ij.

Lapid. prunell. p. ij.

Salnit. fix p. ʒ.

Tomus II.

M. dosis a gr. x. ad xx.

Vel:

℞. Sal nit. ʒij. fluant,

add. sulf. ʒß. deflagret,

adde Sal Armoniaci ʒj. deflagret.

Acetum etiam siccum *Billichio* sic dictum commendatur à pluribus, nempe Tart. seu Sal istud enixum, ex acido vini & fecibus ejus alcalinis oleosis solutis enatum, quod potenter absorbet pinguedinem. Alii commendant instar panaceæ contra Corpulentiam nimiam pulverem ex Tart. depurat. & cymarum seu julorum Coryli verno tempore excrefcentium aquali portione paratum, mane & vespere sub introitum læti, quantum cusps cultri capit, aceto prius irroratum assumendum. *Forestus* sequente pulvere aurifabrum se curasse narrat.

℞. Tart. ʒij.

Cinamom. ʒij.

Zzib. ʒj.

Sacch. albiss. ʒiv.

M.

Terra foliata Tart. elegans est remedium, post quod vel primum locum sibi vendicant Vitriolata, sic oleum vitrioli super fult. Antimonii effusum, indeque per retortam destillatum egregium est, cujus destillati guttæ 8. vel 9. in Acq. rosarum assumptæ & sæpius reiteratæ cujusdam viri obesitatem, qui 4. ulnarum circumferentia habuit, in tantum diminuit, ut 5. ulnæ quadrantum majoris redditus fuerit, curatam notavit sæpius laudatus *Etmullerus*. Acidula quoque Martiales, vitriolacæ, nitrosæ maximè conducunt in obesibus, quia per urinam & sudorem eliminant chyli portiunculas, ceu patet exemplo casus primi l. 6. Dn. a Guldenklec. Nec Theriacæ exsiccatæ potæ & probalisco adhibitis inutiles erunt, imprimis Embesicæ & Carolinæ, quæ hodie magno in usu sunt, extrinsecus enim admotæ stringunt & corrugant plus solito relaxatas fibras, arctantque & angustant partium tubulos,

B quo

quo ipso copiosioris nutrimenti receptio necessariiò impeditur. Ex regno vegetabili præ aliis commendamus potum Theæ, qui omnibus indicationibus satisfacit, alvum enim sollicitat, urinam & sudorem movet, maximè enim est nitrosus, nostraque experientia constat, hoc potu, addito simul femine fraxini, quendam ad duas ulnas in circumferentia fuisse medicentiozem inde ad dimidiam ulnam redditum. Sic etiam succus betulæ, semen urticæ cum melle mixtum, item Terebinthina cum saccharo, gummi Juniperi, vel pilulæ ejus Mynsichti ceu insigniter diuretica & deterfiva contra obestatem maximè laudantur. 'Ra Diureticam sequentem tanquam experientia sæpius hoc in casu utilem repertam commendamus junioribus Medicis.

R. Milliped. ppt.

Appum ppt.

Cicad. ppt. aa. Mß.

Cantharid. P. ij.

M. F. Pulvis, & 'Ra cum liquore Sal nitri fixi hinc cum Spir. Vin. extrahatur Detur à guttis x. ad xv.

Inter Sudorifera commendamus varia ex lignis parata, quæ attenuando Massam sanguineam, ejus circulationem rapidiorem reddunt, unde superfluum alimentum, seu succus nutritius sensim liquefactus, lymphæque denuò imbibitus, sensim per poros corporis excernitur: hinc præter decocta Delicationibus sequentem præscribimus Essentiam lignorum ad xxx. guttas sæpius exhibendam:

R. Lign. sancti. lb. ß.

Cort. ejusd. ʒiij.

Sassafras ʒv.

Sarsaparill.

Ligni buxi & pini aa. ʒiij.

Santal. rubr. & citr. aa. ʒj.

Lign. rhod. & nephrit. aa. ʒß.

Bacc. Juniper ʒvj.

affund. liq. Sal fixi q. s. f. 'Ra longiore digestionem, quæ rursus Spir. Vin. rectif. extrahatur.

Spiritus verò sequens Catarrhalis noster egregias possidet vires in Corpulentia nimia abigenda.

R. Spir. C. C. volat. opt. ʒviij.

Oliban.

Massich.

Myrrh. aa. ʒiij.

post 24. horarum infusionem destil.

Dosis est à guttis 20. ad 60.

Sequens pulvis Ferdinandi Imperatoris contra Obestatem à pluribus magni æstimatur.

R. Pulv. Sarsaparill. ʒj.

Coriandr.

Anis.

Cinamom.

Caryophyll. aa. ʒij.

Calam. arom. ʒj.

Tartar. ʒß.

Sacchar. alb. q. s. f. Pulv.

Salia volatilia more recepto in mensa a cipi possunt, imprimis Sal C. C. volat. vel succin. quod est optimum sudoriferum & potens Diureticum. Ex Antimonialibus sequentiæ egregia sunt, cum per sudorem & urinam opem ferant. 'Ra Antimonii Tartarificata optima est, hæc tamen juxta præparationes variat, omnes quidem continent Sulfur, sed magis vel minus fixum hinc quoque 'Ra vel cathartica, vel diaphoretica, vel diuretica, & temperans paratur; sequens verò hic optimè conveniet 'Ra Antimonij alcalina dicta.

R. Antimonij crud. pulv. q. s.

Liq. Salnitri fixi q. s. ad eminent. 8. digitorum transverborum, diu digere. 'Ra decantia & elice cum Spir. Vin. rectificato.

Vel:

R. Antimonii crud. q. v.

irrota Spir. Vr. vel Sale volatili liquido, & admoto Aqu. excrefces Sulfur, quod collige & extrahes cum Spir. Vin. rectificato.

Vel sequens 'Ra Antimonii Regulina.

R. Reg. Antimonii part. j.

Sal nitri part. iv.

redigantur in pulverem, qui deo-



detonetur, hinc cum Spir.  
vin. rectif. f. Ra. Sic etiam ex  
Antimonii crud. part. j.  
& Sal nitri part. iv pulverifat.  
& detonat. cum Spir. Vin. re-  
ctif. paratur Ra elegans.

Pulveres viperini tam simplices  
quàm compositi non minùs condu-  
cent, hinc novimus Medicum  
quendam Empiricum illas pro uni-  
versali remedio venditantem, &  
modo in forma Eleſtuarii, modò  
in forma pulveris exhibentem, im-  
primis pro magno arcano æſtiman-  
tem: Eleſtuarium in omnibus  
morbis conducibile quod paratur  
ex confeſtione alkermes, paucis  
gurtis Spir. Vetricoli, Specif.  
Cephal. & pulvere viperino, sed  
ut audio fama ipſius cum pulvere  
expiravit, & in auram avolvit  
cum promiſſis ſuis magnis & au-  
dacibus.

Quod attinet reliquas Chirurgi-  
cas Operationes in Obefitate nimia,  
abdominis ſcilicet incifionem, pro  
imminuenda & tollenda, ſeu ex-  
trahenda pinguedine, cujus men-  
tionem facit Plinius l. 11. c. 37. dum  
inquit, L. Apronii Conſularis viri  
filia detractor adipis, levatumque  
nec corpus imm-bile onere: eam tan-  
quam impoſſibilem & periculoſiſ-  
ſimam, nec unquam inſtitutam,  
reiciimus: venæſectio verò ad im-  
minuendum chylum, & ſic ema-  
ciandum hominem per vices in-  
ſtitui poteſt. Sic & fonticuli & ſe-  
tacea hoc in affectu laud proſcri-  
benda, ſed potius in uſum vocan-  
da ſunt; hæc enim promiſcuè quic-  
quid inveniunt humoris alluentis  
colliqueſcere faciunt, & ita etiam  
ſucceſſivè ſuccum nutritium in for-  
ma liquaminis purulenti exhau-  
riunt. Fames verò & labores cum  
animi paſſionibus frequentibus,  
imprimis mœrore, terrore, &c.  
egregia remedia ſunt ad obefos ac  
corpulentos reddendos macilentio-  
res. Tabacus etiam facit ad im-  
minuendum corpus. Omnia amara,  
ſalia volatilia, ſal volat. viperar.  
Eſſent. abſynth. C. pilulæ de ſanda-

racha Myſſ. aliis palmam præri-  
piunt, ut & Zziber in India con-  
ditum, aliaque aromatica in In-  
dia ſolennia, quæ ibidem inter  
potum Theæ maxima in quanti-  
tate aſſumuntur, hinc Indi  
ſunt ſerè omnes macris textu-  
ræ.

## CAPUT II.

De Inflammatione, Abſceſſu & Sinu.

## §. I.

Succorum in corpore noſtro  
exiſtentium motus inordinatus,  
aut varia ejuſdem tardatio, non  
tantum viſceribus gravia impor-  
tat mala, ſed externis etiam ar-  
tubus. Quando enim contingit,  
ut hæc vel illa in parte membro-  
rum ob ſtagnationem ſanguis cum  
reliquis liquoribus diutius, quàm  
par eſt, ſubſiſtant, in tantum di-  
verſarum in iſdem commemorantium  
particularum motus intellinus au-  
getur, in quantum progressivus  
imminuitur, non ſine noxa par-  
tis illius, cui ſtagnatio iſta ob-  
venit inſigni, quippe poris ita à  
particulis craſſioribus obſtrudis,  
ut globulis cœleſtibus tranſitus de-  
negetur, igneæ particulæ ſubtiliſ-  
ſimæ tanro partes contentas cum  
continentibus percellunt furore, ut  
magnum aliquando ſuſcitetur in-  
cendium, quod conſueſto no-  
mine Inflammationis Medici indi-  
gant.

Eſt autem Inflammatio partium  
externarum, affectus, qui quoti-  
die in præxi occurrit, & Græco  
nonine Phlegmone exprimitur, in-  
terdum etiam Phlogofiſis nomina-  
tur, quando ſcilicet immodera-  
tus accidit calor in partibus præ-  
ſertim ſuperioribus, & ſpectatim  
in facie, ſed ſaltem momenta-  
neus, abſque tumore, qualis  
ſcorbuticis frequens eſt, de quo  
affectu ſuperius abunde egimus in

Inflam-  
matio.  
Phlegma-  
ne  
Phlogofiſis.

capite de Morbis Faciei; stricte verò denotat tumorem in partibus ut plurimum carnosus, cum rubore & dolore, à stagnatione sanguinis & reliquorum succorum in tubulis suis vel ex eis, vel extra eos in alienis evasorum, & sic ordinem in motu turbantium productum. Aliter etiam describi potest, quod sit partis cujusdam tumor extraordinarius, à sanguine aliisque succis in ea stagnantibus & ebullientibus obortus. Vel dici potest rubedo partis alicujus inordinata. Exacta definitione ad leges Logice non opus est Chirurgi ad curandum ægrum, cum Scholasticis istis tempus inutiliter tantum teratur. Varia nomina ulterius & quidem pro ratione loci, in quo hæret, aliorumque accidentium imposita fuisse à veteribus. Voluerit etenim Græculi posteriores & illi, qui in scholarum pulvere consueverunt, quum rerum scientia veteres superare non possent, magna verborum strue, quibus umbraticam *doctrinam* ostentabant, luxuriare, & per vocabulorum myriades sæpius rem obscurare, non enim res, sed nomina sæpissime absque necessitate multiplicarunt. Dividitur in partium internarum & externarum inflammationem, illa plerumque est erysipelacea & malignis febribus aliisque communis. Veteres quoque distinxerunt in legitimam, quæ à sanguine puro, copia tantum peccante, oritur; & spuriam, quæ à sanguine heterogeneo, vel bilioso, vel seroso ciudo provenit, qua tamen distinctione non opus est, quia constat, sanguinem non solum, sed unà cum aliis humoribus, quibus permixtus est, evasari.

*Abcessus.* Abactis per diuturniorem succorum stagnationem particulis eorum subtilibus, spiritibus nempe & salibus volatilibus, crassiores artius junctæ miscelam exhibent, quæ partem, in qua hæret, distendendo *Abcessum* producit, & quam-

vis vocabulum hoc satis generale sit, omnem tumorem humoralem denotans, cujus causa in aliqua membri cavitate ab humore extraordinarie collecto parata, & observatur: Specius tamen & *Abcessus* illud *Abcessus* genus hoc loco indigat, cujus materia purulenta est. Dicitur & *Apothema*. *Abcessus* enim est à verbo abscedere, unde partes antea unitas abscedere indicat, quæ in saniem abeunt. Describi potest *Abcessus* quod sit Tumor in quo pus vel aliud extraordinarium lateat, & cum sanie permixtum, ex abscedentibus fibrillis, laceratisque vasculis. Sicque *Abcessus* est purulente materię, ex humore stagnante, Tumorem excitante, in partis alicujus cavitate collectio.

Vocabulum *Abcessus* latius etiam fimitur, & denotat contumacitatis vel contumacitatis solutionem, quæ fieri solet in Crisi imperfecta sic dicta à materia morbifica ad aliam partem vergente, collecta. *Abcessus* verò nostro sensu denotat, ceu diximus. Tumorem, cujus materia collecta chylosa ob acidum latens & stagnatione elicitum in pus aut in saniem abit. Distinctio inter *Abcessum* & *folliculum*; sunt enim hujusmodi tumores in quodam folliculo & membrana inclusi, quorum materia, vel speciem pulvis, ut in *Atheromate*, vel mellis, ut in *Meliceride*, vel sevi, ut in *Steatomate* præ se fert, de quibus particulari Capite inferius agemus. Nonnunquam etiam in *Abcessibus* reperiuntur piluli, ceu exemplum Curiosis in *Eph. German.* communicavimus, item carbonēs, testæ, item plus centura lapilli excreti, ossicula, amurcæ, lutum, lapides, chartæ, vermes, araneæ, lacertæ, ranæ, bufones, &c. de quibus omnibus videri possunt *Ephemerides nostræ Curiosæ*. & quidem ipsarum Annus 4. & 5. Obs. 189. Quin non tantum superius dicta, sed insignis variorum humo-



## CAP. II. DE INFLAM. ABSCESSV ET SINV. 21

morum varietas in apertis abscessibus interdum observatur, quorum alius amurcam, alius vini feces, alius aliud quid refert cum deterimento saepe fetore. *Abscessus* etiam duriores inficit partes, hinc *Abscessum* ossis observavit *Bartholinus Aët. Hæffn. Volum 1. Obs. 8.*

*Sinus.*

*Sinus* nihil aliud est Chirurgis, quam *Abscessus exulceratus, inveteratus*, quando nimirum in medio carnosarum partium tumor ut plurimum chylosus cum sanguinis effluxu stagnat, & acrimonia salina sibi exitum quaerit, & simul fibrosas partes in liquamen putridum abire facit. *Sinus* est ergo cavitas in carne, producta à pure in quadam parte diutius stagnante, cujus orificium strictius est, interior verò illius cavitas amplior & latior existit; & in quo cutis adjacens carni subiecta non coalescit. Differt hic affectus à *Fistula*, partim flexuositate, partim callositate, quæ in *Sinu* haud occurrunt, hinc & aliis dicitur *Plenus Sinuosus*; & reverà nihil aliud est quam *Ulcus*, & non opus fuisset distinctionem hanc, me iudice, in forum Chirurgicum introducere. Inflammationis status est talis, in quo pori partium solidarum ita ocluduntur, ut materię subtilis ensibiliter acceleretur transfluxus, cum dolore tensivo, pungente vel scindente, rubore partium, aliquando cum aliquando sine febre.

*Parti affecta.*

§. 2. Omnes ferè *Partes* hi affectus occupant, præprimis verò musculosas; Musculi verò ex arteriis, venis, fibris tendinosis & nervosis constant. Primò tunicæ illorum externam superficiem pervagantur, illumque pertundunt. Penetrata illa, statim in subtilissimos ramos distribuuntur, qui fibris tendinosis inosculantur. Nervi aliquoties tendines subintant, & interdum musculosum ventrem. Postquam in quancum.

que ingressi fuerint partem, percipiuntur semper fines ramorum ipsorum fibras tendinosas attingere. Hæc omnes fibræ tendinosæ cavitatem habent, illas siphonis instar percurrentem. Musculi omnes subtilissima obducuntur membrana, adeò ut tria partium genera compositionem Musculorum ingrediantur. 1. Copiosæ venæ & arteriæ in iis apparent. 2. Nervi & 3. tandem fibrillæ, quæ nec sunt arteriæ, nec venæ, nec nervi, sed fila quædam oblonga, tenuissima & tamen robustissima. Modus, quo fibrillæ istæ in musculis sunt dispositæ, quidpiam continet notatu dignissimum. Statim enim in unum coactæ occurrunt, & tum temporis funiculum exhibent, deinde à se invicem desciscunt & inter se varias arteriarum & venarum ramos recipiunt: Denique in unum coalescunt, & funiculum rursus conficiunt. Prior & posterior funiculi tendines, sive caput & cauda musculorum vocatur. Pars illa quæ inter caput & caudam jacet, & in qua fibræ tendinum à se invicem disjunguntur, & ubi inter se arterias & venas admittunt, Venter Musculi dicitur. Inter fibras has membranaceas & tendinosas oriuntur ut plurimum *Inflammationes, Abscessus & Sinus*, quæ & sæpe ipsas glandulas tum conglobatas, tum conglomeratas, imo nonnunquam interiora occupant viscera quæcumque, de quibus tamen hic non tractabimus, cum in capitibus specialioribus satis jam fuerint explicata; hic verò de affectibus externarum partium simus dicturi. Ubi, cumque his in partibus dantur intersticia, in quibus sanguini extra vasa aliquid peregrini confundi potest, & sic necessariò stagnat, ibi etiam *Inflammati* locum habet; frequenter tamen est in partibus membranaceis. Hinc pro loci varietate Veteres peculiare nomen imposuere, & propterea aliquot *Inflammationum* nomenclaturas recensebimus. Ubi igitur *Inflammati*

adnatam oculorum tunicam defec-  
 dat, *Ophthalmiam*, si palpebræ ci-  
 lium, *Epiphoram*, si solum oculi  
 interiorem versus nasi radicem an-  
 gulum, *Alegilopa*, & hinc exor-  
 tam excisionem, Sinum & *Rhyadem*  
 nuncuparunt: in auribus *Exanthlas*,  
 in glandulis pone aures, *Parotida*,  
 in gingivis *Parulidem*, in fauci-  
 bus *Anginam*, &c. Si in externa cu-  
 te apparet retinens cum pulsatione  
 dolorifica tumor, Inflammatio &  
 Phlegmone *αἰκμή* vocatur; quæ si  
 mitior, *Oedematodes* dicitur; cui  
 si ardor jungitur, & dolor & ru-  
 bor latè se extendat, *Erysipelas* est,  
 cui si ardor est intensus & per vi-  
 ces, *Phlogosis* seu *ignis sacer* erit.  
 Externarum & inflammationum no-  
 mina iterum subdividunt, & his  
 ipsis nova condunt nomina, sæpius  
 etiam barbara, quibus eas insigni-  
 unt, magna calliditate verborum  
 itrophis sibi erudittonis famam ca-  
 pantes; hinc in glandulis emer-  
 gens Inflammatio *Phygethon* seu *Pa-  
 nus Phyma*, *Bubo*, *Anthrax* seu  
*Carbunculus* vocatur; subtus cu-  
 tem Ecchymosis est, sub Ungui-  
 bus *Paronychia* seu *Reduvia*: in  
 Pede *Pernio*. Huc refer Furuncu-  
 los, Epinyctides, Herpetes, Pu-  
 stulas omnes, scabiem, ejusque  
 species, Achores, Tineam & om-  
 ne ulcerum ac Apostematum ge-  
 nus, Steatoma, Atheroma, Meli-  
 ceridem, nec non Gangrænam &  
 Sphacelum, quæ cuncta non tam  
 reapse, quàm loco, gradu, no-  
 mine, colore & similibus acciden-  
 tibus differunt, & nihil aliud sunt,  
 quàm *Inflammatio* ejusque effecta.  
 Si quis verò Nobis obiciat. Nos  
 ipsos methodum hanc tam strictè  
 non esse secutos, is sciat, junio-  
 rum Medicorum captivos accom-  
 modasse, ut de quacumque parte  
 morbis occupata latius & accura-  
 tius differuerimus, & quodd medi-  
 camenta interdum pro loci varieta-  
 te fuerint varianda, hac de causa  
 placuit *Veterum* insistere ordini, ut  
 à quolibet omnia ritè intelligan-  
 tur.

§. 3. Ut in cognitionem mor-  
 borum præsentium ritè pervenia-  
 mus, ad *Signa Diagnostica* ani-  
 mum sedulo advertamus. Id quod  
 Inflammationem dicimus, est acci-  
 dens partis alicujus, in quâ obser-  
 vatur tumor, calor & rubor, cum  
 pulsatione & dolore. Tumor orit-  
 ur, si in loco aliquo in tubulis  
 angustioribus succus quidam sta-  
 gnat, & inde canaliculi obstruun-  
 tur & liber succus denegatur transi-  
 tus, unde quidam tubuli tamdiu  
 distenduntur, donec rumpantur &  
 sic succum intus contentum effun-  
 dant, qui succus stagnans tumo-  
 rem & tensionem efficit. Et quo-  
 niam ubivis, ceu sæpius dictum,  
 arteriæ & venæ in partibus muscu-  
 losis exsunt, quæ tunc per evasa-  
 tum succum in loco, ubi pars in-  
 tumescit, copiosius expressum ma-  
 ximè comprimuntur, arteriarum  
 inde oritur pulsatio, quæ aliàs ar-  
 teriis existentibus liberis tam vehe-  
 mens non percipitur: Similiter  
 eum sanguis quasi vi transeat &  
 circuletur, hinc necessariò calor  
 intensior oriri debet, qui non ad-  
 esset, si sanguini ac reliquis succis  
 liber concederetur transitus. Ad hæc  
 à pressione ista sanguinis violenta  
 per angustiores & exterius coarcta-  
 tas arterias & venas, non tan-  
 tum oritur pulsatio & calor, sed  
 etiam dolor, dum scilicet mem-  
 brana & fibrillæ tendinosæ violen-  
 tia quasi premuntur, & tenduntur,  
 imò sæpè planè dirumpuntur, hinc  
 dolor diutius abesse nequit, par-  
 ticulæ enim acriores spiculis suis  
 partes membranaceas vellicant, quæ  
 fibrillis nervis impactæ eas vehe-  
 mentius vibrando concutiant, quod  
 dum ad nervorum principia usque  
 continuatur, sensorium commu-  
 ne eo, utpote inconsueto, vehe-  
 mentius movetur, & cum aver-  
 satione tristitem sensationem, rup-  
 tionis periculum tum minitanti-  
 tum sæpius afferentem, anima re-  
 cepit, quam perceptionem ad sen-  
 sum relatum dolorem vulgò nun-  
 cupamus: qui pro ratione partis  
 affe-

affectz, modi afficiendi, sanguinis & particularum concurrentium pungens, rodens, lacerans, lancinans, contundens, gravans, comprimens, distendens, ardens, pulsans in illa parte esse creditur, ex qua vibratio, pressio, & concussio fibrillarum nervearum ad sensorium commune resultat. Magnam Inflammationem etiam febris comitatur, quod liquores in parte inflammata alterati, per ductus venosos reliquæ massæ sanguineæ commixti heterogencum quendam motum in ea suscitent, similique labe inficiant, ex qua miscela inordinatâ febres resultant, sæpè inflammatoriz dictæ. *Inflammatio* ergo signa sunt, ut breviter comprehendam, calor, dolor, rubor, febris, tenitencia & partis pulsatio.

*Diagnos*  
*Abscessus.* *Abscessus.* Signa Diagnostica quod spectat, alia fientem, alia factum designant. Fieri illud patet ex *S. 2. apb. 47. Hippocratis*, quod nimirum calor, dolor atque pulsatio in parte augeatur: facti verò seu puris confecti plures circumstantiæ sunt, sc. primò, si jam dicta accidentia parum remittant, imò tumor etiam aliquantum subsideat; dein si duobus digitis se haud contingentibus tumor contrectetur, ita ut unus illorum leviter premat, alter suspensus magis teneatur. Si materia intus contenta sufficienter maturata, seu ut loquuntur, cocta, ejus fluctuatio & motus quidam, per quem illa de loco in locum propellitur, sub altero & quiescente digito percipitur. Inflammatio etiam ut antè, non adeò est intensa, nec ad rubedinem inclinât, sed subalbet. Tandem in eminentiam fastigiata & quasi mucronem tumor abit, cujus rei ratio dari potest, quod cum partes Apostematis laterales aliquomodo decumescant, & subsideant propter materiam illas hætenus distendentem, nunc verò ad Sinum Apostematis depositam,

hæc illum tanquam sui receptaculum distendat, atque elevet ad illam quidem plagam, i. e. partem supernam atque exteriorem, ubi levius est obstaculum. Signa ergò Abscessus sunt: vel ipsius fientis vel ejusdem facti. Inflammationem in Abscessum converti denotant dolor & palpitatio in parte cum febre: Ipsum verò factum designant calor imminutus, dolor sedatus, tumor in mucronem elevatus, mollescens & albescens, ac pus sub digito fluctuans, nisi pars sit crassa, vel materia profundè nimis lateat.

Abscessus sæpè latent circa partes absque calore, dolore ac rubore prægressis, sed cutis cum sana cute colore convenit, hinc plures Chirurgi sunt, qui vel pro fungoso, vel Emphysematico, vel alio agnoscunt tumore, & eos aperire non audent: hinc pus quod sensim ac sensim colligitur, plures tubulos, imò & sæpè ligamenta absomit, quare Chirurgos hic omnes moneo, ut ritè cognoscant prius humorem, & si ex mollitie ejus pus suspicetur, id propediem facta incisione emittant, ne pars sincera à puris acrimonia lædatur. & tumor evadat incurabilis. Plura enim ejusmodi novimus exempla, hinc non sæpè valet regula illa Chirurgorum. *Quod nulla suppuratio fieri possit absque inflammatione, rubore ac dolore partis.*

*Sinus* facillè cognoscitur ex Abscessu scilicet exulcerato & inveterato, vel si nulla callositas observetur, ut in Fistula. Si verò latera fuerint callosa ac dura, tunc propriè *Fistula* appellatur, hoc enim solo differunt *Fistula* & *Sinus*. Sinus est vel rectus, vel obliquus, magnus vel parvus; cavus vel superficialis, acclivis aut declivis. Acclivis est, cujus os vergit sursum, fundus deorsum, declivis contrâ. Quoties in magnis Abscessibus pus diutius stagnat, sive quod

*Diagnos*  
*Sinus.*

tardius aperti, five negligentius mundati fuerunt, morà longiore corrumpitur, vicinasque carnes ac fibras tendinosas exedit, inde ulcus efficitur Sinuosum. Si ulcus uniri non potest, & caro sit spongiosa seu fungosa, si ulcus saniem reddat nigrum & oleosum, si linteamina, quæ sicca imponuntur, quoties remouentur, graveolant, hinc Sinum adesse denotant.

Sinum ergò in parte quadam, Abscessu antea afflicta residere dignoscimus, primò ex eo, quòd orificium, cujus consolidatio inducta fuit, brevi post aperiatur, & materia ichorosa vel illo prodeant. 2. ex eo, quòd turunda, quæ statim in angustius orificium inducta fuit, deinde in amplam cavitatem impellatur.

5. 4. *Causa proxima Inflammationis* existimatur *Galenicis* ipse sanguis, & quidem in exquisita bonus & purus, in spuria verò non ita bonus & purus, sed mixtus cum copia quadam humorum aliorum, unde contingat, quòd interdum lenior sit, interdum or, interdum tenuior, interdum crassior, nec moderatus uti in exquisita deprehendatur. Adeò quoque multus ab iis putatur sanguis hic, ut non solum vasa magna, sed etiam parva distendant, & quæ prius evidentia non erant, apertè in conspectum veniant, unde cum nequeat ob copiam contineri, ex vasis roris modo effundatur, & à parvis foraminibus proximarum partium, maxime laxiorum, uti musculosorum & glandulosarum combibatur. Ad causas antecedentes referuntur pariem mittentem validiorem, tum partem recipientem imbecillio-rem, quam imbecillitatem vel naturalem esse dicunt, vel adventitiam. Ad priorem referunt substantiæ laxitatem, canalium ad ipsam pertinentium anplitudinem, & sicut in loco inferiori. Posteriori attribunt, quando pars vel nimium dolet, vel nimium calet,

unde debilitata ab aliis partibus sanguinem, quamvis non adeò redundantem, ad se allicit. Dolere partem docent, quando vel vulneratur, contunditur, luxatur, frangitur, distenditur, vel vehementem sentit frigoris vel caloris appulsus; dolorem verò istum cum natura illa, quam ferè in cunctis adorant, depellere conetur, eandem ab aliis partibus ad affectum unà cum sanguine & spiritibus deferri. Tumorem & calorem inflammationem sequi, ob sanguinis statuunt copiam in partem effusam, & in eadem retentam; dolorem ob partis distensionem à sanguinis illa multitudine illatam, pulsus molestum, ob calorem auctum, sanguinis enim copiam in loco angustiore facere, ut arteria partem verberet, & ab eadem reverberetur. Febrem interdum excitari putant, quando calor in parte adeò sit intensus, ut ipsum cor appetat, isque vel solus, unde febris diaria, vel cum putredine, unde febris emergat putrida, quæ putredo vel ob magnitudinem, vel viciniam partis affectæ ipsi cordi communicetur.

*Abscessus* in genere considerati causas accusant vel substantiam solidam, vel humorem unum vel alterum ex quatuor, aut omnes simul concretos, ob quæ partes, quæ se contingebant, ab invicem abscedant, in specie tamen hic ipsum pus accusant, quòd distendendo & rodendo majus sibi faciat spatium. Puris verò materiam constituunt sanguinem, efficientem causam ipsum calorem, uti dicunt, præternaturalem, unde frequentius sequatur inflammationem, quam tumores alios, quoniam sanguis non modò humidus sit, sed calorem facile contrahat, quæ duo ad peccatum istum, five concoctionem sanguinis in pus, maxime sint necessaria.

*Sinus* fieri docent à pure acrisse, quod nimium rodendo sinuet, & partes profundius à se invicem abscedere cogendo majus sibi spatium

*Abscessus.*

*Sinus.*

spatium comparet, hacque ratione particulam ita excoriet, & contentia à subjectis separet, ut distantia inter se pristinum statum haud faciliè queant recuperare.

*Juxta Paracelsum causa inflammationis, sive Phlegmonis,*

§. 5. *Paracelsus* ipsa *Inflammatio*, sive *Phlegmon* est apostema, quod non tendit ad mortem, nec ad impotentiam membri, minus ad aliud quod aliud accidens. Producentur autem apostemata ista præter corporis detrimentum orientia, juxta Auctorem hunc ex aluminibus liquefactis, & ab aliis apostematibus hoc solo differunt, quod non sint obnoxia morti, nec etiam accidentibus.

*Abscessus, & Sinus.*

*Abscessus* ac *Sinus* cum ex sale sanguinis, tum ex utriusque humorum abundantia oriri statuit, tanquam ex boni superfluo propter excessum in apostema translato, post hujusmodi superabundantis separationem à natura factam, quod cum collectum est, in corruptionem transire cogitur, per locum, in quo situm habet, quia repletus est ultra suum diametrum.

Ubi jam in sanguine superfluitas orta est, ex qua generantur apostemata communia, si cutis eo loci naturale centri foret ejus emunctorium, transit in apostema, quod aliàs per nasum destillasset. Abscessus hujusmodi maximos dolores & putrefactiones præter infectionem excitat, eò quod excessus in sua puritate minimè permanere possit: cum superfluum quodvis putrefactionis sit exordium.

*Helmontii cogitata de causa inflammationis.*

§. 6. *Helmontius* spiritum, seu Archem calefacere hominem naturaliter in sanitate existimat, eundemque in febribus æstare ait, assertque sequens exemplum: Spina querna digito infixà actū & potentialiter frigida mox in digito excitat calorem p. n. Non quidem, quod calidi humores affluant, quasi per spinam eò convocati, expectassent spinæ vulnus, & qui aliàs suis sedibus temperari resedissent, siquidem cruor vulnere proximus, primus accurrit, adiuturque venienti cruori præcipit.

Et ipse per se quoque non calet, sed ex gratia vitalis spiritus. Itaque audacter statuit Author, *Inflammationem*, & tumorem cum pulsu duro, dolore & calore à solo spiritu casualiter, ab infixà verò spina occasionaliter duntaxat ortum suum habere. Quamobrem calor p. n. auctus in parte quadam indicium est Inflammationis, non verò ipsa Inflammatio, nec illi ideò inter medendum magnopere insudandum esse arguit. Hinc ideò factum esse putat, quod *Hippocrates* seriò monuerit, calorem & frigus non esse morbos, nèque horum causas, sed causas (nimirum occasionales) morborum esse amarum, acre, salsum, ponticum, &c. spiritum verò esse eum, qui impetus omnes, adeoque & Inflammationem faciat. Materialem verò causam admittit cruoris, vel alimenti in partem aliquam evasationem.

*Abscessus & Sinus causam dicit Abscessus, & Sinus.*

esse sextæ digestionis mucilaginem, quæ adhæret intra venas, & arterias, canalesque quoslibet suæ primùm qualitate infontem, sed hospitii jus, quatenus indirectè advena est, violentem, unde mox dein ab Archemo parti insito concipitur desiderium eam expellendi, cujus conceptus idea in exosam mucilaginem imprimatur. Membrum autem non valens subigere hospitem, sibi invito connexum, majore flagitante nisu, appetituque expellendi: qui tandem pertinacius connexus sæpe victor vitalem facultatem illius membri in sui clientelam subigat, mortificando nimirum, suoque contagio conformem partem, cui insidet, reddendo. Pars autem cum sit lassationi, hujusque termino obnoxia; è contrà verò character, sive idea seminalis jam concepta, sit indefessa, necesse est, velut convocatis viribus Archemi, morbus ille proferibatur per crisin, vel robore morbi spontè exantlato, orbetur vi agendi, fiantque oppilationes, vel loco victa pellatur, fiatque Abscessus. *Sinusque* ite-

iteidem & Abscessus desperatos contingere ait solius sæpe naturæ ductu, quos abscessus etiam per ipsa ossa fieri notavit. Si in Phlegmone cruor, vel alimentum solidorum in pus degenerat, Abscessum instare arguit, & apostemata à vitio distributivo, at stabiles eorum dolores ex indignatione Archet esse pronunciat.

*Vilisissimio de causa inflammationis.*

§. 7. Ex opinione *Vilisissimi* sanguinis motus vera est in eo accensa flamma, quæ ab iisdem prorsus causis ac in igne nostro elementari in illo producitur ac fovetur. Sulphureæ siquidem particule jam motu à primo principio donatæ, exquisita ventilatione fœventes nitrosas ex ambiente aere perpetim, & abundanter emanantes apprehendunt, atque ab iis expanduntur, & accenduntur. Sanguinis autem incendium sibi semper non est consimile, nec in omnibus subjectis eandem servat normam. Ast intensior, remissiorve advertitur, pro sanguinis principiorum proportionem, & mensuram, eorumque dispositionem. In iis enim vividior est flamma, in quibus spiritus, & sulphur prævalent, spiracula debita libertate gaudent, nitrosæque pabulum copiosum advehitur. Secus autem accidit illis, quorum sanguis salinus, aquosus, & terrestris existit, paucumque communicatur nitrum, & tenuis fit ventilatio. Si verò sanguinis massa spiritibus turgescat, sulphureoque scatet pabulo, copiosusque nitrum ab aere mutuetur, intenditur ejus accensio, & cursus, & concitatio, & rapidior venit cruor, siquidem effervescens ad angustiora adductus vasa, eorumque tunica plus nimio distendens, illisque inhaerens ob glutinositatem à sale depresso acquiritam, ab ipsis expelli nequit, sed in eorum alveis rector. Vasorum etiam pori à validiore illa distensione, humorisque viscidum remora, & arctiores fiunt, & oburantur, quo fit, ut fulgines exitum sibi para-

re nequeant, & denuò in sanguinem concidant, qui humo & vapore quasi obrutus vehementius ebullit, & inflammatur, partique, in qua stagnat, labem suam communicat, & in ea *Inflammationem* inducit. Dispositio autem ista inflammatoria à quamplurimis causis cruoris massæ infertur, quæ cum à sex illis rebus non naturalibus vulgo dictis repeti debeant, ab iis enumerandis hic supersedemus.

Furibundus ille, atque inflammatorius sanguinis motus sensim imminuitur, tandemque propemodum extinguitur. Spiritus siquidem indefinenter avolant, partæque sulphureæ perpetuæ, quam patiuntur, collisione atteruntur, earumque subtiliores evaporantur: difficiliore etiam facta, tum ob poros obstructos, tum ob partis, in qua subsistit viscidus sanguis, & coagulatus, repletionem, materiæ extravasatæ ventilatione, parcius illi commisceatur pabulum nitrosæ, à quo flamma ejus conservetur. Tum temporis autem resurgunt salinæ particule, quæ à crasso, viscidoque sulphure exaltato irretiuntur, & diuturna concoctione in pus commutantur, quod summam gaudet acrimonia ob salis evesti aculeos, à sulphure exaltato actuat. Putridus itaque ille humor fibras partis, in qua cespitat, & fluctuat, spiculis suis attingens, eas exedit ac corrodit, nidumque sibi parat, quem moram adauget atque ampliat, *Abscessum*que producit, è quo aperto prorumpit fœculentus fœtidusque liquor, ingrato ut plurimum odore nares afficiens, crassioribus particulis sulphureis, spirituum consortio destitutis, turmatim impetuoseque à reliqua massa secedentibus, odoratus organum moleste ferientibus.

Puris materia virtute mirè corrosiva prædita, si diutius in parte sinatur, altiores semper agituniculos. Intestino enim quo illa

*Abscessus.*

*Sions.*

agi-



agitur motu in partes circumjacentes perpetuo compellitur. Musculi humori isti circumpositi, continuo spirituum affluxu agitati liquorem premunt, & in laxiorem quandam adjacentem partem portionem ejus aliqualem protrudunt. Pus ergo partes carnosas & membranosas subiens illas exedit, & dilacerat, ipsarumque stragealveum sibi cudit. Sed quum tenuiores tantum puris particulae huc usque attingere potuerint, aliis ob molem, visciditatemque in fovea remanentibus, paucae disperduntur fibræ. Carneæ verò solæ non destituuntur, sed nervorum quoque contingit pectura, è quibus exsilians succus nervus portioni illi humoris alibilis partibus spermaticis enutriendis destinata associatus, fibras nerveas efformat, ambitumque cavitatis istius, *Sinus* nomine, à pure factæ, tunica quadam semicartilaginea succingit, quæ partes carnosas, & membranosas ipsi adpositas à liquoris corrodentis acrimonia vendicat.

*Sylvii opinio de causa Inflammationis, Abscessus, & Sinus.*

§. 8. *Sylvio* causa *Inflammationis* continens est sanguis vel in vasis suis subsistens & stagnans, vel ex tertia eadem effusus, & corruptus, cujus corruptionis exemplum allegat in aqua communi, hæc enim licet sit pura, modò stagnet, aut in vase diutius conservetur, putredinem subit; eodem modo illud etiam existimat fieri in corpore nostro, nam sanguis extra vasa sua effusus propter motum ipsi denegatum ibi hæret, subsistit, stagnatque, hinc fit, ut spiritus subtilis, ac volatiles tum acidas partes, tum salinas temperare soliti avolent, unde tunc acida ac salia in sanguine existentia evadant acriora, quæ acrius in se agunt & paulatim ita corrumpunt, ut in pus mutetur, uti videre est in preparatione lactis sulphuris, ibi enim sulphur in lixivio forti coctum, colorem rubicundum lixivio communicat, huic dum affunditur acetum destillatum, aut quicumque

spiritus acidus, color rubicundus mutatur in album; hinc *Abscessus* dicitur, quando scilicet acidum materia defervescente incipit exsuperare, avolantibus subinde plurimisque particulis volatilibus, & accedentibus hinc inde heterogeneis, sanguis enim ita corrumpitur, ut in pus abeat, acidum verò in pure maximè accusat. Stagnat verò, juxta ipsum Auctorem, in vasis suis sanguis, quoties eadem sunt obstructa. Obstructio autem illa fit vel ab ipso sanguine propter aerem frigidiorum, ut & ipsa medicamenta acida & austera puta, coagulato, vel à materia aliqua viscida & pituitosa: existimat enim *Sylvius* pituitam à calore solutam unà cum sanguine deferri per totum corpus, imò etiam per vasa minima, & capillaria, quod si tum pars aliqua à frigore externo afficiatur, aut aer, potiusque liberaliori haustu assumatur, tum ab eo humor ille pituitosus ac viscidus antea à calore motus & attenuatus, adeoque in illius partis vasa minima propulsus, ibi coagulatur, & eo facilius, quo vasa sunt minima, qui humor pituitosus à frigore coagulatus in vasis subsistit, & sic obstructionem facit, unde tunc à sanguine continuo accedente vasorum illorum distensio oritur, ubi autem amplius distendi nequeunt, tunc tandem rumpuntur, & per consequens sanguis ex vasis suis effunditur, qui tunc effusus corrumpitur, & inflammationem facit, nam sanguis juxta ipsum extra vasa sua effusus, in aliqua parte diu hædere nequit, quin acquirat acrimoniam propter spiritus obeuntes, iis autem absentibus, corrumpitur sanguis. Effunditur ex vasis suis sanguis propter eorum apertiones, aperiuntur autem vel per anastomosen, vel per diuresin, vel per diabrosin. Causa ergo obstructionis, & consequenter inflammationis antecedens est ipsa pituita, & præsertim viscida abundan-

dantius in corpore hærens, quæd vasorum sanguineorum ramusculos capillares delata, ibique viscidior reddita, aut coagulata, sit ejus causa continens, hinc negata sanguinis circulatione, motuve illius impedito, necesse est, sanguine vasa ita distendi, ut tandem rumpantur sanguisq; contentus effundatur, nunc in vicinæ partis substantiam, nunc in muscoli alicujus interstitium, qui sanguis effusus partium suarum actione mutua corrumpitur, & juxta Auctorem hunc inflammationem parit, si verò jam sanguis corruptus fuerit, & in pus mutatus, tunc *Abcessus*, & si sinuosos anfractus sibi paret, *Sinus* ipsi dicitur.

*Cavities non sententia de causa inflammationis*  
§. 9. *Cavities non sententia de causa inflammationis* *110215*  
*Inflammatio* oritur, quando humores arteriosi extra vasa in poros & tubulos partium solidarum effusa, partium istarum poros ita obstruunt, & tam exigua spatiola relinquunt, ut non nisi materia primi elementi per ea transire possit, quæ cum ignita sit, parti inflammata ruborem inducit, cumque fulminis instar celerimè moveatur, & cum impetu irruat in istos minimos poros, lancinando fibrillas istarum partium, dolor iste inflammationem comitari solitus inducitur. Liquor etiam chylosus in diductis arteriolarum extremitatibus stagnans, viciniorem in iis contentorum transitum impedit, qui circa extremitates istas copiosius collecti, tumorem producant, abs quo cum arteriolarum comprimantur, & sanguis per ductus constrictiores fluere cogatur, pulsus quoque augetur. Ex succis istis ob stagnationem diuturniorem motu intestino celerius agitatæ ipsa febricula quandoque suscitatur.

*Abcessus*  
*Abcessus* oritur à copiosiore pure intra partem collecto, quod inde generatur, quòd materia primi elementi tanto cum impetu irruat in fibrillas partium solidarum, in

quibus hærent inflammationes, ut illæ tandem ex continua expulsiōne ista rumpantur, & à reliquis separentur, sicque cum reliquis humoribus ibi stagnantibus misceantur, adeoque fiat ibi quasi confusum chaos omnis generis particularum, quæ ibi quandam formant cavitatem, & hæc mixtura vocatur pus, quod cruentum fit, quando vascula sanguifera etiam per istas partes dispersa ab acredine istius puris eroduntur, ut sanguinem suum in eandem cavitatem effundant varium; coloratur pus, quando ipsi admiscetur particulæ biliosæ, aut flavæ sanguinis hætenus innominatæ, quale ulcus sordidum, & malignum vulgo nominatur.

*Sinus*  
*Sinus* oritur à majori fibrillarum à pure acriori devastatione, unde liquores contenti ex tubulis dilaceratis copiosè effunduntur, quorum particulæ volatiliores facile absuntur, crassiores verò remanentes lateribus fortius adherentes, sibi invicem firmitus sociantur ob quietem diuturniorem, inter quas spatium relinquitur magnum, & fistula quasi amplior elaboratur.

§. 10. Ut præmissæ aliorum de causis sententiæ facilius intelligantur, nostrum nunc submittemus judicium. Optimè verò *causæ Inflammationis* constituuntur internæ, & externæ. Posteriores referuntur vel ad lésiones externas, quales sunt contusiones, fracturæ, puncturæ, &c. vel ad sex illas res vulgari nomine nonnaturales indigitatas, quæ inflammationem excitare valent, sanguinis particularum ordinis turbationi ansam præbendo, ipsiusque & aliorum succorum stagnationem inferendo. Quando enim pars aliqua contunditur, fibrillæ ipsius comprimuntur, & ad se propius accedere coguntur, sanguinis, & reliquorum succorum particulæ aliquales è tubulis suis exprimuntur, & in fibrillarum interstitia effunduntur. In valida il-

*Sinus*

*Nostra sententia de causa inflammationis*



la sanguinis expressione, partium ejus situs & dispositio invertitur; alkalicarum enim pori, per quos antea materia ætherea liberè perfluebat, immutantur, fiuntque vel obliqui, vel angustiores in medio, quàm in superficie, aut etiam ab aciculis acidarum, quæ compedibus suis solutæ fuerunt, occupantur. Materia ætherea, quæ partes omnes perpetim præterfluit, viam sibi præclusam reperiens, & à nova à tergo insequenti impulsâ, in alkalicarum poros impetu vehemētissimo impingit, sed cum obex sibi oppositus fortior sit, quàm ut primo molimine ipsum tollere possit, ab illo reflectitur, & in sanguinem repellitur, eundem velociori agitatu motu; ac in tali perdurat opere, donec sibi liceat recto incedere tramite, seu alkalicis in minutiores particulas perfractis, seu exturbatis acidis ab illorum poris, pristinaque ipsis restituta rectitudine. At cum sulphura alkalicis, à quibus antehac soluta, & à se invicem semota conservabantur, sint destituta, & à phlegmate, cui innatant, undique premantur, sibi invicem propius accedunt, eorumque rami inter se implicantur, & in grumos facessunt, qui tubulorum orificiis inhzrentes illa occludunt, sanguinisque affluentis, & materię subtilis adventantis cursui obstant. Talis autem subsistit coagulatio, donec alkalica acidis liberata sulphuribus denuò commisceantur, ipsorumque ramos explicent, & illa ab invicem semoveant, in fracturis & puncturis, adest semper vel fibrillarum pressio, quare eadem ratione, qua in contusione Inflammationem contingere afferere possumus. Omnes ergò Inflammationes non nisi ab humoribus incrassatis exoriuntur, quæ pro diversa fibrarum, ac ductuum angustia, ac humorum crassitie, & tenuitate, etiam varia phænomena proveniunt. Hæc si paucis comprehendere debeant verbis, dicendum esset, Inflammationem à causa externa productam, aut ab

aere, aut contusione, aut puncturis nervorum, ustione, vulneribus, aut fracturis; ab internâ verò à mala humorum, sive succorum dispositione ac miscela. Sic si corpora calefacta, vel à motu nimio, vel ab exercitio violento, subito refrigerantur, Inflammationes faciliè patiuntur; dum enim incalcescimus, succi nostri celerius per corpus propelluntur, postea verò refrigerante corpore ac sanguine, succi minus moventur, & magis incrassantur, prout toto die videmus in aqua à frigore in glaciem mutata. Exinde sequitur, motum in corpore vel in aliqua parte imminui ex eo, quòd influxus ætheris ei denegatur, intumescencia ergò diminuta, etiam vasa, ac pori detumescunt, ac præcluduntur. Hinc apparet, sanguinem prius adeò agitatam ulterius posse fluere, quàm ante calefactionem, nam tempore calefactionis particule viscidæ, ac crassæ adeò fluidæ redduntur, ut vascula etiam illa minima penetrare possint, postmodum autem sanguine refrigerante, tenaces illi succi se ex canaliculis istis excutere nequeunt, adeò ut obstrui cogantur, nam denegato priori motu magis ad invicem à circumstante aere premuntur. Certum enim est, Inflammationem oriri ab exhalatis particulis potissimum salinis rigidis, porosque obstruentibus paulò inferius clarius explicandis. In Inflammationes circumstantiæ advertendæ sunt, obstructio nimirum in canaliculis, ac ductibus minimis, à minori ætheris motu facta, deinde mutationes, quas succi adfiscunt, qui in vasculis obstruendi continentur; denique pulsionem, ac pressionem sanguinis, ac succorum. Omnium Phænomena Inflammationis faciliè causam reddere possumus; Calor enim oritur non duntaxat à motu particularum nimio Inflammationem facientium, ast potissimum à materię subtilis influxu vehementiori: particule enim istæ hoc pacto disponuntur,

& ad

& ad invicem premuntur, ut interstitiis minimis remanentibus ætheri tanquam cœlesti aditus patefeat, & globuli ætheri excludantur, cœlesti igitur igne primas tenente, particulæ pellentes ab eodem agitantur, unde calor oritur, omnis enim calor à motu particularum minimarum vario excitatur.

Sic quoque color iste sanguineus Inflammationibus solennis sit non duntaxat à motu ætheris celeriori partes in superficie ita disponente, ut radii ab iis reflectentes nobis repræsentent rubedinem, sed & oritur à sanguine adfluente, & præterfluente, obstructa enim ista, & stagnatio, seu incallescencia istius Inflammationis premit arterias circumcirca pertransientes, exinde angustantur, & per consequens sanguis allabens patentes vias non reperiens ibidem magis coærcetur, vascula & membranas extendit, hinc color sanguineus per cutim ipsam apparet, à calore quoque particulæ istæ sanguineæ accenduntur, & moventur impetuosius, hinc calor iste intenditur. Porro ob angustationem arteriarum majore in copia colligitur sanguis, quam per venas reduci potest, hinc oritur intumescencia, seu partis affectæ elevatio, stagnantem autem sanguinem Inflammationem inlucere & partem in tumorem elevare quis nescit?

Ob dilationem & nimiam partis inflammatæ expansionem fibræ nervosæ ferè disrumpuntur, hinc dolor, qui ab Anima percipitur, nam dolor nihil aliud est, quam existis sensatio, fibræ enim, ceu dictum, ab incalcescente materia, vel à sanguine stagnante expanduntur & dilacerantur. Dolor enim solet in principio esse *tensivus*, quia per celeritorem ætheris fluxum partes circumjectæ fortius expanduntur, si autem salinæ particulæ in partium poris hærentes, iis per celeritimum ætheris fluxum, vel per pressio-

causam altius imprimantur, dolor ex *tensivo* abit in *scindentem*, vel *pungentem*, pro ratione Salium obstructuentium, si enim dolor est *fixus*, *scindens*, potissimum oritur ab acidis scindentibus, vel acidopungentibus particulis, fibrillasque erodentibus, si verò dolor est *vagus*, *pungens*, igneus, signum est Salis potissimum pungentis alcalici.

Ob inflationem, & expansionem inflammatæ partis oritur *remittentia*, quæ sæpè non aliter digitis cedit & resulat, quam vesica inflata propter angustationem arteriarum partem inflammatam transcurrentium, sanguis non nisi majori vi permeare potest, & arteriarum latera interiora magis ab eodem afficiuntur, hinc *Pulsatio* oritur, quod & referri potest calor, & agitatio particularum acidarum arterias convellens, & convulsionem excitans, unde motus ac pulsus augetur, imprimis si simul coagulatio succorum aderit. In Inflammatione vehementiori cor majorem exprimit sanguinis copiam, quam angustas arterias persolvere potest, & sanguis simul existit crassior, hinc à conglutinato, crassioreque sanguine cor perlabente, id quasi convellitur, & *Pulsatio* multum augetur. Febris autem hæc symptomatica potest oriri, dum hæc particulæ, poros obstructuentes motum celeritimum ætheris peregrini in corpus introducunt, qui cum sanguine per arteriarum & venarum poros communicatus, motum ejus multum auget & perturbat, quæ tamen *febris* in omnibus Inflammationibus haud est sensibilis. Hinc haud difficulter percipere poterimus, quare in generatione puris, quam *Inflammatio* præcessit, *febris* sit intensior, doloresque acerbiores, quam generato pure, cum ante pus generatum particulæ obstructuentes hærent in singulis tubulis, ibique ætheri transeunti viam præcludunt liberiori, *Inflammatio* in suo vigo-

re constat, tubulis autem per ætheris transcuntis motum saliumque celeri agitatione disruptis, liberior transitus ætheri conceditur, ac proinde febris acuta, doloresque atroces & potior *Inflammationis* pars cessat, quæ apprime conveniunt cum illis, quæ *Hippocrates* S. 2. Aph. 47. predixit, dicens: *Dum par sit, dolores ac febris acedunt magis, quàm confecto.*

Ex hisce apparet, nec solum *anguinem*, nec bilem causam esse *Inflammationis*, uti veteres existimarunt, sed potiùs omnem humorem ex canaliculis suis evasatum, ibidem stagnantem, & ob acidum suum cum alkali, vel salso effervescente, ruborem, calorem, dolorem, & tumorem introducen-tem. Certum enim est, quo plus humoris ex canaliculis suis effluit, eò tumor sit major, hinc & fibræ magis extenduntur, & dolor augetur. Omnis ergò *Inflammatio* supponit tumorem, omnisque tumor obstructionem, in omni enim *Inflammatione* respicimus ad partes obstructas, obstructasque particulas, diversa enim est obstructio, & hinc *Inflammatio*, pro diversitate particularum, à quibus & partis, in qua producit, prout enim materia vel est salina alcalica pungens, vel acida pungens, variant *Inflammationum* phenomena. Ratione etiam loci, partisque affectæ etiam inter se differt, prout enim in diversis partibus observatur, diversis etiam nominibus insignitur: in cute enim *Inflammationis*, vel *Erysipelatis* nomine venit, si autem pleuram membranam occupavit, dicitur pleuritis, si verò cerebri ejusque meningum substantiam invasit, vocatur *phrenitis*, quæ nomine solum variant, in essentia autem conveniunt, omnium enim eadem est ratio, causæ eadem esse possunt, sive enim obstructio fiat, & hinc acceleratus ætheris fluxus in hac, sive illa parte, erit tamen *Inflammatio*. Nulla igitur est dif-

ferentia, quàm quæ diversitate spectat salium, prout enim hi variant, sic *Inflammatio* differt. In *Inflammatione* ergò ( ut *Tyrone* bus omnia clare, & perspicue proponamus, eapropter quandoq; hæc repetere libet: ) quacunque diversitas partium observanda est, tubuli enim in una parte sunt firmioris, quàm in alia, hinc patet, quare *Inflammatio* oculorum sit pertinacior, quàm si musculus inflammatus fuerit; 2. una pars plures habet nervos, hinc patet, quare *Inflammatio* tendinis sit valde dolorifica. 3. Observanda diversitas humorum, quos tubuli vehunt. Alia lymphæ est in glandulis parotidibus, quæ videtur magis viscosa, quàm quæ est in glandulis cutis ( miliaribus dictis: ) illarum lymphæ autem crassior multis particulis ramosis, chylo sis conferta est in tubulis musculorum, hisce accedit amplitudo tubulorum, quibus positæ, varia jam emergere debent symptomata. Omnes succi quo crassiores sunt, minus apti sunt ad inflammationem excitandam, hinc non credimus sanguinem solum extravasatum primariam causam *Inflammationis* esse, sed præter sanguinem alii etiam humores effunduntur, qui facilius obsequuntur motum ætheris, & hinc *Inflammatio*. Certò enim persuasi sumus, sanguinem extravasari posse sine subsequente *Inflammatione*. Sic videmus, quod *Inflammatio* tendinis sit omnium peracuta, ratio est, quia lymphæ est omnium tenuissima, est ipse succus nervorum, qui facillimè ab æthere agitari potest, non mirum proinde in tali *Inflammatione* gravissima suboriri symptomata. Et ut *Tyrone*s *Inflammationem* clare percipiant, ipsis dico, quod *Inflammatio* ita sit, si sal aliquod adigitur in porum quendam, & interstitia quædam relinquuntur soli ætheri pervia, sal autem illud agitur in porum, quando à motu, vel exercitio

citio corporis humores vehementius agitantur, hinc partes lubricæ facile sequi possunt, non autem rigidæ, quæ tunc hærent, & à tergo venientibus premuntur. Hoc idem sal figi potest, vel fisti in suo motu à frigore constringente poros, sal ibi hærens, & agitatum tam à particulis à tergo, quam æthere premente punit, & disnectit tubulos, unde dolor, affluxus autem fit, quia dum sal punit, fibræ contrahuntur, ac quasi convelluntur. Rubor, qui ibidem conspicitur, non est ad nientem veterum à sanguine, aliàs eo aperto sanguis exsillare deberet, quod tamen non observatur, prout omnes Chirurgi testari coguntur. Eas partes, quarum tubuli sunt firmioris texturæ, minoris diametri, variè intorti, multisque nervorum propaginibus colligati, si contigerit obturari, à particulis cujuscumque generis ratione molis, figuræ, & agitationis, angustia viæ ordinario accommodatis, non crassissimis, ( utpote quæ cum glutinosioribus à cæteris secedentes per venas ad cor pergunt) stagnantibus à causa vel interna, humidis, & spirituosus è corpore à nimio corporis motu, ac exercitio expulsi, & frigidis crassioribus salis, imprimis acutis, ac acidis, in tubulos ampliatos fortiter adactis hærentibus &c. dicuntur Inflammatione corripi. 1. Si particulæ activæ stagnantes à copiosa congestione compressæ, ab invicem secedentes, avolantibus lubricis, & spirituosus in motum turbulentum excitantur ab æthere, per poros constrictos, ( ut in sæno non debite congesto, floribus sambuci, aliarumque herbarum recentibus compressis, ) inæqualis ruente, quo acutæ scindentes, ac pungentes acidæ particulæ viscosarum ramos auferendo, caput exerunt, stagnantem materiam resolvunt, flaminaque tubulorum disnectendo, eos erodunt, quod non contingit sine dolore, & hinc influxu concitatiore spirituum, ardore, & hinc ru-

bore, ( ita determinata ab æthere globulorum propensione in motum circula-rem & rectilineum: ) nec non sensu pulsationis à compressione arteriolæ, sanguine fortius impingente. 2. Si pori constantiores tubulorum à rigidis in hærentibus ita partialiter obturentur, ut per interval- la relicta non nisi subtilissimus celerimè peruat ather, qui cum merus sit ignis, sufficientissimus est ad ea, quæ concomitantur Inflammationem, producenda phenomena. Si demum conigerit fibrillas partis inflammatae propter atheris celerimum transfluxum, & particularum acutarum violentam adactionem rumpi, humores, qui per tubulos cursum suum ordinario absolvunt, extravasantur, atque ita ab irregulari atheris perruptione immutantur, ut in pus degenerent, tunc præsens est *Abcessus*, si cutis, vel

*Abcessus*,

erosa, vel ferro aperta est, pus autem pro diversæ partis Inflammatione, diversæ moræ, diversæ sanguinis constitutione, auditione, &c. particularum, est magis, vel minus corrosivum lividum, viride, tenue, vel album, tenaciusculum, &c. Porro prædominantibus in sanguine particulis acris, ab eo derivata materia, vel pus debito acris morando diutius viscosas oleosas dividit, seque ab earum amplexu liberans vicinos circumcirca erodit tubulos, sicque

*Sinus*.

*Sinum*, seu concavitatem efformat, sique non debite cavitas illa mundetur, particula puris acris, per intersitia musculorum tubulos obvios ibi pauciores, ac proin minus resistentes erodendo per varios anfractus sibi viam aperit, atque hic illic *Sinus* efformant, qui cum debite mundificari nequeant, & tubuli erosi à transiens viscosæ materiæ portione, ( fugatis lubricis, & tenuibus, ) quasi visco obducti, ( impedità hinc eorum accretione ) callum contraxisse dicuntur, constituunt *Vlcus anfractuosum*, vel *fistulosum*, quod vel manet in eodem statu, vel ulterius serpit, prout ex

aper-

apertis & erofitubulis humor stillans magis vel minus acris, vel aliter constitutus fuerit.

Remotè suum Symbolum addunt res nonnullæ, inter quas Aer primum occupat locum, qui iuxta varias suas constitutiones Inflammationum auctor esse potest, æstuans liquidem particulis fumè volatilibus rapidissimoque motu agitaris est refertus, quæ cutis poros subeuntés sese in fibrillas insinuant, sanguinique immiscentur, ad quem etiam inspirationis ope advehuntur, vellicantur ab illis tubulorum fibrillæ, quæ in cincinnos abeuntés à tubulis sanguinem, aliosque succos exprimunt, & in spasmodicos quasi motus ab irritatione, quam patiuntur comitatæ, vibrationibus suis frequentioribus illum comminuunt, ac ipsius particulas à se invicem dividunt; aeris particulæ volatiles alkaliorum poros subintrant, illa exagitant, subtilioraque per poros tunc dilatatas foris abripiunt, unde accidit, ut paucioribus in sanguine, aliisque succis evasatis resistantibus alkaliciis, sulphura (ut eum Chymicis loquar,) resistere nequeant acidis, à quibus coagulantur, nec phlegmatis, à quibus conglobantur acida reliqua, quæ sulphuribus non sunt intricata, & à materia subtili, spiritibusq; animalibus in partes vicinas appellentibus sunt commota, crassiorum alkaliorum, quibus avolare non licuit, poris insiguntur, à quibus omnibus turbatur sanguinis, reliquorumq; succorum circulatio, materiaq; subtilis in cursu suo impeditur. Aer frigidior particulis duris, rigidis, acutis, iisque crassis donatur, quæ corporis partibus exceptæ, & tubulorum poris infixæ, illas obstant, & constringunt, sanguinis aliorumque succorum alkalica saturant, illiusque sulphura cogunt, & sic succos coagulant, & incrassant, præcluditurq; hoc modo liber transitus & materiz æthereæ & sanguini, reliquisq; succis. Aer nebulosior,

humidiorq; particulis scatet aqueis, molis, nec mediocris, quæ corporis externæ superficiei appositæ poros ejus obstruunt, impediuntque ne subtiliores salinæ particulæ per insensibilem transpirationem avolare assueant, exhalentur: illa verò in sanguinem repulsæ majorem turbationem conciliant, & in tubulos impingentes acrimonia sua salina pungunt, sanguinemque aliosque succos ab ipsis exprimunt: tenuiores aqueæ particulæ, sanguini commixtæ acida & alkalica illius solvunt, & enervant, sulphur in grumos cogunt, destituta ergò acidorum, & alkaliorum dispositione, sulphuribusque in grumos collectis, sanguini, succis, & materiz æthereæ adventantibus obstititur. Cibus quandoque Inflammationes inducit; illius enim acidiores particulæ à ventriculo dissolutæ in chylum lacteum convertæ, & sanguini permixtæ alkaliorum poros opplent, aciculis suis sulphura coagulant, & sic tubulorum orificia obstruunt; Cibi verò volatiliores, acioresque particulas possidentes in chylum commutati, & sanguini confusi, eadem prorsus ratione illius stagnationem & rarefactionem inferunt, quæ aer fervidior. Potus Inflammationum causa est pari modo, quo cibus; Potus acidior, seu nive, glacieque refrigeratus particulis abundat acutis, duris & rigidis, quæ alkaliorum poros saturant, sulphuraque coagulant. Potus autem ex liquoribus ardentibus Inflammationes progignit, ut jam de cibo diximus, ad aeris æstuantis exemplar. Motui concitatiore succedere potest Inflammatio, quia quum in eo uberior spirituum animalium copia cum ad cor, tum ad arterias accedat, abundantior sanguis in universum corpus compellitur. Copiosiores etiam determinantur spiritus in reliquis corporis partes, quarum fibras extendunt, & valido agitant motu. Sanguis in vasīs suis contentus

velociori agitur cursu , ab abundantioribus massæ suæ admixtis spiritibus , particulae illius comminuuntur à continua, vehementique fibrillarum à spiritibus extumescendum in ipsum vibratione , unde sanguis rarefit , & attenuatur partium illius situs, earumque pororum dispositio immutatur ; subtiliores ejus partes avolant, crassiores verò remanent. Acida , quorum exigua pars, habita alkaliorum proportionē, evaporata sunt , & quæ à spiritibus , quorum ingens facta fuit dissipatio, amplius non continentur, alkaliorum poros subeunt, & Sulphura cogunt , à quibus occluduntur orificia tubulorum, vel canaliculorum, qui angustiores facti sunt, poris illorum ac parietibus à longa ista & fortè mutua afflictione sibi propius admotis . Sed si rapidior motus Inflammationem inferre valeat, desidiofa etiam quies illum procreare potest, in illa siquidem pauciores determinantur in ventriculum uti in alias partes spiritus animales, ideoque alimenta in ipso minus comminuuntur , acidorum spicula debilius atteruntur, & ab alkaliorum poris exterminantur , Sulphuraque paucioribus acidis , à quibus coagulantur, liberantur, chylus è massa ista elicitur sanguini, cui commiscetur, crassiores apportat particulas , ac ad motum ineptiores ; quæ quum in minutiores tubulos, eosque tum ob spirituum penuriam minus dilatatos pervenerint, in iis facili negotio remorantur, eosque occludunt. Nemo nescit in *vigiliis* animam obiecto cuidam considerando , vel motui cuidam exercendo semper esse attentam , hinc spiritus animales copiosiores in partes amandantur ab illo, velocioreque motu donantur, isti sanguini commixti partiumque fibrillarum copia sua validius extendentes, sanguinis massam vehementius exagitant, partes illius magis comminuunt & attenuant, à frequenti inter se facta collisione, fibrarumque vibratione.

Particulæ subtiliores alkalinae, & tenuiores phlegmaticæ à reliqua massa per durabiliorem istum motum separatæ, foras per patulos poros cum spiritibus exeunt . Cum verò acidorum vis à phlegmatis amplius ut antea, non infringatur, nec à spiritibus subtilioribusque sanguinis particulis in proprio situ contineantur , illa crassiorum alkaliorum poros subintrant, & in Sulphurum ramis implicantur, unde fit tubulorum obstructio, materię æthereæ sanguinis , reliquorumque succorum circulationis interruptio, à quibus Inflammatio ; quæ omnia de vigiliis immoderate sunt intelligenda . Nec mirum si à nimia evacuatione subsequatur Inflammatio, in ea enim copiosi deperduntur spiritus, tenuioresque ac volatiles avolant sanguinis particulæ, crassiores verò ad motum ineptiores in eo remorantur ; quare acida, quæ ob propriam configurationem omnium difficillimè in motum cidentur, in sanguine remanent, dominiumque obtinent, alkalica imprægnant, & sulphura coagulant. Assuetis excretionibus suppressis succedunt ut plurimum Inflammationes . Inter ea enim, quæ ordinario è corpore nostro eliminantur, Principatu gaudent salia, quæ quum nihil aliud sint, quam alkalia acidis prægnantia, eorumque spiculis horrida , si in tubulis, è quibus excerni debent ob nimiam crassitiem, cespitent, materię æthereæ & sanguini adventantibus sunt impedimento.

*Animi perturbationes* Inflammationum causæ fiunt, vel spirituum subtiliorumque sanguinis particularum dissipationem promovendo, vel cursum ejus tardiorē efficiendo, spirituumque proventum præpediendo . Primæ tenent ira, gaudium, profusum, &c. Secundæ verò classis sunt timor, tristitia, &c. quum enim ab hisce, vel spirituum penū imminuatur, & sanguis volatilibus alkalicis exuatur, vel spirituum restauratio inhibeatur, Sulphura,

quæ



quæ ab alkalicis aquæ ac antea à se invicem semota non detinentur, ab acidis coagulantur, & alkalica ob torpidiorem suum motum acida nec declinare, nec è poris suis excurrere valent.

Causæ internæ respiciunt vel tubulorum obstructionem, vel sanguinis nimiam rarefactionem, ipsiusque in parte aliqua stagnationem, quæ quum supra jam explicata sint, ipsi diutius non immorabimur. A nonnullis causæ internæ spina interna dicuntur, quia sicuti quandiu spina parti cuidam infixæ remanet, dolor perseverat, ita etiam perdurat Inflammatio, donec tubuli referati fuerint, sanguis ac reliqui succi pristino fruuntur cursu, liberaque gaudent circulatione.

Si sanguis aliorumque succorum particulæ tubulos seu canaliculos infarcientes, per diaphoresin expelli nequeant, & acida, alkalicorum poris sint adeò infixæ, Sulphurumque acidorum ramis adeò intricata, ut ab illis exturbari haud valeant, materia atheræa, quæ aliò deflecti nequit, continuo impetu in Salia, quæ ab acidorum cum alkalicis conaubio emerferunt impingit, in motum illa concitat, eaque impellit in partium ambientium fibrillas, quas aculeorum suorum cuspidibus discindunt & dilacerant, foveamque hoc pacto excavant, fibrillis minutim incisiss & canaliculis ruptis, & sic *Abscessus* constituitur. Sed unde quæso pus in *Abscessu*? Nos asserimus, pus esse lacteam sanguinis partem, in ipso *Abscessu* plus minus alteratam, cui quædam subinde portiuncula dilaceratorum tubulorum unâ cum cruore admisceantur.

Quum particulæ salinæ puris majorem partem constituent, eademque spiculis duris & acutis sint horidæ, & à materia fibrili adventante, ac spiritibus animalibus ad partes circumpositas appellentibus in motum agantur, tubulos & canaliculos dictarum partium scindunt,

scrobemque excavant, quæ quo latior & profundior sit, eò diuturniorem moram trahit pus in parte, sed non sufficit, ut fovea ampla ac lata sit & profunda, quæ *Sinus* denominatur, sed superficies ejus interior præterea obduci debet pellicula vel callo, abs quibus impediatur parietem ejus coalitus; quapropter Sulphura quæ in pure resant, & ab acidis non fuere coagulata, in tubulos & fibrillas à salibus dilaceratos impingentia, ramus suos poris & interstitiis illarum insigunt, & quum Sulphurum particulæ flexiles sint, tubulis, canaliculis seu fibrillis superextenduntur, iisque applicantur viscida phlegmata, quæ in pure continentur, materiæque fluiditatem conciliant, at salium acrimoniam attemperant, in particulas Sulphureas acidas tubulis ac fibrillis adnatas impingentia, illas validius in ipsarum poros & interstitia impellunt, iis fortius adjungunt, utrasque inter se arctius uniant. Super extensis itaque Sulphureis particulis ac infixis partium circumjacentium fibrillis earumque interstitiis, ipsisque stricte inter se conjunctis efformatur pellicula levis, & æqualis, quæ parvos & angustos poros possidens, ab ipsis lædi nequit, sed è contra eadem ipsam eò densiorem faciunt, quo frequentiori impetu in illam feruntur, particulas ex quibus constituitur, arctius hoc modo inter se conjungendo, & fibrillis partium applicando, inde fit, ut aliquando totus *Sinus* callo circumdetur & sic fistula producatur.

§. II. Quæ de morbis hiscè formari possint *Præfagia* nunc paucis percipiemus. *Inflammatio* partium tendinosarum & membranosarum longiori tantum elapso temporis spatio solvuntur, carnosarum verò brevius finiuntur, de quibus partium specialium Inflammationes videas, ubi earum invenies prognosin. Omnis Inflammatio, quæ per insensilem transpirationem non discutitur, sup-

*Prognosis  
Inflam-  
mationis.*

puratur, vel si malè tractetur in gangrænam degenerat, & sæpè in ipsam mortem. Inflammatio partium internarum est periculosissima & sæpè lethalis. Quo inflammatio est intensior & partes occupet nobiliores, eò curatu difficilior existit; facilius curatur Inflammatio in Juvenibus, quàm Senibus, quia partes Juvenum sunt molliores & facilius cedunt motui ætheris & partibus obstruentibus quàm in Senibus, ubi omnia sunt rigidiora. A malignitate quoque causarum, item Symptomatum vehementia desumuntur præfagia. Si partes adenosæ fuerint Inflammatione obsessæ, faciliè ad concipiendam corruptionem aptæ natæ sunt, hinc in gangrænam ac Sphacelum facillimè degenerant. Inflammatio quoque secundum tempora judicatur, nimirum si in principio non respondeat voto, aut statim discutiat, aut resolvatur, neque in fine status, & inclinationis suppurari velit, sed inducatur, quod maximum facessit negotium, quia resolveri vix, aut ne vix quidem potest, aut planè tendat ad Syderationem, quod absolute pessimum est, tum quia minatur abscissionem, aut subitanam mortem ob sanguinis coagulationem in corde factam. Ex his patet, quod obstructio Inflammationem præcedens quo gravior est, eo soleat etiam esse gravior Inflammatio, quia talis partium fieri potest obstructio, ut impedita humorum ad partem affectam circulantium communicatione, insequantur gangræna. Dolores quo sunt vehementiores, eo etiam difficilior est, quo autem partes minus rubent, eo etiam faciliior est, quia tantam prognos partium obstructionem, ac per consequens tantam ætheris agitationem non præsupponit.

*Prognosis Abscessus.* Prognosis Abscessuum variat vel intuitu causæ, vel partis affectæ; ratione causæ à Veteribus dicitur criticus, qui in morbis acutis observatur, & per causæ aut materiæ

morbificæ collectionem contingit, seu cum euphoria, seu secus hoc fiat, alius non criticus, qui velà causâ externa, saltem interna locali à vulgo ita dicta tantum dependet. Ille ergo qui minus criticus est, nihil periculi portendit, ac prolixam in Prognosi circumspeditionem haud desiderat, cum educta materia faciliè curetur. Intuitu partis affectæ i.e. membri modò nobilioris, h.e. magis membranosi & sensibilis magis, modò ignobilioris, atq; minus sensibilis, alius Abscessus erit periculosior, qui prius aliquod genus, alius secutior, qui posterius quoddam occupat. Abscessus apertio qua diutius protrahatur, eo pejus est, succedet enim febres, sinus, ossium subsectorum caries imò & gangræna. Pus eò laudabilius erit, quo magis ad indolem chyli & succi nutriti accedet. Sin acrem nimium contraxerit, inficiet sanguinem, febres producet, corrodet, atque exedet fluidorum canaliculos. Si pus a quosum & tenue minus, aut viscidum foetidum fuerit, pejoris notæ, nec puris nomine dignum erit, cum contumacis obstructionis, præcipationis, & putredinis indubitatum perhibeat testimonium.

*Prognosis Sinus.* Sanies seu pus ex *Sinan* profluens valde tenue, malè coloratum, viride, nigrum, aut putridum nihil boni promittit. Pus autem album instar chyli, vel succi nutriti, laeve, æquale, minimeque foetidum certò & sanitatem pollicetur, sic & si dolor & tumor disparcant, bonum est. Sed cum pars etiam leviter compressa dolet, subiectas nervosas, fibrosas, ac tendinosas ulceratas, & tactas esse, non levis est conjectura. Si sanies in *Sinnu* exeat valde tenuis, eaque nigra & foetida, malum est, denotat enim, quod ad os usque caries pervasit. Sin crassa, viscida & similis foeci materia est, signum est solam carnem ulceratam esse. Cum spiritus volatiles particulas cæteras temperantes arctè, & amicè continentur

avolarunt, sal tum fluorem concipit; unde insignis ille *Acor* curiosis linguis perceptus, tum cum sulphure exaltatus nervi odoratorii fibrillas spiculis suis concutit, quod insuetum anima sub odoris idea recipiens ut ingratum averfatur, id quod tum ad sensum respicientes foetorem dicimus. Sal quoque & sulph. ita combinata materiz flavidinem conciliant, quam tum Latiniore dixeret sniem, quod in ea sani quid sanguinis adhuc contineretur, de cujus à pure differentis eleganter, ut solet, *Celsus* edidit. Interea dum acidum incipit exsuperare, avolantibus subinde plus minus particulis volatilibus, Inflammationis tragadia Catastrophem suam sortitur ex Tumore inflammato in ulcus purulentum abscedendo Abscessum, & Ulcus *Sinuofum* constituens. *Sinus* curatio difficilis est expectanda, si callum & duritiem contraxerit, at boni omnis est, si pus paucum, bonum, album, exeat, & ferè siccus existat sinus, nullusque addit amplius dolor.

*Diat.* §. 12. Quod concernit *Diatam*, Aer fugiatur nimis calidus & frigidus, sit verò temperatus, nimis enim dissipando spiritus, & frigidus coagulando sanguinem, succosque, nocere potest. Alimenta sint optima, abstinetur à nimis calidis, ut piperatis, fluorem quidem & cursum cruori restituentibus, sed majorem Inflammationi dolorem parientibus, propter angustatas & pressas vias, quia sanguinis nimium preniens dolorem Inflammationi auget, plus enim sanguinis ibi colligitur, quam venæ absorbere possint, ex illa pressione vasa & membranz expanduntur, & fibræ minantur rupturam, hinc difficultas illa dolorem parit, & propter eam quidam ad venæ sectionem coguntur descendere, ut nimirum sanguinis cursum moderentur, temperantibus itaq; uti debemus, ne in illud malum incidamus. Ab acidis quoque salitis saccharatis & frigidis

abstinendum est, præcipue enim morborum causæ existunt, hinc fugienda sunt. In Inflammationibus potus commendatur Thea, vel Coffea omnem stagnationem sanguinis, & succorum artens, vitentur vina acida; in affluctis tamen concedi potest vinum, in quo bacce sambuci succintinsus, & sacchari momento ad gratam dulcedinem edulcoratum. Cerevisia malè coctæ & veteres, item julepi acidi, qui potius Inflammationem augent, quam minuunt fugiantur. Pessimè ergo sanitati suæ consulunt ii, qui in Inflammationibus refrigerare tentant, cum hæc in deterius omnia ruere faciant.

Motus quoq; nimius, vigiliz immoderate angue pejus fugiuntur, cum hæc omnia æquè motum intestinum ac progressivum augeant, & sic dolorem, & ruborem partis efficiant.

Excreta & retenta, sibi invicem respondeant, ne motum excedant.

Animi passiones immoderate, imprimis ira & mæror, atro carbone notande sunt, & animus potius sit tranquillus, confidens in Deum O. M. fidum illum in re quavis difficili Auxiliatorem; quæ omnia etiam accuratè observanda sunt in *Abscessu* & *Sinu*.

§. 13. *Galenici* in curatione *Inflammationis* ex arte constituenda ad morbum, causam & symptoma solent respicere. Cum verò cuncta sint auferenda, potissimum verò morbus & causa, quibus ablatis symptoma facile cesset, venæ sectionem præsertim existimant necessariam, siquidem sanguine detracto, qui inflammationem facit, rumor, calor, obstructio; vel adstrictio, & unitatis ulterior solutio desinant. Hæc verò præmissa ad calorem nimium in partibus solidis restringendum refrigerantia nonnulla adhibent, ulterioremq; materiz in partem prohibent influxum, remediis in usum ductis repellentibus, & digerentibus simul junctis, ne repellentia sola adhibita materiam ad partes nobiliores remittendo, vel sola digerentia, utpote calida, ad partem affectam can-

*Galenico-  
ræ modus  
curandi  
Inflamma-  
tionem.*

dem materiam copiosius attrahendo plus noceant. Habito proinde respectu ad hepatis intemperiem calidiorē, quam temperandam volunt, & victu instituto tenui, omni adhibito studio ulteriorem ad partem affectam sanguinis prohibent influxum, & eamque laxiorem corroborant adstringentibus, spongia nempe vino madente, vel defensivo ex bolo Armeno, terra Lemnia, oleo rosaceo & aceto parato imposito. Dolorem tamen vehementiorem leniri volunt relaxantibus non nimium humidis, qualia sunt perfusio olei & aquæ calidæ, vel cataplasma ex farina triticea, vel ceratum ex passo, oleo rosaceo & cera, vel linimentum ex vitellis ovorum, oleo rosarum & croco. Hæc in ipso peragunt principio, in majori verò incremento digerentia admiscunt repellentibus, & in vigore hisce planè omisissis solis utuntur digerentibus. Repellentium numero adscribunt remedia frigida & humida, qualia sunt lenticula palustris, asine, psyllium, portulaca, malva, cucurbita, lactuca, folia hyoscyami, succus mandragoræ, vel refrigerantia & adstringentia, uti sunt umbilicus Veneris, sempervivum, plantago, solanum, malicorium, balaustia, hypocisthis, Thus, galla imatura, vinum austerum. Digerentia & simul repellentia illis sunt, myrthus, lentiscus, absinthium, parietaria, lens, crocus. Remedii in augmento Inflammationis adhibendi sequens esse potest formula.

℞. Fol. Sempreviv.

Laſuc.

Parietar.

Cucurbit. aa. Mj.

Flor. ros. rub. Mj.

Chamomil.

Melilot. aa. Pj.

Malicorii

Rhois aa. ℥ β.

Favin. bord. Mij.

M. Coq. ex aqua, additaque portione quadam olei rosacei, F. Cataplasma.

Emplastrum quoque diachalciteos, vel enzum barbarum ad eundem usum imponunt. Pro derivatione præter venæ sectionem cucurbitulas & frictions adhibent. Ad magis digerendum, si opus sit, cataplasmata parant ex uvis passis cum pane & melle, vel ex radicibus altheæ, liliorum alborum, foliis malvæ, floribus meliloti, semine lini, fœnigræci, caricis, farina tritica, oleo chamæmeli & pinguedine suilla, vel anseris & gallinæ. Si digestio impetrari nequeat, & inflammatio jam sit remissa, humorem crassiorē aperto loco affecto, vel si hic aperiri nequeat, loco maxime vicino, effundunt.

Vergente verò Inflammatione in *Abcessum*, *Abcessum*, propter copiosum pus intus collectum, quod distendendo & rodendo partes antea se contingentes faciat abscedere, concoctionem istam humoris, & transmutationem in pus promovere emplasticis & cutem occludentibus, calidis nempe & humidis pus facile moventibus, ut terebinthina, galbano, bdello, pice, emplastro diachylo, cataplasmate ex farina hordei vel secalis in aqua decocta, in qua radices altheæ prius ebullierint, addita adipe gallinacea, vel anserina, aut quod paratur ex caricis in aqua coctis, & farina tritici vel quod sequens exhibet formula.

℞. Rad. alth.

lilior. aa. ℥ iij.

Ferment. ℥ ij.

Farin. sem. lin. ℥ j.

Resn. terebint. ℥ β.

Croci ℥ ij.

Ol. chamomill.

Adip. gallin. aa. q. s.

Terenda terantur, & cum pinguibus misceantur, ut F. Cataplasma.

Pus probe maturum vel digerentibus, & in vapores convertentibus discutunt, vel si hoc fieri nequeat, aperto loco evacuant. Inter digerentia referunt ficos, farinam hordei, panem ex fursure, terebinthinam, picem aridam, adipem, vitulinam, baccas lauri, nitrum rubrum,

brum, vel cataplasma, aut linimentum ex mucco cochleæ, pure, aloë, ac myrrha paratum. Si verò ob altitudinem loci, puris copiam, vel acrimoniam, vel crassitiem digerentia ista parùm queant proficere, loco aperto pus illud manifestè evacuant. Apertionem istam nonnunquam ab ipso pure acriori & in superficie existente fieri norunt, interdum verò medicamentis, vel Chirurgia eam instituendam esse præcipiunt. Medicamenta apertionem istam perficere docent, vel extrahendo pus ad partes externas, vel erodendo, vel adurendo. Extrahentia illis sunt propolis, pix, sulphur, radix cucumeris agrestis, bryonia, narcissi, arundinis, aristolochiæ, emplastrum ex gummi ammoniac, terebinthina, cera, sulphure, & nitro, vel theriaca, & mel invicem mixta. Exerodentibus laudant allium superimpositum, vel fermentum cum cantharide. Aduerentium ordini hic accensent saponem nigrum, chalcitidem, oleum chalciant. Chirurgiam celebrant vel secando locum scalpello, vel adurendo ferro candente, quo facto pus faciliè evacuetur, sed non prius operationem hanc instituunt, quàm pure toto bene confecto, nisi abscessus sit prope anum, aut circa articulos, in quibus materiam suberudam evacuant, ne à puris acrimonia, vel fistula producat, vel nervi, aut ligamenta erodantur. In minoribus autem abscessibus, unicam apertionem sufficere movent, sed in majoribus plures concedunt, respiciente semper foramine inferiora, ut pus commodius evacuetur. Si contingat, ut venæ, vel arteriæ grandiores sanguinem nimis effundant, easdem claudunt emplasticis, & crustam inducentibus, ut albumine ovi, stuppa vel linamento excepto, si dolor affligat, lintea oleo rosaceo madida imponunt; si partes vicinas inflammatio occupet, emplastrum diachalciteo oleo rosaceo dilutum illis imponunt; si durū

aliquid restet, illud emplastro tetrapharmaco debite emolliunt. In evacuatione puris monitum etiam Hippocratis adveitunt, nec una vice illud totum emittunt, ne animæ sequatur defectio, cui fortè supervenienti odoribus, vini potione, & aquæ frigidæ in faciem asperzione statim volunt esse succurrendum.

*Sinus* curationem aggrediuntur detergentibus, hinc eundem implent & cicatricem inducunt, abstinentes semper à pinguibus & olei vim habentibus, cum siccandum sit. Detergionem peragunt abluendo sinum multa, vel vino cum aqua marina mixto, aut cui sal adjectus fuerit, vel terebinthina, & farina hordei cum melle, aut squama æris cum vino & melle. Sinum ita mundatum carne implent, auferendo impedimenta naturæ suæ opposita, & difficultatem inferentia, quod perficiunt medicamentis modicè detergentibus, & sine morfu siccantibus, ut pulvere ex radice iridis, aut aristolochiæ, manna, thure, myrrha, aloë, aut remedio ex fermento & ostris ustis, & ablutis. Carne sic procreata veram cutem attingente, cicatricem inducunt, prospiciendo simul, ne caro nimis multa procreetur, quod fasciis peragunt, easdem à fundo sinus arctando, ut sublimia sedena contingant, ad os verò ejusdem laxiores ducendo, orique linamento emplastro barbaro obducto, & ad saniem effundendam in medio perforato imposito. Ipsum verò os sinus semper deorsum spectare volunt, ne sanies retineatur, quod si fortè sursum spectet, aut membrum ita collocant, ut in partem inferiorem vergat, aut demisso specillo quâ pervenit fundum scalpello aperiunt ut humor superstes evacuetur, & os supernum occludunt. Cute tandem à pure diutius retento nimis extenuata, & à carne subiecta separata, visu idoneo & totius corporis purgatione prohibent, ne sinus noxium humorem recipiat, tum medicamentis siccantibus, &

*Sinus.*

modicè detergentibus cutem cum subiecta carne paulatim agglutinant, compellendo in sinum per vesicam bululam vel suillam, cui fistula alligata sit, emplastrum ex charta combusta, aut lsis oleo rosaceo liquato, aut aloen, thus & myrrham cum melle, aut pulverem ex centauro, symphyto, radice iridis, farina ervi cum melle, nec locum nimis comprimunt; sed carne subrescente paulatim sinunt agglutinari.

*Paracelsi  
cura in In-  
flamma-  
tione.*

§. 14. *Paracelsus* in Phlegmone curam commendat mundificantem, quam sequentibus potissimum peragie remediis:

℞. Ol. ovi. ʒ vj.

Camomelinā ʒ j.

Serapini

Galbani aa. ʒ vj.

Visci de abiete, aut pino ad pondus omnium,

Farin. hordei,

fabarum, aa. quantum

sufficit pro incorporatione,

Commisce in formam unguenti.

Mel etiam rosatum, & salis aquam simul permiscet, eoque liquore sero thaneque locum jubet lavare.

*Abscessus,  
& Sinus.*

In cura Apostematum & Sinuum abstinendum esse ait a magno magisterio, vel artis Chirurgicæ nimia subtilitate, quæ potius quam curabunt, inficiunt. In omnium siquidem ulcerum cura animadvertit, naturam sui ipsius esse Medicum, atque medelam innaro, proprioque suo balsamo peragit. Sed si sortè balsamum hoc illi deficeret, vel aliqua parte minutum foret, balsamum vult introducendum per emplastrum oppoditoch, quod quidem Apostemata recentia maturando, & mundificando curat, vigesima quaque hora renovando, ligandoque. Ex. gr.

℞. Lithargyr. cocti in cerat. ʒ ii j.

de incarnati viri quatuor ʒ β.

de gummis liquifacilis ʒ i j.

M. F. Emplastrum. artem.

In principio ait tutum fore prævenire phlebotomiis venarum, à quibus Apoplema generatur, & si-

tum habet: his enim, inquit, aufertur illis rubedinem membrorum per sanguinis diminutionem, & unà cum ea tollitur superfluitas sanguinis abundantis, nedum in histantem, verum etiam in omnibus aliis apostematibus. Tria verò potissimum in Apostematum curis observanda vult: Primum, ut spiritus vitæ fortificetur, ne præ dolore debilis fiat: sicuti solet in his, qui venenum hauserunt, præservantibus medicamentis noxæ præveniri. Secundum, ut infectio, quam introduxit morbus, diaphoreticis mundificetur & specificis, quæ non solum clarificant, sed etiam dolores mitigant. Tertium, ut locus affectus à toxico præmuniatur. Si carnis aliqua pars à sua natura sit alienata, quod putrefactum est ejus auferri vult, cum ex ejusmodi carnis infectione, juxta Authorem hunc, tale damnum inferatur, ei, quæ le combusto sit ab una parte ligno, & ab altera sano.

§. 15. *Helmontius* Inflammationis cujuscumque partis eam educta cura imdirigit, ut causa occasionalis, si Inflammatione, ve spina tollatur, qua depulsa Archeus ab ulteriori accensione redigatur ad quietem, quapropter interne arcana sua diaphoretica commendat, externe verò omnia ea, quæ ex lapide calaminari, & camphora parantur.

In Abscessu quoeumque emolliationem, & maturationem promovet, per medicamenta apostematibus accommodata, imprimis pinguedinem leporis, maxime vetustam commendat, quæ ea valde emollit & rumpit. Sic etiam sanguinem hircinum externe applicatum ea maturare ait, oleumque strumasum hic magnificat externe illitum, ejus descriptio in capite de Strumis videri potest.

*Abscessus.*

Sinus hoc modo tractat, ut sal acre corrigatur per medicamenta ex lapide calaminari preparato & camphora, nec mundificativa omittit ex gummi aliisque detergentibus parata.

*Sinus.*



## CAP. II. DE INFLAM. ABSCESSV ET SINV. 41

*Vvillisi* 9. 16. *Vvillisi* ad Inflammationem quamcumque abigendam curam eò dirigit, ut sanguini motus suus iterum reconcilietur, & à lentore suo in statum pristinum restituitur, quod peragi posse putat venæsectione, hirudinibus, & nonnunquam cucurbitulis applicatis. Alveum adstrictam relaxandam esse innuit & reliqua sanguinem temperantia, & æstum ejus sedantia intus assumenda commendat, qua de causa tum julapia, tum apocemata præscribit Ex. gr.

*R. Ag. nymph.*  
*Violar.*  
*Papav. errat.*  
*Endiv. aa. ʒ. iij.*  
*Spir. sulfuris ʒß.*  
*Syr. pomor. ʒiß.*  
*M. d. ad vitrum.*  
*R. Decoct. rad. acetos.*  
*cichor.*  
*Endiv.*  
*Ligni santal. citrin.*  
*Raf. G. C.*  
*Pom. citri N. j.*

**D.**

Omnia ea remedia, qua sanguinis coagulationem resolvunt, internè commendat Author, imprimis sequens.

*R. Ag. Acetos.*  
*Gramin.*  
*Petrofel.*  
*Parietar. aa. ʒ. j.*  
*Lapid. prunell. ʒj.*  
*Syr. de Cichor. ʒj.*  
*M. d. cochleatim.*  
Vel in forma pulveris.  
*R. Lapid. prunell. ʒij.*  
*Flor. sal. nitr. ʒß.*  
*Ocul. cancr. pp. ʒiß.*

*M. F. Pulvis*, qui detur cuspidatum.

Ad lentorem sanguinis magis dissolvendum spiritum variari, vel salis Hermeniaci magni æstimat. Inter externa commendat cataplasmata emollientia & disecutientia ex scordio, ruta, parietaria, malva, agrimonia, floribus chamomillæ, meliloti, verbasci, hyperici, semine foeniculi, vel ex medulla panis

albi in lacte cocta; sequenti modo.

*R. Herb. parietar.*  
*malv.*  
*agrimon. aa. M. ij.*  
*Flor. chamomill.*  
*Hyperic. aa. P. ʒß.*  
*Sem. fenigr. ʒj.*  
*Medull. panis alb.*

*Coquantur in lacte ad pulvis consistentiam.*

*Add.*  
*Vitell. ov. N. ij.*  
*Croci ʒß.*

*M. F. Cataplasma.*

Fotum etiam instituit ex malva, althea, beta, scordio, ruta, floribus sambuci in aqua communi coctis tepidè adhibitur, & ad dolorem magis leniendum, vel etiam suppurationem promovendam unguentum dialtheæ, populinum, & emplastrum diachylon admodum existimat proficua.

In *Abscessu* & *Sinu* internè laudat decocta vulneraria, externè unguenta digestiva, balsamum de Capaiva internè & externè usurpatum, unguentum Basilicum, maturantia scilicet seu suppurantia, ut sunt cataplasmata ex radice altheæ, herbis malvæ, parietariæ, agrimonie, floribus chamomillæ, verbasci, meliloti, semine lini, farina fabarum, foeniculi & sexcenta alibi jam dicta.

9. 17. *Inflammationis*, hinc & *Sylvi* curationem ad mentem *Sylvi* quod attinet, consistit ea 1. in obstructionis vasorum solutione; 2. in sanguinis substitutione ac stagnantis motus restitutione; 3. in sanguinis effusi & aliquo modo corrupti correctione; 4. in maturatione *Abscessus* faciendâ; 5. in sanguinis maturati, seu *Abscessus* apertione; 6. in *Abscessus* aperti mundificatione; 7. in ejusdem consolidatione. Si ergo obstructio vasorum seu compressio fuerit à vinculis artibus parti affectæ circumjectis, illa propediem auferantur. Obstructio verò vasorum à pituita viscosa vel sanguine in ipsis coagulatis solvitur medi-

medicamentis, quæ motum sanguinis egregiè accelerant, illudque impedimentum, quo sanguis stagnare cogebatur, tollunt, qualia sunt blanda aromatica & salibus præsertim volatilibus abundantia, nam quatenus ea medicamenta sunt aromatica, eatenus humor pituitosus attenuatur, ut desinat efficere obstructionem; quatenus autem ea sunt Sale volatili constantia & prædita, uti sunt de Ossibus Cornu Cervi, &c. non tantum vim habent coagulata dissolvendi & fluida reddendi, sudorem movendi & sic materiam peccantem expellendi, sed & ipsum sanguinem effusum, & à spiritu suo liberatum, adeoque acidum factum corrigendi, cujus acidi vis dum est infracta, nova coagulatio impeditur, eam ergo in finem formulam sequentem præscribere so-

*R. Aqua Hyssop.*

*fenicul. aa. ʒ. ij.*

*Ther. simpl. ʒ. ʒ.*

*Spir. Sal. Armoniac. gr. xxv.*

*Antimonii diaphoret. ʒj.*

*Laudan. opiat. gr. ij.*

*Syr. papav. err. ʒj.*

*M.*

Hujus mixturæ cocleare unum aut alterum subinde assumendum esse præscribit ægro, ut ea ratione obstructio solvatur. Ad Salem volatilem quoque refert oculos Cancr. mandibulas lucii, os de corde Cervi, &c. cum hæc Sale volatili abundant. Omnia quoque Sulphura metallica & mineralia, sed fixa, hoc in casu conducere scribit, imprimis Antimonium diaphoreticum ad fixitatem aliquam deductum. Nec tantum hic laudat animalium salia volatilia, sed omnia ex variis plantarum scorbuticarum & acrium partibus petita, eorundemque vim emulanti, uti sunt succi erysimi, cocleariæ, nasturtii & hortenensis & aquatici, taraxaci, aqu. theriacalis, &c.

Externè in Inflammatione partium commendat fons ex plantis

aromaticis in aqua aut vino coctis paratos, vel spir. vini rectif. tam simplicem, quam compositum, item olea & unguenta varia, ungu. sc. mariat. alth. ol. lil. alb. chamæmelin. aneth. laurinum, Philosoph. &c. vel cataplasmata magis dissolventia, quam emollientia, vel maturantia, quorum vis per cutis poros penetrat, & sic obstructionem solvit. Exempli loco seq. præscribit.

*R. Capar. subcinerib. aut fistili vase astarum & contus. ʒij.*

*Fol. erysimi.*

*Chærefolii.*

*Nasturt. horti.*

*Sambuc. aa. Mjss.*

*Farin. fabar.*

*Lupinor. aa. ʒj.*

*Nid. hirund. N. j.*

*Albi Græc. ʒj.*

F. f. a. decoctio in lacte ebutyrato ad cataplasmatis consistentiam. Ejusmodi cataplasma mediocriter calens parti externæ inflammatæ applicandum vult, cujus ope internæ quoque obstructiones solvuntur, & observandum vult, quod renovanda sit, quamprimum exsiccare incipiat.

Dein 2. sanguinis stagnantis motum restituit sudoriferis & modo dictis salibus volatilibus, quandoque etiam venæ sectione, sed in initio, & quidem pro ægrorum constitutione peculiari & viribus per iteratas vices instituta, quatenus in omni sanguinis eductione major motus sanguini concedatur.

3. Sanguinis effusi & aliquomodo corrupti correctionem consistere ait in acidi emendatione & sanguinis coagulatione impedienda, quod juxta ipsum præstant oculi cancr. antimon. diaphoret. mumia, Sperma ceti, Gumm. Galbanum, Sagapenum, opium, Cerevisia lopenensis dicta; Inter Externa laudat Emplast. de sperm. ceti, cum Gumm. Galbano, ut & fons ex aromaticis paratos.

In Abscessu ubi materia profundior

In Abscessu.

dior hæreat , promovendani esse suadet maturationem per emollientia ac maturantia dicta , qualia sunt radices altheæ , herbæ malvæ ; bis malvæ , lil. alb. branc. urfin. attripect mercurialis , quæ coquenda sunt in lacte , & cujus lactis parva copia est usurpanda , possunt etiam illa maturantia cataplasmatibus forma parti dolenti applicari , imprimis seq. cataplasma.

*R. Farin. rad. alb. bordei aa. ʒij. Fol. mava. branc. urfin. aa. Miiij. Sem. lini , eius farin. ʒiʒ. Caricar. concis. N. x.*

*Coquantur igne lento ex aqua pura , cerevisia tenui , aut urgente ardore summo ex lacte ebutyrato. ad humiditatis consumptionem ac decoquendum emolliationem , tunc contusus omnibus adde*

*Axungia porcina Butyri recent. aa. ʒiʒ.*

*M. F. Cataplasma.*

Commendat quoque Emplast. diachyl. scilicet cum Gummi. ut & mucilag. imprimis ubi multâ pituita eaque viscosa feceret corpus & sanguis . Absoluta sic puris generatione non procrastinandam vult puris educationem , cum pus mora reddatur acrius , atque ab ipso partes vicinæ magis magisque corrumpantur , sicque Sinus curatu difficilior , efficiatur , imprimis quando vasa vicina corroduntur à pure illo acriore facto , & natura sua existente acido , quapropter ubi ex partis affectu molliæ tactu manifesta , ut & rubedine ac dolore diminutis puris perfecti præsentia innotuit , aut cultello acuto , aut potenciali cauterio puri exitum patat , & quidem in loco tumoris maximè molli ac declivi .

Quod si nimis delicatulus aut morosus fuerit æger , ut apertio- nem hanc utramque permittere recusset , tunc sequens Empl. suadet imponendum tumori .

*R. Mellis opt. Farin. scial. aa. ʒj. Vitell. oni N. j.*

*Imponantur igni blando & agitentur ad Emplastri formam . Ficus quoque contundi & cataplasmatibus modo applicari jubet , quo sic faciliter & promoveatur Abscessus apertio . Ubi autem puris multum continetur in Abscessu , cavendum vult Author , ne omne una vice educatur , sed partitum , ne vires ægrorum prosterantur . Ubi vero puris parum , concedit , ut omne effluat , sed sine pressione forti ac diutina , unde plus mali , quàm boni emergat . Quoties autem in loco ab apertione remotiore pus hæret , aut Sinuoso duntaxat ductu ad locum apertionis fertur , toties pressione blanda ipsum foras propellere permittit . In Abscessu ac Sinu consolidatione tum externè , tum internè guttam unam vel alteram balsami sulph. terbinchinati vel anisati commendat summopere , non solum quatenus & ulcus mundificat , & consolidationem excitat , sed etiam quatenus oleositate sua & sal. volatili acidum expellit & enervat .*

§. 18. *Cartesiani* ad curandam Inflammationem remediis utuntur attenuantibus , particulas acutas frangentibus , hebetantibus , & coagulationem succorum resolventibus , quibus calor imminuitur , & effervescentia sedetur . Pro sedando dolore vehementi venæsectionem admittunt , ne sanguis impetuosiùs affluens fortiore sua pressione dolorem adaugeat , nec stagnatione chylum ad suppurationem disponat . Si tamen suppuratio vetari nequeat , eandem promovent , & mundationi ac consolidationi incumbunt . Nunquam ad particulas acutas si- ve acidas evacuandas remedia exhibent purgantia ex radice potissimum Jalappæ , ejusque resina composita , quibus glandulæ intestinales agitatae magnam emittant lymphæ vitiosæ copiam . Hisce remedia

*Cartesia- notum ta- tio curan- di inflam- matione .*

*In Sinu .*

media subjungunt fale prædita fixo vel volatili materiam viscidam incidentia, & ad fluiditatem disponentia, quorum numero adscribunt diaphoretica & diuretica, qualia sunt antimonium diaphoreticum, oculi cancer, unicornu, bezoardicum minerale mandibulæ lucci, spir. fal. hermeniaci, C. C. fuliginis, spermaceti, crocus, laudanum opiatum, remedia ex herbis nasturtii aquatici & hortenſis, cochleariæ, baccabungæ, cichorii, taraxaci. Forinsecusetiam resolventia adhibent, succos stagnantes & incraſſatos ad fluorem disponentia, qualia componuntur ex radice bryoniz, bardani, raphani, cucumeris asinini, iridis, foliis absinthii, scordii, cochleariæ, beccabungæ, chærefolii, cardui sylvestris floribus, chamomillæ, sambuci, croci, fal. hermen. bolo, ceruſſa, creta, camphora, sulphure, spermate ceti, fermento, spiritu vini, sæce cereviſiæ, & vini, ſtereoribus animalium, unguento albo canphorato & ſimilibus. Approbant itaque ſingulariter linimenta attenuantia & abſorbentia ex ſulphure trito, bolo Armeno, terra vetrioli, camphora & ſpiritu vini, vel ſotus ex ſæcibus cereviſiæ, albo Græco, fale hermeniaco, camphora, vel cataplaſmata ex foliis taraxaci, cardui ſylveſtris, cochleariæ, alſines, lenticula paluſtri, ſulphure invicem contuſis, aut ex radice cucumeris asinini, baccis lauri, foliis, eupatorii, cicutariz, tabaci, absinthii, petroſelini, chærefolii, floribus Camomillæ Romanæ, ſambuci, ſem. cumini, & camphora in ſpiritu vini coctis parata, vel emplaſtra de ſpermate ceti, ranarum, diapalme cum terra vetrioli, de minio, vel in ſubjectis denſa cute prædictis & oleoſa tolerantibus unguentum dialtheæ, martiatum, oleum anethinum, laurinum, terræ, Philoſophorum, Petræ, ſuccini, terebinthinæ Pro exemplo ſequentem D. D. Dexbacchii, Phyſici Caſtellani celeberrimi, Obſervationem nobis

hodie communicatam adjungimus. Juvenis enim mercator 39. circiter annorum per triduum inflammatione totius pedis ſiniſtri cum dolore capitis, ſiti auſta, inquietudine continua, febre atque alvo obſtruſta, rubore & tumore cum maculis lividis afflictuſ, die nono Calendarum Decembris Anno 1688. laudatum modò virum acceſſivit, qui ſequentibus remediis acidum vitioſum, ſuccos coagulans & in tubulis reſitare faciens corrigentibus, attenuantibus & abſorbentibus priſtinæ cum reſtituit ſanitati. Ratione enim alvi obſtruſtæ ſequens præſcripſit enema.

℞. Rad. ſenicul.

Petroſel. 22. ʒʒ.

Contrayerv. ʒʒ.

Herb. menth.

Chærefol.

Eryſim.

Card. bened. 22. P. ʒ.

Thee P. j.

Flor. ſambuc. M. j.

Chamomill.

Hyperic. 22. P. j.

Myrrh. ʒʒ.

Sem. ſenic. ʒʒ.

Incif. & contuſ. affund. Aq. hord. caleſact. vel fervent. q. ſ.

Salis tartari ʒʒ.

Stent per 5. horas in digeſtione in loco calido, dein coq. & exprimantur ad 1ʒj. in qua diſſolv.

Elect. diacathol.

Mell. anthoſat. 22. ʒʒ.

Eſſent. ſambuc. ʒʒ.

Elect. Diaſcord. Fracaſtor. ʒʒ.

Ol. violar. coct. q. ſ.

Salis ſambuci ʒʒ.

M. F. Enema.

2. ℞. Tartari ſolubil. ʒʒ.

Oc. cancer. pp. ʒʒ.

Antimoni diaphores. rûd pp. & recenter denotati gr. ix.

Camphor. gr. j.

Salis ſambuc. gr. iij.

Extraſt. croci gr. ʒ.

M. F. Pulvis digeſtivus pro una doſi.

2. ℞. Oc. cancer. pp. ʒʒ.

Corall.

*Corall. rub. pp. gr. v.*  
*Tart. emet. ritē pp. Mynf. gr. ii j.*  
*Salis C. C. volat.*

*sambuc. aa. gr. j.*

*M. F. Pulvis vomitorius pro una dosi manē sumendus.*

4. *℞. Effent. sambuc.*

*sumar. aa. ℥℥.*

*Tinctur. Antim. Tartarizat. gr. xv.*

*Spir. C. C. rectificat. absque fetore parat. gr. xii j.*

*F. Mixtura sudorifera pro una dosi.*

℞. *Aqua flor. sambuc. ℥℥.*

*S. Aqua ad mixturam sudoriferam, etiam pro una dosi.*

℞. *C. C. L. Aq. ℥j.*

*Ocul. cancr. pp.*

*Ebor. pp. aa. ℥j.*

*Antimonii diaphoret. ritē pp. & recenter. detonati gr. xxii j.*

*Myrrh. elect. gr. vi j.*

*Camphor. gr. ii j.*

*Salis sambuc.*

*Card. bened.*

*Scord. aa. gr. v.*

*M. & divid. in 6. doses aequales.*

*S. Pulvis absorbent. pro 6. dosibus.*

℞. *Aq. flor. sambuc. ℥vj.*

*Spir. antiscorbutic. n. ℥j.*

*M. S. Aqua ad pulverem absorbentem, pro 6. dosibus.*

6. *℞. Spir. salis hermeniac. succinat. ℥ij.*

*S. Spiritus guttatum usurpandus, pro una dosi gutt. vi j. in potu ordinatio.*

7. *Decoctum Thee per dies 14. usurpavit.*

*Remedia externa adhibuit sequentia.*

1. *℞. Spiritus Vin. camphorat. ℥ij.*

*S. Spiritus externus, de die bis tepide applicandus.*

2. *℞. Rob. sambuc. ℥vi j.*

*Elect. diascord. Frac. ℥ij.*

*Pulv. erysipelat. Mynf. ℥vj.*

*Flor. samb.*

*Chamomill. comm. & Rom. ℥j.*

*Scord. ℥vj.*

*Myrrh. ℥ij.*

*Camphor. ℥ij.*

*Crocior. ℥j.*

*Spiritus vini q. s.*

*F. Cataplasma tepide applicandum.*

3. *℞. Her. beccabung.*

*Cochlear.*

*Scord.*

*Eryf.*

*Abfinth. aa. ℥℥.*

*Flor. sambuc.*

*Chamomill. comm. & Roman.*

*aa. ℥. ij.*

*Pulv. erysipelat. Mynf. ℥℥.*

*Sem. nigell. ℥j.*

*Cretæ ℥vj.*

*Camphor. ℥℥.*

*Croc. or. ℥j.*

*F. Pulvis grossus,*

*S. Pulvis ad 2. sacculos, calide applicandus.*

4. *Secunda vice spiritum vini camphoratum ordinavit, quibus ager Deo auxiliante convaluit.*

Vergente verò Inflammatione ob materię copiam & crassitiem nimiam, resolutionem quamcumque & attenuationem recusantem, in Abscessum, suppurationem promovent emollientibus, particulis suis ab æthere faciliè mobilibus calorem imminuentibus, & chylum corruptum ad exitum propellentibus, qua virtute præstare volunt radices alii, altheæ, bryonix, cepæ, cucumeris asinini, filicis, liliorum alborum, folia altheæ, atriplicis, betæ, brancæ urfinæ, brassicæ, chærefolii, malvæ, mercurialis, parietariæ, spinachiz, verbasci, violariæ, farinas fabarum, hordei, seminis altheæ, scœnigraci, lini, ficus, mala dulcia, passulas majores, dactylos, flores camomillæ, croci, malvæ, meliloti, sambuci, verbasci, gummi Ammoniacum, bdellium, galbanum, Opopanax. Sagapen. refinam pini, terebinthinam, styracem, ceram, mel, fimum animalium, aloen, myrrham, nec non ex compositis unguentum Altheæ, Agrippæ, Basilicum, emplastrum diachylum simplex, cum gummis, de meliloto, de mucilaginis, re cumino, de baccis lauri. Pro exemplo sequens existat cataplasma.

℞. *Cepar. sub cineribus coct. ℥℥.*

*Herb. beta M. ij.*

*Ferment. acris ℥℥.*

*Fia. ping. N. x.*

*Flor.*

*Flor. melilot.*

*Camomill.aa. Mj*

*Coq. ex cerevisia crassa in consi-*  
*stentiam debitam.*

*Contusis adde*

*Farinae lini.*

*Unguent. basilic. aa. ℥ij.*

*M. F. Cataplasma;* cui interdum  
portionem quandam saponis im-  
miscent.

*℞. Emplastr. diachyl. simpl. ℥ij.*  
*de melilot. ℥j*

*M.*

Ut cataplasmata ista magis pene-  
trent, subtilioribus prædita parti-  
culis iisdem immiscunt, qualia sunt  
nicotiana, semen sinapi, piper In-  
dicum & Brasiliense, cinamomum,  
caryophylli, spiritus C.C. calx viva,  
sal. alcali, Ammoniacum, Tartari,  
aliaque volatilia. Facta suppuratione,  
tumorem aperiunt vel ruptorio  
ex sapone nigro & calce, aut luna  
spiritu nitri calcinata, & in la-  
pidem infernale mutata, vel lan-  
cetta aliove cultello acuto, ut ma-  
teriz purulentæ exitus pateat,  
qua evacuata, cavitatem mundant  
remediis sale volatili oleoso, vel  
alcalico fixo præditiis, quancum-  
que chyli ascensum prohiben-  
tibus, & fibras disruptas à carne  
sana separantibus, qualia sunt ra-  
dices gentianæ, succus chelidonii  
majoris, alchimillæ, torisnarini,  
myrrha, sagapenum, balsamus sul-  
ph. vitrum, anrimonii, mel ro-  
satum, unguentum Apostolorum,  
Basilicum, resina pini, cecbinthi-  
na, gummi ekmi. Mundatione  
peracta sarcoticis & consolidanti-  
bus foramen denuo occludunt, in-  
stillato vel oleo Hyper. petra, bal-  
samo Capayvæ, vel illito balsamo  
italico, aut imposito emplastro  
diaphysulphuris, aut oppodeltoch  
Vvurtzii, tandemque carnem cute  
obducunt, cui scopo illis inservi-  
unt lithargyrium, cerussa, plum-  
bum ustum, turia, lapis calamina-  
ris, unguentum desiccativum ru-  
brum, emplastrum griseum, dia-  
pompholygos, & oppodeltoch.

In Sinu potissimum eò respici-

unt, ut succum acidum acrem car-  
nem depascentem doment, reme-  
diis alcalicis, & volatilibus,  
præsertim succo vel melle chelido-  
nii, ex quo pessum formant, eun-  
demque cavitati immittunt, aut ab-  
sterisiones ex decocto scordi, ab-  
sinthii, nicotianæ, vel succo cen-  
taurii, nasturtii, aspi, torismari-  
ni, in quibus myrrha prius dissoluta,  
iniiciunt, vel unguentum Ægy-  
ptiacum in iisdem dissolvunt & eo-  
dem modo adhibent, vel turundis  
illitum insinuant. Pessum etiam vel  
turundæ ex melle chelidoniz for-  
matæ mercurium præcipitatum ad-  
spargunt, & cavitati ad fundum  
usque immittunt. Expressa satis  
materia purulenta, & callo absum-  
to, ipsaque cavitare probe munda-  
ta, sarcotica superius enumerata in  
usum ducunt, ut coercitis parti-  
culis acutis depascentibus, ex chy-  
lo benigniori nova carne defectus  
refarciatur, & spelunca ista con-  
venienter occludatur.

§. 19. Prælibatis ita aliorum opi-  
nionibus, restat ut *nostram* quo-  
que de morbis hisce curandis sub-  
jungamus sententiam. Quum ex  
suprà dictis pateat, Inflammatio-  
nes tantum prodire ex tubulorum  
obstructione facta ab alcalicis aci-  
dis saturatis, ac ob inaequalem su-  
perficiem ad motum ineptioribus,  
& à sulphuribus ab iisdem acidis  
coagulatis, à quibus non tantum  
sanguis, & reliqui succi in circulo  
suo retardantur, & materia æ-  
therea in cursu suo sistitur, ope-  
ræ pretium est, quò curam ejus  
absolvamus, ut medicamenta ad-  
hibeamus, quæ acida absorbent,  
sanguinem & reliquos, succos vo-  
latilioribus ditent particulis, tu-  
bulosque obstructos hoc modo ex-  
pediant. Curatio enim pro tempo-  
ris & Inflammationis, status, par-  
tis affectæ, ac proin materiz ob-  
struentis diversitate variat. Talia  
medicamenta sunt interna vel ex-  
terna. Interna sunt vel absorbentia  
dicta, vel sudorifera quæcumque.  
Prioris ordinis sunt oculi cancr.

carbo

*Nostra  
Curatio  
Inflam-  
mationis.*



tarbo tiliz C. C. ust. antimon. dia-  
phoret. ebur. ust. Corall. rubr. cry-  
stall. mont. Tartar. lapis Irland.  
mum. optima ex gr.

*℞. Sperm. Celi ʒj.*

*Ocul. caner. ʒss.*

*C. C. ust.*

*Lap. Irland. aa. ʒj.*

*Sal. volat. C. C. vel succin. gr. 2.*

*M. F. Pulv. divid. in 6. partes æquet,*  
mane & vesperi dosis exhibeatur,  
cum potu calido Theæ vel Cap-  
heæ. Alcalia enim tales possident  
poros & meatus, in quibus cus-  
pides particularum acidarum om-  
ni occasione suscipiuntur, adeo ut  
vel cuspides aliquo modo frangan-  
tur, vel saltem obtundantur, at-  
que sic materia stagnans tandem  
fluidior reddatur. Posterioris or-  
dinis sunt Bezoard. minerale, Jo-  
viale, Martiale, Antihæsticum Po-  
teri. Tinct. bezoard. volatil. nostr.  
spir. nitri dulc. Theriac. Diafcor-  
d. mixt. f. spir. Theriacal. viperar. &c.  
Ut autem ipsarum partium obstru-  
ctarum fiat reseratio, materiaque  
obstruens incidatur, conveniunt  
omnia incidentia, salia volatilia  
& fixa oleosa, Diaphoreticis com-  
binata, incidentibus suis particu-  
lis, & ratione ætheris persluentis,  
poros obstruictos aperientia. Talis  
sudoriferi poterit esse forma se-  
quens:

*℞. Regul. antimonii ʒss.*

*Sal. Card. bened. gr. xij.*

*Prunell. gr. vj.*

*Camphor. gr. iij.*

*M. F. Pulvis.*

*Vel:*

*℞. Theriac. v. ʒj.*

*Sal. volat. C. C. ʒss.*

*Bezoard. min. gr. xij.*

*Ol. Juniper. gr. iij.*

*M. F. Bolus.*

Medicamenta enim omnia quæ ex  
plurium alcali constant, quæ & si-  
mul acidum absorbent, & per con-  
sequens fluiditatem sanguini resti-  
tuunt, non negligenda sunt, in  
quem finem conducunt varia de-  
cocta ex rad. chin. Salsaparill. sem.  
anis. rad. liquirit. vel potus Theæ

vel Coffæ, quibus acidum pec-  
cans domabitur. Rustici verò de-  
coctum flor. sambuci cum albo  
græco cum lacte paratum assu-  
mant. In omnibus etiam Inflammationibus mirè juvant Salia vola-  
tilia debita in dosi exhibitâ, quo-  
niam tales particulas obtinent, quæ  
à subtili materia faciliè agitantur,  
& vulgò calidâ nominantur, quæ  
& internè & externè symbolum  
suum conferunt, qualia sunt scor-  
dium, ruta, abrotanum, absyn-  
thium, salv. rosmarin. bacc. Juniper.  
lauri, sem. cumin. levistic.  
Camphora, Myrrha, Mastix, spir.  
vin. Camph. spir. Sal. Hermen.  
calcis vivæ, flor. Sambuc. Cam-  
phoræ, Matricalis, &c. Sic & hic  
maximam opem afferunt salia vola-  
tilia oleosa, quæ tales poros ha-  
bent, quos materia subtilis facili-  
mè persluit. Motus iste, quo sal  
ille movetur, iterum cutis poros  
penetrat, eundemque motum par-  
ticulis obstruentibus adfert, & sic  
dissolutio peragitur. Ex sale enim  
volatili oleoso internè & externè  
exhibito tumorem inflammatorum  
de tumefactum sæpius observavi-  
mus, & si dolor simul maximè  
urgeat, tutissimè Ranodyn. nostra  
c. spir. C. C. volatili circa vesperam  
propinari potest. Anodyna enim  
commode cum sudoriferis miscen-  
tur, viscositate enim sua acutos sa-  
lium angulos obtundunt, ita-  
que:

*℞. Theriac. rec. ʒij.*

*Diafcor. F. ʒj.*

*Antimonii Diaph. gr. xv.*

*Salis prunel. gr. v.*

*Theriac. cal. gr. j.*

*M.*

Febris curandæ ratio consistit in re-  
ductione massæ sanguinis ad pri-  
stinam mixturam, quod optimè  
per sudorifera fixiora ut regul. anti-  
monii bezoar. miner. &c. perficitur.  
In Inflammationis augmento tenta-  
tur attenuatio stagnantis incrassatæ,  
non debite mixtæ & agitatæ  
materiæ, introducendo particulas  
fluidas aquosas, & fluvia oleosa  
subti-

subtilissima ( non crassa , ramosa , quibus poris magis constrictis , malum potius augetur : ) spirituosissima, salina, volatilia, ( aliquando & acida tenuissima, si viscositas sit incidenda : ) quibus inhibetur effectus acutarum imprimis acidarum scindendum, particulæque inhaerentes rigidæ e poris elutuntur, præprimis à lubricis facili se in- & extricantibus, materia coagulata fluidior debite mixta & agitata redditur, imò & tubuli laxantur, & ad hanc sufficienter admittendam convenienter disponuntur, quo ipso discutitur tumor, sitque legitima restitutio. Applicantur indicata remedia optimè sub forma foras externi vel cataplasmatibus calidè usurpandi, multum enim contribuit calor actualis. Cura ergo Inflammationis perfici debet, non, uti veteres solebant, repellentibus, astringentibus, & refrigerantibus, que tantum obstructions tubulorum augent, qui subtilioribus evanescentibus particulis æriores redditi, fibras & tubulos discindunt vel rumpunt, unde aucta obstructione major supervenit tumor, & ad gangrenam via redditur magis expedita. Melius proinde obstructionem hanc factam tolles alcalibus volatilibus aromaticis ac balsamicis, ex. gr. spir. vin. Camph. item simplici rectificato ut tartarificato vel crocato. Spir. Sal. hermeniaci, c. spir. vini & calc. viu. parato, auxiliatur etiam vinum & cum vino factum luxivium, Decoct. calc. viv. cum spir. vin. Camph. & Matricali mixtum, sequenti pro usu ordinario nobis servamus.

*Re. Aq. calc. ʒiij.*

*Spir. vin. Camph. crocat. matric. aa. ʒj.*

*Sal. saturni ʒj.*

*M. D.* ad vitrum, quod linteis duplicatis calidè sæpius applicetur. In Curatione Inflammationis solum aqu. calidam cum sapone veneta proficuum fuisse observavimus,

ut & infusum Ther. Suffumigia ex succino, mastiche, gum. animæ, oliban. sæpius instituta non negligenda sunt, vel Epithemata ex scordio, card. bened. absynth. ruta cum quatuor farinis in urina vel in sero lactis vel in lixivio, vel cum proprio decocto sæpius tepidè applicata, maximè juvant. Epithema sequens Phlegmonicum maximè conveniet.

*Re. Summit. rute*

*Scordii aa. M. ʒ.*

*Rorismar. M. ʒ.*

*Absynth.*

*Alli aa. M. ʒj.*

*Sem. cumin.*

*Carvi*

*Fenicul. aa. ʒʒ.*

*Sal. Tartari*

*Sal. Hermeniaci ʒʒ. in vin. solut.*

*Spir. vin. rectif. ʒij.*

Extrahe in MB. l. a. Ra

*Re. Huius Tinct. Phlegmonica ʒxij.*

*Camphor. ʒij.*

*Spir. Sal. hermeniaci ʒj.*

*Spermæceti ʒʒ.*

*M.* & applicetur calidè eum linteis. Cataplasmata enim Nobis magis arident, imprimis sequens vel simile.

*Re. Herb. rute*

*Scordii*

*Absynth. aa. M. ʒ.*

*Pulv. rad. bryon. ʒʒ. ʒij.*

*Fl. sambuc.*

*Chamomill. aa. M. ʒ.*

*Farin. lupinor. ʒj.*

*bacc. lauri ʒx.*

*Coq.* ad consistent. pulvis molis, add. *Spir. sal. hermeniac. calc. viv. parat. ʒij.*

*M.* calidè applicandum & bis vel ter in die repetendum. Tinctura myrrhæ, aloes, croci, mæcis, nec non sinapi, allium, cæpa, tabacum &c. quæ in se continent sal volatile ac aromaticum maximè proficua erunt externè applicata. Cum verò vulgus in Inflammationibus abhorreat à madidis tum spirituosiss, tum cataplasmatibus, hinc ægri sicca expositulant, in quem finem ex supradictis herbis

herbis fl. sambuc. aliisque aromaticis, adjectis salis tart. & hermeniaci Camphor. &c. sacculi repleti & calidè applicari queunt, hæc enim omnia acidum temperant, invertunt ac absorbent, alii farinam vel cretam cum floribus sambuci & cort. inter sambuc. applicant: salia volatilia oleosa applicari possunt, ut & diascordium & Theriaca, quæ juvant novos inducendo motus. Pars quoque inflammata foveatur crebrius decocto sulfuris cum urina, conducitque succus cancerorum fluviatiliū calidè impositus & renovatus. Excellit insuper decoctum ex blandis diaphoreticis ac aromaticis cum spir. vini Camph. & aqu. Regin. Hungar. Ad partem etiam fovendam egregium est decoctum Rad. bryoniz in vino, vel si in eodem decoquantur plantæ aromaticæ veluti rad. ireos nostr. rosmarin. menth. scord. &c. prodest quoque lixivium sequens vel simile:

*℞. Ciner. Sarment. vit.  
Vitrioli aa. ℥ij.  
Sal. tartar. ℥j.  
cum vino gallic. &  
aqu. fl. sambuc. f. l. a.  
lixivium calidè  
sepius applicand.*

Aliquando & emplastra pro renata applicari possunt, modo non nimis emplastica fuerint, & præaliis confert Empl. de Labdano, vel de Cinnabari nostrum, vel diaphulph. vel Empl. de sperm. ceti cum camphora & croco. Melius verò juvat Epithema sequens vel simile.

*℞. Facis cerevis. ℥v.  
Sal. tartari ℥iij.  
Camphor. ℥j.*

*M.* & calidè cum linteis applicetur. In Inflammatione semper eò respiciendum est, ne medicamenta nimis sint calida, nam sicuti ignis nimio suo calore res corrumpit ac discindit, ita & fibras plurimas ejusmodi remedia calidiora dirumpunt, ac discindunt, imò in cinnos abire faciunt, medio ergo

tutissimus ibis, quod juniores Medici apprimè notari velim. Ab omnibus quoque acidis in Inflammationibus abstinendum est; si motus sanguinis nimius est, venæsectionem admittimus, ut & Enemata imprimis ubi dolor urget. Lac virginis sunt qui calidè imponunt, sed videndum ne in vulnus ponatur, quia interdum constat acidis, hinc partibus vicinis tantum imponunt. Si autem pori tam pertinaciter sint obstructi, ut tam subtilibus nolint auscultare, nec se incidi patiantur, & sic Inflammatio discuti nequeat, suppurationi iisdem remediis procurari potest, solis enim alcalicis & volatilibus tota res perficitur; si enim obstructio partis inflammata talis existat, ut obstructæ fibræ penitus rumpantur, particulæ chylosæ effundantur & puris materiam præbeant, tunc suppurationi ac maturatio promovenda est; quibus maturantibus scilicet remediis externis pori magis obstruuntur, qua obstructione facta interior promovetur fermentatio, ac proinde ruptis tubulis materia extravasata, quæ in illis stagnabat, in unum focum colligitur, & pus constituit; quæ suppurantia ex viscosis, pinguibus mollibus efficiuntur. Post maturationem pus emittitur, ulcus detergatur ac consolidetur, ceu inferius de Abscessu prolixius percipiemus.

Qui sanguinis circulationem norunt, à repellentibus, in crassantibus facile abstinebunt, cum sciant particulas inhærentes non posse per arterias regredi, omniaque acida & austera valdè nocere, hinc & repellentia, quæ talibus constant particulis, angue pejus ceu dictum, fugiunt, cum acida, ut notissimum, omnes nostros succos coagulent, & constipent potius quàm dissolvant vel repellant. Malè verò faciunt, qui ejusmodi remedia applicant supra partem affectam, frustra impeditur, ne ma-

teria partem ruat, cum hæc omnia ex ignorantia circulationis sanguinis procedant. Si sanguis hic nimium premens dolorem infert & inflammationem auget, quando scilicet plus sanguinis circa partem inflammatam colligitur, quam venæ absorbere possunt, & simul ex illa vehementi pressione membranz ac vasa extenduntur, & sic fibris minantur rupturam, hoc in casu V. S. institui potest, ut nimium sanguinis cursum moderemus, & interponenda sunt temperantia, alias V. S. plus obest quam prodest. V. S. enim non intendimus derivationem sanguinis à parte affecta, cum circulatione detecta sanguinem per partem affectam circulari clarissimum sit, sed V. S. hoc in casu hoc præstabit, quod sanguinis impetum & copiam diminuat, unde arteriarum vasorumque latera collabuntur, porisque coruæ minus parulis factis, tanta humorum tractio & pressio fieri non potest, & præcaveatur quo minus per pressionem à tergo sequentem vel profundiores emergant obstructions, vel ipsarum fibrarum raptiones. Suffumigia etiam, cum jam diximus, instituuntur, quæ sola sæpe laudabilem præstiterunt effectum, ex pulv. fumal. usitato, additis sabina, tabaco, scordio, roremarino, thure, mastiche, aliisque pluribus.

In Statu Inflammationis quando vasa à contenta materia modo sunt erosa, vel ubi rosio impediri nequit, & adsint ardor, rubor, tumor, pulsatio, dolor, (phenomenis hæc humoris qualitatem, partem affectam, morbi que statum indicantibus, ut id intendinis à punctura Inflammatione manifestissimum est:) agitatioque particularum modicè adaugenda, (non sistenda, ne gangrena suboriatur:) similibus aut fortioribus, quam in discussione adhibendis, quibus dum maturatio (ut ajunt) seu erosio & fluiditas sunt promota, cutis aperitur, proditque *Exulcer-*

*ratio*; quo pro sui diversitate, vel curationem vix admittit, vel diversimodè curatur, temperando pus, si materiam, eamque educendo, & quicquid accretionem à ramosis, viscosis, &c. insinuantibus se & adherentibus (secundum cursum fluidi,) filamentis tubulorum impedit, amovendo, internè ob intemperiem acrem, vel aliam causam, non bonè constitutum sanguinem corrigentibus: Externè remediis acere quodcumque temperantibus & propterea merito suo appellandis mundificantibus.

*Abscessum* cum consideraverimus, vel ut fientem, vel ut factum, duplex etiam instituenda est ejus curatio. Ubi primum enim videmus Inflammationem diaphoreticis & resolventibus nequaquam obtemperare, quamvis omnes ad suppurationem materiæ stagnantis promotionem statim confugiant, melius tamen agemus si quamprimum discutiamus ac Inflammationem ritè curemus, omisiss repellentibus omnibus adstringentibus ac refrigerantibus, cogitationes unice in obstructionem intendentes, cui scopo inserviunt sapientis dicta alcalia volatilia, aromatica, balsamica, tum interna, tum externa, v. g. spir. vin. Camph. Balsam. Neryin. spir. catarrhalis n. d. volatilis, cephal. volat. atther. balsam. Ischiat. spir. sil. hermeniaci aromat. cum aqu. calc. viv. Suffumigia Sal. volat. oleos. &c. quorum plura superius in Inflammatione enumeravimus. Oleosa & pinguis angue pejus videntur, emollientibus & resolventibus, iisque in lacte coctis utendum, quapropter aliis pulverem nostrum dissolventem, vel Empl. de Cumino in Belgio multo usu receptum imponatur. Alii Empl. de meliloto malaxat. cum oleo lil. alb. jam in acutum tendenti tumori ac ad maturationem inclinanti imponunt, plures Empl. de melilot. cum diachyl. miscent: Nos alius Empl. de Labdano hoc in casu præferimus. Inter reliqua eminet lac, in quo co-

*Curatio.*  
*Abscessus.*

Etus fuerit Sapo Venetus, cujusdo-  
sus pro Inflammationis statu auge-  
bitur, aut imminuetur. Decoctum  
illud parti affectæ cum linteis mul-  
tiplicatis appositum mirè maturat,  
& Abscessum aperit: in quem fi-  
nem etiam ex variis emollientibus  
fl. chamomill. verbasc. melilot. sem.  
lini. farin. fessall. mell. vitell. ovor.  
&c. parari possunt varia cataplasma-  
ta, ac linimenta calidè imponenda,  
quo præstantius sequenti vix ullum  
datur.

*R. Herb. alb. Mij.*

*Menth. M. ʒ.*

*Fl. Chamomill.*

*Melilot. aa. M. ʒ.*

*Cog. in lact. dulc. B. 3. in fine add.*

*Mice panis alb.*

*Farin. lini aa. ʒiij.*

*Ol. diapalm. ʒj.*

*Vitell. ov. N. ij.*

*aliquid croci*

*F. Cataplasma.*

tepidè applicandum. Quando verò  
nobis constat pus adesse in sufficien-  
ti quantitate, nec in suos canalicu-  
los resfluere posse, ipsum eliminan-  
dum, & foras ejiciendum est, ne  
tubulos vel canaliculos plures di-  
scindat ac dilaceret, atque amplio-  
rem foveam excavat. Circa Abs-  
cessus, maturationis tempus linci  
cum gummatibus, &c. plurimum  
ætheris transmittentibus simulque  
cutis oros obturantibus, quo in-  
testina agitatio magis continuetur,  
applicandi. Aperitur dein Abscessus  
vel benignioribus vel diachyl.  
cum sem. sinapi & sale, vel sequen-  
ti ruptorio nobis solenni.

*R. Mell. ʒß.*

*Ferment. ʒij.*

*Ocul. cancr. ʒß.*

*Sal. succin. v. gr. vj.*

*Axung. lepor. ʒiij.*

*M.*

vel ferro & cauterio potentiali. Pu-  
re evacuato, ulcus ab acido acri  
liberandum, sive ut vulgares lo-  
quuntur Chirurgi, mundificandum  
est, in quæ finem plures utuntur  
succo apii, centaur. min. agrimon.  
betonie, absynth. aristoloch. cha-

rosok. virg. sol. vel eorundem de-  
cocto in aqu. & vino, non verò tu-  
rundis utendum, sed tantum plu-  
maceolis, si pars non fuerit sensus  
delicatiore, associatis rad. aristolo-  
ch. O. gentian. fetophul. distamn.  
Omne verò absolvunt paginam spir.  
vin. Camph. aqu. Regin. calc. viva  
Balsam. sulfuris thebachin. vel ani-  
fat. Ol. Balsam. Peruv. bals. divin.  
spir. matric. &c. Probè sic purga-  
to ulcere chylus fiat balsamicus vo-  
latilis & dulcis, ut parti appositus  
carnem generaret, cui scopo infer-  
viunt pomphol. lithargyr. ceruss.  
sal. saturni, pulv. aristol. long. vit-  
triolata & Onosi eximia etiam sunt  
balsamica ac absorbentia. Produ-  
cta carne esse cicatricem inducen-  
dam vulgo urgere solent, quod per-  
ficiunt exsiccantibus, contrahenti-  
bus, adstringentibus & densantibus,  
quibus tamen me judice non opus  
est, quia correcto chylo ab ipso hoc  
ritè apposito, & ab aere defenso,  
omnia perfectè consolidabuntur.  
Si caro copiosius expullulat, absu-  
menda est cathartecis, quæ tamen  
ita corrigenda est ac temperanda,  
ne magna nimis ab illis fiat absum-  
ptio, utimur hoc in casu aluminos-  
is ungu. Egyptiaco inspissato &c.  
sed corrigendum est acidum & ab-  
undantius serum absorbendum, hinc  
& remedia internè in Abscessu ad-  
hibenda sunt, varia scilicet vola-  
tilia oleosa, sal volat. nostr. oleo-  
sum, Elixir vitæ, spir. matric.  
volat. imò hic omnia viperina con-  
ducunt. Tinctur. viper. Vigon. an-  
timoniata quoque haud negligenda  
sunt, Tinct. nostr. antimonij sola-  
ta, antimonium diaphoret. Anti-  
hect. Poter. imprimis acidum ab-  
sorbentia, hinc sæpe soli sufficiunt  
oculi cancr. in Abscessibus egre-  
giam navantes operam, ut & cry-  
stall. montan. Terr. Japon. &c. imò  
Balsamica hic omnem implent pa-  
ginam. Præ aliis autem commen-  
damus ol. Balsam. Peruvian. ritè  
cum alkali destillatum, vel Balsam.  
Chili Anglorum. Potiones quoque  
vulnerariz, item potus calidus Theæ

vel Caffea apprimē conveniunt, quia sunt diuretica, quæ magni usus sunt, tum in Abscessibus internis, tum externis ex variis vulnerariis parata ex. gr.

*R. Aqu. Heder. terr.*

*Agrimon.*

*Fumar. aa. ʒij.*

*R. Ocul. cancr. ʒi.*

*Bellid. ʒiij.*

*Syr. dialth. F. ʒj.*

*M. F.* Mixture cochleatim assumenda. Ut curam Sinus paucis etiam attingamus, statim hic aperiendus est, & materia intus contenta evacuada dein expurganda venit cavitas spir. matricali, aqu. calc. viv. vel hord. in qua solutum fit mel rosaceum, quo posteriore Galli cum fructu utuntur; & quoniam pellicula vel callus cavitatem illius obducentes carniū agglutinationem inhihent, ipsis auferendis opera danda est. Si in partibus carnis sedem habuerit Sinus, totam ejus cavitatem dissecare expedit, at si ferrum ad fundum usque pervenire non valeat, intingendæ sunt rurundæ lapide caustico liquato & in Sinum immittendæ. Si verò Sinus angustia ferrum nequaquam admiserit, hoc uti possumus remedio.

*R. Therebinth. ven. in vitell. ov.*

*dissolut. ʒj.*

*Pulv. Mastic.*

*Oliban.*

*Myrrb. aa. ʒij.*

*Ol. rosar. q. s. digest. cui miscetur mercur. præcipit. rubr. ʒj. aluma ust. ʒiij.*

*M. ad usum.* Conducie quoque balsam. saturni cum Camphora Sinui imponend. eum linteis carptis, item confert oleum antimonii. Omnibus verò aliis generosis preferimus Balsamum nostrum divinum ob vires divinas ita à nobis nominatum, quo plures Sinus & fistulas, pro incurabilibus à Chirurgis habitas feliciter curavimus, testis est Chirurgus noster Castrensis, hujus n. balsami guttulæ aliquot Sinui vel ulceri fistuloso immittantur egregio, & semper felici cum successu. Ubi

callus magnus adsit, qui ferro abscindi nequit, sequens adhibendum est:

*R. Mercur. Sublimat. correct. ʒj.*

*Opii exsiccat. ʒj.*

*Excip.* Tragacanth. & formentur trochisci, pisi magnitudine, qui Sinui immittantur, in eoque per 12. aut viginti quatuor horas retineantur. Si autem trochisci vehementius agant, opii dosis est augenda, Sinus anfractuosi ferro ad fundum usque, si locus incisioni detur, aperiendi, callosaque latera mitioribus vel fortioribus, prout res opus habet, catharteticis auferenda, dein procedendum ut in Simplici Ulcere. Interna cura eò dirigenda est, ut intemperies aeris sanguinis aliorumque Succorum corrigatur per absorbentia, sudorifera ac diuretica superius de Abscessu satis dicta, quæ repetere non libet.

### CAPUT III.

*De Bubone & Anthrace, seu Carunculo.*

§. I.

**P**ROUT in Macrocosmo ardentes & flammanes observantur montes ut sunt Aetna, Vesuvius, Gannapus, &c. Sic in Microcosmo aliquando tempestuosissimus sanguinis ac succorum coctus & æstus exurgit, unde sæpe ardentes oriuntur monticuli, h. e. Tumores inflammatorii, veluti montes flammivori modo aperto igne conspiciuntur magis, unde Anthracum fluxit nomen, modo occulto, quod in Bubonibus visendum est. Ut enim ipsi illi montes modo cæruleas fundunt & præcipitant flammæ, insignissima strage accolarum & vicinorum camporum, modò fumante solum tecto easdem sublimant, ita quoque in Tumo-

*Anthracum.*

*Bubon.*



Tumoribus hisce ut plurimum malignis se res habet. Ut alluvie sua continua, & motu maris perenni somitem incendii præbent & suggerunt marini fluctus, commoventes Sulphur, ignis matricem: Parilem in modum unda microcosmi desumpat quasi ad exitos parietes miasmata unctuosa, crassiora, salino-sulphurea, calore, rubore, dolore, per cuniculos elatos incendium particulare afferentia. Terribilis est uterque effectus, casus difficilis, & non paucis lethalis.

Bubo ab inguine, tanquam ut plurimum existente loco affecto, ita dictus, Tumor est inflammatorius occupans ut plurimum partes glandulosas, hinc potissimum glandulas inguinis, nonnunquam colli vel secus aures, unde parotides emergunt, de quibus supra de Aurium Affectibus abunde egimus, nunc verò de Bubone in genere pauca disturi sumus. Vocatur & Aliis Tumor inflammatorius erysipelaceus.

Bubo dividitur vulgò in benignum vel simplicem & malignum, hinc rursus in Venereum & Pessilentialem. Simples Bubones sunt pueris & adolescentibus familiares, unde & vulgò augmenti corporis indices habentur & dicuntur Germanis, Vvöchs Drüsen ab abundante sero ibidem stagnante quacunque de causa ob laborem, aerem frigidum &c. oborti tumores. Maligni vel pesti debentur, ceu fructus & effectus, simulque indicium communissimum, vel sui venereæ, hinc venerei dicti, luum enim hanc comitantur, eum gonorrhæa virulenta aliisque Symptomatibus, maximam acrimoniam, & viscositatem seri, & inde obstructionem enatam pertinacissimam notantibus.

Quod si ~~Phlogistis~~ animus sit, ipsa notio melius Tyronibus patebit. Notat verò Bubo extra corpus humanum consideratus avem fœralem, quo de Poeta:

*Tomus II.*

*Ignarus Bubo, dirum Mortalibus omen.*

Nostro verò in foro triste & fœrale pestilens virus ut plurimum denotat, sic etiam ceu diximus Tumorem glandularum inguinis benignum indicat. Sunt ergo Bubones Tumores glandularum maligni & dolorifici, in locis magis glandulosis corporis infecti erumpentes, à lymphæ, aliisque succis acerbis corrosivis stagnantibus producti.

Carbunculus dicitur Latinis à Carbone, uti Græcis Anthrax indigitatur; Carbunculi hi indefinitis locis hinc inde palantes visuntur majori ardore & rubore infames, unde Anthrax Ulcus vocatur, crustam habens cum multa partium circumjacentium Inflammatione. Dicitur hic affectus aliis Ignis Persicus quod Persis sit solennis, ab *Avicenna* nuncupatur *Pruna*, item in Carbo Germanis dicitur, eine Khol oder eine Corfunchel Blotter ein pesthol. Gallis un Charbon. Describitur vulgò Carbunculus, quod sit ulceratio cum Inflammatione, aliquando cum ipsa peste conjuncta, nonnunquam sine ea, cum pustulis igneis ardentissimis febre & dolore acutissimo, variis in locis nonnunquam cum, plerumque absque Suppuratione productus, latius in ambitum serpens, carnem exrens & ulcus veluti Escharetico inustum reliquens, à stagnantibus acerbis corrosivis succis proveniens. Vel brevius describitur, quod carbunculus sit Tumor à succis acerbis rodentibus ac scindentibus tubulos lacerantibus proveniens.

Num ad classẽ Epidemiorum, quàm Endemiorum Carbunculus referendus, an sit novus morbus, prout nonnulli somniant, judicent Critici.

Differentia Bubonis & Anthracis plurimum in eo vertitur, ut Bubo occupet partes glandulosas, Anthrax verò tendinosas.

Paraf.  
fclla.

§. 2. Subiectum horum affectum sunt partes externæ corporis, non exclusis etiam internis, hæc enim affici posse, Experientia & ratione comprobatur, *Paulus Barbet* enim inquit *de Peste* p. 413. Rarum admodum, attamen verum, oculum, nasum ventriculum; imò & intestina ipsa Carbunculo affici posse absque ulla curationis spe. De Carbunculo in cervice vesicæ suppressionem Urinæ, & tandem mortem inferente, confer eundem *Barbette* loco citato, & paulò inferius. Ut plurimum verò tendinosas corporis partes affici in Carbunculo omnibus notum est; hinc, & dolor intensus semper adest. In Bubone verò partes glandulosas ut plurimum affici jam superius indigitavimus, glandulæ istæ corpora sunt torunda, in quibus tria asterisco digna observantur: Primò, singulas glandulas arteriæ ramum recipere, qui ad illos sanguinem advehit, & ab ipsa proficisci venæ ramum, qui eam sanguinis portionem revehit. Secundò, ex singulis glandulis oriri Canalem, ex quo fluit liquor à sanguine diversus. Tertiò tandem glandularum compositionem duplicem esse; quædam tantum sunt fasciculus aut glomer vascularum, quæ mutuo conjuncta canalem efformant, per quem peculiaris liquor defluit: Illæ verò nihil aliud sunt, quàm glandularum minimarum compages. Quibusdam in locis vesiculæ istæ sunt angulares, & inter earum cavitatem mutua conspicitur communicatio, ita ut illæ universæ in duas tresque desinant, quarum elongatio canalem unde fluit, liquor à sanguine differens, efficit. In aliquibus aliis locis ex vesiculæ sunt distinctæ, quarum unaquæque singularem canalem emittit: Glandulæ vesiculares sunt, quæ ex vesicularum congerie solummodo constant. Si tria hæc attenta mente consideraverimus, & ad eorum examen animum nostrum adju-

xerimus, nullo negotio glandularum detegetur textura. Arteriæ sanguinem adferunt, qui irroratis vasculis vesiculisque glandularum retrograditur per venas, quæ ab ipsis exoriuntur. Deinceps glandulæ ex vasculis aut exiguis vesiculis liquore à sanguine diverso repletis sunt coagmentatæ. Sed quia hucusque nullum oculis nostris occurrit vas, quod aliquid ad glandulam afferat, præter arterias, quæ ad illam sanguinem apportant, jure merito credere possumus, liquorem istum portionem sanguinis arteriosi quandam esse, quæ ab eo separata fuit vel à vasculis, vel à vesiculis, & quæ in ipsorum cavitatibus collecta est, unde fit, ut liquor ille semper à glandula effluat per canaliculum, qui ab ea proficiscitur, & quem canalem Excretorium appellamus. Afferere quidem possumus, non solum diversos poros arteriarum glandularum non esse pares, verum etiam poros arteriarum unius glandulæ absimiles esse poris alterius glandulæ, quod liquet eo, quod aliquoties exeat ab una glandula liquor planè discrepans à liquore qui ab altera effluit. Notandum deinceps de glandulis, quasdam apparere solitarias, & nulli alii connatas, nominantur ex glandulæ *conglobatæ*, quia considerantur ut globuli, qui liquorem à sanguine separant segregant que.

Sed quando adest glandularum congeries, & universæ unica involvuntur tunica, & cunctæ eorum vasa excretoria in unum coeunt, atque hoc pacto canalem componunt, per quem fluit liquor, quem unanimiter à sanguine separatum existimant, *Glandulæ conglomeratæ* nuncupantur, quam verò distinctionem *B. Bonet* hoc *Amicus noster* dum *verberet singularem*, & *post busta colendus*, non admittit, qui statuit, omnium liquorum separationes fieri ope glan-  
dularum, quæ nihil aliud sunt, quam

quàm textura minutissimorum canaliculorum, ex minutissimis arteriarum ramis, in quos sanguis nimis crassus non influit, sed tantum tenuis succus in tam exiles canales ingreditur. Separatio igitur humorum non per poros peragitur, sed per canales, qui magis apti sunt, quia succi facile ex parvis ductibus in minores introduuntur, & sic premuntur donec à crasso sanguine & succo separantur. Ab aliis pleræque glandulæ conglomeratæ dicuntur *Vasculares*, & pleræque conglobatæ vocantur *vesiculares*. Sed aliquantum in gratiam Tyronum erimus in his prolixiores, ut eò melius parte affecta sic explicata, causas & curationes horum affectuum intelligerent. In glandulis ergo conglobatis principaliter in inguinibus, & sub axillis prorumpere solent, quorum etiam pertinent Tonfillæ in summitatibus faucium consistunt, lympham deponentes ad humectandum, & lubricandum œsophagum pro usu deglutitionis, & deglutitorum promotionis, in quibus tonfillis Bubonem observavimus aliquoties. Dein etiam in collo, sub mento & prope aures potissimum, interdum in glandulis mammarum erumpunt. Ut plurimum verò eum jam sapius diximus, in inguine Bubones apparent, hinc à pluribus Pestis Bubonibus comitata *Lues-Inguinaria* vocatur. In aliis quoque corporis partibus, præsertim in artubus tales tumores oriri possunt. Sic *D. Gieselerus Obs. 172. de Peste Brunsv.* in Brachi sinistro medio musculo supra cubitum, Bubonem seu tumorem durum non admodum elatum, sed latum, indolentem & cuti reliquæ concolorem, unaque similem sub *Mento* vidit. Sic etiam *P. Barthele Obs. 30.* mentionem iniicit Bubonis pestilentialis, interius circa brachii sinistri articulum musculi bicipitis tendini inhzrentis. Et *Zacutus Lu. Janus 1. 3. Prax. admirand. Obs. 391.*

Bubones se observasse scribit plures, etiam in capite, nucha, humeris, thorace, umbilico, femore & tibia lethales, eo nonne refutatas à *Diemerbrokio l. 1. de Pest. c. 14.* *Zacutus* enim non magna fides adhibenda est, quoniam in pluribus excedit. Sed veritatem temper studendum est ne Tyrones decipiamus, & à via Regia declinemus. Carbunculi in omnibus verò corporis nostri partibus prorumpunt, non enim habent certa determinata loca, in quibus producuntur, sed indiscriminatim modò in collo, modò in abdomine, sæpius in dorso, frequenter in cruribus, brachiis, pedibus, digitis, qualem *Francothalii* tempore Pestis observavimus, imò in visceribus interioribus solent fuere abscessus, & non Bubones, ipsis tamen analogi.

6. 3. Quò quis melior in cognitione, eo felicius erit in curatione, effatum est commune. Opus ergo est signis, quorum ope morbus intellegatur, quapropter *Signa Diagnostica* Prognosticis præmittenda sunt, cum qualis sit morbus, & quæ ejus conditio, doceatur. *Bubo* cum vel simplex sit, vel aliis quibusdam symptomatibus stipatus, utriusque cognitionem nobis comparabimus. Dignoscitur autem simplex à tumore cum renitentia, rubore, dolore & febris levicula. Symptomaticus cognoscitur si per se & nullo prægresso morbo, oboritur. Criticus vel ille dicitur, qui morbum alium sequitur, egerque ad ejus eruptionem levatur. Bubo malignus aut Pestilens percipitur tum ex, quod ipsius symptomata sint vehementiora, imò quæ ipsam Pestem comitari solent, tum quod vel in Febribus malignis vel sæviente Peste exoritur, frequentius sub axillis quàm in Inguine appareat. Bubo Venericus Inguina ut plurimum affligit, & in axillis rarissimè videtur, ipsum venericum esse certo scimus, si agrotans eum impuro scorto se rem habuisse fateatur, reliqua

que luis venetæ signa appareant. Bubones primò se in conspectum dant ex albo rubicundi apparentes, dein brevi rubicundiores redduntur ac splendiores, imò sapius fuscæ ac ex nigro rubicundi, ardore ac æstu summo præditi; plerumque altius sub cute latent in glandulis, & in initio hinc inde protrudi possunt; verum statim magis magisque intumescunt, ac incrementum accipiunt, sicq; immobiles redduntur cum tensione, duritie, ac velut solido nervo ad partes vicinas sæpe producto: notabile tamen est, aliquando citius oboriti Bubonem, ita ut vel occurrat ante febrem, interdum post demum; nonnunquam etiam levius ferri, tum quoad totum, tum quoad ipsam partem affectam, quæ singula à diversitate succorum earumque stagnatione eveniunt, & ubivis probè discernenda.

Signa Diagnostica *Anthraxis* sapius infallibilia esse scribit *Barbette de Peste* p. 477. quia Anthrax, seu Carbunculus diversa admodum specie se manifestat. Plerumque tamen, ubi Carbunculus fieri debet, adest pruritus, sequitur pustula major, vel plures minores milii seminis magnitudine & acerrima, quæ inde oriuntur, quòd non duntaxat ramus quidam magnus, ubi Anthrax prodit, sit obstructus, sed rami etiam minores, ex quibus pustulæ itidem minores erumpunt, & visu conspiciuntur. Nec diu pustulæ speciem servant Anthraces, quin mox tumorem duriorem in universa sui circumferentia ostentant, sicuti in sui medio & centro in ulcus exedens aperiantur, quin imò sæpenumero quaquaversum ambulant, & vicinas partes mirè depascunt, unde nonnunquam oculos inde excidisse *Sylvius* notavit. Sed & post curationem subinde contingentem, scædæ ac prægrandes cicatrices remanent propter carnis multæ depredationem. Caro omnis Anthracibus correpta mortificationem gangra-

na similem patitur. Aliquando vero absque pustula magna oritur Carbunculus, sed ulcus crustosum producitur, quale fieri solet à candente ferro, ejus crusta modò nigricantis, modò cinerei coloris est. Caro circumposita maxime ardet, & quidem circa vesperum, & colorem habet nigriorem, quam in Erysipelate, & phlegmone. Crusta ablata non semper pus, sed carocaliqua spongiosa occurrat, quæ à sana parte relicto ulcere cavo, abscedit. Colorem pustulis his atro-purpureum assignat *Barbette de Peste*, qui ibidem etiam albas pustulas non excludit, hisce prolatis verbis: *Si sapius non nisi pustula alba, atque plana se exhibet, quæ pus bonæ notæ continere videtur, compressa verò sicca omnino & dura notatur, profundè admodum subiectam carnem consumens.* Varia Carbunculum malignum comitantur Symptomata, veluti febris, nausea, vomitus, palpitatio cordis, animi deliquium, delirium, convulsiones, anxietates præcordiorum, &c. ut jam dicta brevius connectamus. Manifestat se Carbunculus quadam minori albicante pustula, interdum numerosis iisque acerrimis & acutissimis doloribus ægros instantibus, quibus propediem succedit ulcus crustosum, iis non absimile, quæ à ferro candente excitantur. Nonnunquam erumpit ulcus absque præcedente pustula, crusta modò nigra, modò cinerea obductum, qua sublata profundum apparet Ulcus, pueritiam carnem circumcirca depascens & mortificans. Caro ipsi circumposita eum intensa phlogosi, & ardore circa vesperam ingravescens, effervesceat, unde omnis Carbunculus circulo rubro est circumdatus, qui nihilominus aliquoties liuidus est, aut coeruleus in Carbunculis malignis, quibus simul adjunguntur, febris, vomitus, inappetentia, palpitatio cordis, animi deliquia & deliria.

§. 4. Tradita sic Diagnosti, restat ut causam quoque subjungamus, & qui-

*Galenico-  
rum indi-  
cium de  
causa Bu-  
bonis.*

quidem proutquam *nostram* aperiamus sententiam, aliorum Affectus hosce explicandi rationem præferemus, inter quos ob vetustatem *Galenici* primus conceditur vota sua proferendi locus. Hi verò *Bubones* glandularum inflammationem esse dicunt, quos abscessorios tumores in pestiferos, simplices & prodromos morbi Gallici dividunt. Bubonis pestiferi *causæ* conjunctas duas esse contendunt. Efficiens nempe conjuncta est robur, & vivacitas expultricis Facultatis ipsarum partium principalium, quæ expulso semper ab illis ad sua emunctoria fit. Causam materialem esse dicunt sanguinam quandam corruptum, & omnino propria natura privatum, & sæpe adeo alteratum, & immutatum, ut à tota substantia naturæ inimicus sit. Causam hujus corruptionis esse ex aeris corruptione ajunt, qui attractus inficit spiritus & corrumpit sanguinem, atque sic pestilentes Bubones à putredine quatuor humorum oriri contendunt. *Bubonem* autem simplicem nihil aliud esse, quam glandularum inguinalium inflammationem, atque dicunt Hepar sæpe exonerare materiam viciatam ad inguina.

*Carbunculi.*

Bubones verò Gallicos in inguinibus obortos, quamvis non noverit Antiquitas, hinc à nonnullis Angi vocantur, Codocellæ, Tincones, & Panochiæ. Utpurimum verò tumores hos Gallicos deducunt à materia frigida transmissa ab Hepate, sed accidit, ut aliquando calida portio misceatur, & tunc dolor, rubor, caliditas apparent, & de isto Bubone venereo pronunciant celerem, & bonam maturationem.

Sanguine verò magis attrahilario existente, ubi se ebullit, & ad partem aliquam irruit, *Carbunculus* oriri asserunt, eodemque produci ajunt *Galenici*, ex quibusdam popularibus causis, imprimis malignis, & pestiferis. Cum Anthrax conspigitur splendens veluti pix

& bitumen; hoc esse ex atra bile contendunt; pestiferum Anthracem esse à materia venenata non dubitant: vesicarum & pustularum in Carbunculis exortum causam ajunt esse vapores ibi exhalantes. Alii sunt ex antiquitate, qui Carbunculos fieri autumat ex sanguine crasso, & calcfacto, alii ceu dictum, ex atra bile, h. e. ex malsa sanguinis crassa vergente ad naturam atræ bilis, alii à putredine quatuor humorum.

§. 5. *Paracelsi Bubo* vel *Bufo* est infectio ex duorum similium commixtione proveniens, & ex tertio in Apostematum generationem, ac per salia luxuriosa tandem in Ulcerationem producta. Cum enim illa duo mineralia simul in matricem veniunt, inde juxta ipsum Authorem, generatur *Bubo*, tum ex accessione tertii subsequitur *Bubo* vitriolatus; & causam hujus esse dicit, quod sperma luxuriosum scabie sua infectum est.

*Paracelsi  
rationem  
de causa  
Bubonis.*

Anthrax verò ipsi *Paracelsi* est apostema, quod ex Realgar Mercurii generatur, & in radice venarum earundem oritur, postea sibi facit exitum, suo centro nihilominus in radice manente. Inde sequi ait, unamquamque venam hujusmodi minerale Realgar continere. Quare quot venas tot Anthraces contingere contendit, ut Anthrax salvatellæ, Anthrax medianæ, cephalicæ, &c. Est ergo ipsi Anthrax apostema per sanguinem ex venarumque prima radice pulsum, uti communia cum emunctorio proprio, & est apostema radicale, quod oritur eo tempore quo mineralia venena solent apparere, similisque corruptio est ei, quæ fit in mineralium concavitatibus.

*Carbunculi.*

§. 6. Nunc etiam paucis de *Bubone* *luxta Helmontium* ac *Anthracibus* audiamus *Helmontium nostrum*, qui Bubonem ac Anthracem, aut Escharam, non esse materiam Pestis primitivam comprobat, sed effectum ac productum quod Pestis sibi paravit. Negat etiam contra Scholas, Bubones, ac Anthraces pestilentes non nasci à putredine quatuor humorum huius-

mo-

morum, ut neque ex aeris calore aut frigore, nec ex veneno aliquo abditatum causarum alumnio. Denique advertendum esse ait, quod cum Tartarus cruoris sive ultimæ digestionis vitiatæ scoria susceperit fermentum pestilens, non minus quam cætera transmutata, privilegium habent exhalandi per poros, sive ulla post se residenda, sive residuo capite mortuo, si nempe humores fuerint alimentarii, non autem si ipsa solidorum substantia in Escharam, aut Anthracem sit ambusta. Quamquam autem Tartarus cruoris præfata quoque gaudeat prærogativa, quoties extra vitæ Oeconomiâ, ut in infamis est proscriptus: attamen dum in pus aut virus saniosum transmutatus est, pellem prius eroditâ Escharæ speciem, quam quod vapore tenuis transsudet. Idque facili- cet ob impressam peregrini fermenti labem, qua degeneravit in transmutatum formale. At si odorem fermenti quidem hauserit tartarus cruoris, sed nondum sit transmutatus, sunt juxta Authorem nostrum *Glandule & Bubones*, quæ sudoris profluvio citra cutis apertionem non raro terminantur, ubi præfata illa nequeunt. Bubones venericos faciliè propagari posse à sordida Meretrice: Pestis ideam facili marte in glandulas protuberare ait, Pestiferos odores in stomacho paratos comitari sæpe Bubones in inguine scribit. Sic quoque Terroris imaginem in peste solo nutu suo, tam diversa à se invicem producta eudere existimat author, qualia ipsi sunt Anthraces, Bubones, escharæ, vesiculæ, tumores ac vibi- ces. Anthracum causam à sale cau- sico vult deducendam.

fla mensura largitur. Sed si ab heterogenea cujusdam, materiei adventu spiritus in motu suo perturbentur, sanguinem exagitant, & vehementes effervescentes in illo excitant, donec extraneum illud vel domitum, vel foras expulsum fuerit. Turgescit enim sanguis juxta mentem Authoris, quum scilicet irritantur spiritus à retentis vel lignibus, vel eorum peni à generosioribus alimentis locupletatur, vel à sulphure copiosius exhalato accuntur. Tunc enim tumultuarius commovetur sanguineus latex, vehementiusque ebullit, atque principiorum ejus solvitur, nec sanguis solus effervescit, eo vitio etiam contaminantur succi, tum ab eo emanantes aut discedentes, tum ad illum appellentes, variique eorum dyserasia exsurgunt affectus. Nulla autem cruoris massa advenit extraordinaria effervescencia, à quacunque excitata fuerit causa, quin ipsam subsequatur crassiorum, recrementariorumque particularum segregatio: & quo intensior durabiliorque fuerit fervor, eo copiosior fiat materiz impuræ separatio, majorque atque auctior ejus coagulatio. In axillarum vero inguinumque glandulis deponitur nonnunquam vitiosa ista materia, ubi ad mentem Authoris Bubones excitat, quia vasorum sanguiferorum furculis tenuissimis existentibus in illis, venæ impares sunt, sanguini illuc arteriis adfecto facile prompteq; reportando. Ipse autem crassioribus coagulatisque particulis repletus vascula ista permeare non valens, in iis commoratur ac stagnat. Succus quoque nutritius, cujus adenes receptaculum existunt, & per quas in vasa sanguifera transfunditur, in eorum laxiori substantia coagulatas suas particulas deponit, quoniam illarum poros adimplentes & obturantes, cum sanguineis jam aggregatis glandulam distendunt, & in tumorem bubonis nomine insignitum elevant.

5.7. *Philis* opinio de causa Boni est sequens: dum proportio nata subsistit principiorum sanguinis mixtura, motus ejus æqualis permanet, & universis corporis partibus, quas lustratione continua perluit, succos tum ad vitam, tum ad nutritionem necesarios in-



*Carbunculi.*

*Carbunculum* verò Author dicit à Miasmate quodam venenato sanguinem cum aere subingresso pendere, quia juxta ipsum atomi isti perniciosi cruori permixti, spiritus ejus in motus inordinatos compellunt, partes sulphureas exaltant, febrilemque ebullitionem in eo concitant, partes verò sanguinis tali labe infestatae ab aliis deficient, & in glomusculos coagulantur. Sanguis enim perperam partes univcrsas corporis pervagans, ad superficiem delatus, & in vasa capillaria propulsus in iis sistitur, glomusculis ipsi innatantibus in tenuioribus istis vasis haerentibus, viamque liquori adventanti praeludentibus. Aggesta verò coagulata ista locum, in quo coeunt, extollunt, & tumorem in eo producunt, qui sensim accrescit, à novæ peccantis materis accessu. Immanis autem ardor talem tumorem concomitans oritur, juxta Authorem, ab atroci ista deflagratione in sanguine producta à spirituosius ejus particulis aestro percitis, & sulphur. summè evectis, à qua potior aquæ portio exhauritur, spiritusque & tenuiores sulphuris partes perpetim avolantes dissipantur. Sal itaque freno amplius nequaquam temperatus exaltatur, spiritibusque ac sulphuri furibundis adjungitur: sed tandem principatum obtinens, & cum terra, crassioribusque quibusdam sulphuribus associatis retorridam constituit massam, cujus particulae congelatae, & in tenuiora quaedam vasa delatae in iis cespitant, & locum, in quo nidulantur adu-runt, exeduntque; liquor nervosus, à tali contagio intemeratus nullo modo subsistit: quum enim à sanguine tanquam à scaturigine sua ortum ducat, venenata ista miasmata, qui ab aere in ipsum irreperferunt, in sinum suum suscipit, quibus infectus cerebrum nervosaeque partes subiens varios irregulares motus in iis parit.

§. 8. *Silvius* triplicem *Bubo-*

num mentionem injicit, pestilentialium nempe, venereorum, & non-malignorum dictorum. *Bubonum* omnium causam ipse dicit sanguinem acrem ac viscidum, ob suam acrimoniam vel visciditatem, vel aliud vitium, in conglobatis, (non verò conglomeratis) glandulis haerentem, atque illas in tumorem attollentem, accedentibus pro vitii diversitate symptomatibus diversis. Ipse Author notat etiam, difficilius ad sui maturationem deduci *Bubones* pestilentes quam alios, & dolorem ardoremque molestiorem habere ut plurimum comitem, ex ardore autem bilem biliosumque humorem, h. e. sale volatili constantem peccare judicat. Si proinde in non-maligna dicta inflammatione acidum sanguinis tandem superat jus amarum, hinc in maligna idem desiderari, & minus potens esse, tunc acidum contendit. Hoc est, in malignis pestilentialibusque *Bubonibus* sanguinem bile abundante magis quam decet, habere saltem ipsum acriorem, aut humorem sali volatili similem, & acri constantem, minus verò acidi continere.

*Carbunculi* autem causam *Silvius* ab acri, vel ab acido, vel à falso lixivo deducit, & probat per id, quod à falso lixivo ardor rodens producat, ceu id testantur cauteria potentialia cuti applicata, idem confirmat per butyrum antimonii, quod ardorem, urentem ac rodentem cuti applicarum ducat. Butyro verò antimonii inesse acidum acre sal lixivum temperans, & infringens nullus dubitat. Concludit ergo, sal lixivum acre humoribus inexistens *Carbunculos* producere, hinc caro omnis *Anthracibus* correpta corruptionem, Gangraenae similem patitur, ad internectionem integramque mortificationem deducitur.

§. 9. *Cartesiani* ascribunt *Bubonem* originem succo chyloso in Glandulis conglobatis ab acido quo-

*Sylvii opinio de causa Bubonis.*

*Carbunculi.*

*Cartesiani opinio de causa Bubonis.*

quodam, siue particulis quibusdam angularibus acutis in lymphâ existentibus coagulato, & propterea in iisdem stagnante, non modò ipsas glandulas, sed partes etiam vicinas distendenti, & tumorem cum dolore, rubore & pulsu, uti in ipsa inflammatione producenti, hic verò succus chylosus cum in glandulis hisce non adeò sit lutosus, ut in aliis partibus, propterea bubones ajunt non facîle suppurari.

*Carbunculi.*

*Carbunculorum* causam non tantum obstructionem esse dicunt tubulorum in partibus quibusdam corporis nostri, sed materiam etiam, abs qua obstructio illa inducitur, particulis multis salis corrodentibus repletam esse, partes vicinas destruentibus & mortificantibus. Ejusmodi verò particulis acutangulis, siue salibus acidis corrosivis tempore pestis aerem abundare dicunt, quæ cum unâ cum aere assiduò inspicientur, sanguinem non modò incrassent, sed particulis etiam chylosis tenuissimis se insinuando, eandem ad similes redigant corrosivitatem; quapropter in extremitatibus arteriolarum subsistentes particule istæ chylosæ corruptæ, atque à materia coëstialiter, quàm anteà commotæ, angulis suis acutis fibras nervæ dissecando, non modò pruritum, & inflammationem inferant, sed partes etiam vicinas destruant, mortificent, & hinc inde pustulas suscitent.

*Nostri de sensu h. rum affectuum recensio- nem. Affe- ctuum sensu- rum.* §. 10. *Nos*, ut in causarum horum affectuum recensione eò felicius provehamur, ponemus ulterius, quæ ad harum inquisitionem solidiorem faciunt. Constat nempe vitam nostram fundari super circulatione sanguinis ac reliquorum succorum. Cum enim cor in corpore nostro sit instar anti- læ in machina Hydraulica existens, hinc cor contractione sua sanguinem ex ventriculis suis in auriculas immittit. Sed quoniam arteriæ sensim decrescunt, sanguis

in eas injici nequit magno cum impetu quin eas tumeficiat. Cum arteriæ hoc modo tument, ad pristinum redeunt statum fibrarum suarum elatere, & ea ratione partem sanguinis, quem acceperunt, cordis venis impendunt. Et cum cor iteratis vicibus sanguinem in arterias protrudat, ita etiam illæ extolli debent & subsidere iteratis vicibus. Motus iste arteriarum pulsus vocatur, circa quem annotandum est, arteriarum dilatationem cordis contractionem concomitari, & arteriarum contractionem ejus dilatationi adjunctam esse. Nos cordi tantum tribuimus munus sanguinem in arterias compellendi, ipsumque præcipuum circulationis instrumentum existimamus. Iis, qui autumant, cor esse sanguificationis organon, permittendum est, incertiori inniti conjecturæ, ut alibi videre licet. Sic quoque lymphæ quæ constat partim ex succo nerveo, partim ex lacte, circulat ex receptaculo lumbari in cor, & de corde in cerebrum, & sic iterum de partibus externis ad suum receptaculum. Sic & succus nervæ suam habet circulationem, quando ergò unus vel plures ex his succis subsistunt, sic morbus, imprimis verò serum cum sanguine aliquando ~~non~~ indispiscuntur in glandulis, hinc oriuntur tumores glandularum Bubones dicti, quorum causa proxima, & immediata dici potest obstructio angustiorum tubulorum, seu canaliculorum glandularum conglobatarum, siue stagnatio lymphæ in suis glandulis ichore- scentis actis corrosivæ, à qua extenduntur & rumpuntur rubuli, & canaliculi, ex quibus major evasatur feri viscidioris quantitas, quæ dein stagnat, & hunc tumorem ob particulas acriores conjunctas igneam excitat, hinc & membranz maximè premuntur, & extenduntur, unde dolor iste vehemens. Cumque sanguis cum lymphâ in Peste sæpè maximè corrosivus existat,

flat, tantum abest, ut promptè fecerni, & revehi amet, ut potius in minutissimis canaliculis glandularum coaguletur, stagnetque, & acris scindentibus triangularibus suis particulis salinis se infinet, unde tumor, dolor & ardor ingens seu Bubo excitatur.

Illustrari hæc possunt non solum exemplo Bubonum simplicium benignorum, & venereorum, & pestilentium malignorum, in quibus diversis saltem & remissioribus gradibus causarum, stagnatio consimilis observatur. In morbis & febribus sunt hi tumores per congestionem, dum particulae hæc vitæ acres massæ sanguineæ ex volatili acri corrupto oriundæ coagulantur, circa vasa capillaria, & dum sanguini vias intercludunt, Inflammationem talem cum tumore constituunt, tubuli enim glandularum conglobatarum imprimis in Inguine existentium apprimè nati & fabricati sunt, ad ejusmodi tumorem producendum, quod si imprimis circa inguina contingat talis tumor, Bubo tum vocatur. Causa ergo Bubonis est, uti antea jam meminimus, obstructio angustiorum tubulorum glandularum conglobatarum, in quibus is exoritur, à succis quibuscumque crassis tubulos opplentibus. Febris, quæ Bubonem comitari solet, designat sanguinis particularum dispositionem esse turbatam, ejusque motum esse inordinatum, & in illo fermentationem quandam fuisse excitatam, nulla autem quæ fieri potest in stagnatione succorum ab acidorum cum alcalicis miscela, impeditoque libero materię æthereæ comæatu. Si enim acidorum penu à quadam ex sex vulgò dictis non naturalibus rebus adauctum sit, vel si dissipatis in diuturniori eoque acuto quodam morbo ad maximam partem volatilibus alcalicis, acida imperio potiantur alcalicorum in sanguine subsistentium, porè ab acidis occupan-

tur, sulphuræque ab illis coagulantur, à quibus in tubulos delatis emergit obstructio. Materia ætherea, quæ antea alcalicorum poros absque impedimento permeabat, ab illis acidis opplentis reflectitur, & in sanguinem repellitur, quem vehementius turbat & exagitat, donec vel acida ab alcalicorum poris abegerit, vel ipsa alcalia contriverit, partiumque atque earum pororum dispositionem immutavit, adeò ut rectè tendere possit. Sed si acida duriora fuerint altiusque alcalicis infixæ, irriti fiunt materię subtilis conatus, nec penes ipsam est liberam sibi sternere viam. Ex arcta illa igitur acidorum cum alcalicis unione exsurgunt salia, quæ cum sanguine in angustos, & à Sulphuribus coagulatis jam obstructos glandularum inguinum aut axillarum tubulos delata, in iis cespitant, & retinentur, particulae ejusdem ordinis partes hæc indefinenter actingentes nec ulterius progredi valentes, prioribus adjunguntur, tumoremque coacervatione adaugent: qui durior sit, particulis salinis materię æthereæ continuo impetu in ipsas irruenti, obfistentibus, ab illa arctius conjunctis, & unitis, comminutisque hac ratione, & expressis phlegmatis ac foràs expulsi.

Febres malignas, Pestilentiales, & Pestem ipsam per gradus tantum inter se differre jure statuunt Medici, illasque ab eadem causa, cujus effectus variant, juxta intensiores vel remissiores ejus vires produci fatentur. Premissis igitur aliorum placitis, existimamus supra dictos morbos produci, à particulis quibusdam duris, rigidis, acutis & scindentibus, arsenicales audientibus, quæ è terræ todinis in aerem elevatæ, & cum ipso in sanguinem reliquosque succos usque penetrantibus alcalicorum poros subeunt, insque insiguntur, sulphura-

*Causa  
maligni  
seu Pestil  
lentis Bu  
bonis.*

phuraque coagulant, à coagulatis Sulphuribus obturantur canaliculi, & impeditur sanguinis ac reliquorum succorum circulatorio, ab alcalicorum poris ab acidis occupatis reflectitur materia subtilis, quæ in sanguinem repulsa violentas in eo excitat turbas, vehementissimoque conamine particulas illas salinas ex acidorum arsenicalium, cum sanguinis alcalicis coalitu protrudit, validissimoque impetu in reliquis sanguinis & succorum particulas, & partium fibrillas compellit: illæ verò angustias duris & acutis donatæ occurrentes sanguinis particulas atterunt, & comminuunt, fibrillasque partium violentius lancinant & convellunt: nec à sanguinis phlegmatis attemperari possunt propter eam, quæ pollent, duritiem & rigiditatem, à quibus potius phlegmata viscida incidunt & attenuant, pauca quoque ex acidis istis arsenicalibus, quæ sanguini sunt permixta, in Sulphurum ramis implicantur, quia cum Sulphura particulis mollibus sint donata, acidorum ductitiei & rigiditati resistere nequeunt, atque ab iis seinduntur ac minutim secantur, unde fit ut Bubonis maligni aut pestilentis Symptomata atrociora multum sint simplicis Symptomatibus. Cæterum enim est, quando coagulatus sanguis è corde hanc vel illam arteriam obstruit, Anthraces gigni, quæ nihil aliud sunt, quàm gangrænæ & Sphacelli, cum enim sanguis coagulatus ibidem in parte aliqua stagnat, acidum illud acre seu serum acre à sanguine secedit, sicuti serum à lacte, h. e. motu pristino circulari denegato materiz subtilis alio modo particulas illas disponit, adeo ut quædam magis ab aere, aliz minus premantur, habet se verò istud acre ac si parti escharoticum fuerit impositum.

*Causa.* Venerei verò Bubonis causa ut plurimum est acidum acre, à putrefactione ulcusculorum in mulieris pue-

dendis excavatorum elevatum, & viri urethræ ac balano exceptum, quod vasorum sanguinis tunicas penetrans illius massæ immiscetur, quædam ex illius alcalicis saturatur, & quædam Sulphura coagulat, quæ in inguinum & axillarum glandulas cum sanguine circulate advehta, in illarum angustioribus tubulis commorantur, sanguinique affluenti, & materiz æthereæ adveniienti sunt impedimento.

Bubo ergo (qui pro pestilentiali ob subjectum Carbunculum intelligendus videtur, vixque sine ipsius Pestis expositione sufficienter exponitur) est particularis inflammatio orta ex obstructione tubulorum angustiorum varicque intortorum, in glandulis parotidum vel axillarum, vel inguinalibus, à secedentibus ex exteriorum contubernio, particulis quibusdam imprimis acutis irregularis figuræ, &c. (ob dissolutum nexum & unionem particularum sanguinem & humores constituentium, vel terrore, & imaginatione, rejecto veneno omni contagioso pestifero speciatim sic dicto, à particulis pestiferis corrosivis & inconsueto ab iis, vel cum iisdem adducto æthere:) hærentibus & viscidis, quæ hic ordinariè cum lymphâ seccantur, involutis, hinc veneni pestilentialis corrosiva vis hic non tam efficax, quàm ubi in glandulis & tubulis cutis variantem ob diversum diametrum, &c. liquorem continentibus exigua, vel pluribus exilibus pustulis (inflammatione ad suppurationem vergente,) se prodians, non ita irretita, circumvicinorum tubulorum, & subsectorum musculorum filamenta dissecans, efficit, ut iis in cincinnos resistentibus, omnemque humoris adventum, vel transitum denegantibus omnino gangræna, si non perfectus Sphacellus produci-

*Carbunculi & Bubones à congeneri h. e. eadem ferè ac Bubonis materia excitantur, & eadem est eorum causa, duoque isti tumores in*

*Causa.*  
*Carbunculi seu Anthracis.*  
eo

eo tantum inter se differunt, quod in carbunculo materia acrior ardentiorque sit quam in Bubone, & non tantum in glandulosis, sed etiam aliis & variis corporis partibus decumbat. Materia verò Bubonem excitans ut plurimum in inguinum axillarumque glandulis stabulat. Novimus enim primò, Bubones in glandulis sub axillis, ponè aures, aut in Bubonibus sic dictis glandulis produci: notum etiam est genuinis Medicis, non verò lipis & tonsoribus, glandulas constare ex tenuioribus arteriarum calaliculis variè inter se contortis. Oriuntur quoque Bubones hi, quando succi sanguinis nostri malè sint commixti, ut fieri solet tempore malignitatis, hinc succi illi per glandulas transire nequeunt, sed in iis manent, ac obstructionem inferunt, quia partem affectam continuo motu discindunt, palpitatio quoque ob arteriam convulsivè affectam percipitur postea, sed tardè ad suppurationem tendit. Ex hac distinctione clarè pater, *Carbunculi* seu Anthracis causam esse particulas sanguinis ac succorum corporis nostri fecedentes acriores, ac corrosivas circa partem quandam exteriorem sibi cavitatem parantes, & tubulos quoscunque corroden-tes: & huc referri possunt omnia ea quæ superius de Bubonibus imprimis pestilentibus ac malignis diximus.

*Prognosis  
Bubonis.*

§. II. Cum signa *Prognostica* Medico magnam famam, si rectè prædixerit, ingens verò vituperium, si secus fecerit, conciliare possint, meritò in eo totus esse debet, ut hac in parte, quantum per vices licet, studium suum colloceat & cautiùs discat mercari si ea ignoret. Curatio *Bubonis* dubia est, si tardiùs maturetur, quàm in fistulas abeat periculosas, cecum dum hæc scribo in Rustico in proximo pago Hohenkirchen habitante observavi, qui neglecto Bubone in inguine in fistulam abiit, ex qua excrementa liquida continuo effluebant, cras-

fioribus verò per anum. Nisi quoque Bubo Venericus citò curetur, vel si materia illius acrior fuerit, & succedaneam habeat luem Venericam, majus impendit periculum à maligno ac pestilenti, quàm à simplici, & si negligatur ejus cura, vel si materia vehementioris fuerit acrimoniz, partis gangræna, osium subjectorum caries, amò & ipsa mors subsequi potest. Bubo siquidem affectus est periculosissimus, imprimis in inguine, quod sequens confirmat historia: hic enim Castellis ancilla in inguine prope pudenda, & quidem dextro latere, maximum sensit dolorem, quem sequebatur Bubo, quem autem ancilla ob pudorem neglexit, tandem ob acrimoniam fucorum intus contentorum tubulos omnes corrodentium rumpebatur, ex quo prodibant itidem excrementa, (per alvum excernenda: ) foetida cum flatibus, quare Chirurgus, & quidem non malè, suspicabatur intestinorum exulcerationem, etenim non solum hæc, sed & peritonæum, pudenda usque ad coxendicem cum nervis & musculis sphacelata & pueritæ observata fuere: adhibitis tum internis tum externis remediis optimis, septimo die morbi prunella alba à Chirurgis sic dicta, accidit, ut & hæmorrhagia ex gangrænosa parte exorta sit adeò vehemens, ut undecimo die circa horam nonam matutinam animam Creatori suo placidè reddiderit: Cadavere dissecto repertum fuit intestinum jejunum ad magnitudinem nucis jugulandis corrosum ac pertusum, reliqua eriam penitus fuere corrupta. Non tamen semper adeò periculosus affectus hic existit, aliam enim novimus 20. anorum filiam Bubone in dextro coxendicis latere laborantem, ex quo maturato excremento foetida non duntaxat prodire, sed & in appositis Emplastris crudi reperiabantur cibi, quem felicissimè curavit Chirurgus noster aulicus Dn. *Johannes Mattliet*, & quidem intra 8. hebdomadarum spatium: idem

idem & alium curavit militem eodem affectu laborantem. Dicit etiam Hippocrates Medicorum Princeps, qui ex offensionibus aut aliis ulceribus aut doloribus proveniunt Bubones, extra periculum sunt: qui verò ex febris (quæ sanè maxime in Peste coincidere solent;) pessimi existunt, sive juxta femur, sive sub alis, aut ad collum enati fuerint. Periculum item ex ætate, regione & viribus desumendum esse existimamus, quia delicatulis, item regionibus calidissimis inhabitantibus ac debilibus majus periculum denotat, quàm adultis, regionem incolentibus temperatam ac robustis. Maximum itidem periculum exoriri solet, si ægri Bubones negligant, & nec internis nec externis utantur Topicis, sed soli suæ dextræ naturæ curandos relinquunt. In pestilentibus Bubonibus non levi promittunt spem, quando vires constant, & medicamenta optima non revomunt ægrotantes, sed per sudorem eliminantur, & sic ad emunctoria sua vulgo sic dicta, v.g. sub axillis, prope aures, vel inguinibus, ubi glandularum adest copia; sic & quo citius Bubones apparent, iique constantes, ut minus retrocedant, ac perfectam acquirant maturitatem, eò minus mortis incurrunt periculum ægrotantes, si verò maligniores sint, citum etiam interitum inferunt. Observantur tamen Bubones ad chronicorum morborum naturam deflectere, quando morbo ipso principali jam quiescente ad plures sæpe septimanarum consolidatio ob *unclum* succorum producitur, adeoque quæ de abscessibus in universum prædicantur in Scholis Medicis, illa possunt intelligi de Bubonibus. Bonus nempe est, qui maturè erumpit, imprimis in inguine, si colore vivido conspicuus est, hinc optimè dicit Senex noster: Tubercula extra extuberantia & acuta, & fastigiata, & æqualiter maturescantia, & non obdura, & deorsum vergentia, & non bifida, meliora;

contraria verò mala, & quantò plus contraria, pessima. *l. 6. Epid. f. 1. 29.* conferri etiam potest *5. Aph. 65. & 67.* Sic vires prostratæ, vomitustum Medicamentorum, tum assumptorum frequens & continuus, faciei partes subito immutatæ & cadaverosæ, lipothymia sæpe recurrentes, convulsiones, delirium, exteriora frigida, interiora calida, alvi dejectiones nimis copiosæ ac diversi coloris, atræ nempe & ad lividum tendentes, ut & urinæ foetidæ ac nigricantes, denotant mortem in olla esse. Sic etiam non absque mortis periculo apparent Bubones in collo & ad aures, cum dolore gulæ, ac summa deglutiendi difficultate conjuncti, de quo tumore egimus superius, de oesophagi tumore, quò Lectorem remittimus *Paræus l. 2. c. 30.* ait de Bubone: Lethale est, tumores repente augeri, & furente veluti impetu ad debitam magnitudinem pervenisse, summaque omnia doloris, tumoris ac ardoris accidentia subito & momento habuisse. Si Bubones circumlum quandam instar iridis habeant, vel si sint lividi ac nigri, mortis sunt prodromi, sed & hæc signa in malignis sæpe infida sunt, id quod Autores plures norunt, moriuntur enim non rarè, & quibus rubicundi sunt Bubones, & quibus œdematosi, aut cuti concolores, tanta est hujus morbi fallacia. Pessimi quoque ominis signum habetur Bubonum cita evanescencia; Maligniora sunt, inquit Hippocrates *l. 2. Epid. f. 2. t. 136.* qui de repente disparent: item, quando impositum velicatorium intra 8. vel decem horas nullas plane vesicas excitat, vel humiditate scætet, ægrum in summo versari periculo, certissimum. Hinc quoque periculosiores sunt illi, qui sub axillis, & in collo apparent, quàm qui in inguine, ex metu suffocationis. Pessimum est, si locis Bubonum ordinariis Carbunculi, vicem eorundem tenentes, occupant. Modus eventus Bubonis cum aliis tumoribus communis est, solent enim



terminari, vel per discussionem paulatim, neque enim semper in ulcus degenerant, sed sæpe per se evanescere solent, siue materia sit pauca, & renuior, siue per uberes sudores alio versa, ut suo quasi nutrimento privatus tumor excrescere minus possit, & medicamentis Bezoardicis discutiat, & in auras exsolvatur, id quod sæpè lentè accidit, prout apparet ex *Barbette Observ.* 4. quatuor sc. septimanarum spatium, vel quod ordinarium est, per suppurationem materiz in pus versa, quod itidem genio Succi, vel humoris non adco aeris, vel maligni est conveniens; vel per necrosin, corruptionem, vel per indurationem, qui modi pessimi sunt, & ut plurimum lethales.

*Prognosis  
Carbunculi.*

*Carbunculorum* curatio ferè nulla expectanda est, si mox evanescant qui erubuerunt; difficillima si post febrem pestilentem erumpat Anthrax, aequè ac si niger in emunctoriis, ac prope membra nobiliora prodeat; facilius est ejus cura, si ante febrem pestilentem apparuerit, uti & eorum, qui rubicundi, parvi & soli exoriuntur. Tumorem hunc inflammatorium, Carbunculum dictum, esse valdè periculosum, suo etiam exemplo probavit *Constantinus Copronymus Imperator*, qui ex Carbunculo pedi inhaerente mortuus est, ut refert *Zovingerus in Theatro suo vite Human.* vol. 2. l. 7. p. 526. Atrocitatem affectus hujus optimè cognovit *Quintus Serenus Sammonius*, scribens c. 38.

*Horrendus magis est perimit qui corpora Carbo,*

*Vix hic inclusus, vitalia rumpit acerbus.*

Affectus hic imprimis pestilens, inter acutissimos à Medicis refertur, cum brevi ægris mortem asferat. Unde *Quintus Serenus Sammonius* ait, vix ad 7. dies produci posse vitam infestè hoc affectu. Qui in membranarum, aut nervis situr, non tantum dolorem maximum in-

ferunt, sed & diutius permanent, ut etiam inflammationes Erisipelatosæ ipsis fiant: non paucis autem ad suppurationem convertuntur, plerisque etiam febres adfunt. Periculosiores sunt Carbunculi *interni* quàm *externi*. Omnes Carbunculi qui occupant partes nervosas, ac membranaceas, plus periculi, ceu diximus, alunt, quam qui occupant partes carnosas, hinc & pessimi moris habentur, qui in emunctoriis, & glandulis prope membra nobilia, & principalia extuberrant. Periculosus valdè est Carbunculus qui niger, quia maximam denotat partis mortificationem ac necrosin, huic succedit lividus, & flavescent; minus malus est rubicundus; quò pauciores Carbunculi, eò minus periculi est; sic majores minoribus deteriores sunt. Exitiosi etiam habentur, qui ubi eruperunt, mox iterum evanescent. Notandum quoque est, num pestilens Anthrax ante febrem oriatur, an verò pestilentiali febre præcedente, demum producat. Prior casus majorem salutis spem promittit quàm posterior. Buboni accedens Carbunculus pro lethali signo à *Barbette* habetur, qui etiam valdè periculosum pronunciat Carbunculum cauda quadam præditum.

§. 12. Jam demum veniendum ad id, cujus gratia reliqua omnia præmittuntur, *Curationem* scilicet, & primò ad Medicinæ organum illud primum, *Dietam* nempe, quæ in omnibus affectibus legitimo ut instituat modo opus est. Præprimis eò incumbendum, ut succi omnes corporis nostri liberiores transcursum habeant, nullibique stagnent, quare aer eligatur temperatus, purus ac copia subtilis materiz refertus, vitetur è contra frigidus carens materia cœlesti multa, acidus ac nebulosus, foetidus squalore ac contagio omni infectus. Cibum sit euechymus & cupeptus, celeri heic opus est refocillatione, & succorum de-

*Dista:*

ficientium restitutione . Profunt ergo iuscula caporum, pullorum, Gallinarum, & omnia ea alimenta quæ multum salis volatilis in se continent; vitanda acida coagulancia, & acria corrodentia, & salina tumoque indurata: potus sit calidus Theæ, vel Caffæ, interponendus alius potus confuetus, & cerevisia herbis & radicibus aromaticis, ac volatilibus maritari possunt, ex rad. helen. Scorzon. herb. card. bened. scord. rut. betonic. &c. Vigiliæ ac somnus sint ut in statu sano esse solent. Quies corporis sæpè nocet nimia, motionis verò loco corpus moderate conficitur linteis calidis, Venus imprimis illicita, ac cum scortis, & lue Venerea infectis instituta exulter, nec conversatio tuta est, & cum iis qui morbo pestilenti correpti sunt. Excernendorum sedula quoque habenda est ratio, defectusque quantum fieri potest, debitis refarciatur remediis. Animus valedicat curis, & sollicitudinibus necesse est, iraque, timor & terror similiaque proscribantur. Gaudio potius exilaretur mens nostra in Deum confidens.

*Galenici-  
rum cura  
in Bubone.*

§. 13. Nunc ad Curam Pharmaceuticam, ac Chirurgicam accedamus, in qua primus locus debetur Galenicis, juxta quos Bubonum curatio in eo consistit, ut humorum copia minuatur per V. S. & purgantia leniora sæpius dicta, aliaque quæ atram bilem, & frigidam hic peccantem corrigunt materiam; non semper hic ut in aliis tumoribus, ad repellentia confugiunt, ut ne dum repellitur materia, ad profundum recurrat, à discutientibus verò incipiendum esse jubent, quod si nihil prohibeat, velut atas, aut vires, V. S. cum cautione tamen hic institutam suadem, in loco verò aff.cto fomentis ex decocto fl. Chamomali, aut anrhi, &c. uti solent. Aster Atticus ipsis est specificum, quam herbam etiam Bubonium ob hoc ipsum vocant, quod non solum impositum, sed etiam colligatum

Bubonibus auxiliari credunt.

In Bubonibus malignis incipientibus duos Galenici respiciunt scopos, ut non solum impendant fluentem materiam, sed eam trahant, quoniam materia est maligna & contagiosa; secundò ut dolorem mitigent & laxent locum. Ratione doloris Ol. chamomali ponunt, ratione verò relaxationis ol. amygd. dul. Alii solent accipere lanam redundantem sordibus, in qua est vis relaxandi, & molliendi, & eodem inungunt oleo: sunt qui recurrunt ad motum, & jubent agrotos ut se maxime commoveant, ut motu fiat fluxio: accedunt alii ad usum cucurbitularum, quum timent maximam luem, vel infectionem. Bubones etiam maturandos esse ajunt veteres, in quem finem sequens commendant Emplastrum.

*℞. Rad. alth. ℥j.*

*Farin. commun. ʒij.*

*Caricar. coct. in aqu. ʒi β.*

*Sem. lini ʒj.*

*Pingu. Gallin. vet.*

*Porcin. aa. ʒij.*

*M. & cum decoct. rad. alibea, &*

*Cavicar. f. Empl.*

Alii norunt parare Emplastrum ex fermento, cæpis, lil. alb. coctis melle erudo, & alth. laudat quoq; Empl. diachyl. ex Gummatibus, cui addunt tria Gummata, armoniacum, bdellium, & sagapenum. Sunt qui ad sectionem & cauterium accedunt, dein applicant dolorem mitigantia, in quem finem oleum abietinum imponunt, vel extra emplastrum maturativum per tres, vel quatuor dies applicant, ut si quid relictum est materia congesta, maturetur mitigato dolore, & concocta materia, omnia faciunt, ut vulnus servent apertum, & quidem ad 40. dies: vel ungu. Isidis, vel imponunt diapalm. ad moderandam fluxionem, & impediendam putrefactionem. Aliquando intercidunt glandulas tumefactas & faciunt ut cadant more caruncularum.

*Carbunculo verò Galenici cura- Carbunculo*

### CAP. III. DE BYBONE ET CARBVNCVLO. 67

ri afferunt per venæ-sectionem, sanguinis evacuatione ad animi deliquium usque facta. Scarificare etiam post venæ-sectionem non incommodum fore ajunt, profundioribus vulnusculis impactis ob humoris crassitudinem. Quotidie quoque, seu ad minimum alternis diebus esse fæces educendas per alvum lenientia contendunt, ut sunt Confect. Hamech. elect. ros. Mcl. elect. de succ. rosar. diacathol. Ad removendam aduersionem corrigendam esse atram bilem dicunt, in quem finem exhibent Syr. de acetos. seu de ejus succo, de soncho, cichor. acetos. f. cum decocto prædictarum herbarum, ut sonchi, cichorei, acetos. endiviz, & nunquam omittendam esse volunt scabiosam, quæ inter reliquas herbas optimè hæc medetur, adeo quod si ejus decoctio, aut aqua sola sumatur, hoc in casu apprimè conveniant.

His internis peractis ad locum transeunt affectum, & ei moderate repellentia, ac discutientia applicant, in quem finem Cataplasma parant ex plantagine, ac lentacula cocta, cui panis clibanitz, neque valde puri, neque sordidi, micæ teneræ sint adjectæ, super ipsum verò ulcus ex vehementibus aliquod imponunt, velut est Andronis, & Polyidæ, & Passionis pastillus. Diluantur autem passo ad strigmentitiam compagem. Sed & Massaliotæ pulvilus siccus, aut etiam ipse similiter dilutus. Commendant quoque radicem dracunculi, aut aristolochiæ, aut succum Silphii, aut cyrenaicum, singula cum aceto illita. Postquam verò Carbunculi ardor remisit, cerata capitalia diluta, & linamentis excepta Carbunculis immittunt. Maxime autem id conducere, quod ex herbis, & nitro paratur, & pulvilli ficei nominis dicati tum per se, tum cum rosaceo. Duritie verò Anthracis permanente melius Serapionis utendum esse di-

cunt. Ante omnia student, ut Carbunculus citissime suppuretur, in quem finem bis in die, & semel noctu Cataplasmata, ac Medicamenta emollientia imponunt. Cæterum ut planè Carbunculi eradiceatur, & à conjunctione cum vicinis adjacentibus exolvantur, mala punica acida contusa in aceto cocta, & fluida trita sique linteo infarsa imponunt, ubi verò resiccantur aceto madefaciunt. Carbunculum suppurare ac rumpere dicunt nucis regiz veteris nucleo imposito, item laudant cupressi folia ac germina, & recentes ac teneras pilulas com polenta, uvas passas vinaceis rejectis, caricæ in vino coctas, papaveris cornuti flores, succum Silphii cum ruta, & modico melle, vel picem liquidam cum uvis passis & adipe suill. vel seq. summis extollunt laudibus.

*R. Spum. argent. ℥j.*

*Olei veter. ℥j.*

*Auripigment. ʒj.*

*M.* quod linamentis illinunt imponuntque, si adfuerit magna crusta in medio Carbunculi, Celsus dicit nihil melius esse, quam partem Carbunculo infectam adurere.

*§. 14.* Si tumor in altero sulco penes pudenda surrexerit cum rubore succedente, viresque deficiant, calor atque frigus invaserint, eadem die transierit appetitus, ut sic Bubonem adesse videat, ejus curam Paracelsus per apertionem fieri contendit, & quidem maturatione propria, postmodum per oppodeltoch curandum esse scribit. Descriptio maturativi ipsius sequens est.

*R. De quatuor resinis ʒj.*

*De liquoribus altheæ.*

*Bismalvæ aa. ʒ.iiij.*

Fiat Mixture superponenda.

Descriptio oppodeltoch ipsius sequens est.

*R. De quatuor seminibus incarnativis ʒj.*

*Cera.*

*Paracelsi  
cura in  
Bubone.*

*Colophonice* aa. ʒij.

*Picis naualis* ʒij.

*M.* & deduc in Emplastrum.

Cautelam adiungit, cavendum nimirum esse à resolutivis, cortosis & attractivis Medicamentis.

In Anthracis.

Cùm Anthracis, seu apostematibus investio juxta *Paracelsum*, privativa confurgit ex Mercurii mineralibus, & est mineralis cuilibet innatus venæ slos, quæ omnia causantur ex venarum hujusmodi corruptis cavitatibus, hinc in cura ejus primum dicit esse virtutis diaphoreticæ Medicamentum adhibitur illius venæ radici. Postmodum unctionem circumcirca factam commendat. Deinceps in escharam ductum Consolidativis curat. Virtus diaphoretica est descriptio Lithontipon, si fuerit separata à sua substantia: quia tum accedit radices venarum, humectat, sanguinem excitatum, & tum venit sudor, & ipsi est signum optimum. Species, quæ ingrediuntur Lithontipon, debent à sua substantia separari per spiritum vini. Diaphoretica Medicina talis est.

*℞. Vin. corraēti* ʒx.

*Theriaca.* ʒβ.

*Myrrh. rubea.*

*Crocis singulorum* aa. ʒj.

*Liquoris Zingiberis* aa. ʒβ.

*M.* de quo bibatur uncia semis in optimo vino

Realgaris aliaque fugienda esse cauteria monet.

Helmontii  
cura in  
Bubone,  
& Car.  
hunculo.

§. 15. *Helmontii* nunc audiamus Consilium in *Cura Bubonis*, ac *Anthracum*, eò vetò incumbendum esse ait, ut omnes digestionum sordes in extimas usque oras persequamur, cum vindicta. Hinc Bubones & Anthraces citra venæsectionem, purgationem, solis sudoriferis curari dicit, in quem finem commendat sua diaphoretica specifica ac arcana.

Externè verò commendat cauterium actuale, nisi deterreat doloris atrocitas, cujus verò vicem implet cauterium potentiale, vel

vesicatorium, quorum numerum complet emplastrum arsenicale magneticum. Escharam mediantibus digestivis separandam, ulcusque mundificativis, & defensivis tractandum vult, ne venenum latius serpat, unde non raro carnis magna frustra excidere solent, in quem finem Saphirum circa tumorem ductum commendat. Nullo amplius apparente pure, vel veneno, consolidationi studet Author, & laudat emplastrum Saturni syderati.

§. 16. *Petspesta Cura Helmontii* *Villifium* nunc paucis audiamus *Villifium*. cura in Bubone. Bubones juxta ipsum sunt vel maligni, vel benigni, illi febribus malignis, & pestilentialibus succedunt, vel easdem comitantur, quare cura eorum variè institui debet à benignorum cura, suadet enim illicò Author noster veneno in illis contento edomando, & materiæ aggestæ maturandæ & educendæ: priori siquidem intentioni satisfacere satagens, bufonem, vel ex illo paratum cataplasma imponit. Secundæ ut obsecundet, eschatam vesicatorio parti inuit, remotæque crusta emplastr. Magnet. Ang. Salæ imponit, sic apertum Bubonem ad consolidationem producit ope bals. Sulphutis, ungu. Basilic. vel digestivo communi cum Theriaca. Benignus verò ab eisdem suppuratur Medicamentis, quæ vulgo in usum vocantur, ad alias inflammationes suppurandas, qualia sunt cataplasmata ex emollientibus parata, ungu. de althea &c. Quod interna attinet Medicamenta, in prioribus alexiteria Medicamenta veniunt propinanda, quæ veneno sanguinem infestanti resistent: hujus generis sunt rutha, scordium, &c. Mithridatum, Diacordium, Theriaca. In postterioribus blandæ diaphoretica sunt, ad mentem Authoris exhibenda, quorum beneficio materia aggesta facilius subigatur, citiusque foras eliminetur.

# V. CAP. III. DE BVBONE ET CARBVNCVLO. 69

*In Carbunculo.*

*Anthracem* omnes malignam naturam obtinere inquit, quapropter in eorum curatione alexipharmaca non negligenda putat *Villifius*. Externè verò idonea auxilia à Chirurgia expectantur, ut promptius profugeretur infensus ille hostis, exemplo autem secundum Authorem, ducatur circulus circa Carbunculum butyro antimonit, & caro mortificata separetur; vel excitetur crusta vesicatorio, qua sublata imponatur Empl. Magnet. A. S. vel si hæc præ manibus non fuerint, scarificetur Carbunculus. Ulcus dein mundificetur, remota eschara, & diu apertum retineatur, & denique secundum artis leges, & accommodatis remediis consolidetur.

*Syluius in Carbunculo.*

S. 17. *Consilium Syluii* nunc restat, qui *Bubonum* Venereorum curationem in eo situm esse contendit, ut maturetur quam propediem eorum suppuratio, & apertio, in quem finem Emplastrum varia aromaticis, ac volatilibus Gummatibus parata commendat, inter quæ præ aliis Diachyl. Magnum laudat. Quod si segnius procedat suppuratio, ad cauterium potentiale, ad aperiendum scilicet tumorem confugit cum aliis Practicis, ne ad interiora pergat venenum in tumore maligno existens.

*Bubones* verò *pestilentialiter* ut discutiantur jubet Author, & si discuti nequeant, ut maturentur, & ad suppuracionem deducantur, suadet, hinc eos aperiri, mundari, ac tandem consolidari vult. Eadem adhibet Medicamenta, quibus alios glandularum tumores curare satagit. Hic verò imprimis ad venenum respiciendum vult, in quem finem Theriacam, Mithridatium, similiaque commendat, quibus aliisque admiscenda præcipit oleum è C. C. destillatum, aliaque sale volatili oleoso constantia. Unguentum Martiatum cum Theriaca mixtum ad discussionem Bubonis pestilen-

tis reperit præstantissimum, ut & emplastrum Diachylum cum gummatibus compositum, nisi dolor vehemens urgeat non admittit Bubonum scarificationem, multò minus ipsis adhiberi vesicatoria, vel cucurbitulas. Ubi autem grandes sunt Bubones, ardentessque, viribus adhuc constantibus, tum cucurbitulas, tum scarificationes permittit, nunquam verò vesicatoria, quia nunquam exinde redundasse observavit: Author. Bubonum discussionem, & suppuracionem forinsecus applicatis, & internis temperantibus blandis Medicamentis promoveri vult, ut hisce acrimonia humorum temperetur.

Quamprimum verò suppurati fuerint Bubones, eos aperiendos esse præcipit vel scalpello vel ruptorio, licet scalpellum aliis instrumentis ferreis præfert. Aperto Buboni imponit Balsamum Sulphuris terebinthinatum, & anisatum, una cum unguento Basiliconis & Theriaca, hujus enim opæ brevi absolvi Ulceris mundationem scribit. Consolidacionem verò Bubonum prædictis Balsamis feliciter, ac citius evenire ait, superimposito ad cicatricem accelerandam Emplastro diapompholygos. Non malignum verò Bubonem curandum esse ait simplici modo tanquam alius partis tumorem, Empl. sc. diachyl. cum gumm. apertum autem mundandum esse communi digestivo, & consolidandum Empl. de tutia, diapomph. vel alio consolidante stictico.

*Syluius Carbunculum pestilentem* curat serpentem partium vicinarum mortificationem separando, partem mortuam mundificando, & ulcus relictum consolidando. Ad separandum butyrum antimonii commendat, si circumcirca parti illinatur affectæ, ad miraculum enim ait sisti partium omnium corruptionem serpentem, ac omnia depascentem. Huic

*In Carbunculo.*

proximum existimat Magnetem Arsenicalem, ex partibus aequalibus Arsenici, Antimonii, & Sulphuris partium, & Emplastris convenientibus immixtum: cuius ope ad sui separationem dispartem corruptam haud dubitat. Ad partes vero separatas mundificandas laudat Balsamum sulphuris imprimis anisatum, una cum unguento Tetrapharmaco, & Basiliconis vocato mistum, & ulceri applicatum. Ad mundificatum ulcus consolidandum itidem magni facit balsamum sulphuris, ut & alia emplastra vulgaris.

Carbunculum non malignum ferè iisdem curat remediis, impostis etiam emplastris gummosis diachyl. f. & magn. altis tumoribus solennibus.

*Cartosia*  
*noti ratio*  
*curandi*  
*Bubonem*

§. 18. *Cartesiani* curam *Bubonis* instituunt remediis obstructionem glandularum reserantibus, & interitum succos vitiosos evacuantibus, purgantibus nempe ex Jalappa, diaphoreticis ex antimonio, bezoardico minerali, spiritu C.C. florum sambuci, Electuario diascordii, theriaca, & diureticis ex Tinctura Tartari, spiritu lumbri-  
*corum* & similibus. Externè *Buboni* simplici imponunt emollientia & anodyna, quibus sequens constat cataplasma.

℞. Fol. alib. Mj  
Flor. melilot. Mjß.  
Farin. sem. lini ʒ iiij.  
Butyr. recent. ʒ ij.  
Lactis vaccin. q. f.  
M. F. Cataplasma.  
Vel:  
℞. Emplast. de mucag. ʒ ij.  
Vitell. ovor. n. iij.  
Butyr. recent. ʒ j.

M.  
Ad effervescentiam sedandam buboni etiam gallinam, columbam, vel ranam applicant, & apertionem sequenti promovent emplastro.

℞. Emplast. de mucag.  
diachyl. cum gumm. aa. ʒ iiij.  
Resin. pini ʒ vj.

*Vnguent. Basilic. ʒ iiij.*  
*Sem. sinapi ʒ ij.*  
*M. F. Emp. astrum.*

In Bubonibus malignis fortiora adhibent particulas aciores ad superficiem allicientia, & potissimum vesicatoria ex fermento, cantharidibus, sapone & aceto vini, vesiculas inde productas post 7, vel 8. horas aperiant, & emplastrum imponunt magneticum, vel loco vesicatoriorum ruptoria adhibent, separataque eschara foramen ad tempus aliquod apertum servant, ut unguento aureo, basilico, vel Apostolorum probe queat mundari. Duriore scarificant, & marginem butyro antimonii oblinunt, ne tumor increseat.

*Carbunculum*  
*colorum*

*Carbunculi* curam peragunt interitus diaphoreticis particulas acutas sciindentes hebetantibus, frangentibus, & eliminantibus ex bezoardico minerali, vel antimonio diaphoretico, C. C. Philosophiæ præparato, sale volatili viperar. camphora, aqua Scoryon. flor. sambuc. Card. bened. Electuario diascordii, Theriaca, & id genus aliis; foris verò incrementum impediunt butyro antimonii circa tumorem illito, quo simul separationem crustæ instituunt; vel peculiariter ea de causa sequentia adhibent emplastra.

℞. Ferment. acid.  
Vnguent. Basil.  
Fulig. camin. aa. ʒ j.  
Mell. scirvin.  
Butyr. recentia. aa. ʒ ij.  
Aer. ug. ʒ j.  
Sapon. vulg. ʒ iiij.  
Terebinth.  
Res. pin. aa. ʒ ij.  
Croc. ʒ ß.

M. F. Emplastrum.  
Vel.

℞. Calc. viv. ʒ i.  
Cantharid.  
Aerugin.  
Vitrioli Rom. nst. aa. ʒ j.  
Arsenic. ʒ ij.  
Mell.  
Sapon. aa. q. f.



*M.F. Emplastrum.*

Cruſta verò adeò exiſtente tenaci, ut præſcriptis obadire & ſeparari nequeat, candem ad carnem uſque ſanam diſcindunt, & lixivio, aut unguento Ægyptiaco in ſpiritu vini diſſoluto, abluuat, vel unguento Apoſtolorum, aut Baſilico illinunt, baſamque ſulphuris mundant, & ad perfectam dirigunt ſanationem.

*Noſtra methodus curandi Bubonem.*

§. 19. Noſtro iudicio *Bubonis* cura cum Anthracis ſerè conſentit, & omnia quæ in eo conducunt & hic proderunt. Hoc ergo in Inflammatorio tumore commendamus internè omnia volatilia alexipharmaca, imprimis Theriacalia, ut in aqua Theriac. camph. ſcordii, ſpir. Theriacal. matricial. ſpir. C. C. compoſ. item Tartariſat. liq. catarrhal. volat. Noſt. omnia enim hic conveniunt, & Bezoartica antimoniana, viperina, imprimis pulvis Anglicus ex viperis, rad. contrajervæ, aliſq; abſorbentibus paratus, & ad grana 20. in vehiculo appropriato exhibitus. Sudoriſera enim, ac abſorbentia omnem implent paginam, detur ergo ſequens, vel ſimilis pulvis cuſpidatum.

- 1. *Ocul. Canc. ppt.*
- 2. *Ebur. ppt.*
- 3. *Unicornu ſeſſil. 22. 3ß.*
- 4. *Antimonii diaphoret. 3j.*
- 5. *Camphor. gr. vj.*
- 6. *Sal viperar. volat. gr. iv.*

*M. F. Pulvis alcoholiſatus.*  
Vel in forma Eſſentia.  
R. *Spir. CC. compoſit. 3ij.*  
*Theriacal. 3j.*  
*Camph. ʒi.*

*M. detur ad 20. guttas per vices in vehiculo convenienti, aqua ſcordii, vel Card. bened. &c. Dari etiam poſteſ Theriaca Andromachi, vel Cœleſtis noſtra Caſtellana, vel diaſcord, Frac. vel ſylvi, ex quibus varia concinnari poſſunt formulae.*

Externè quoque in Bubonibus ſimplicibus conducunt varii ſorus ac Cataplaſmata ex volatilibus a-

romaticis parata, & capite de Inflammatione commendata calidè imponenda, adjectis Theriac. & diaſcordii, Empl. de Labdano, de Thea, item ſpir. matricial. aqua Calc. viv. & ſpir. vin. Camph. ſucci hyperic. cicut. conducunt ſummopere Bubonibus impoſita.

In Bubonibus venericis conveniunt omnia antivenerica interna, & curari ſolent inſtar ipſius luis Venericae decoct. lignorum ac Mercurialibus. Externè etiam Mercurialia egregium ſapè præſtant effectum, tumoribus ergo hiſ venericis imponatur Emplaſtrum, Viginis cum quadruplo mercurii, Diachyl. c. ol. Tartar. malax. Diaphoret. cum mercurio. Bubones hi maturati aliquando aperiri poſſunt, rariffimè enim ſuccedit ſuppuration, vel cultero, vel cauterio potentiali, ſcarificationes, veſicatoria, cucurbitulas non ſemper admittimus. Conſolidatio promoveatur baſamicis ol. baſam. Peruv. deſt. Guajaci, hyper. ſpir. matricial. aqu. calc. viv. ſucc. hyperic. nummular. veronic. mxrrh. ungu. de apio, ex hiſ enim parari poſſunt mixturæ Bubonibus apertis calidè cum linteis excarptis inſtar plumaceolarum imponendæ. Empl. poſteſ eſſe divinum, ſtipicium Par. &c. imponendum, à pinguibus abſtinendum eſt. Sed ſequenti meo liquore diſſolvente ſapè illivi Bubones minores, qui paratur ex ſpir. vini alcoholiſato, cinamom. caryophyll. & croc. inferniſ deſcribendis.

*Bubonem Venericum*

Quod curationem attinet *Bubonem peſtilentium* Methodo medendi innoxiam, commodè illa diſtinditur in *generalem*, quæ Peſti ipſi in genere debetur, & *Specialem*, quæ Bubonibus ipſis tribuitur. *Generalem* proſequi hic noſtri inſtituti non eſt, cum in *Encyclopædia Medica* de Peſte eandem ſufficienter tractaverimus. Si ullibi, certè in Bubone Peſtilenti alexipharmaca diſta remedia ac ſudoriſera volatilia, & fixa, ſola anchora erunt, ad quæ conſugiendum eſt, ut ſunt

*Bubonem peſtilentem.*

Tinctura Nostra Bezoartica se- magnificimus.  
quens:

℞. Rad. Angel.

Zedoar.

Gentian. aa. ʒ ss.

Myrrha ʒ iv.

Croci ʒ j.

Castor. ʒ ij.

N. M.

Macis aa. ʒ j.

Caryophyll. ʒ ss.

F. Pulv. gross. mod. add.

Campb. ʒ ij.

℥ affund.

liquor salnit. f. x. q. s.

digere & f. l. a. Tinctura, quam  
rursum extrahit ex sale volatili &  
spir. vin. rectificat. Optimum &  
operegium est sudoriferum dōs, d  
ʒ ss. ad ʒ j ʒ ss.

Inter fixa laudamus antimonium  
diaphoreticum, Bezoarticum mine-  
rale, ac chalybeale. Antihæticum  
Poteri, pulverem Anglicum Bezo-  
articum Nostrium sequentem, qui  
insignes vires habet, quem juniori-  
bus omnibus hic commendamus.

℞. C. C. f. ign. ppt. ʒ j.

Terra sigillat. ʒ vj.

Vnicornis fossil.

rasur. Ebors aa. ʒ iiij.

M. F. Pulvis subtilissimus, dosi d  
ʒ ss. ad ʒ ss.

Sic etiam spir. eboris, ebeni (qui  
præstantissimus est,) C. C. vipera-  
rum, alii, cepar. Essent. alexiphar-  
maca, vel sequens aqu. cochlearim  
exhiberi potest.

℞. Albi ʒ iv.

Cepar. ʒ ij.

Cumin.

Sal. hermeniaci. aa. ʒ j.

Herb. rut.

abfynth. aa. M j.

Vin. Malvat. infund. &  
destillantur, add.

Spir. C. C. compos. ʒ ij.

M.

Salia enim volatilia quæcunque,  
ut & sal. hermeniaci sanguinem ac  
succos machinæ nostræ attenuant,  
& simul acidum coagulans tempe-  
rant. Externè in Bubonibus pesti-  
lentibus instar omnium sequens

℞. Gumma Galbani.

Empl. Arsenical. aa. ʒ j.

Myrrh.

Mastic. aa. ʒ vj.

Bdellii ʒ j.

Pulv. euphorb. ʒ ss.

rad. pyrethri ʒ ij.

Croc. opt. ʒ ss.

Theriac. Andr. ʒ iiij.

Ol. Therebint.

Juniper. aa. ʒ ij.

Succini ʒ ss.

Pulv. sem. cumin. ʒ ss.

finapi.

cervæ. aa. ʒ ss.

M. f. l. a. Coratium.

Et simul interponantur Diaphore-  
tica volatilia superius jam recensita,  
quæ selectu & respectu habito  
ætatis, sexus, virium, & aliarum  
circumstantiarum, saluberrimam  
præstant opem, & omnem absol-  
vunt paginam, quatenus hæc ipsa  
vim veneni pestiferi coagulativam  
solvendo, ac cohibendo aculeos  
hebetant, & quod inordinati mas-  
se sanguinea inest, uti revera est,  
per canaliculos cutaneos exclu-  
dunt, & eliminant. An vene se-  
ctio in Bubonibus pestilentialibus  
locum obtineat, à pluribus ho-  
diernis disquiritur. Totæ Galeni-  
corum cohors cum pluribus Neo-  
tericis, Langio, Sydenhamio,  
aliisque eam admittit, Langius e-  
nim l. x. epist. 18. inquit, apparen-  
te Bubone, secare venam in eodem  
latere, sub ipso affectu nil vetat;  
cum per venam sectam, ut ille ait,  
veneni pars, quæ intra vasa conti-  
netur sanguini commixta, educi,  
obstructio expediri, febrisq; ætus  
commode remitti possit. Verum si  
in hisce attendamus usum venæ se-  
ctionis collatum cum veneno pes-  
tilenti, & præcipuè per cunicu-  
los hosce se jam exercente, faten-  
dum est venæ sect. consultius o-  
mitteri, cum noxam potius inferat,  
quàm utilitatem, ceu pluribus ex-  
emplis probare satago. Quantitate  
enim sanguinis ablata, reliqua mas-  
sa congruescit magis, & vias jam  
dum

dum debiles fati, vel non suffe-  
re magis exhauriuntur. Pesti-  
nim acrimonia coagulativa, & a-  
culcata in sanguine, & succis re-  
liquis corrigi hoc pacto renuit, ut  
potius parte sanguinis diluente ab-  
lata, magis sauiat. Motus ad exte-  
riora hoc ipso non promovetur, sed  
potius inhibetur, & quidem non  
sine presentaneo vitæ periculo. Sed  
cum brevitati nos itudeamus, si  
quis auctoritates, rationes plures,  
& observationes desideret, hanc in  
rem legi merentur Demerbroch.  
*Simon. Method. cur. pest. l. 1. p. 47.*  
& alii. Quod jam de venz-sectione  
diximus, id quoq; valet de cucur-  
bitulis, item de hirundinibus, &  
praesertim de purgantibus. Non e-  
nim in primis viis, vel extra mas-  
sam sanguineam malum residet,  
quin diarrhoeæ sæpe malignæ distæ  
conjunguntur, nisi enim lenem al-  
vi refectionem per cremorem tart.  
ol. amygd. dulc. vel clysteres aliaq;  
mitiora procures, praestat & ab iis  
abstinere. Purgantia enim ad mas-  
sam sanguineam delata, in ea non  
aliter præcipitando secernendoque  
particulas, itemq; corrodendo effe-  
ctum præstant, ac ipsa venena, re-  
liqua fetacea, atq; scarificationes in  
torturam hominum excogitata sunt  
hic non admittenda.

Curationem *Bubonis pestilentialis*  
*specialem*, seu localem externam in-  
ternæ succenturiandam quod atti-  
net, præmissis suprà dictis acrimo-  
niam corrigenibus medicamentis  
dissolvenda, ac corrigenda sunt  
particulæ corrosivæ stagnantes. Æ-  
quæ in benignis, ac malignis Bu-  
bonibus perfecta in initio dissolu-  
tio, & dissipatio locum habet, in  
pestilentialibus verò maturatio pro-  
curanda. Cura enim variat pro  
peccantis succi acrimonia, sic in  
Bubonibus veneris, ubi acidum  
viscidum magis peccat, conve-  
niunt mercurialia, & non æquæ in  
Pestilentialibus. Si benigni sint Bu-  
bones, nisi dissolvi, ac dissipari  
possint, maturationi opera danda  
est, Medicamenta hic conducunt

varia maturantia, quibus, uti so-  
lemus aliis in Inflammationibus ad  
suppurationem tendentibus, etiam  
hic utendum est, ut sunt cataplas-  
mata ex emoll. rad. alth. malv. fl.  
chamomill. sem. lini, sic. inter  
Composita aliis præferimus ungu.  
Basiliconis, quod egregie internam  
promovet fermentationem, non e-  
nim, uti Chirurgi loquuntur, hæc  
attrahunt humores, sed maturati-  
va potius blandis suis particulis  
volatilibus promovent, & adju-  
vant fermentationem succorum sta-  
gnantium, Emplastr. de Melilot.  
diachyl. f. aliaque mucilagines com-  
mendantur, à pinguibus tamen,  
me iudice, potius abstinendum  
est, & potius mucilaginosæ, & ca-  
taplasmatæ locum inveniunt in la-  
tæ costæ, & tepidè applicata, ex  
farina sem. lini fabar. fl. sambuc.  
verbas. malv. vitell. ov. croco.  
aliisque, possunt etiam his addi  
Theriaca, cum capis, vel Dia-  
scord. cum Bufone mell. rutæ. &c.  
Cum jam maturaverit Bubo,  
peritusque si non sponte cultro tamen  
fuerit opus, omni autem conatu  
promovenda est, (cui jam di-  
ctum) Bubonis suppuratio, quæ  
si vix obtineatur cataplasmatibus,  
vel emplastris appropriatis, sunt  
qui eam ipsis vesicatoriis tentan-  
dam esse volunt, licet aliàs yche-  
mentiora contra Bubones remedia,  
ut & altæ in Carbunculis scarifica-  
tiones plus aliquando damni, quàm  
emolumenti adferant, qui ut & hi  
quo nitidius, vel circumspicius  
tractati, eò citius curati obser-  
vati sunt. Disputandus autem  
Bubo pestilens non est uti Bubo  
simplex, ne sanguinis mixturam  
turbando advenientibus ex parte  
affectæ particulis incongruis, imò  
pestiferis sulphureis corrosivis,  
(hic ut & alibi verbis venia,  
modò de re constet;) periculoso-  
ra, & sæpe lethalia producantur  
Symptomata. Etenim semper & ubiq;  
expendendum, num plus mali ab  
ipsa exulceratione imminet, an verò  
à particulis diverso à sanguine mo-  
dò

do, agitat, fermenti indole fruentibus, & non raro sanguinis (si communicentur ut sit in omni discussione;) mixturam turbantibus. Quoad Bubones pestilentes ac malignos, qui facile patent, dum loca occupant glandulosa, horum eadem est indoles hoc in casu, ac Carbuncolorum, nisi sint mitiores, ad quorum acrimoniam causticam venenatam delendam plures Bubonibus calide applicantur bufoes in aceto maceratos, vel ex istis cataplasma parant, sicq; imponunt. Alii laudant cucurbitulas, vesicatoria, fetacea alii, quorum omnium dicunt securissimum esse remedium, quod fetaceum aliquando cum fructu institutum vidimus. Si dolor in Bubone imprimis pestilentiali maxime urgeat, sequens Cataplasma tepide applicatum eximii erit usus.

*R. Herb. scord.*

*ruta*

*cicutar.*

*Fl. Chamomillæ. aa. Mj.*

*melilot. Mß.*

*Summ. absinth. Pij.*

*Mica panis similag. q. s.*

*Myrrb.*

*Croc. opt. aa. ʒß.*

*Aqu. Regin. Hungar.*

*Theriac. Andr.*

*El. diascord. aa. ʒiij.*

*M. pro Cataplasmate.*

Si Bubo simplex aliam præter ordinariam afficit partem, ex. gr. si sub mento appareat, & haud magnus est, dissolvendus est, in quem finem liquorem nostrum dissolventem commendamus applicando, vel fortiter illinendo.

*R. Spir. vin. alcalisat. ʒvj.*

*Cinamom. acutiss. ʒß. ʒij.*

*Caryophyll. ʒß.*

*Croc. opt. ʒß.*

*M. & digerantur diu; aliquando & destillentur.*

Vel sequens, aut simile imponatur Empl.

*R. Gum. Ladan. ʒj.*

*Galban. ʒß.*

*Tinct. eiusdem q. s.*

*Campbor. ʒj.*

*Myrrb.*

*Aloes aa. ʒß.*

*Pulv. sem. cumini.*

*anif.*

*Herb. sal. v. aa. ʒiij.*

*Spir. matric. q. s. ad consisten-  
tiam Cerati mollioris.*

Vel si hisce non cedat Bubo, sequens conducet.

*R. Aloes*

*Myrrb. aa. ʒj.*

*Campbor. ʒiij.*

*Sal. Saturni ʒß.*

*Aqu. Regin. Hungar. ʒiij.*

*Spir. matric. ʒxx.*

*Elix. vit. Math. ʒj.*

Cum spongia fricetur, & imponatur sacculus ex herbis discutientibus, & sale tartari, & hermeniaci, sem. cumini. repletus, omnia enim hæc attenuant & resolvunt, imprimis cum accedat calor actualis, quo vires Medicamenti promouentur, & fermentatio interna succorum augetur, vel illinatur spir. lumbri. cum spir. sal. hermeniaci succin. &c. Si vero Bubonem satis magnum ad maturationem vergere appareat, maturantibus, & suppurantibus adjuvandum, ita quandoeger. dolorem lancinantem, & pulsanterem remittere, & quandam titillationem succedere sentit, & cedens molli s. digitis aliaque apparene signa perfectæ suppurationis, & brevi futuræ apertionis, nisi sponte rumpatur abscessus à perito Chirurgo apertendus est, & quidem magis lancetta, cauterium enim potentiuse, propter longam eschata motam, si optio detur, minus locum habere videtur, idque in loco declivi, & quidem magis latè, vel per transversum, præcipue in inguinibus, quo materiæ ichorose acerrime facilius pateat exitus. Facta apertione mundantia dicta conveniunt, ad ulcus depurandum & apertum servandum, ne citius consolidetur, nisi succis pravis alius magis idoneus concedi potest exitus sunt qui canalibus plumbis des-

vant apertum ut depleatur pus, vel iniiciendi sunt varii liquores, si ulcera hæc profundiora sint, vel quod melius, turunda vel plumeæ ex linteo carpto fiant, & imponantur cum aqua calc. viv. spir. matricar. spir. vin. Camph. vel digestiv. vel Basilic. bals. sulphur. terebinth. cum Theriaca vel dialeordio, vel spir. vin. myrrhat. qui instar omnium est, & cunctis ulceribus optimum remedium existit. Si ichorosa magis sit materia, addatur Balsamus de Capivi. vel pulv. herb. scord. vel balsam. most. vulner. &c. Quando verò notantiora evanuerunt symptomata, ac reliqua ad statum pristinum magis accedunt, tunc sarcoticis & consolidantibus vulgò sic dictis locus erit: ex Emplastris hic conveniunt oppodeltoch, sticticum, Diapalm. item Terebinthinat. imprimis verò ex olivbano, aloë, myrrha, mastiche, camphora, sarcocolla, succo hyperic. veronic. nummular. prunell. parata remedia.

*Cura Carbunculi, seu Anthracis* Curatio Carbunculi, seu Anthracis cum eura Bubonis ferè convenit, nam Tyroneſciant velim, quod affectus hic curari debet ut Gangrana, & cum jam ad sphacelum tendat gangrana, omnis propediem opera adhibenda est, ut suppuratio sequatur, & per consequens separatio Escharæ. Præcipue ergo curæ totus cardo vertitur in partis sidentæ à sana separatione, h. e. tubulis debitò patientibus solum fluidum convenienter transmittentibus, quæ sit à sanguine, & humoribus continuo impingentibus in partem, æquatione tubulorum erosorum, ac fluidi contenti, putrescentem, quam dum penetrare nequeunt, tandem de se desciscunt, idque facilius, si vel ab acido, vel ol. antimonii circumliniti intus contento toti jam abscissi fuerint tubuli, vel scarificationibus aperti tubuli sani vi propulsus cordis copiosum effundunt humorem, qui insinuans se

inter partis denotiora fragmenta, jam divisa ea lubricando efficit, ut frustulatim decendant, facilitatque hæc separatio, si applicentur sub forma imprimis Cataplasmatibus, talia, tum quæ agitantiora, tum particularum acidarum, &c. in parte demortua, quam humorum in parte sana adaugent, tum quæ spirituosius salinis volatilibus balsamicis &c. particulis, ne acidum corrosivum ulterius in tubulosanos saviat, impediunt, humorumque è tubulis stillantium acrimoniam auferunt; quod ad mundificationem, & consolidationem requiritur, sique Carbunculus in exulcerationem transit, quæ hic terminatur extremitatibus vasculorum abruptorum, ex quibus, & perque humores (ut alibi fluunt sic hic) exstillant, curanda ut omnis alia, habito scilicet ad ipsam sanguinis constitutionem, ut & cæterorum si idorum ab eo ut fonte derivandorum, respectu.

Ad separationem plures utuntur butyro antimonii, eoque circa Carbunculos saltem circumlun ducunt, inde statim pars corrupta secedit à sana, & dein ulcus facili negotio mundificant, & ad perfectam deducunt curationem, vel loco butyri antimonii Emplastro Magnetico A. Salæ uti possumus, quod propediem crustam excitat, quæ separata unguento maturante separanda est materia supposita.

Si malignitatem adesse constet, præter interna Diaphoretica, Bezoartica, Theriacalia, viperina & absorbentia varia Camphorata, aliaque superius dicta, ad externa quoque confugiendum, & est sequens insignium virium, in Anthrace singulis bihoriis, vel etiam pro re nata citius repetendum, & calidè applicandum.

*℞. Herb. scordii.*

*Rutæ*

*Cicut. aa. M.ß.*

*Sem. Bardan. 3 i.ß.*

*Aloes.*

*Myrrh. aa. 3 ß.*

*Oli-*

## CAPUT IV.

De Phygello, Phymate, &  
Furunculo.

§. I.

Oliban.  $\mathfrak{z}$  iij.  
 Tind. Galb.  $\mathfrak{z}$  iij  $\beta$ .  
 Croci  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
 Terebinth. ver.  
 Ynga. Basilic. aa.  $\mathfrak{z}$  iij.  
 Resin. pini  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Aqu. Regin. Hungar.  $\mathfrak{z}$  i  $\beta$ .  
 Campbor.  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Farin. fabar. q. l.  
 & Theriac. Andr.  $\mathfrak{z}$  j.  
 M. f. l. a. Cataplasma calide imponendum, & sacculus arena calida refertus super applicandus.  
 Si quis à tali magno apparatu abhorreat, imponat vel Theriacam Andr. vel Diascordium Frac. vel aliud Cataplasma magis simplex. Sunt qui prius scarificant Carbunculum, & dein imponunt seq.

R. Succ. Symphyt.

Scabios.

Calend. aa.  $\mathfrak{z}$  i  $\beta$ .Theriac. vet.  $\mathfrak{z}$  iij.

Vitell. ov. N. 2.

M. &amp; calide applicetur.

Sunt qui crudeliter agunt, & ferro aperiunt Anthracem, vel cauterium imponunt potentiale, facta apertione ulcus mundificant unguento de apio, &c. & tandem consolidant sequenti vel simili.

R. Succ. calend.

absynth.

scabios.

apii.

Myrrh.

Irid. fl.

Aloes aa.  $\mathfrak{z}$  j.Sarcocoll.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .Mel. ros.  $\mathfrak{z}$  iij.

M.

Vel quod nobis magis arridet

R. Aqu. calc. viv.  $\mathfrak{z}$  ij.Spir. vin. campb.  $\mathfrak{z}$  j.

Succ. hyperic. express.

nummular.

prunell. aa.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .Myrrh.  $\mathfrak{z}$  i  $\beta$ .

Quamvis hi affectus cum supradictis Phlegmone, Bubonibus, & Carbunculis, non quidem nomine, sed ut plurimum convenient, & tantum quoad figuram, situm, & dein secundum magis & minus differant, attamen Antecessorum nostrorum Methodum semel receptam imitari, & eos in Tyronum gratiam perspicue tractare nobiscum constituimus. Hi enim affectus non minus ac Bubones sunt glandularum passiones, sola differentia in gradibus polita.

Phygellon describitur, quod sit Phygellon, tuberculum inflammatorium, vel potius Erysipelaceum glandularum subcutanearum absque suppuratione, cum dolore urente & mordicante, à lymphæ stagnante acriori obortum. Dicitur etiam Panus, veteribus Panis, item Panula, vel Panicula, Græcis verò Phygellon.

Phyma verò generaliter tuberculum denotat, hic verò strictè sumimus, pro tuberculo glandularum inflammatorio mox erumpente, & ad suppurationem tendente. Aliis tantum est Bubo statim ad auctus, & ad suppurationem festinans, qui revera nil nisi modum Bubonis, & gradum certum exprimunt, unde merito sub eisdem genere, & notione à Præsticiis tractari deberent, cum non opus fuisset ob minimam circumstantiam tumoris novum non tantum excogitare nomen, sed & alia.

Furunculus Græcis Dothien, describi potest quod sit tumor in hac, vel illa corporis partes exiguus in acutum tendens, ovum columbinum vix excedens, cum rubore, dolore, à stagnatione, & acri-



*Parti affe-  
cta.*

acrimonia succorum obortus.

§. 2. Quod *partem affectam* tumorum horum concernit, Phygetlon & Phyma Adenum seu glandulosa occupant loca, maxime verò emergunt in cervice, alis & inguinibus ut plurimum post febres, Phygetlon in inguine productum dicitur Bubo. Furunculi verò omnes corporis partes possident, imprimis verò in carnosissimis, plerumque partibus circa cutem cum inflammatione & distensione fibrillarum circumvicinarumherent, aliquando sunt profundiores, & usque ad membranas penetrant, & modò plures simul afficiunt partes, sæpe verò in musculis hærent, & motum artus obstruendo ac distendendo fibrillas impediunt.

*Diagnos.*

§. 3. Perspecta parte affecta nunc paucis *Diagnosin* horum tumorum perspicimus. Signa verò ex quibus cognoscitur Phygetlon, sunt tuberculum seu tumor instar Erysipelatis vel Inflammationis, adest, enim calor, durities, dolor ac distensio, febris, sitis, vigilæ: ac initio adest pulsatio, gravitas, ardor, rubor, horrorque, rarissime hi tumores ad suppurationem perveniunt.

*Phyma* cognoscitur à tumore glandularum in sensus nostros incurrente, qui facile ad suppurationem transit, minor est tumor quàm Phygetlon, minoremque habet dolorem & ruborem.

Quod Furunculorum *Diagnosin* attinet, apparent isti ruberrimi cum ardore & duritie, eruptionem horum comitari solet horror, rigor & febris. Dolor adest valde intensus, imprimis, si ad suppurationem tendunt, adest enim pulsatio, calor cum maxima inflammatione totius artus. Diversæ sunt magnitudinis, ut plurimum sunt instar ovi columbini, alii minores, alii majores, si unus ab alter revertitur, & hoc per menses aliquot sæpe durare solet, rariùs sponte evanescunt, sed ut plurimum

per suppurationem, & quasi ulcera dein constituunt, materia quæ prodit valdè tenax est & lutosæ, coagulata & aliquando cum sanguine mixta, sæpe foraminula in superficie cutis exhibent, per quæ humor stagnans subtilis emanat, & reliqua durities discutitur, per frustula sæpe chylus coagulatus extrahi potest, Furunculi hi sunt aliquando Epidemici, prout hoc anno 1688. observavimus illos per totum Districtum Castellaniæ grassantes.

§. 4. *Ætiologiam* tumorum imprimis *Phygetli* vel *Pani Galenici*, dicunt nihil aliud esse, quàm glandulæ alicujus erysipelas inflammatum, aut inflammationem erysipelatosam: vel phlegmone in adenum locis emergens, maxime verò in cervice, alis & inguinibus, ut plurimum post febres aut post alicujus partis dolorem, quæ fluxionem etiam adenis proritam, eveniens. *Phygetlon* verò in inguinibus emergens veteribus dicitur Bubo. Causas tumoris hujus calidè & celeriter orti dicunt, esse alias externas alias internas: illæ ipsæ sunt quæcunque fluxionem promoveant, hæ verò ipsi sunt plethoræ, & partis recipientis emunctorii scilicet mollietis receptioni apta, conjuncta verò causa Galenicis est sanguis biliosus ejusmodi tumorem excitans.

*Phyma Galenicis* dicunt tumorem glandularum, quem à sanguine pituitoso producti existimant, qui citò ad suppurationem pervenit, ob humiditatem à pituita provenientem putredinis matrem.

*Furunculus* ipse est humor abscessorius ex crassis humoribus in carnosissimis maxime locis conflatus, mitis quidem, quum in ipsa sola cute consistit: malignus autem, quum ex ampliore profunditate emerferit.

§. 5. *Phygetli* seu *Pani* causam *Paracelsus* ex colore emortuo provenire ait, sic quoque juxta ipsum

*Galenico-  
rum opi-  
nio de  
causa  
Phygetli.*

*Phymatis.*

*Furunculæ.*

*Paracelsi  
opinio de  
causa Phy-  
geli, Phy-  
matis &  
Furunculii.*

in Musculis affectis absconditur hoc tuberculum, quod ex sale Mercuriali oriri contendit. *Phymatis* verò causam ex nutrimento proprii membri liquoribus deducit: *Furunculium* esse apostema per sanguinem ait, confurgitque ex Mercurii mineralibus.

*Helmontii  
de causis  
horum af-  
fectuum  
opinio.*

§. 6. *Helmontius* *Phygeion*, *Phyma* & *Furunculos* à Laticis & cruoribus affluxu produci existimat, & à solo spiritu vitali causaliter eorantium oriri arguit. *Phyma* verò è latice infecto salium dissolutorum ob horri haud dubitat.

*VVillisi opi-  
nio de  
causa Phy-  
geli.*

§. 7. *VVillisus* de causa *Phygetli* sequenti modo ratiocinatur. Immanis illa sanguinis effervescencia febrilis, & per se & ex ægrotorum querelis satis superque conspicua ab admixta materia quadam heterogenea, vel ab exaltatis spiritibus sulphureisque accenditur. Si enim extraneum quid massæ sanguineæ confundatur, & ab illius particulis ita dissimile existat, ut cum iis nequaquam uniri, nec toti massæ assimilari possit, eam violenter perturbat, & motus maximè inordinatos in illa excitat, duratque intensior ista ebullitio, donec silvestris & aliena ista materia vel subacta, vel foras eliminata fuerit. Si verò spiritus aut sulphur dominio gaudeant, & ultra præscriptos limites evahantur, alia principia obruunt, nulloque freno coercita impetum faciunt, sanguinisque liquorem plus debito exagitant, nec malaciam illis prius concedunt, quàm exardescerent istæ particulæ deflagaverint, facta autem per humorum turgescenciam subtiliorum particularum evaporatione, sal spirituum consortio orbatas, nec ab iis exaltatus accescit, atque coagulatur; at glandulæ liquorum corpus perreptantur partibus excrementitiis heterogeneisque iis confusis excipiendis destinatz, & ob substantiæ laxitatem illas faciliè admittentes, easdem ob pororum angustiam in gremio suo

retinere coguntur. Adenes verò ab aggesta hac materia, à qua ipsarum interstitia opplentur, distenduntur, & in tumorem durum ob exhaustas in exardescencia particulas aqueas, elewantur.)

*Phymatis* causam quod attinet, *Phymatis* Præternaturalis, ut ille loquitur, sanguinis fervor cum ab heterogenea materia ipsi confusa, tum ab ferocientibus ejus activis principis exorta, remissior quandoque existit, modo ab illa pauciori copia minusque fermentescibilis indolis cruoris massa admixta, modò ab his minus effectis, tum temporis enim parciore contingit extranei illius humoris sanguineum subingressi secretio, minorque partium liquorum coagulatio; tenuiorum quoque & aquearum particularum tanta nullatenus accidit deperditio, residuæque massæ fluiditatem conciliandæ sufficientes supersunt; in adenes ergò delatæ extraneæ istæ, coagulateve succorum particulæ, tardiorique motu in illas compulsi, tenuiora ipsarum vasa, ad que pervenerunt, obstruunt, depressiorem minusque durum in glandulis tumorem producunt, ob tranquillorem excitatam in sanguine turgescenciam, materiæque fluiditatem, propter quam etiam tumor promptè suppuratur.

Quod *Furunculium* causam concernit, ex *VVillisi* principiis sequenti modo explicari possunt *Furunculii*. Alieni atomi sanguini nequaquam congeneres, nec ipsi ritè miscibiles illi subeuntes nullam interdum sensibilem promptamque perturbationem in eo inducunt; quandoque etiam liquoris sanguinei solum quodammodo strictum vinculum nullatenus subsequitur subitanea vehemensque ejus effervescencia. Paràmper tantum intenditur sanguinis cursus, nulla apparente in corpore alteratione, quia materia.

*Furunculii  
opinio.*

teria heterogenea, tenuioresque ac paucę particulę in reliqua massa separatę facili negotio omnes corporis glandulas pervadunt: sed quum ad miliares perventum fuerit, nec arduiores quarundam ex iis poros permeare valeant, in iis commorantur, eosque infarciunt, glandulasque extendunt, partemque in qua ipsę sunt confersę, tumefaciunt: in illa verò utut temperata sanguinis turgescencia, indefinenter avolant spiritus, laxiorque fit totius massę compages: principia autem à se invicem secedunt, crassęque particulę à tenuioribus seu fluidis separantur, quibus cum tamen universas corporis partes percurrunt, earumque ampliores poros penetrant, & pertranseunt, sed ad cutancas glandulas attingentes, & in angustioribus earum poris inhiærentes, in illis sensim ac sine sensu aggeruntur, & quum continuo fluxu illuc advehantur, tenuiorisque sint indolis, partem validè distendunt, acuminatumque tumorem producant, in sanguine verò vehementior ab iis excitatur ebullitio, quia quum ob abundantiores in parte aggestę fuerint, à cruore nullo modo subigi & scerni, & propter obturatos meatus foras amandari possunt.

*Sylvii ratiocinium de causa Phygetli.*

§. 8. *Sylvius* Phygetlon, Phyma & Furunculos ad magnitudinem auctam refert. Tumores igitur alii sunt ex partium consistentium magnitudine atque substantia aucta, alii ex partium contentarum extra locum naturalem effusione in vel inter partium consistentium substantiam. Author etiam tumores hos non multum à Bubonibus & Carbunculis differre, ait, eandemque ipsis assignat causam quamvis benigniorem, & acrimoniam non adeò esse fortem ac in Bubonibus, sed viscidam admixtam esse pituitam, & sanguinem non val-

dè acrem, hinc pro diversitate hujus miscelę sanguinis vel *Phygetlon* vel *Phyma* vel *Furunculum* produci arguit.

*Phygetlon* ergò *Ipsi* est à sanguine magis bilioso, *Phyma* verò à sanguine magis pituitoso, qui statim ad suppurationem pervenit, hinc minor est tumor quàm *Phygetlon*, minoremque habet dolorem ac ruborem, & citius ad maturationem transit.

*Furunculus* verò *Ipsi* est tuberculum in acumen magis protuberans, cum inflammatione & dolore, ovum columbinum magnitudine adæquans. *Furunculum Sylvius* agnoscit alium benignum, alium malignum seu pestilentem: *Furunculum* benignum esse mitem ait, qui cutim ferè tantum occupat; malignum verò qui pesti est conjunctus, hinc & causam variare dicit. Causam ergò *Furunculorum* humores pituitosos, atque impurum esse sanguinem contendit. Pestilentis verò causam humores esse vult acriores ac lixivos nimis corroderentes.

*Furunculi.*

§. 9. *Cartesiani* causam *Phygetli* attribuunt succo crasso chyloso multis particulis acutis rigidis repleto, & ductus glandularum conglobatarum obstruente, circa quam tubulorum obstructionem hærens, nec transitum inveniens, liquor glandularis fibras distendat & tuberculum suscitet.

*Cartesianorum judicium de causa Phygetli.*

*Phymatis* causam ejusdem planè generis, ut prioris tuberculi, esse existimant, nisi quòd particulę chyli acutę non sint adeò rigide & facilius flecti queant, unde & citius suppurationem admittat.

*Phymatis.*

*Furunculum*, sive *Dothien* à succo oriri docent chyloso crassiore multis particulis tenacibus, viscidis, caseosis & lutulentis repleto, in quo retentę partes acutę minus, quàm in prioribus, sint subtiles, sed grossiores & graviores, quas æther subtilis majori violentia movere debeat, unde &

*Furunculi.*

coagulatio hæc difficilior quæst dissolvi.

*Nostra  
sententia  
de causa  
physica.*

§. 11. Perspectis aliorum de causis tumorum sententiis, nunc & nostrum deponamus iudicium. Causa *Physica* eadem est ac aliorum tumorum inflammatoriorum, vel Erysipelatodum, nempe obstructio inflammatoria, quæ secundum magis & minus, & pro materia, ejusque visciditate ac acredine, locoque quem occupat differt, & cum obstructionem hanc inflammatoriam superius capite de Inflammatione latius deduxerimus, ea hic rursus repetere supersedemus. Causæ etiam hic possunt esse vel *internæ* vel *externæ*. Internæ sunt *acidum* sanguinem ac succos nostros, imprimis verò lympham in glandulis contentam coagulans, ductusque obstruens, ut alluentibus succis nulla concedatur circulatio, hinc similis producit tumor. *Externæ* quoque causæ varix symbolum suum afferre possunt, ceu in aliorum opinionibus sufficienter jam dictum.

*Phymatis.*

*Phyma* itidem ab obstructione inflammatoria dependet, imprimis si plures tubuli in glandulis fuerint obstructi, & lymphæ motus ac per fluxus ordinarius haud concedatur, cum simul multum succi chylosi eo perveniat, & fermentatio propediem fiat, facile tumor hic in suppurationem abit.

*Furuncul.  
is.*

Si ritè causa *Furunculi* persistetur, certissimum est ipsum oriri ex sanguine polypofo acido coagulato, admixto simul crasso chylo stagnantibus. In his enim tumoribus salia alcalia nimis subtilisfacta sunt, quoniam falsum acidum muriaticum non ritè dissipatur prout decet. Hinc sequitur, quod ex ejusmodi sanguine muriatico tot salia volatilia, aut spiritus subtiles, vel particule oleosæ, gummosæ produci nequeant, quot ad œconomiam animaleam necessaria sunt, hinc attenuatio particularum reliquarum sanguinis impeditur, sed stagnant potius in mu-

sculosi ac carnosii partibus, excitantque tumorem ovi columbini magnitudinem æquantem, & in acumen vergentem. Sanguis enim lutosus diu ita per totum corpus circulari potest absque productione *Furunculi*, nisi causæ aliæ interveniant, quæ mutationem aliam in Massa sanguinea producant: tam diu sc. particule chyli crassæ ac lutosæ cum acido in arteriis & venis circulantur, tam diu sanitas persistit, si verò mediante aere fermentatio in sanguine oboritur, tunc improporionatæ particule è sanguinea massa propelluntur in partes extremas, hinc sunt ab *acido* in sanguine latente particulares coagulationes in carne ac cute externa. Obstructio inflammatoria ergo existit modo in hoc, modo in illo vasculo, & non duntaxat in uno ramo, sed nonnunquam in mille aliis minutissimis vasculis. Hic ergo est stagnatio succorum maxima, à ruptione vasculorum oborta. Qui enim abutuntur acidis, salis, ac muriaticis, faciliè in affectum hunc incident, uti in pueris observamus tempore autumnali fructibus immaturis vel alimentis crassis, spirituosis & sale volatili carentibus, abutentibus.

*Prognosis.*

§. 12. Quod Prognosis concernit, *Phygelon* est tumor non facili curatu, quoniam glandulas occupat, omnes enim tumores glandulosi difficilioris sunt sanationis, quam aliarum partium carnosarum.

In pueris, quibus *Phyma* est familiarius, citius curatur quam in juvenibus, quibus rarò contingit, difficilior, ad suppurationem vel maturationem propediem abit hic tumor phymaticus.

Prognosis *Furunculorum* quod spectat, tardius isti ad suppurationem tendunt, rarius in Gangrænam ac Sphacelum transunt. Suppuratio enim nihil aliud est quam attenuatio & fermentatio succorum evasatorum, & hæc operatio

ratio similis est chylicationi, quæ in stomacho contingere solet. Cum non sint periculosi Furunculi, attamen infantes faciliè ad atrophiam disponunt, diu sæpè durant, ac faciliè recidivæ sunt, si una in corporis parte aperiuntur, & curentur, alia iterum repullulant, doloreque maximum ab initio cum horrore, febre, & externa inflammatione, rubore, calore inferunt, infantibus sæpè dyspnoeam aliosque affectus accersunt, ceu sæpissimè id evenisse animadvertimus. Nonnunquam in ulcera transeunt diuturna. Difficillimi quoque curatu sunt hi tumores, quando aperti foramen profundum ac rotundum excavant. Tumores hi tempore ad fermentationem excitandam apto, solent grassari epidemicè. Furunculorum cura sæpius ad menses differtur, imprimis in scorbuticis ac cachecticis subjectis, quo enim credinis humorum gradus major, eò cura difficilior succedit. In adultis non tam faciliè, quàm in pueris curantur hi tumores.

Cura Dietæ.

§. 13. *Curam Dieteticam* quod concernit, his in tumoribus præmissis eò dirigatur *Dietæ*, ut obstructio facta tollatur, & succi liberentur ab acidis aliisque causis stagnationem succis inferentibus, ut ipsis tantum liberior concedatur transitus per omnia vasa ac tubulos, imprimis per glandulosos; Aer ergò qui ad *Dietam* pertinet, sit temperatus, purus & ab omnibus inquinamentis liber, vitetur frigidus copioso acido nitroso refertus, item nebulosus fuliginosus &c. Cibi sint optimi succi lactescentis copioso turgidi Sal. volatili, fugiantur omnia acida, salsa, muriatica, terrestria faciliè succos coagulantia, & ad stagnationem invitantia, potus sit ita comparatus ut succi inde fluidiores redantur, nec ullus ad hoc præstandum aptior existet, quàm potus calidus Theæ vel Caffæ, hinc filiam nostram à furunculis pluribus, alijs

remedijs nihil juvantibus, non ita pridem liberavimus; vel si placebit talis calidus potus parari potest ex fumaria, epatic. nob. ex Enul. aliisque, vel Caffæ. Vinum Gallicum vel Hispanicum modicè in prandio concedi potest, qui verò vino Rhenano assueti sunt, nec plane ab eo desuescendi, cum subita mutatio periculosa sit, sanguis enim ac succi nostri debent conservari iisdem particulis, quibus à prima nativitate nutriti sunt, hinc sanguis noster ac succi reliqui, amaris, salis, acidis, dulcibus volatilib. terrestribus, viscidis ac sexcentis alijs constare debent, sed ne vel acidæ vel salinæ, vel aliz in illis copia prævaleant.

Vigiliæ ac somnus, motus ac quies sint pro re nata legibus sanorum accommodata, neque excedant limites ordinarios.

Excreta & retenta quod attinet, ea semper more solito excernantur, vel retineantur, si obstructions vel alvi, vel mensium, vel lochiorum, vel hæmorrhoidum idoneis sollicitentur remedijs, hinc inde abundè, & ad nauseam revelatis.

Animi passiones firma fiducia in Deum nostrum rationis freno regulentur, mæror, terror omnimodo exulent, ne ab his coagulentur succi corporis nostri, maximi enim hi sunt coagulatores sanguinis ac succorum nostrorum, ceu experientia quotidie testatur.

§. 14. *Curationem* ita instituunt *Galenicæ* in *Phygeto*, attendentes ad indicationes sequentes, ut scilicet magnitudo aucta tollatur, intemperies corrigatur & pars corroboretur: his indicationibus satisfaciunt, præcipuè si ab externis causis oriatur malum: scilicet, si à peste, & febribus malignis: tunc nim periculosissimum dicunt affectum: quod si non obset febris alicujus malignitas, à principio statim injecto enemate sanguinem

*Galenicæ  
rum cu-  
ram in  
Phy-  
geto.*

detrahunt, & faburiam corporis leniente pharmaco eadem cautione adimunt, & si absit malignitas, Topica aliquantum repercutientia & refrigerantia applicant, oxycratum lintollis calide apponunt, vel lanam succidam, oleo rosaceo, vel olivarum immaturarum omphaci- no dicto inunctam tumori obvol- vunt. Si verò adsit febris vel ma- gna humorum copia, minimè re- percutiendum sed potius discutiend- um esse præcipiunt: in quem si- nem sequens commendant.

*R. Fol. malv.*

*perietar.*

*alsiner* 2a. Mj.

*Rad. althææ* 3 j.

*Flor. melilot.*

*hyperic.*

*thamomill.* 2a. P. j.

pulveriscentur vel minutissimè incidentur, & cum s. q. a- quæ in cataplasma coquantur, quod tepidè applicetur.

Si adsit durities, maturantia & emollientia laudant, & sequens præscribunt.

*R. Fermenti,*

*Caricar.* 2a. 3 iij.

*Coq. s. q. hydromeliis, addendo adipis suille* 3 ij.

*Mf. Cataplasma cui add.*

*Gumm. ammoniac* 3 j.

*Farin. hordei*

*lini* 2a. 3 i β

*Cum aq. in pulv. mixt. & calide applicetur.*

Suppuratione facta tumorem a- periendum, dein mundifican- dum & carne implendum esse di- cunt.

Quod si rumpentibus opus sit, apponunt fermentum cum caricis confusum & melle. Vel rad. cu- cum, asimini, lupin. & rad. cap- par. excip. s. q. terebinth. & appli- cant in casu ubi patientes apertu- ram pati renuunt.

Curam Phymatis in plerisque convenire ajunt cum Phygeti- sm dicti: Topica debent hic es- se talia, inquirunt, quæ natu- ræ motum sequuntur, quò eni-

natura vergit, èd per loca com- ferentia esse ducenda, ajunt, Mel, in quò dissolutum sit gummi am- moniacum apponunt, ut emolliat- ur tumor, deinde suppurantia ap- plicant.

*Furunculi*, ad mentem *Galenicorum*, curantur 1. ordinata victus ratione, 2. causæ antecedentis a- blatione, & 3. conjunctæ mate- riæ correctione. Prima intentio, juxta ipsos, perficitur debita re- rum sex non naturalium admini- stratione: Secundo satisfaciunt scopo, si fluxionem avertant ve- nalesedione vel scarificatione, fri- ctione, ligatura, motu &c. ulti- mæ verò intentioni satisfaciunt, si materiam non repercutiant, sed corrigant imposito fermento cum mastiche, vel Empl. diachylum simplex.

Vel:

*R. Mica panis filig.* 3 iij.

*Farin. sem. lini*

*fenigrec.* 2a. 3 ij.

*Caricar. pingv.*

*Fermenti* 2a. 3 iv.

Coq. c. s. q. lact. caprini ad consi- stentiam Catap'asmat: si dolor adsit hisce addunt *rad. althææ lil. alb. & fol. malv.* quod si tumor a- pertus mundificativo deapio abster- gunt, item seq.

*R. Succ. apii* 3 iij.

*Terebinth.* 3 ij.

*Vitell. ov.* N. ij.

*Pulv. thuris* 3 iii.

*Coq. ad aliqualem succi exha- lationem, deinde add.*

*Farin. hordei* 3 ii.

*Mell. rosat.* q. s.

*M. F. liniment.*

Dein nlcus implent & cicatrizant.

§. 15. *Paracelsus* in cura Phygeti- li, Phymatis & Furunculorum So- nath commendat, cui virtus ex- pulsiva inest, hujus enim virtu- te ac vi singula Apostemata pelli- at, quia hoc resolvit, mitigat, de- nique expellit Apostemata ex cor- de. Una etiam adesse dicit oportet Chirurgica Praxis, interve- nientibus Maturativis quibus in- emun-

*Furunculo.*

*Paracelsus contra id morbis hujus.*



emundatorium redigantur tumores hi. Maturativa quoque cum attractivis ita coniungi vult, vt expulsum attractivum sequatur. Directo igitur Sonath in virtutem suam expulsiua sequitur Thyrisca, sub qua delitescere contendit Arcanum in omni veneno proptervirtutem usurpandum.

Helmonstii  
cura.

§. 16. Helmonstius tumores hos non aliter curari ait quam alios tumores, per interna sc. sudorifera & Arcana sua, Mercur. diaphoret. &c. Inter externa magnificat axungiam leporis vetust. sanguinem hircinum, imprimis vero oleum strumarum.

Willisii  
modus curandi  
Phygeton.

§. 17. Willisius materiam in adenibus aggestam, & Phygeton in iis producentem ex partibus terrestribus crassioribus Sulphureis, & paucis aqueis illas diluentibus constitutam, ad supurationem redigendam incumbit, & interius sudoriferis & Marialibus, & quia materia valde compacta existit, fortioribus etiam maturantibus externis ad supurationem eam deducendam vult, in quem finem suadet ut foveatur statim Phygeton decocto sequenti.

Rad. alib.  
lil. alb.  
Fol. malv.  
parietar.  
violar.  
branc. ursin.

Cog. in 4. font. ad thii. & decoct. tepid. bis in die foveatur tumor & post forum imponatur Cataplasma sequens.

Rad. Residens. decoct. supra dict. in mortar. contus. & per cribrum traict. q.s.  
cap. sub cinerib. bct. N. ij.  
Ol. lil. alb. q.s.

M. F. Cataplasma applicandum tumoribus in die.

Si hæc autem non suffecerint, imponatur tumori emplastr. de galbano, vel de gumm. ammon. vel diachyl. magn. cum gummi. Abscessus deinceps aperiatur.

& solito more tractetur ulcus.

Phymatis materiam temperatorem fluidioremque facilius maturari ait Author, promptiusque superari. Sequens commendat Cataplasma.

Phyma.

Rad. Mica panis.  
Vvar. pass. sine acin. aa. 3j.  
Butyr. recent.  
axung. suill. non salit. aa. 3vj.  
lact. vaccini. 3ij.

M. F. Catapl. l. a. quod bis in die tumori imponatur.

Vel:  
Farin. fenigrac.  
Sem. lini aa. p. aq.  
Decoq. in lact. vaccini. l. q.

M. F. Catapl. f. ac fervetur ad usum.

Furunculum verò maturari statim author suadet, imposito sc. emplastro citrino, vel apertu ferro vel cauterio. Evacuata autem materia absque Medicamentorum auxilio plerumque coalescere existimat, sed si sponte non consolidetur, imponi illi Emplastr. de meliloto, vel etiam tantillo balsam. Peruvian. illini jubet.

§. 10. Silvius Phygeton cum Bubonem curat discutientibus nimirum externis, item emplastris, & unguentis emollientibus ac resolventibus, ut sunt diachyl. melilot. de gumm. Varia quoque Cataplasmata ex aromaticis, ac salibus volatilibus parata imponi jubet, si maturatus fuerit tumor, cum apertum esse præcipit maturantibus sc. ac rumpentibus, inter alia commendat fermentum cum caricis contusum, & melle mixtum sicque impositum, vel in fortioribus aperiatur scalpello vel lancetta in parte molli ac declivi. Apertum mundare jubet digestivo vel balsam. sulph. anis. vel terebinthin. Dein ad consolidandum Emplastr. diapompholyg. vel stictic. Crolii applicandum esse suadet.

Sylviana  
curatio  
Phygetli.

*Phymatis.* Curam *Phymatis* quod attinet, Sylvius noster eam cum cura *Phygetli* in plerisque convenire ait, & Empl. diachyl. cum gummat. aliisque volatilibus concinnatum laudat, item mel in quo dissolutum sit gummi Ammoniacum, exinde enim illico emolliiri humorem hunc scribit, quem de in imposito balsam. sulph. Terebinth. vel anis. mundificandum & iterum consolidandum esse Tyrones suos docet.

*Furunculi.* *Furunculum* etiam iisdem remediis curandum esse contendit, imprimis Empl. diachyl. s. commendat, vel seq.

*Re. Mica panis filig. 3ij.*

*Farina sem. lini*

*senigr. aa. 2a. 3ij.*

*Caricar. pingv.*

*Ferment. aa. 3iv.*

Coq. c. s. q. lict. caprin. ad consist. Catapl. si dolor adsit, hisce addi vult.

*rad. lil. alb.*

*alib.*

*Fol. malv. aa. 3ß.*

*M.*

Pro mundificatione sequens laudat.

*Re. Succ. apii 3ij.*

*Terebinth. 3ij.*

*Vitell. ov. N. ij.*

*pulvis Thuris 3ij.*

Coq. ad aliqualem succi exhalationem, dein ad.

*Farin. hord. 3j.*

*Mell. ros. q. s.*

*M. F. linimentum.*

Dein implexi jubet ulcus cicatrizandum.

*Carosia-*  
*norum*  
*methodus*  
*curandi*  
*Phygetlon*  
*& Phyma.*  
§. II. *Cartesiani* talem nobis suppeditant *Phygetlon* vel *Phyma* curandi rationem, qua impuritates ex intestinis eliminantur, ne succo chyloso & sanguini communicentur, hinc resinam Jalappi, scamonium rosatum, & mercurium dulcem in usum ducunt, quibus si scoriz crassiores ejestz sint, particulas acidiores & rigidiores obstructionem ductuum, glandulosorum inducentes flectere, absorbere & per habitum corporis eli-

minare conantur remediis porosis, alcalicis fixis & nonnunquam volatilibus, Sale nempè fumariz, scordii, bezoardico minerali, Sale C.C. volatili, rob sambuci, Tinctura Tartari antimoniata, vel infusus & decoctis ex lignis aliisque herbis sanguinem depurantibus. Ipsa verò hæc tubercula externis topicis attenuare, incidere, emolli-re & resolvere student, illito vel oleo amygd. dulcium cum oleo scorpionum, additisque guttulis quibusdam olei destillati anisi vel succini, misto, vel unguento dialtheæ & Basilico, vel imposito emplastro de mucilaginis, aut diachylon & de meliloto invicem mistis. Materia satis emollita tumorem aperiunt, & exempto pure ulcusculum mundant unguento aureo, vel basilico & balsamo sulphuris, emplastroque diapalmæ, vel de gratia Dei ad optatam perducunt sanationem.

*Furunculi* curationem itidem emollientibus peragere tentant, qualia sunt Empl. de gummi Ammoniaco, sulphure, camphora, euphorbio & oleo petrz, vel quod sequens exhibet formula.

*Re. Pic. naval. 3ij.*

*Pyrethr.*

*Galban. aa. 3ß.*

*Terebinth.*

*Cera aa. 3j.*

*M.*

Materiam suppuratam remediis corodentibus separant, ulcus mundant, & sarcoticis explent. Recusante verò materia suppuratatione, sectione cruciformi premissa, & cute sublata, materiam spatula separant, reliquias unguento Ægyptiaco, vel præcipitato, aut alumine uto absumunt, & ulcus emplastro oppodeltoch debite occludunt.

§. 12. Quod *Nosstram* curationem Pharmaceuticam ac Chirurgicam tumorum horum attinet, *Phygetli* cura consistit in tumoris glandulosi deobstructione, qua obtinenda est aque per remedia interna ac externa, interna egre-

*Furunculum.*

*Nosstra*  
*sententia*  
*de Phy-*  
*getli cu-*  
*ra Phar-*  
*macuti-*  
*ca ac Chi-*  
*urgica.*

gia sunt incidentia, & dein diaphoretica sive absorbentia, inter incidentia hoc in tumore amara & tartarea meliora sunt, ex. gr. Essent. myrrh. cent. min. card. bened. absynth. &c. inter Tart. liq. terr. fol. Tart. R. tart. nostr. volat. tart. Vitriolat. Crem. tarr. cum ocul. caner. hæc enim optimè cum absorbentibus conjungi possunt, & sic una fidelia plures dealbamus parietes. Et cum sæpe aliquid maligni seu acrimonie subest, hinc Diaphoretica non contemnenda sunt, imprimis Sal. C.C. volat. viperar. ex exuviis viperar. solum confectus, spir. viperar. ex viventib. viperis cum toto destillatus, salia volatilia oleosa, imprimis hic conducit internè spir. matricalis nost. oleosus; egregium remedium in omnibus tumoribus. Externa etiam statim tumori apparenti applicanda sunt, hinc angue pejus repellentia ac alia refrigerantia fugienda, sed statim ad resolventia ac deobstruentia transeundum est: commendamus ergo statim ab initio seq. vel similem fctum, seu forma Cataplasmatibus applicandum.

*Ba. Herb. salu. origan.*

*ruta, cicutar.*

*malv. atripl.*

*alsiner aa. Mß*

*rad. alib. ʒj.*

*Flor. melilot.*

*hyperic.*

*chamomill. aa. Piß.*

*bacc. lunip. ʒj.*

*Cog. in vin. Gall. vel muls.*

*dein add.*

*Spir. matric. ʒiß.*

*Fl. sambuc. ʒj.*

*Camphor. ʒiij.*

*Sal. armoniaci ʒß.*

Uel spiritus matricalis cum linteis madefactis & quadruplicatis imponatur. Theriacam cum capis alii cum effectu applicant. Imponantur varia emplastra, ut de Sal. armoniaci diachyl. s. diaphorer. de melilot. de mucilag. omnibus verò præstat Empl. de Labdano

cunctis tumoribus discutendis egregium Empl. Ut verò horum applicatione per aliquot dies continuata, si tumorem satismagnum ad maturationem vergere appareat, quamvis hoc in tumoris genere rarissime fiat, maturantibus & supurationem promoventibus succurratur; ita quando & æger dolorem lancinantem & pulsantem remittere, & quandam titillationem succedere sentit, & cedens molities digitis, aliaque apparent signa perfecta maturationis & brevi futuræ apertionis, nisi sponte rumpatur abscessus, à perito Chirurgo aperiendus est, & quidem lancetta, idque in loco declivi, facta dein apertione mundandum est ulcus & tantum exsicccandum, quod more solito cito curetur aq. calc. viv. spir. matric. vin. Camph. succ. hypetic. nummular. plantag. Sal. Saturni, aliisque balsamicis digestivis vel ungu. nostro balsamico, bals. de Peru, de Capaiva, Tolutan. vel Chili, vel plumaceola cum supradictis liquoribus & balsam. nostro divino imbuta applicentur tepide. Empl. divin. diachalcit. de plumbo stictic. oppodeltoch, vel polychrestum nostrum apponantur.

Cura Phymatir vix differt à cura prædicti Phvetli, gradu enim à se invicem differunt; internè ergò conveniunt incidentia absorbentia ac diaphoretica, hinc inde ad nauseam dicta, imò vinum medicatum ex herbis & radicibus aliisque parata volatilibus & absorbentibus hic maximè convenit.

Cura externa eò dirigatur ut suppuratio promoveatur, quod obtineri potest si externis impositis fermentatio succorum augeatur, in quem finem conducet ungu. basilic. externè impositum, vel alia Cataplasmata ex emollientibus parata, specificum in hoc tumoris genere habetur niel in quo dissolutum fuerit gummi ammoniacum, si apponatur illicò, à quo emolliuntur & aperiuntur Phymata. Vul-

gus imponere solet mel cum farina subactum; apprimè conveniet farina lini melle mixta. Dein aperti facillè curantur impositis mundificantibus, & dein exsiccantibus jū superius dictis ex calc. viv. & succis temperantibus paratis.

CUra Fu-  
runculis.

In Cura Furunculorum eò respiciendum est, ut coagulum sanguinis ac succorum impediatur, & circulatio promoveatur, ne partes lutosæ alibi stagnare possint, quod obtinere possumus, si acidum in sanguine ac succis existens mortificetur vel absorbeatur, & dein sanguis crassus attenuetur, in quem finem absorbentia diaphoretica fixiora commendamus, imprimis verò sequentem pulverem ad ℥j. vel plus vel minus pro re nata exhibendum.

℞. *Antimonii diaphoret.* ℥℥.

*ocul. cancr. ppt.* ℥j.

*alb. græc.* ℥j.

*Eber. ppt.* ℥j.

*M.F. Pulvis.*

Salia enim volatilia & alcalica hoc in pulvere contenta acidum apprimè temperant, prout hunc effectum in pluribus morbis præsertim in Soda vidimus. Hic verò effectus non tantum in primis viis percipitur, sed etiam in chylo ad eor tendente effectum hunc præstat. Profunt etiam hic omnia salia volatilia oleosa, hinc Furunculis affectis semper exhibendæ sunt guttulæ aliquot salis volatilis oleosi, vel spir. catarrhalis oleosi, vel cephalici in vino malvatico, non Rhenano vel alio acido, quoniam cum hoc effervesceus volatile oleosum figuram suam, & per consequens vires suas amittit. Si hisce *Furunculi* non cedant, ad acidum magis temperandum, & sanguinem attenuandum ac incidendum siquens conducet decoctum ad ℥iij. ter de die exhibendum.

℞. *Radix Chinæ.*

*Salsaparill.* aa ℥j.

*bardan.* ℥℥.

*Lign. Guaiac.* ℥ iv.

*Bacc. Lauri*

*Herb. rorismar.* aa ℥℥.

*Fl. verbasc.*

*Cent. min.* aa M℥.

*Herb. cochlear.* ℥j.

*Sem. anis.* ℥℥

*Sal. Tart.*

*Sal. armoniacæ* ℥j.

*Antimonii crud.* ℥vi. in nodu-  
lolignand. vini & ferulae.  
q. s. coq. & servetur colat.

Jucundius verò ægri curantur decoct. lignor. ac rad. chinæ cum Thee infus. & saccharo edulcorat. & more solito ex patellis absorpto. Hisce non juvantibus ad vinum calybeatum accedendum est, & sequens commendamus.

℞. *Limat. Chalyb.* ℥j.

in vino optimo generoso vel  
Gallico vel Hispanico  
Mens. dimid. loco calido  
digeratur.

& patiens vitrum hauriat  
& simul

Tincturam corallorum cum cera paratam nostram assumat, & interponantur salia volatilia ut C.C. Sal. armoniaci, de quibus de die ℥j. assumat. Hæc omnia sanguinem crassum attenuant, & acidum peccans temperant, quod semper in tumoribus hisce respiciendum est. Nec negligenda sunt Antipionata Tinct. antimonii Tartar. salis que alibi ad nauseam dicta.

Curatio Furunculorum externa iidem consistit in sanguinis lutosi ac ab acido coagulati ac in crassati incisione & attenuatione, ut succi stagnantes rursus circulari possint, & quoniam non multum fluidi in hoc tumoris genere reperitur, hinc particulæ Medicamentorum fores haud perumpere possunt, ex quo tarditas motus dependet. Ratio ergo æquæ ac experientia Nos docet, quod ejusmodi tumores ope vehementiorum maturantium & fermentationem internam promoventium Medicamentorum curari ac auferri debent. Ut plurimum ergo in curatione Furunculorum animus dirigen-

rigendus est ad ipsius massæ sanguine aliorumque succorum correctionem & emendationem, materia enim peccans, quæ adhuc cum aliis succis in sanguine commixta est, ansem dare potest novæ productioni tumorum, quod apprimè hic notandum est, si enim hoc non ritè observatur, per plures menses artus vexantur, prout experientia Nos docet abundè. Nec etiam ab initio ut in aliis tumoribus, discutientibus volatilibus discutere tentemus Furunculos, sed potius ad eos suppurandos nos accingamus, aliàs tantum detinemus materiam, quæ dein profundius excavat corroditque.

Ad maturationem ergo Furunculorum sequens Tyronibus communica me remedium egregium.

*℞. Gumm. ladan.*

*Galban.*

*Ammoniac. aa. ʒʒ.*

*Styrac. calam.*

*Pulv. rad. bryon.*

*Herb. salu.*

*Sem. cumini. a. ʒʒ.*

*Resin. pini ʒiii.*

*Ol. Guaiac. ʒj.*

*Mf. l. a. Ceratum mollius.*

Gummata enim ex quibus constat hoc Ceratum, quia in se continent sal volatile acre, oleum & spiritus, maximè profunt, imprimis Ladanum, cujus oleum multum subtilius est quam galbani, prout ex suavi odore gummi hujus percipi potest, hinc sequitur ejusmodi gummi optimè particulas coagulatas & lyptosas discindere posse, quoniam materia subtilis aliter per commixtionem particularum gummi ladanii fluit, quam per gummi Galbani, reliqua quoque Medicamenta in Cerato hoc contenta in se continent Salia penetrantia & volatilia, item olea balsamica, sic & pulveres particulas suas salinas habent, quatum ope operatio Medicamenti hujus maximè promovetur, & inde necessariò particule stagnantes ad motum intestinum seu fermentationem incitantur,

hinc sequitur inflammatio, quam dein excipit suppuratio. Si dolor maximè urgeat Cerato præscripto croci ʒij. misceri possunt. Vel imponatur unguent. Basilicon. quod egregium est ad maturandos tumores, quoniam internum motum particularum ac fermentationem promovet. Si inflammatio sit vehemens, conveniunt Cataplasmata ex scord. menth. fl. chamomill. &c. parata, vel Theriaca vel Diafcoridium forma Cataplasmatibus imponantur tepidè. Si jam maturatio & brevi futura appertio imminet, nisi spontè rumpatur abscessus, ferro aperiendus est, facta dein aperture ulcus mundandum est à quacunque sorditie, imposito vel balsamo nostro digestivo ex myrrh. thure, aloë, calc. viv. vitell. ov. Terebinth. parat. pro re nata & ungu. Egyptiac. imponend. vel balsam. de peru, vel chili, vel sequenti mixtura, quæ raro te effe. cū frustrabit.

*℞. Aq. calc. viv. ʒj.*

*Spir. matric. ʒʒ.*

*Succ. hyperic.*

*nummular.*

*plantag. a. ʒv.*

*Sal. Saturni ʒj.*

*M.* quæ mixtura plumaceola imbuta imponantur ulceri.

Empl. divin. vel sticticum vel calam. de tutia, vel aliud exsicicans imponatur. Pinguia in his aliisque angue pejus fugiantur.

## C A P U T V.

### De Ecchymomate & Plaga.

#### §. I.

**E**Cchymosis cutis affectus dicitur, hinc varia sortitur nomina, *Ecchymoma* nempe, à Græco verbo *ἔκχυμα*, vel *ἐκχυσία* i. e. Effusio, Sugillatio, Diffusio, *ma*, *sugillatio*: Species Ecchymomatosis sunt Hypopyon & Hyposphagma, *fusio*.

sanguinis sc. evasati concursus ad ungues ex plagâ, de quo vitio de unguium affectibus in specie fusiùs dicemus. Huc referri possunt vibices, stigmata, peliomata, à fustigatione vel plaga (Germanis Knippen Pezen dicitur) exorta. *Ecchymosis* ergo est affectio circa cutem & sub cute, qua sanguis è suis vasis per fissuras & rimas effunditur, nondum in grumos coactus, tandem tamen à stagnatione acidior redditus in grumulos abit, & partem livescere facit. Hinc jure meritoque vulgo dicunt Ecchymosin solutionem continuitatis cum contusione & ruptione vasorum sanguiferorum aliorumque conjunctam: alii Ecchymosin describunt, quod sit suffusio sanguinis in spatia vicina, unde pars affecta lividum sortitur colorem.

Si verò hoc malum sit à contusione, fractura, lapsu vel alia causa violenta *Plaga* dicitur, quæ verò sanguinis effusio à causa fit interna, nulla prægressa evidente causa violenta, *Ecchymosis* dicitur: quàm verò veterum differentiam, & distinctionem tanquam inutilem rejiciamus, si enim vel ab interna vel ab externa causa producat effectus, idem talem affectus erit. Hinc iterum abundè patet, Veteres in nominibus excogitandis magis curiosos quàm in aliis utilioribus explicandis fuisse. Sic quoque Molops, item vibex ipsis nihil aliud est, quàm cutis sugillata ex verberibus, idem significant stigmata ac peliomata.

§. 2. Pars affecta merito *Cutis* dici potest, quia in ea apparent stigmata illa; & cum Cutis rete mirabile variorum tubulorum & lymphaticorum, glandularum, arteriolarum, venarum, nervorum, &c. sit, nulli mirum videri debet, hanc eandem cutem & in ea vasa potissimum sanguifera pati debere. Quæ vasa sanguifera in cute, vel sub cute latentia facili matre eroduntur à

causa interna, succis scil. acribus, ac corrosivis seindentibus, vel aperiuntur à causa violenta, hinc non potest non fieri, quin evasatus ibidem jaceat stagnetque, & ob crassitatem minimos tubulos permeare, multò minùs per cutis poros avolare nequit.

§. 3. Affectus hic Sugillatio scilicet, nullis indiget signis, quibus dignoscatur, quàm oculis, quibus se satis manifestat; sanguis enim ex contusis, erosus vel ruptis arteriis ac venis exsudans, ruborem, dolorem inflammationem, vel livorem excitat. Signa ergò Ecchymosicos sunt tumor mollis, lividus, quandoque cum, interdum sine doloris sensu partes corporis nostri imprimis sub cute latentes occupans varias. A relatione ægri nosci potest num à causa violenta, vel à causa interna producta fuerit Sugillatio. Livorem totius corporis periodicè recurrentem observavit Celeberr. *Carolus Rayperus*, testantibus *Ephemer. Germ. Nostr. Ann. 9. & 10. Observ. 3.*

§. 4. In eruenda *Causa* Ecchymomatis adscribunt eam *Galenici* sanguini evasato, cum caro ab aliquo pondere incidente contusa fuerit, venæque parvæ quæ per eam dispersæ sunt, ruptæ fuerint, sanguis profunditur, quasi transcolans isque sub cute collectus, juxta ipsos facit id quod Ecchymoma vocatur, cute adhuc integra: rupta cum Ecchymosi h. e. sanguine, qui in loco contuso collectus sit, omnino fieri ajunt. Ecchymosis ipsis est ceu aliis effusio sanguinis subter cutem, quam ab omnibus causis fieri asserunt, quæ possunt exprimere sanguinem, è venis arteriisque extravasare, ruptis, erosis, apertis aut rarefactis eorum tunicis, & cutaneum aneurisma facere. Plagam dicunt eodem ferè modo oboriri, quam tamen à causa violenta ut plurimum fieri ajunt, ut nempe ex acuto re-

*Diagnosis.*

*Causa secundum Galenicis.*

*Ecchymosis.*

*Plaga.*

*Pars affecta.*

tusio.



tufove telo , aliisque instrumen-  
tis .

*Paracel-  
sum .*

§. 5. *Paracelsus* coagulationes sanguinis in cute vario modo fieri posse contendit , ut *trusionibus* , *casibus* , *percussionibus* , vel in corpore vel in membris . Cum aliquod membrum gravi nimium percussione contusum fuerit , impossibile est , ut in eo fiat iterum naturalis unio læsi cum circumstantibus , quia , ut ille ait , mortem in se recipit à percussione vel trusione ; at si percussioneibus , trusionibus aut casu coagulationes intra corpus contingerint sanguinem mox in putrefactionem transire ait , nam ibidem ac in membris extrinsecis tamdiu resistere non potest , ob internum calorem in corpore , sic in deterius proum est , ut quicquid in eo læsum fuerit , mox in putrefactionem agi contendat .

*Holmontium .*

§. 6. Secundum *Holmontium* nomen *Ecchymoma* ac *Plaga* à causis variis produci potest , spissimè verò à plagis & percussioneibus artuum & partium carnosarum , hinc *Ecchymomatis* causam in coagulatum & evasatum cruorem unicè rejicit , concretionem ac contusionem cruoris adesse nullus dubitat , hinc ipsum cum aliis sub cute congelatum & nigricantem esse statuit .

*VVillifsum .*

§. 7. *VVillifsum* in *Ecchymosis* causa deducenda sequenti modo ratiocinatur : Sanguis in partium substantiam effunditur , & in ea remoratur , vel ob earundem partium contusionem , vel ob vasa aperta aut disrupta à cruoris acrimonia , vel ab eodem crassiore obstruata : grave siquidem corpus aliquod parti cuidam violenter applicatum fibras ejus vasaque sanguifera in eo dispersa comprimit , ipsaque sibi invicem propius adjungit , & coarctat , sanguis autem curriculum suum pergens , & per arterias ad locum contusum

appellens , compressa vasa penetrare nequit , nullaque patente via , qua ulterius progrediatur , in ea parte ad quam pervenit moram facit , & in illa stagnat , ac talis sanguinis effusio *Ipse Plaga* dicitur . Disrupto verò apertove vase aliquo ab insita sanguinis acrimonia , cruor in vicinas partes delabitur , ipsasque inundat ; & quum plus sanguinis ab arteriis deferatur , quam à venis reportari possit , nec sanguis ab arteriis exiens , pari modo ac antea venarum oscula subeat , in parte in quam decidit , aggeritur , & cespitat . Si enim sanguinis quidam grumulus ad tenuiora partium vasa attigerit , quæ ob eam , qua pollet , molem permeare nequeat , in ipsorum limine hæret , illorumque orificia obturat , cruorique indefinenter adventanti viam præcludit , ille verò in itinere suo impeditus in parte commoratur & retinetur , & hæc sanguinis extravasatio *Ecchymoma* denominatur , sanguine dictis de causis in parte quadam cespitante , spiritus perniciosi motu agitati à reliquis principiis desciscunt , & per poros avolant : Sulphur verò spirituum consortio orbatum deprimatur , & crassescit , terreasque ac salinas particulas venis suis complectitur . Quum autem propriè dicta tunc existat principiorum residuorum confusio , nec ea sub exacto mixtionis vinculo à spiritibus contineantur , interstitia , quæ inter eorum particulas interfunt , irregularia existentia , plerosque lucis radios absorbent , coloremque subnigrum aut lividum exhibent .

§. 8. *Sylvius* *Ecchymoseos* & *Sylvium* .

*Plagæ causam* , ut & omnis aliud sanguinis effluxus dicit esse apertionem vasorum sanguiferorum qualemcumque , sive illa fiat à causa externa violenta , ut ictu , casu , contusione , vasa lacerante , aut ex nimia vasorum à copioso , valde rarefacto aut retardato sangui-

ne ,

ne, flatibusque, distensione, sive ab humoris aut in vasis, aut extra ipsa subsistentis actione rodente, sive à re dura & acuta vulnerante, obtuse contunden- te, aut plaga aut quovis alio modo contingat modo.

*Cartesia-  
nos.*

§. 9. *Cartesiani* sanguinem è vas- sis suis inter cutem & cuticulam effusum tanquam causam materia- lem proximam admittunt in *Ec- chymomate*, eamque effusionem, ob arteriolarum potissimum dirup- tionem contingere affirmant, vel ab interiori sanguinis impetu ex fortiori particularum angularium, cum poros effervescentia orto, vel ab externa quadam violentia per contusionem, concussionem, sus- tigationem, unde *Plaga*, virgis factam cansionem, unde *Vibices* ex- citentur, inducunt. Internam di- ruptionem plerumque arteriolarum & tubulorum quandam præcedere dicunt obstructionem, ob quam sanguis in transitu impeditus ar- teriolas nimium distendat, novus vero assiduò affluens, & priorem in angustiore rano depellens, ostiolum aliquod nimis aperiat, ut portio quadam ejus cum succo chyloso nutritio in partem effun- datur, ibidemque hærens sal. suo volatili pedetentim destituatur, porosque obstruens globulorum æthereorum appulsu variè com- mutet, ut vel ad latera dessectan- tur, sicque livorem exhibeant, vel omnimodò suffocentur, & a- trum quendam colorem præsen- tent.

*Notum  
indici-  
um  
de causa  
Ecchimo-  
matis, &  
Plaga.*

§. 10. Causæ ergo Sugillationis, me iudice, in duplici sunt ordi- ne, duplicemque ejus constituunt differentiam: causæ siquidem ejus sunt, cu jam dictum est, *Externa* vel *Interna*. Prioris classis sunt contusio, fra- ctura, lapsus, collisio, sustiga- tio, &c. & inde sanguinis effu- sio à causis istis producta veteri- bus Plaga denominari solet. Po- sterioris verò ordinis sunt tubu- lorum obstructio & sanguinis sta-

gnatio, hinc tandem facta dirup- tio vasorum, vel à corrosione humorum vel nimia horum dis- tensione vasorum, illa sangui- nis evasio propriè *Ecchymosis* dicitur. Nos verò promiscuè af- fectus hos pertractamus. Partem cuidam inferitur Sugillatio, cum grave quoddam instrumentum ve- hementius in illam impellitur, & ab illo canaliculi sanguinem de- ferentes validius premuntur, ju- xta se invicem propius adigun- tur, & ab orificiis suis sangui- nem quem continent, ejicere co- guntur in partem, in qua termi- nantur. Sanguinis particularum ordo à fortiori ista pressione de- struitur, ipsæ à se invicem dispe- scuntur, & illarum perit unio, materia ætherea partes omnes irre- quietè pervadens, ad sanguinem istum extravasatum appellens, & in particulas ejus alcalinas tenuio- res, & ad motum aptiores æquè ac in viscosas phlegmaticas im- pingens, ipsas ad exitum determi- nat, vel per reliquorum inter- stitia viam illis molitur; quum verò acida Sulphura, & crassiora alcalia motui sint minus idonea, in parte remorantur. Acida Sul- phurum ramis intricantur, eaque coagulant, quæ motu, quo à ma- teria ætherea adventante, & à spiritibus animalibus influentibus donantur, in tubulos angustio- res, quàm ut liberum permittant illis transitum, compulsa, in il- lis retinentur, eosque obstruunt & impediunt, ne sanguis illos præterfluere valeat. At quum om- nes partis tubuli vel canaliculi ab instrumento contundente non fue- rint compressi, & strictiores tan- tummodo sint oclusi, adsistatque anastomosis inter vasa congenera, sanguis ab obstratis canaliculis in apertos desceat, à qua fit por- ta ruit: quare ea non fit sangui- nis stagnatio, quæ tumori elevan- do sufficiat. Alcalia crassiora, quæ in parte stagnarunt, amplio- ribus gaudent poris, quàm ut acida,

acida, quæ illos subeunt in iis coereantur : quum ergo acida præ tenuitate sua latos alcalicorum poros facile negotio pervadant, nulumque adsit materiæ subtili adveniendi impedimentum, & ea libere per Sulphurum coagulatorum interstitia transire queat, rectè tendit, neque vel minimam in sanguine turbam concitat. Quapropter contingere potest sanguinis extravasatio seu fuggillatio sine subsequente inflammatione, attamen si confusio gravior fuerit, canaliculique ampliores & angustiores, ac profundius in parte cæcantes, æquæ ac illi, qui in superficie sunt positi, supra modum compressi fuerint, & eorum parietibus atque poris validiore ista compressione propius ad se invicem admotis, sanguini non liceat per canales illorum iter facere, nec subtiliora alcalica in profundiori latetia evaporari queant, necessariò ut plurimum subsequitur inflammatio, quia alcalica tenuiora in parte recta delicatorum acidorum spicula poris suis excipiunt, quæ cum ipsis remorantur, eosque angustiores facientes materiæ æthereæ accedenti obicem ponunt, quæ in sanguinem reflexa, illum velociori agit motu. *Ecchymoses* propriè dictæ causas internas asseruimus canaliculorum obstructionem, & sanguinis stagnationem accusavimus, at quum sanguinis stagnatio ut plurimum à canaliculorum obstructione & ruptione producatur, & canaliculorum obstructio à Sulphuribus viscidis coagulatis exciteatur; unde oriatur Sulphurum coagulatio, rimamari operæ pretium est: cam autem emergere à sanguinea massa acidis à causis in Capite de Inflammatione allatis, quæ acida in Sulphurum ramis implicata illa coagulant; sed si delicatiora fuerint acida, subtiliora solum quadam sulphura cogent, quæ in minores grumulos à phlegmatibus innatant conglobata, ampliores canaliculos prætermittunt,

& in arterioribus tantummodo exspitabunt, quare Ecchymosis vii & Plaga Inflammatione vacare potest, quod accidit pro obstructorum canaliculorum ratione, si nimirum fuerint latiores aut arctiores, in profundo aut in superficie collocati. Certum ergo ex his colligere est, sanguineo liquore coagulato, ac hinc & inde à motu quiescente, Ecchymosin constitui. A coagulatis succis obstruuntur & ita comprimuntur, ut circulatio spirituum animalium, seu succi nervi impediatur, quemadmodum enim hypothefin de Circulari Sanguinis motu ab omnibus sanioris mentis Philosophis ac Medicis receptam, & infinitis Experimentis atque Ratiociniis confirmatam novimus, sic quoque succum nervinum seu spiritus animales moveri à cerebro per nervos ad partes, ab his per vasa lymphatica ad venam Subclaviam & Cor, hinc per arterias Carotides & plexum Choroidem ad glandulam Pinealem, & ad Ventriculos cerebri anteriores tres, per porositatem verò hujus denuò ad nervos. Alii supponunt, in plexibus choroidibus cerebri produci & in glandula depurari fluidum quoddam æreum simulque flammeum, quod ad nervos delatum nomine succi nervi aut spirituum animalium, sensum ac motum cunctorum in corpore nostro existat author, hoc verò fluidum seu spiritus animales necessariò circulari debere, i.e. ad principium suæ emanationis reverti, extra omnem dubitationis aleam ponimus.

§. 11. Si leves sunt Ecchymoses, *Prognosis.* nullum habent periculum, sed tantum defæcationem Corpori inferunt. Sanguis sub pelle extravasatus vel insensibiliter discutitur, vel suppuratur, vel obstruendo nervos tubulos Gangrænam aut Sphacelum inducit. Plaga à graviore contusione vel lapsu orta, ut & Ecchymosis in profundiore loco facta, subsequentem habent ut pluri-

plurimum suppurationem, quam tamen Ecchymosin in manu dextra absque suppuratione vel ullo incommodo, & per 24. annos durantem vidi in generoso viro quodam hisce in horis commorante. Sic etiam partis affectu ratione sunt vel difficiliore vel faciliore, in pedibus & Tibia difficillima curatu est suffusio imprimis in scorbuticis aut cachecticis, continuò enim madent partes, quam Ecchymosin in Nobili Aulico à lapsu graviore ortam per annum & ultra durasse observavimus; Ue plurimum remanent stigmata livida tanquam evasati sanguinis testes.

*Dieta.* 5. 12. Nec *Dieta* in Sugillatione negligenda venit, alias accedente succo nutritio acido acri ac terrestri affectus hic potius augebitur, quam diminuetur; eò enim collimandum est, ut succi omnes attenuentur & volatilifentur, in quem finem Patiens aërem eligat calidum ac temperatum, frigidum ac pluviosum contrà fugiat sollicitè. Conveniunt cibi eupepti, fluidi, aromatis ac Sale volatili turgidi, partim ut sanguis stagnans & evasatus attenuetur & resolvatur, humores incrustati obstructionem parientes incendantur ut melius fluant, è contra vitentur summopere frigida, item salina, muriatica ac acida. Potus sit hic imprimis calidus Thez nempe vel Caffè, vel alius herbæ volatilis, cerevisia quoque variis herbis ac radicibus aromaticis maritata concedi potest, vel vinum Gallicum vel Rhenanum, modo fuerit oculis cancr. maritatum, vel in quo bæcæ sambuci fuerint infusæ; vel cum sale volatili more solito in mensa assumi potest.

Somnus, vigilæ, motus & quies, excreta ac retenta, animi passiones sunt pro re nata rationis trutina pendenda.

*Curatio Ecchymomatosis &* 5. 13. Cura *Galenicorum* in Ecchymomate & Plaga in eo consistit, ut concretus sanguis per ha-

licum digeratur, idque celeriter, *Plaga secundum Galenicum.* priusquam nigrescat, ab initio erigò si Ecchymosis magna est V. S. instituunt, & Syrupos seu Julapia sanguinis coagulationem, seu concretionem, seu putredinem prohibentia propinant: uti sunt Syrupus de succo limonum, de succo acetosellæ, de acredine cirri &c. Inter Topica commendant illi adstringentia, refrigerantia digerentibus admixta, ut calor partis uniatur & putredo prohibeatur, & venulæ sanguinem effundentes constringantur, misc. nt itaque albumen ovi cum ol. rosato, & mediocri, adstringente tamen ligatura parti affectæ applicent, partem quoque in circuitu eodem inungunt oleo, & addunt pulverem rad. bryon. vel ros. rub. inspergatur, sunt etiam ex hoc grege, qui in principio Ecchymomata scarificant. Aliqui ex iis pellem arietinam recenter detractam, & adhuc calentem iisdem pulveribus & paucò sale pulverisato inspergunt, & confusis Ecchymosi circumligant partibus. Alii utuntur ungu. dialthez cum croco myrtill. rad. bryoniæ vel ros. rub. pulv. partem sugillatam quoque foveri ajunt vino calido in quo mel & sal sint dissoluta. Quod si Ecchymosis sit inveterata & radices egerit, raphanum contusum applicant, alii partem affectam lavant aceto calido, vel decocto raphani cum vino facto, vel sequens Cataplasma:

*B. Herb. malv. chæresol. flor. chamomill. melilot. aa. ʒj. rad. symphyt. aliheæ aa. ʒij. succi absith. ʒiʒ. vin. alb. q. l.*

M. f. l. a. Cataplasma.

Si malum ad maturationem tendat, hanc adjuvandam esse jubent, & dein ulcus detergendum & consolidandum.

Cæterum de numero *Ecchymomatium*

tum sunt quæ fugillata nominantur, & livores ex *Plaga* contracti; præter jam dicta conveniunt hydropiper una cum suo semine illitum, fugillata & humores qui obdurerunt, disciunt. Pellem autem pecudis recens detractam, eos qui flagris caesi sunt, potius quam cætera omnia, uno die naque nocte persanare ajunt. Ranunculum quoque illitum, aut capparidis folia, aut cerussam cum aceto laudant, oleum lilieum continuò inunctum vibices concolores abigere non dubitant.

*Paracelsus.* §. 14. *Paracelsus* duas conditiones remediorum pro coagulationibus sanguinis esse arguit. Externarum hoc est percussio, vel contusio, ut locum oleo laterino perungas, postea liges cum aceto rosaceo. Non est, inquit, quod cæruleum colorem auferre cures, at resolvere, tum abeunt per se colores. Inter cætera quæque præstantissimum oleum ad omnia externa membra contusa fractaque hypericonis deprædicat. Itidem & olea vulneraria, balsama, & ex fodicationum emplastris tracta esse in usum, qui dictus est, utilia.

Ad coagulatum sanguinem intrinsecus multa recepta posse adferri scribit, cæsaliqua tamen corpora præstantissima è quibus omnia constant remedia, inquit, quorum tradit sequentia selecta; ut sunt Rheubarbarum, sperma cæci, lacca, carbones tiliarum arborum, astrucium, vel branca ursina, aqua pæonia, endiviz, bolus armenus, terra sigillata, hirundinaria, reupontica; lapatium majus, aqua valerianæ, Mumia, diagridium, agaricus, scolopendria, Ysopus, aqua cardui Mariz, sal gemmæ. Omnes etiam purgationes, aut laxationes coagularum sanguinem peltare dicit, cum aliud remedium haberi nequit. Locus etiam casus, aut contusio, inungi debet prædictis medicamentis ad exteriora membra po-

fitis ad mitigandum. Clysteres quoque commendat juxta necessitatem. Mannam pariter esse excellentissimum hoc loco remedium ait. Animadvertendum vult, ne priusquam ad maturitatem pervenias, acris utaris medicamentis, at à nitioribus incipias.

§. 15. *Helmontius* ad contusionem, concretionemque Cruoris absorbendam, & dissolvendam commendat æque interna, ac externa remedia, inter interna aliis præfert lapides caner. & ossifrag. in spiritu aceti resolutos, & assumptos, item Diuretica, ac Diaphoretica tanquam specifica remedia laudat, post volatilia, ut spirit. tartar. C. C. lignorum Camphorata, &c. Sudorifera fixa extollit, ut & Mercurium Diaphoreticum, quo remedio plus quam centum hoc morbo affectos sese feliciter curasse gloriatur. Ejusque indolis Mercurialis habetur Rothmaleri particulare ex universali.

Inter externa Topica commendat rad. Bryon. alb. ras. & parti fugillatæ superimpositam, quæ Ecchymomati, ac Plagæ, in qua cruor sub cute congelatus & nigricans est, cum paucis horis in aquam resolvit, eamque pariter per cutem exigit.

§. 16. *Villifus* sanguinis suffusionem quæcumque curat, ipsum congruatum blandè Diaphoreticis intrò assumptis dissolvendo, & spiritibus parti applicatis per poros discutiendo; ultimi ordinis sunt spir. Vini Camphoratus, spirit. lavendul. flor. sambuc. Juniper. &c. qui juxta authorem sanguinis stagnantis partes comminuendo, & in motum ciendo, porosque aperiendo, illum per insensibilem transpirationem evaporare faciunt.

§. 17. *Sylvius* sanguinem è vasibus effusum, ac per vicinarum partium substantiam dispersum, si removeri queat, in totum, aut ex parte

*Helmontius.*

*Villifus.*

*Sylvius.*

parte quantocyus inde remouendum putat , impediendo idcirco ipsius coagulationem , atque potenter dissolvendo partes ipsius crassiores sub cute latentes & Ecchymosin efficientes , discutiendoque tenuiores , ac temperando insimul acriores , idque tam internis medicamentis , quam externis . Ad sanguinis ergo coagulationem quaecumvis impediendum Author commendat oculos cancr. Antimonium Diaphoreticum, Mumiam, sperma Ceti, Gum. Galban. Sagenum, opium, cerevisiam Joppensem dictam , & sequentem prescribit formulam :

*℞. Aqu. hyssopi.*  
*funiculi aa. ʒ i j.*  
*Acet. stillat.*  
*Spir. vini rectif. vel cuiusvis*  
*Aromatici ʒ ʒ.*  
*ocul. cancr. ʒ i.*  
*sperm. ceti*  
*Mum. Alex. aa. ʒ j.*  
*laud. opiat. gr. iv.*  
*Syr. s. rad. ʒ i ʒ.*

Huius misturæ propinat Aegro cochlear unum & alterum , æquè in sanguinis effusi concretionem interna ac externa sub cute .

Parti affectæ inungit ungu. marciat. de Althea compositum , aliudve aromaticum quodvis , additis quandoque oleis itidem aromaticis, Laurino, Anethino, aliisque potentioribus aut stillatitiis Teræ , Terebinth. Succini , Laterino , &c sed minori quantitate . Inter Emplastra aliis præfert Emplastrum de *spermate Ceti* dictum sequens :

*℞. Cera alb. ʒ iv.*  
*sperm. Ceti ʒ ii.*  
*Gum. galban. acet. dissolut. ʒ j.*  
*M. f. Emplastrum,*

per quod liquatum trahatur tela , fiatque vulgo. dictum. sparadrapum utrinque alternatim applicandum , quod egregium ad sanguinem in externis corporis partibus omnibus . Focus quoque conducere posse ait ex plantis Aromaticis & potenter discutienti-

bus , in aqua vinove coctis paratos , addendo subinde usus tempore aliquid spiritus vini . Ex gr.

*℞. Rad. Byron.*  
*Apj aa ʒ i j.*  
*Filicis,*  
*fol. sambuc.*  
*Eupator.*  
*Cannab.*  
*Chamad.*  
*Mentb.*  
*Abynth. aa. Mj.*  
*Flor. melilot.*  
*Chamom. Rom. aa. Miss.*  
*Sem. cumini,*  
*Bacc. lauri aa. ʒ j.*

M.

Crasse confusa omnia coquantur ex aqua pluviali sed igne lento , atque vase clauso . Servetur ad usum , vel cum sacculis applicetur , vel potest pannus laneus vel spongia mollis partem affectam tegere , apta Fotui calenti imponi , mox expresso liquore superfluo parti dolenti applicari , atque sicut modò dictum aliquoties renovari .

Ubi in talem , tamve profundum locum effusus est sanguis , ex quo citra suppurationem & Abscessum amoveri nequeat commodè , promovendam fore ac accelerandam Puris confessionem ac generationem , in quem finem cum aliis Auctoribus Practicis commendat medicamenta emollientia & maturantia vulgò dicta , radices & fol. Altheæ , Malvæ , lil. alb. brancurfin. Atriplex , Mercurialis , &c. horumve farinas ut & hordei , caricas pingues , Axungiam humanam , suillam , pingued. Anseris , Gallinæ , vitulinam &c. Ex his sequens parare solet Cataplasma :

*℞. Farin. rad. alth.*  
*hordei aa. ʒ ij.*  
*fol. malv.*  
*branc. urfin. aa. Mij.*  
*Sem. lini ʒ i ʒ.*  
*Caricar. ping. No. X.*

Coq. in igne lento ex aqua pura , ccre-



cerevisia tenui, & tepidè applicetur.

*Cartesia-  
nos.*

§. 18. *Cartesiani* ad auferendum *Ecchymoma* primariam curam eo locare solent, ut coagulatum resolvatur, attenuetur, & quantum possibile, in debitam redigatur fluiditatem, ut in venas resorberi queat, quod verò reliquis succis immisceri ineptum est, apertis poris ejiciatur, quapropter interne salibus volatilibus prædita exhibent sudorifera, subtilitate sua penetrantia, atque in membris hærentem sanguinem incassatum non modò è quiete in motum provocantia, sed in motu comprehensum per patulos etiam meatus expellentia, quale sequens mixtura præbet remedium.

*Bz. Aq. Chæresol. 3ß.*

*menth. 3ij.*

*Spir. lumbricor. essentificat. 3j.*

*Salis volat. C. C. gr. iiii.*

*Syr. Hyperic. 3iiij.*

*F. Mixtura* duabus vicibus exhibenda.

Juxta sudorifera, vel post eadem usurpata, diuretica quoque prædita in usum ducunt, ad reliquias crassiores egerendas, quorum numero inferunt oculos cancr. sanguinem hirci, ejusque sal volatile, sal succini, sperma ceti, rubiam tinctorum pulverisatam, vel decocti forma exhibitam, mumiam, camphoram, myrrham, spiritum florum sambuci, aliaque humores crassos resolventia. Externè ea quoque adhibent remedia topica, quæ poros aperiunt, sanguinemque concretum attenuant atque discutiunt, ut succum raphani, mucilaginem radicis sigilli Salomonis, & gummi tragacanthæ, aqua chæresolii vel liliorum extractam, aquam calcis viuz, spiritum lumbricorum, armoniaci, cataplasma ex farina fabarum, & aqua florum sambuci paratum, unguentum de cynoglossa. Abluunt etiam maculas lividas frequentius urina calida, vel sequenti mixtura.

*Bz. Aq. Sigill. Salomon. 3ß.*

*flor. fabar.*

*geran. Robert. 2a. 3j.*

*Spir. vin. 3ß.*

*Myrrh. 3j.*

*Sacch. saturni 3ß.*

*Camphor. 3ß.*

*M.*

§. 19. *Cura Ecchymoseos & Plagæ* *Nostre* *me Arbitro*, eadem est, eaque vel interna est, vel externa. Interna medicamenta, quibus hic uti necessum est, sunt sudorifera ac attenuantia sanguinem congruatum resolventia, sicque fluidiorem reddentia, & sic conveniunt omnia ea, quæ in pleuride & casu conducunt, ut sunt pulvis contra casum, sperma Ceti, lapis Island. antimon. Diaphoreticum, oculi cancr. Sangu. hirci, cervi, terr. Japon. mandibul. lucii, flor. papav. errat. & omnia absorbentia, Diaphoretica blandiora cum absorbentibus maritata optimè propinentur. Volatilia quoque maximè profunt, quia sanguinem congruatum ritè dissolvunt, inter quæ *Spir. sal. armoniaci aromat.* aliis præferimus, omnia enim alcalia sanguini stagnanti & quiescenti motum restitunt, ut sic melius fluidior nempe redditus à venulis resorberi queat. Imprimis hic conducet *Mixtura Sylvii* contra hæmorrhagiam sanguinis sæpe præscripta, sine tamen aceto parata cochleatim exhibenda. Vel sequens in juniorum tyronum gratiam præscribi potest formula:

*Bz. Aqu. flor. sambucc.*

*chæresol. 2a. 3j.*

*menth. 3ß.*

*Spir. sal. armon. anthosol. 3ß.*

*matrical. 3ß.*

*ocul. cancr. pps. 3j.*

*Syr. papav. err. 3vi.*

*M.*

Vel in forma Pulveris:

*Bz. Antimon. Diaphoret. 3ß.*

*ocul. cancr. pps. 3j.*

*lapid. scissil. Irland. 3ij.*

*Sal. volat. succin. gr. vj.*

*M. f. pulvis.* cuspidatim exhiben-

bendus.

Vel ꝑ. *Fac. rad. bryon.* Ꝟß.  
*ocul. cancr. ppf.* Ꝟj.  
*terra lapon.* Ꝟß.  
*Sal. volat. C. C. gr. iv.*  
*M. f. pulv.*

Externè conveniunt ea omnia , quæ in Capite de Inflammatione retulimus , sanguini grumoso ac coagulato stagnanti dissolvendo eisdemque discutiendo appropriata , ut sunt spir. vin. camph. crocat. cum spir. sal. armoniaci , cum calc. viva parat. mixt. & parti sugillatæ tepidè cum linteis duplicatis imposita . Huc pertinent varia Cataplasmata ex rad. Bryoniæ & herbis aromaticis concinnata , & calide imposita , nec negligantur suffumigia , quæ & sæpe graviore sugillationes citissimè resolvunt . In contusione partium nervearum , & simul exorta Ecchymosi conducet Bals. Peruvian. in vitell. ovi & spir. vin. Camph. Matrical. dissolutus . Leviori in suffusione sufficit sæpe Emplastrum contra Livorem faciei *Myrsichti* , vel sequens Paræi :

ꝑ. *Syrac. calam.*  
*Ladan.*  
*Benzoe aa.* Ꝟvj.  
*Massich.*  
*rad. irid. flor.*  
*Bacc. lauri*  
*Cinamom.*  
*Caryophyll.*  
*Calam. arom. aa.* Ꝟiß.  
*Ign. aloes*  
*Fl. Chamomill.*  
*Lavendul.*  
*N. M. aa.* Ꝟß.  
*Mosch.* Ꝟj.  
*Cera novæ* Ꝟvj.  
*Resin.* Ꝟij.  
*Ol. rosar. q. s.*

*M. f. l. a. Emplastrum.*

quod valdè resolvit , ac fluidiora omnia reddit .

Sic etiam quandoque sola bryonia rasa parti affectæ seu sugillatæ imposita sufficit . Sequens verò merarò defellit , quoniam partes acidas congruatas maximè dissolvit attenuatque , acidumque temperat :

ꝑ. *Myrrh. ol.*  
*aloes Epat. aa.* Ꝟij.  
*Aqu. Regin. Hungar.*  
*Elix. vitæ Matb. aa.* Ꝟj.  
*Spir. Matrical.* Ꝟxx.  
*Camphor.* Ꝟij.  
*Sal. saturni* Ꝟß.

solve Myrrh. & aloen cum spir. matricali , & misce in vase clauso , & adde ultimum Elixir vitæ & Camphoram , & cum spongia applicetur , sæpius calidè , vel cum linteis quadruplicatis apponatur . Cum autem hujus Spiritus Matricalis sæpius mentionem injecimus , ejus descriptionem hic dabimus .

ꝑ. *Massichis*  
*Myrrhæ*  
*Oliban.*  
*Succini aa.* Ꝟij.  
*Spir. vin. rectif.* Ꝟij.

F. Infusio.

dein destilletur , & dein cohobetur Spiritus , qui insigniendus nomine *Matricalis* , qui solus calidè applicatus Ecchymosin tollit .

In Contusione semen cumini cum Caryophyllis & rad. Sigill. Mariæ applicatum egregie conducit , vel absynthium in vino tostum & applicatum adhibent Nostrates . Alii solo spiritu vini in quo Caryophyll. & N. M. fuerint infusa , ad illinendum vel applicandum utuntur . Omnia enim hic conferunt Salia aromatica vegetabilia , quoniam eorum spiritus , salia volatilia & olea operari , & externè apposita sanguinem resolvere debent , sequens ergo erit egregium .

ꝑ. *Elix. vitæ* Ꝟij.  
*Spir. sal. armon. caryophyll.* Ꝟß.  
*Matrical* Ꝟj.  
*Aqu. flor. sambuc.* Ꝟij.  
*Camphor.* Ꝟij.

M.

quod remedium omnibus contusionibus & sugillationibus applicari potest . Sequens nuper in oculi contusione & inde nata Ecchymosi oculo instillatum juvit .

ꝑ. *Spir. armoniaci volat.* Ꝟß.  
*matrical.* Ꝟiß.  
*Sal. saturni gr. iv.*

Cam-

*Camphor.* ℞.*Croci opt.* gr. xv.*Aqu. fœniculi**euphras.* aa. ʒj.

M.

In quacunq̃ue sugillatione sequens  
proderit Cataplasma.*℞. Radic. figill. M.**ireos fl.**Sem. cumin.**fœnicul.**herb. Salv.* aa. ʒβ.*caryophyll.**Macis* aa. ʒiij.Coq. in Vin. Gall. & add. Panis  
biscoct. q. s. ut fiat Cataplasma, quod  
calidè parti imponatur sugillatz.Si Sugillatio fuerit ex contusione  
fortiori, ex qua sit sanguinis è vas-  
sis suis effusio, debet discuti & con-  
sumi per Sacculos discutientes ex ab-  
synthio, malva, ruta, semperviv.  
fl. Chamom. sambuc. sal. tart. sal.  
armoniaci &c. paratos.In magnis sæpè contusionibus &  
plagis metuenda est gangræna, vel  
exulceratio, vel inflammatio, vel  
abscessus, in quem finem ad  
hæc Symptomata impedienda nul-  
lum præstantius offendi remedium,  
quam sequens, nunquam me nec  
in desperatis ferè casibus deferens,  
quod junioribus Medicis commu-  
nicare libet.*℞. Summ. Absynth. M. j.**Scordii**Marrub.**abrotan.* aa. M. β.*fl. Chamom.**melilot.**sambuc.* aa. P. ij.Concis. coq. ex decocto earumdem  
herbarum, ut consistent. Cataplasma  
acquirat, add.*Farin. Hordei**lini* q. l.

Dein add.

*Sal. armoniaci deparat.* ʒβ.*Spir. vin. Camphor.* ʒij.Cataplasma hoc tepide applicetur,  
& effectus mirandos in Inflammationibus malignis, Punctura ner-  
vorum, Gangræna & Sugillatione  
percipies.

Sunt ægri, qui sæpè Emplastra

Tomus II.

exoptant, inter quæ aliis palmam  
præcipiunt Empl. nostrum Cinna-  
barinum, de Labdano, de Cumi-  
no, de Spermate Ceti, de Bryo-  
nia, Diachyl. scilicet & plura alia  
alibi dicenda. Sæpè etiam sangui-  
nem evasatum Scarificatione facta  
eximunt, & cutem descædatam il-  
linunt oleo Talcii.

## CAPUT VI.

## De Erysipelate &amp; Herpete.

## §. I.

**S**anguinis, aliorumque machi-  
næ nostræ corporeæ succorum  
motum, consistentiam & stagna-  
tionem, seu è tubulis suis evasa-  
tionem plurium morborum esse  
causam, & exinde eam derivari  
& illustrari posse in confesso est.  
Causa enim morborum ut plurimum  
est motus sanguinis ac reliquorum  
succorum malè se habens, ut hic  
vel instar omnium sit, & faciem in  
Pathologia præbeat radices lustran-  
di & symptomatum fontes. Nec  
minùs morbos excitat Motus San-  
guinis ac Succorum Littoralis, quo  
alluitur ad littus Microcosmicum,  
Cutem nempe, ex canaliculis plu-  
rimis & variis mirè contextam,  
ejusque glandulas minutissimas mi-  
liares distas. Non rarò huc sordes,  
quisquilias, & peregrina acida,  
aëria, Sulphura Phlegmata suis un-  
dis vecta expumat, frequenter estum  
particularem huic illive affricat.  
Exemplo sit *Erysipelas* & *Herpes*,  
motui huic viciato debita, sive ab  
intrinseco ardore & pustulis ad exte-  
riorem vestem efflorescat instar rosæ,  
sive Solis calore incalescat pars, ut  
canaliculus ruptis humor insideat  
magis, & alcali cum acido humo-  
ri insitum effervesceat. De hisce  
dum agere impresentiarum animus  
est, nulli dubitamus, quin hi effectus  
ferè in omnibus conveniant cum la-  
flam-

*Erysipe-**las.**Herpet.*

Inflammatione jam superius tractata, etenim gradu tantum differant, & non inconcinne Erysipelas, ut species Inflammationis minor consideratur, eadem enim observantur phænomena, & effectus à similibus præterpropter causis derivandi; Herpesque dici potest Inflammatio leviter exulcerata; quare tantum in eo differt, quod humor seu succus magis acris, & non multo phlegmate refertus in minutissimis tubulis & canaliculis evasetur stagnetque. Ast cum Auctores hanc jam triverint viam, eandem in juniorum Medicorum gratiam etiamnum sequi volumus.

*Erysipelas quid?*

*Erysipelas* ergo dicitur, & ignis facer, propter acriorem calorem, qualem ægri in ambustis sentiunt, hinc aliis dicitur ignis Silvestris, quasi effertus ob fervoris ferociam. Græcis affectus hic appellatur *φλυκίς*, ardor, Germanicè die Rose, das Rothlauff das heilig oder Sancti Antonii feber nonnullis die Schone. Latinis etiam dicitur ignis Persicus ferus: sed ad quem finem Veteres uni rei claræ tot imposuerint nomina, rationem non video. *Erysipelas* ergo est vocabulum Græcum, & originem suam debet nomini *ἔρυσιπλος*, tubor, à quo *ἔρυσιπλος* tubor, & verbo *ἔρυσσι*, vel *ἔρυσσιν*, propinquo, ut ita denominationes hæc à Veteribus partim à colore, partim ab ardore desumptæ videantur. *Erysipelas* est tumor seu rubor cutis aliarumque partium, à succis sale acris, & pungentibus saturatis, in aliqua parte ut plurimum subcutanea decumbentibus, cum macula rubra lata dispersa, & aliquando pustulis cum dolore exortus. Descriptionem hanc quod attinet, licet non plane conformis sit præceptis Logicis, hoc nobis satis erit, *Erysipelas* ad Medicam clarè ac verè delineasse artem, hinc à nobis brevissimè describi solet, quod *Erysipelas* sit Inflammatio vasorum lymphaticorum capillarum

in cute cum febre.

*Herpes* seu *Herpeton*, Latine quibusdam etiam *Serpigo* dicitur, item ulcus serpiginosum, seu pustulæ serpiginosæ. Duplex vulgò statuitur, *Miliaris*, & *Eftbiomenor*, seu exedens. *Herpes* igitur describi potest, quod sit Inflammatio exulcerata à sale acris & rodente, paucoque phlegmate soluto, in superficie partis alicuius sæpius cum pustulis, & erosione cutis, producta. *Miliaris* ille dicitur, qui summam exasperat cutem, & sub epidermide consistit, exiguas illic pustulas producens, quæ minimùm exstant aut prominent, millio semini haud ab similes. Exedens seu ferus *Herpes*, rupis pustulis veram exulcerat cutem & profundius hæret, serpitque in latum, & altum sensim, multoque tempore emergit, pustulas monstrat aridas. Affectus diuturnus est, & febris ut plurimum expers. Siccus ille est, ubi nullum adest serum, humidus verò vulgò dicitur, qui sero iroratur multo. Sordidus verò *Herpes* dicitur, ex quo manat ferofitas quædam graveolens.

§. 2. Subiectum principale affectuum horum sunt partes membranosæ & cutaneæ, & quoniam cutis ex innumeris canaliculis diversos vehentibus succos, componitur, facillè hisce affectibus obnoxia est, imprimis verò vascula lymphatica cutis superficiem perreptantia patiuntur, & læse percipiuntur, ex eo, quod *Erysipelas*, & *Herpes* in cutis superficie nascuntur; quod enim in *Erysipellate* vascula lymphatica capillaria obstruantur, & non sanguifera, ex eo patet, quod in *Erysipellate* rarò pus appareat. Lympha ergo quoad particulas suas rigidiores acresque peccat, quæ hic cumulatæ, & sui juris factæ atque separatæ, affectum hunc producunt. Si ex phlegmate acris interdum glandulæ minutissimæ, quibus cutis maxima ex parte contextitur, ob-

*Part affecta.*

obstruantur, & succus stagnans & evasatus mediante acido & alcali incalcescat, nonnihil elevantur glandulæ & tubercula minima seu pustulas cum rubore partis efficiant, quæ etiam ob modò dictam effervescentiam inter alcali & acidum multum pruriunt, unde Herpes oritur.

*Differen-  
tia.*

Paucis attingamus affectum horum differentias. Differt Erysipelas ab Inflammatione, quoniam in hac calor ardens est minor, quàm in Erysipellate; differunt & dolore, in Inflammatione siquidem dolor est comprimens & pulsans, in Erysipellate verò dolor est instar acicularum pungens. Sic etiam colore differunt, si premitur digito cutis Inflammatione obfusa, tunc permanet rubra, in Erysipelate verò albescit, & dein iterum rubescit. Tumor in phlegmone non ita à premando cedit, quod tamen in Erysipelate observatur. Sic etiam tensio major est in Inflammatione, quàm in Erysipelate. Plegmone in eodem quoque manet loco sine mutatione, sed Erysipelas faciliè serpit de loco in locum, & est instar ignis fatui modò in hac, modò in alia parte. Humor quoque Erysipelas produciens tenuior est, quàm Inflammationis.

*Diagno-  
sis.*

§. 3. *Diagnosis* nunc affectuum nostrorum consideranda venit: incipit Erysipelas cum horripilatione, quæ nulla alia ratione produci potest, quàm ex nimia & continua agitatione particularum rigidarum, ex quibus acidum & alcali constituitur, hinc existimamus, rigidas particulas illabentes panniculo carnosò, eum titillare ac vibrare, unde horripilatio animadvertitur. Sic & sæpè adest capitis dolor ab eadem productus causa, nervosæ capitis fibræ vibrante. Calor etiam intensior adest & volatilior, propter majorem istius succi obstruentis tenuitatem, particulæ enim alcalicæ & acidæ subtilis materiæ ope magis ad invicem colliduntur,

hinc calor augetur. Adest quoque dolor instar æquum vel acicularum pungens, & quoniam particulæ flexiles, ut oleosæ & ramosæ ineptæ sunt ad dolorem hunc producendum, necessum est, ut particulæ rigidæ continuo fibras nervosæ vibrent, unde talis percipitur dolor, qui propter minorem tensionem tolerabilior existit.

Color rubicundior hoc in affectu apparet ex eo, quod sanguis præterfluens hic non tam diu stagnat, quàm in Inflammatione, sed cuticulæ magis appropinquant, hinc fibræ eodem liquore majori copia irrorantur, sed in Inflammatione profundius latet humor, adeò ut color nimis saturus sit, quàm hic, & quoniam digitorum pressione succi isti stagnantes faciliè ex fibris premuntur, & hæc exsuccæ redduntur, color ruber potest meliori jure adscribi texturæ tubulorum mutata, unde radii luminæ aliter reflectuntur: color albus sub digitis apparet, sed remotis digitis, succis eundem locum petentibus, rubor denuò apparet, ut antè; exinde etiam constat succos stagnantes minorem obtinere fluiditatem.

Tumor in Erysipelate non tam altè elevatur, idque ob minorem humorum coactionem & stagnationem, dein ob majorem fluiditatem facilius humor vasa perfluit, huic tumor non adeò elevatur, nec tam rubicundus & calidus, uti in phlegmone apparet, hinc & ob humores istos magis & facilius transeuntes sanguinique cedentes minor est tensio, quàm in Inflammatione, in qua humor obstipans solidior ac crassior est, & sanguini minis cedit. Certum ergò est, quòd in Erysipelate tumor non adeò effelatus, uti in Inflammatione, sed calor intensior, dolor item acicularum instar pungens, & multum tolerabilior est. Color rubicundior est, & deservescente humore

ad flavedinem magis vergit. Loco sepe mutatur & vaga est, nec tensio adeo difficilis, cedit quoque prementibus digitis, & color rubens in album mutatur, qui tamen, ceu jam diximus, illico rubescit. Febris quoque aliquando adest, & comitatur Erysipelas, ob turbatam sanguinis mixturam, & secessionem particularum.

*Herpes* ferè cum omnibus hisce explicatis symptomatis convenit, & in eo differt, quòd Erysipelatis tumori accedant pustulæ, & à rigidis particulis cutis glandulæ miliaris corrodamur, hincque parte agra vesiculæ ac bullæ producuntur, ex quibus liquor falsus, & acris corrosivus parumque tenax emanat, quod Batavi belroos dicunt. In hoc affectu ergo adsunt tumor latus & partem exasperans, durities, dolor, sensus ustionis, progressus quasi in orbem, medio, dum extrema procedunt, sanescente. Hinc affectus hic merito jure Erysipelas exulceratum vocari potest.

*Galenico-rum causa Erysipelatis.* *J. 4. Aetiologiam* instituturi, præmittimus aliorum judicia nostro, & quidem agnui ducunt *Galenici*, quorum de causis Erysipelatis hæc est opinio, quod originem sumat ex sanguine fervente ac tenui, ex sanguine sc. ac bile, quum enim sanguis superat, inflammationem Erysipelatosam: quum flava bilis, Erysipelas inflammatum appellant. In communi verò, tumorem ex sanguine ac bile calidioribus factis productum Erysipelas nominant. Sunt qui causam bilem alimentalem dicunt non excrementitiam, (quæ istorum absque febre genetur,) à calidis visceribus, motu, tempore æstuoso, cibo, potu calido, &c. generatum.

*Herpetis.*

*Herpetis* causam dicunt flavam bilem citra alterius humoris admixtionem secretam, in parte aliqua consistentem, & siquidem bilis crassior fuerit compage, magisque acris, totam cutem usque ad subjectam carnem exulcerat, &

hinc ab ipsis vocatur *Herpes* exedens. Si verò tenuis, & minus acris ac calida, bullas parvas in summa cute excitat milio similes, & miliaris *Herpes* ex similitudine dicitur; verum ex *Oribasii* sententia, pituitæ cum flava bile mixtio miliarem *Hetpetem* facit. Causam *Hetpetis* remotam, & externam dicunt omnem, quæ bilem producere valet, ut aer calidus, cibus & potus calidus, &c. interna verò sunt dispositiones viscerum calidæ, conjuncta autem est bilis sincera & atdentissima, quæ ob tenuitatem partes carnosas transfit, & cuti tanquam subjecto densiori adhæret, illamque corrodit. Quamvis tam *Herpes*, quam Erysipelas, à bile fiant, in hoc tamen differre ajunt, quòd hoc fiat à bile alimenticia, ille verò à bile præternaturali, quæ dum magis feta & acris est, magis depascitur & vocatur *Herpes* exedens, & *nonnulla* ulcera faciens: in hoc etiam differunt *Herpes*, & Erysipelas, quòd ille sensum, hoc verò de repente invadat: quòd ille sit cum pruriginæ: hoc cum dolore.

*J. 5. Paracelso* Erysipelas est consumtum sal vitriolatum, hoc primum in rubedinem, & corrosivum, postmodum in ulcerationem transit; locum ejus esse ut plurimum inter genua & calces circumcirca crus: ibidem esse morbum Mercurialem dicit, & quamvis vitriolatum sal morbum efficiat, est tamen ipsa minera Mercurialis tantum, à qua proprium recessit balsamum, & liquor salis, ejusque species pro quantitate recessus demonstrantur.

Perficium verò ignem esse sulphureum corpus accensum, quod ex suo transformatum est iliado, cum omnibus speciebus sulphuris, & est calx viva sicca, & calx viva liquida, quæ suam accensionem à liquido sale recipit, postmodum utit, consumitque membrum penitus, uti calx cadaver aliquod.

*Paracelsi opinio de causa Erysipelatis.*



*Herpetis;*

*Herpetem* vero Mordacem vel Esthiomenam, vulgò lupum, oriri ex sale Mercuriali tantum contendit Author, ejusque centrum figi, ubi defectus major fuerit: & quamvis adscribatur hepatis, vel per ejus curam procedatur, morbus tamen eam per se recusat ait. Fixum quoque esse, & in circumferentia centrum suum coagulare intrinsecus ad os fodiens, urere callososque nodos tandem procreare usque ad mortem, arguit.

*Helmontii  
opinio de  
causa Ery-  
sipelatis.*

§. 6. *Erysipelas Helmontio* etiam vocatur Apostema igneum, unde Author hic de ipsius causa ratiocinans supponit fingitque. Archeum aliquam in parte ultimæ digestionis famulante conceptum doloris stigma iniquè ferentem, ac velut furore percitum Erysipelas fuscitare. Unde in Erysipelate venenum aliquod ideale ab Archeo natum esse contendit. Frigus quoque insolitum modicum, non tamen rigorem in initio Erysipelatis obvenire ait, quia acor halituosus adhuc modicus est: qui dum ad corporis superficiem per tigerit, extra proprium sui diversorium ibidem acescit atque putrescit. Hinc saponariam & lixiviale medelam extinguere Erysipelas arguit, eo quod in lixivialibus omne acidum commoritur. Febres enim continuas ab intus de-  
tenta aciditate similiter primum rigere, & in finem sive consumptionem usque postmodum zestuare comprobant. Aciditatem ergò vaporealem pervadentem in Erysipelate corporis penitissima acidum esse humorem nullus dubitat, imprimis hoc demonstrat exemplo, quod saponariis aliisque lixivialibus acidum domantibus miscet remediis. Gustu etiam comprobant, liquorem illum ex Erysipelate emanantem non esse amarum seu bilem, uti Veteres existimant, sed acido-salsum; hinc Erysipelas produci ait à spiritu vitali alcalisato. Causa Erysipelatis occasionalis est sal quoddam acidum, si hoc copiosius abundat,

Tymus II.

Archeum in tantum lacescere potest, ut is partem aliquando gangrænet, vel etiam fieri potest salium corrosivorum incensio in particulari membro, ubi affluente latice & cruore pars intumescit, & Archeus partis rebellis existit.

*Herpetis,*

In *Herpete* seu igne Persico sal causticum de forte alcalium pro causa allegat *Helmontius*, rejicitque Galenicorum causam, quam de amaris & bile fingunt, quapropter effectus maximè ignei in corporibus existunt. Ridet frustaneum bilis commentum, cum præsertim, qui ignis indolem imitantur, minimè sint humoris biliosi clientes.

§. 7. Juxta *Villisium* exoritur *Erysipelas* à sulphure extra temperiem ordinariam everso, cujus particulæ quædam cum aliis principiis congenere non existentes, & cum ipsis fororiari non valentes, à mixtione solvuntur, effervatque evadunt, & sanguinem exagitant, ac conturbant. Dominium itaque obtinentibus sulphureis particulis, laxataque cruoris compage, spiritus avolant, augeturque liquoris sanguinei fervor atque exandescencia, sulphure à spiritibus nullo modo amplius temperato. Circulante itaque sanguine, furibundæ illæ sulphureæ particulæ sibi invicem impingentes simul coeunt, & uniuntur, majorisque hac ratione vires acquirunt, & sanguinis incendium intendunt, sed quàm ad angustiores quosdam tubulos pervenerint, quos ob crassitiem percurrere non possunt, in iis commorantur & aggeruntur, adusti nisque sensum excitant, & adaucta indefinenter earum aggerie, ad superficiem usque propelluntur, cutemque discedunt, & in tumorem elevant. At quàm eodem impetu semper agitentur, nisi citò compescatur ipsarum conflatio, repagula à quibus cohibentur, effringunt & disperdunt, partesque, in quibus continen-

*Villisi  
ratiocinia  
de causa  
Erysipelatis.*

G 3 tur.

tur, exurunt.

*Herpes.*

*Herpes* ex *Willisi* sententia producit, quando scilicet sal in sanguine luxuriat, vel summo jure potitur, quum siquidem sal uberius ab alimentis massæ sanguineæ suppeditatur, vel ob pravam digestionem titè non exaltatus, crudiorque remanet, aut dissipatis depressisque spiritibus ab aliis dissoluitur, fluoremque assequitur. Salinæ itaque particule cæterorum principiorum jugo solutæ vnâ confluunt, & per totam massæ sanguineæ compagem sese explicant, atque ob eam, qua gaudent, similitudinem, unâ coeunt & conjunguntur, cruorique acido-salfani diathesin communicant. Sanguis enim universas corporis partes pervagans, ad superficiem advectus, salinas illas, quibus infestatur, particulas humore lymphico dissolutas in glandulis cutaneis, in quibus omnia recrementa sua deponere assolet, relinquit; Porè verò minimarum istarum glandularum acutiores existentes, quamvis lymphæ huic à salibus copiosioribus viscidiori factæ exitum præbeant, eam in sinu suo retinent, illaque plus nimio saturati obstruunt. Salia autem ista ob varias, quas inter se fecerunt, concretascentias, & plurimas terrestres particulas, quas secum abriperunt, majorem acquirunt molem, glandularumque substantiam, in quibus cæspitant, in tumorem extollunt. At salium spicula utut ab admixta terra obtusa, per potos cutis, cujus fibrillas vellicant & dilacerant, foras prominent, & pro intensiori remissiorive acridinis gradu dolorem aut pruritus excitant, & cutem exesam in squamulas discindunt.

§. 8. Erysipelas *Sylvius* cum *Galenicis* à bile pura deducit, ubi scilicet bilis sine sanguine in partem aliquam effunditur aut crumpit; illamque acrimonia sua vexat & malè afficit, ac ex conflictu dolorem excitat in parte sensu

prædita, ubi enim sensus major non est, ut in parte carnosa, juxta *Ipsam* corrumpitur & mortificatur ea nonnunquam sine ullo sensu. Ortum quoque *Ipsi* videtur Erysipelas ab humore bilioso & lymphatico vel pancreatico acribus, & vitiosè in corde simul effervescentibus, febriisque producentibus, acutiusque inter se, ideoque laxidis sanguini junctis, atque cum ipso tamen quaquaversum propulsis, & facilè in corporis superficie, ut & alibi forsan hærentibus, ibique tumorem levem, ardorem autem ac dolorem magnum *Erysipelatis* nomine notum excitantibus. Si tumor hic amplius ibi corruptus, ab externo frigore imprudenter admissio repellatur ad interiora, & sanguini admisceatur, vel non satis medicamentorum externorum ope via ipsi sternatur ad exitum, nec internorum opera propellatur idem foras, juxta *Ipsam* gravior producit febri cum delirio, & sæpè mors sequitur ipsa. Humorem enim hunc, & de bile maximè participantem, ad corporis superficiem propulsus, magis à temperie sua degenerantem & acriorem factum, non sine summa sanguinis noxa eidem admisceri, unde mox ardentiore produci febrem, & effervescentiam nocentem in corde ante omnia cerebro, animalibusque functionibus adversam, quas mox ita turbat ac confundit, ut sensus externi vacillent, interni delirant, animique motus turbentur æquè ac motus corporis animalis. Bilem acriorem sanguini affusam delirium excitare in febre tam intermittente, quàm continua, asserit *Author*. Hinc in Erysipelate retroactò post turbatam mentem mortem in senè jam delirante, & medicamentis præposterè utente *Noster* se scribit observasse.

In *Herpete* verò bilem acriorem ad corporis superficiem, cutem scilicet delatam accusat *Sylvius*, quæ ibidem existens bilis cuticulam corrodit, vesiculasque producit.

*Herpes.*

Intra Syl-  
vium cau-  
sa Erysip-  
elatis.

*Cartesiani  
norum  
ta-  
tiocinium  
de causa  
Erysipelatis,*

§. 9. *Cartesiani* à serosiori succi chylosi liquore in cute molliori subsistente, & coagulato, tumorem illum superficiale produci referunt, quem *Erysipellar* vocant, partesque hujus liquoris acutiores subriles, sive salinas à materia ætherea celerrimè agitata, fibras cutaneas & nervosas tenuiores vellicando dolorem aliquantum urentem excitare & ruborem. Retineri verò particulas istas sub cute arguunt ob pororum ejus occlusionem & tubulorum obstructionem à liquore incrassato, quam incrassationem interdum ab externo frigore induci norunt, ob quod in ductibus lymphaticis liquor iste in motu sive fluore suo impediatur, sed quia ob subtilitatem à calore superveniente liquor hic facilius resolvi queat, quam chylus crassior, eapropter etiam contingere affirmant, ut Erysipelas ad loca vicina migret, fluit enim aliquantum lymphæ ista à priori coagulatione resoluta ad tubulos proximios, sed cum volatilibus salibus sit destituta, in pristinam coagulationem facile relabitur, & in tubulis istis, ut in prioribus, stagnat. A vini acidioris potu largiori & ira affectum hunc suscitari norunt, quod lymphæ à priori non modò in copia augeatur, sed multis etiam particulis acutis, & cuspidatis repleatur, quarum mucrones in fibris cutaneis & nervosis faciliè hæreant, & poros obstruendo insensibilem transpirationem impendant, unde lymphæ diutius hæreat, & quietem acquirit, qua sola coagulatio ista producat. Ob exardescentiam & iram succos omnes & maximè lympham turbare, particulas angulares à reliquis segregari, & majori copia ad partem aliquam unà cum lymphæ transmitti dicunt, quandoquidem ob vindictam liquor nervosus impetuosius ad membra externa, seu executionis organa, influens, lympham in vicinis tubulis simul propellat. Arteriola à

lymphæ hac in tubulis cutaneis stagnante compressæ sanguinem in exterioribus suis ramulis diutius detinere æstimantur, cujus rubor per cuticulam transpareat. Interdum una in parte tumorem hunc abire, & in alia etiam remotiori de novo exfurgere propterea existimant, quod lymphæ ista resoluta in massam sanguineam refluxerit, at nondum ab acutis istis particulis falsis liberata, circuitu sanguineo in aliam partem effusa, eandem obstructionem & fibrillarum excitet agitationem. Pulsum in tumore non abesse existimant, quod minores tantummodò arteriarum ramuli, non verò majores eorum trunci comprimantur. Tubulos etiam quandoque ab acutioribus particulis nimium agitata erodi, aut à succis impetuosius irruentibus dirumpi credunt, unde pustulæ excitentur. Quando verò contingat, ut succi quidam lutosi viscidum ex chylo crassiore subsequantur & tubulos quosdam sub cute obstruant, Erysipelati simul oedemæ quoddam adjungitur.

A succo quoddam multis particulis angularibus imbuto, sive acido glandulas cutaneas obstruente, eademque in tubercula quædam distendente *Herpetem* oriri volunt, quandoquidem lymphæ acidior & crassior in glandulis stagnans easdem in granula quædam duriuscula disponat, unde *Herpes miliaris* vocetur, sed à materia subtili interdum commota fibras vellicet, & pruritus provocet, ad quem sedandum si homines cutem scalpant, cuticulam abradi referunt, canalesque ita apertos assiduò liquorem quendam roris instat effundere, qui particulis acutis erodentibus præditus vicinas fibrulas cutaneas exeat, sicque ultra serpat, donec tubercula invicem proximè jungantur, & cutis valde destruat, & in formam crustaceam mutetur, cum amissis particulis lubrica anguilla,

*Herpetis.*

ribus volatilibus liquor remanens per quam inkrassetur, & tandem ratione particularum erodentium partes subjacentes musculosas non minus destruat & exedat, ut profundando quodque effodiantur foramina.

*Nostri sententia de causa Erysipelatis.* §. 10. Glandularum miliarium seu subcutaneorum pensum est tantum à sanguine separandi ac secer-  
nendi salia à tenuiorum alcalico-  
rum cum subtilioribus acidis coa-  
lita genita, & in phlegmatis dis-  
soluta quibusdamque sulphuribus  
associata, quando verò in sangui-  
ne existunt abundantiora acida, eo-  
rumque spicula æquo sunt longio-  
ra & rigidiora, copiosiora iis im-  
prægnantur alcalica, & salia quæ  
ex mutuo eorum connubio emer-  
gunt, propter longiores, quibus  
gaudent, aculeos ad motum sunt  
ineptiores, & ob eosdem duriores  
& rigidiores acriora & mordacio-  
ra fiunt. Quædam ex sulphuri-  
bus, quæ cum salibus per poros  
amandari debebant, ab acidis co-  
piosioribus coagulantur, & in  
glandularum angustiores tubulos  
impulsa, in iis remanent, eaque  
obturant, ac sanguinem reliquos-  
que succos in circulo suo retar-  
dant; salia jam dicta ad eandem  
glandulas pervenientia, & in ea-  
rum tubulos sese insinuantia ob  
spicularum, quibus horrent, lon-  
gitudinem, illos præterfluere neque-  
unt, & in ipsis cespitare cogun-  
tur, sed quum in continuo motu  
versentur, tum à materia æthe-  
rea, tum à spiritibus animalibus,  
tum à subtilioribus sanguinis in  
vicinia circulantibus partibus, alio-  
rumque succorum communicato,  
& serie perpetua ab aliis à tergo  
subsequentibus compellantur, &  
altius adigantur, aculeos suos pa-  
rietum tubulorum poris insigunt,  
fibrillas illorum dividunt & di-  
scindunt, viamque sibi sternunt  
ad cuticulam usque, quæ cum den-  
sioris robustiorisque sit textura, il-  
lorum acutiei resistit, ipsaque sub se  
reprimat. At cum indefinens sit  
salium istius modi à sanguine se-  
cretio, & in glandularum tubulos

amandantur, per quos ad cuticu-  
lam accedunt, priorum ibi com-  
morantium copiam adaugent, cu-  
ticulam distendunt, eamque in  
vesiculas aliquando elewant, dis-  
tente cuticulæ pori arctiores fiunt,  
difficiliorque eo patet salinis parti-  
culis exitus, paucioresque hac de  
causa exhalantur. Sub cuticula er-  
go coercitæ, & perpetuo motu  
agitatz spiculis suis cutis ac cu-  
ticulæ fibrillas violentius impe-  
tunt, ac spasmodicos motus illis  
inferunt, unde dolor, qui in  
Erysipellate percipitur, & exulce-  
ratio, quæ sublata cuticula inter-  
dum apparet. Certum ergo est,  
quod vascula tenuia lymphatica  
cutis affecta seu rupta sint in  
Erysipellate, in qua non ad-  
est tantus tumor, quia lym-  
pha sat tenuis est, hinc fluidi-  
or pars facilius per vasa late-  
ralia delabitur, hinc non tan-  
ta congestio, neque pus ge-  
nerari potest, quia non plu-  
res chylosæ particule admixtæ  
sunt humori evasato; ratio est,  
quod humor iste in minimis  
istis tubulis pauciores tenaces  
particulas chyli in se conti-  
neat, nec tubuli chyli ferri ma-  
jores rupti sint, sed tantum  
minutissimi. Atque hac ratio-  
ne lymphæ hæc affecta facile à  
causa quadam superveniente re-  
solvî potest, sicque perit hac  
in parte Erysipelas, verum ubi  
hæc materia soluta pervenit ad  
sanguinem, febrem, h. e. le-  
vem secessionem particularum  
sanguinis excitat. Et cum tu-  
buli cutis non sint ejusdem ma-  
gnitudinis, iquippe in facie sunt  
minoris Diametri, si illic alluit,  
facile pedem figit, sicque repro-  
ducitur (Erysipelas, sentitur pru-  
ritus, quia in hoc lymphæ in-  
flammans quadam superest fluidi-  
tas, hinc partes salinæ à se in-  
vicem dissociatz sunt, & quasi quæ-  
libet particula salina seorsim ab  
æthere agitur, sed collectis vi-  
ribus uno impetu non possunt ruere  
in fibrillas nerveas easque dilaniare,

In Erysipelate ergò , ceu dictum est , afficiuntur exigua cutis vascula lymphatica , continentia lympham prægnantem non minus cujuscumque generis acutis particulis , sed non adeò ramolis viscosis chyli obvolutis , sicuti in majoribus cutis inferioris , carnis , &c. tubulis in Inflammatione contingit , prout eorum tubulorum textura magis vel minus compacta dilatari nescit , & Diameter exigua est , facileque oboriitur Erysipelas ab externa causa , ut frigore , incarcerata lymphæ , vel ab interna aliquatenus tantummodo turbata sanguinis mixtura , quod in quibusdam fœminis instante menstruatione , ( imprimis si salsarum vel acidarum particularum ad reliquas sanguinem & humores constituentes proportio non fuerit debita , ) manifestissimum . Intumescencia & resistentia in Erysipelate minores sunt , quàm in Inflammatione ( ratione molis & in hærentis utriusque habitæ , ) cum ibidem & tubuli minores sint , & materia stagnans non adeò copiosè congeritur , & fluidior facilius per vasa lateralia delabitur , nec tantam ( licet promptius ) suscipit fermentationem , hinc est , quòd acutæ , acidæ , &c. ab æthere transfluente adactæ , singulæ seorsim ob intermixtum fluidum impingant quidem in fibrillas tubulorum , non autem tanta vi disnectantur , atque ad rupturam usque distendant ut in Inflammatione , hinc pruritus potius , quàm acutus doloris sensus percipitur , ardor autem major sentitur , tum quia morbosum cutis rete proximum est , tum quia ab ætheris celerissimo interfluxu materia hinc fluidior , promptius ejus agitationi obsecundans , nervulos magis afficit : adhæc color rubens , cum ejus causa non tam altè lateat , vividior apparet , dependens cum priori phænomeno ab eodem ætheris celeris transitu ; abit autem facileque reddit , eodem vel alio color vagabundus loco , in Inflammatione permanens , quoniam obstructio à

particulis aliquatenus adhuc fluidis & lubricis orta falsas rigidasque è poris educentibus , accedente majori earum ab æthere agitatione , ignisque è corde impulsu vi facile solvitur , quòd cum sit , materia ex obstructione in sanguine turbas excitando secessionem leviozem causatur , qua particulæ extra debitam unionis sphaeram ejectione , cum sanguine per universum corpus distributæ , eodem , si illuc propellantur , vel alio in loco hærent , cum textura vasorum cutis & epidermidis ubique serè sit consimilis , ac proin aquæ alibi , quàm ubi soluta est obstructio , reproducitur Erysipelas : exstillat autem , si erosi fuerint tubuli , ( ut aliquando fit in Erysipelate faciei nomine belle rose insignito , ) non pus , ut alibi eruptis tubulis chylosam sanguinis portionem continentibus , sed lymphæ acerrima subjectas partes exorians ; quando verò innumera adfunt & exigua pustulæ , videntur glandulæ miliares cutis vel obstructæ , vel modo erosæ , quæ si imprimis in infantibus à frigore ( uti in aliquibus sudantibus ab impedita transpiratione mox pustulæ oriuntur , ) obstruuntur & dein eroduntur tubuli , exstillat lymphæ vel ichor quidam tenuis instar rosis , quæ species Germanis Thau VVrm vocatur . Ex hisce prolixius deductis abundè constat , causam Erysipelatis Inflammatoriam quandam esse obstructionem . Cause remotæ Erysipelatis sunt vulnera , contusiones , exulcerationes , calor ignis , vel Solis , vel abusus frigidorum ciborum ac potulentorum , ex quibus faciliè causa interna oriri potest , nempe obstructio à lymphæ in tubulis minimis cutis incrassata , & stagnante .

Quòd si contingat , ut vascula cutanea erodantur , humor qui exsistit ratione acrimoniz suæ salinæ exedit partes circumjacentes , & si pustulæ inde excitentur , indicium est ipsas glandulas miliares simul

*Causa  
Herpetis.*

simul esse affectas, & tunc hic affectus in infantibus ut plurimum vocatur Herpes; in adultis verò inde oriuntur ulcuscula. Causa ergo immediata est secessio particularum serosarum & volatiliū oleosarum sanguinis, qualis enim illa intemperies est in sanguine & lymphā, talis etiam est in minutissimis his tubulis. Herpes miliaris oritur, si lymphā debito viscosior absorptis & fugatis ab aere aquosis, & tenacibus concrevit in squamulas, seu crustulas, dicitur Herpes sicca squamosa. Differunt autem à crustis squammæ, cum sint tenuiores, & in superficie exteriori siccata à cute dissiliant, quod in crustis non ita fieri solet. Sub crustis verò effusa lymphā fermentescens punctione particularum acutarum in fibrillas nervorum pruritus, imò ardorem cum leviore Erysipelate, & sæpè dolorem excitat, & pro majore aut minore acredine sanguinis, ac lymphæ, acrior vel secus alios vicinosque cutis tubulos erodens, (contribuente ætheris vicinos humores turbantis inordinato, ut in omni Inflammatione, transitu,) ipsosque capillorum exedens, ut fit in lue venerea, scabie, &c. dicitur merito Herpes exedens. A glandulis subcutaneis particulæ salinas è sanguine secerni vidimus, illudque ab ipsis produci comperimus, eò quod longioribus, rigidioribusque spiculis sint donatæ, ideoque ad exitum ineptiores existant, sed quum in phlegmate sint dissolutæ, vis illarum obtunditur, & cuticula ab earum acrimonia præservatur, à congeneribus salibus oriri Herpetem existimamus, illaque spiculis duris, rigidis, & acutis esse donata quis negabit? Equè ista, ac priora, cum hac tamen differentia, quòd posteriorum spicula priorum spiculis sint breviora. Acida siquidem, quæ hoc in ultimo affectu alcalica saturant, sunt delicatiora, & brevioribus pollent aculeis, quæ causa salia ex mutuo eorum coactu emergentia sunt minutiora, faciliusque glandulas subcutaneas

pervadunt, & ad cuticulam usque deferuntur. Sulphura pauciora à subtilioribus, tenuioribusque istis acidis coagulantur, rarioresque exsurgunt, & in minutissimis tantum tubulis obstructions, unde minor contingit sanguinis stagnatio, quum liber illi sit aditus in ampliores tubulos, à quibus refovetur. Phlegmata salia dissolventia, & unà cum ipsis à sanguine separata, vel illi remiscuntur, & cum eo denuò circulantur, vel à continuo motu à materia subtili, & spiritibus animalibus communicato attenuantur, comminuantur, ac per poros exhalantur. Salia itaque paucò fero dissoluta minuscule occupant spatium, leviorisque cutis elevationem inferunt, sed cum etiam à phlegmatis vis eorum non infringatur, nec illorum acumina ab ipsis obtundantur, & in irrequieto motu persistant, cutis, & cuticulæ circumpositarum fibras, in quas impingunt, durius, graviusque pungunt ac lancinant, unctionisque sensum inducunt, quum autem ab aliis perpetuò de novo advenientibus compellantur, & rectà in oppositam cuticulam protrudantur, poris suis spicula sua infigunt, à quibus foris prominentibus fit partis asperitas, ac continuata, & durante impulsione cuticulæ fibrillæ aculeis, quos poris suis exceperunt, minutim secantur, & in *furfura* abeunt.

§. II. Sequitur *Prognosis*, & quidem ratione salutis, & mortis; ubi asterisco notandum, quòd licet raro lethale sit Erysipelas, (quod tamen in perverso, & quidem repellentium, ac refrigerantium remedium usualiquoties lethale observavimus,) nihilominus cum altiores in imis viscerum medullis, imò & cutis glandulis miliaribus radices egerit, satis rebelles est, & furca fusque licet expulsum, tamen usque recurrere aptum natum est. Breviter sæpè hic affectus terminatur, ipsam verò radicem extirpare, ut nullum medietur reditum, hoc opus, hic labor est.

*Prognosis.*

Prin-



Principem enim Serenissimam novimus, quæ plus ultra 12. annorum spatium Erysipelas à quacunque tempestate vel excessu in diætâ recidivans patitur, nullis remediis, quamvis optimis adhibitis, cedens. Facile ergo, ceu dictum est, recidivat hoc malum, vel aliquando degenerat in ulcera. Curatio illius difficilior est, si ossium denudationi, aut fracturis supervenerit, si ab exterioribus ad interiora, ut vulgo dicitur, convertitur, si putrescit, aut suppuratur, quod verò rarissimè, vel nunquam observatur. Malum est si Erysipelas in facie ac capite oboritur, si in Hepate, utero, aliisque partibus internis erumpit. Modum evenius ad salutem dicimus ut plurimum fieri per insensibilem transpirationem, ubi accedente pruritu cuticula quasi in squamas fatiscet, colorque in ordinarium, & consuetum sensim mutabitur. Sin verò nullius curæ malum egro fuerit, facili negotio, inconsideratè applicatis ( ceu superius diximus, ) repellentibus, & refrigerantibus non alcalinis, unà cum aliis erroribus in cura commissis, in ulcera rebellia, & ipsam sæpe gangrenam, & mortem abit. Introrsum pulsus Erysipelas ipsi vitæ struit insidias, *iuxta 6. aphorif. 25. Hipp.* quod concernit Herpetis prognosin, ferè eadem est cum Erysipelatis prædictione. Simplicis, & humidi Herpetis curatio facilius obtinetur, quàm siccæ & feri. Ferus si vel sponte, vel repellentium ac refrigerantium medicamentorum ministerio promptius supprimatur, graves sæpe habet morbos subsequentes, Apoplexiam nempe phthisin, febrem, &c. Herpes in subjectis scorbuticis ac cachecticis, ubi succi sunt instar aquæ fortis acerrimi, obveniens, difficillimè curatur, & transit sæpe in ulcera diuturna.

*Diata.* §. 12. Perspecta prognosi, pervenimus ordine nostro constituto ad *Curam Diæticam*; cum verò Diætâ nostrorum affectuum nempe Erysipelatis & Herpetis ferè eadem

est, ac Inflammationis superius jam latius deductæ, non operæ pretium duximus plura præter generalia hic addere. Ab aeris ergo calore intensiore, succos nostros dulces ac volatiles per cutis poros avolare faciente, & à frigore eos coagulante, & acriores stagnando reddente sibi caveat ager Erysipelate, vel Herpete infectus, facile enim inde recrudescet malum, & sæpe non absque ægri periculo. Hinc lymphæ incrassatur, & in tubulis minutissimis, seu glandulis cutis miliaribus facile stagnat, unde frigore vago, & postmodum febri admodum periculosa tentantur ægri, sanitati suæ non ritè studentes. Aer ergò sit temperatus ad calidum vergens, vitæ summopere extremis utrisque. Calidior enim dilatando plus justo, & eliminando nimis, ad stagnationem disponere potest succos nostros, imprimis lympham corporis nostri. Quoad cibos, acidis non vescatur æger, nocent etiam omnia alimenta falsa, dulcia saccharata, pinguis, nimis calida, & nimis aromatizata. Potus calidus Theræ, vel Caffæ, vel lign. Guajaci, vel Sassafras, sarsaparill. &c. optimus est. Quies & somnus conducunt, quia succi machinæ nostræ hisce recreantur, ac attenuantur, ut sic fluidiores cunctos tubulos etiamque minimos perfuere valeant.

Motus intempestivus exulet, quia facile inde coagulatio succorum oritur, prout ex motu nimio palpitationem cordis, & arteriarum, à coagulatione succorum ortum habentem fieri toto die observamus.

Venus non sit immodica, Animi affectus coagulationum succorum auctores sanæ rationis moderentur freno. Cane ergo, & angue pejus vitetur ira, vel exandescencia quæcunque, obstetricans facillimè morbo.

Alvus, ut quotidie officium faciat, admonetur. Hæc omnia, & singula occasionalem causam & ansam ut præbere queant affectui recursuro, ita providè sunt observanda, adeoque si exesse hospitem hunc velic

velit, commendatissimum sibi habere Dietæ studium necessum erit.

§. 13. Curationem *Erysipelatidis* agredientes prius *Galenicorum* videamus. Statim *istis* ab initio ubi comparuerit *Erysipelas*, venam in cubito secant, maximè quidem humeralem: sin minus, eam, quæ invenitur: si verò ob aliquod impedimentum venam non secant, purgatione utendum esse ajunt, & bilem educens medicamentum & seq. vel simile præscribunt:

*Re. Rhei elect.*

*Cori. myrob. citrin. aa. ʒij.*

*fol. fenn. ʒiij.*

*mann. elect. ʒj.*

*His superaffunde*

*Aquæ cichor. bullientis ʒiv.*

*Stent per noctem: in colat. dissolv.*

*Syr. de cichor. quadrupl.*

*Rhabarb. ʒß.*

*Crem. tartar. ʒj.*

*Elect. de Tamarind. ʒj.*

M. s. potio: vel etiam clysteres fortiores applicent. Ipsam purgationem sæpius reiterant, ut verò sanguis detervescat, & bilis corrigatur, Julapia refrigerantia ex aqua endiviæ, nymphææ, lactucæ, portulacæ, cum Syr. de endiviæ, de nymphæa exhibent.

Quod externa Topica attinet, illinenda esse *Erysipelati* ea, quæ partim id quod influit repellant, per frigefacientia, partim ut id quod jam coacervatum est, discutiant per moderatè calefacientia, ac humectantia, priusquam livida ac nigra pars fiat, ita ut ea quæ illinuntur semper humida conserventur, per hoc ut frequentius alterentur: atque illud fieri posse contendunt, si per molles spongas prius illita abluantur. Mulus enim partis fervor citò exhalare faciens hæc resiccet. Opus autem habere *Erysipelata* ab initio dicunt frigefacientibus cum humiditate absque adstrictione, velut est sempervivum, & portulaca, & psyllum, lenticula palustris, feris, cucurbita, solanum, hyosciamus, lactuca, glaucium, insuperque apium, & rhamni folia per se, aut cum pane

imposita, & cerata ex aqua valde frigida. Miscent & opii quid istis, & succi papaveris, & cicutz, & mandragoræ, & efficiunt medicamenta composita. Parant quoque eum in sinem ceratum ex cera alba, rosaceo quadruplo admixto, quod ex oleo crudo citra salem sit paratum, ita ut hæc in pila emolliantur, & aquæ frigide affundatur quantum suscipere possunt. Aceti etiam tenuis, ac pellucidi reliquis medicamentis parum admiscere solent, sed & polentæ cum aliqua ex relatis frigefacientibus herbis, & palmule pingues ab ipsis applicantur. Illinunt etiam partem affectam cerussâ, aut cimolia, aut figulari terra cum solano, aut spuma argenti cum rosaceo, aut chalcitide cum oleo & passo, aut cerussâ cum aceto lycio, aut acacia cum aceto. Remittente autem fervore utuntur simplicibus quidem sulphure viuo, & nienta, cum aceto rosaceo, aut ruta cum abinthio & aceto ac oleo, aut spuma argenti cum porri & betæ succo. Compositis autem privatum quidem ad caput, hoc pastillo utuntur spumæ argenti, cerussâ, croci, sulphuris viui, opii cum passo: in communi verò ad omnes partes, minii, sinopici, chalcitidis, misyos torrefacti, æruginis, atramenti sutorii, aluminis scissi singulorum æquales partes utuntur ex aceto.

Vel:

*Re. Sulphur. viv.*

*Cerussâ.*

*opii.*

*acaciæ. aa. ʒß.*

*aceti q. s.*

*M.*

Vel:

*Re. fol. recent. alibæ tener. ʒj.*

*in aceto coct. probè tris. & addito*

*rosacei triente,*

*spumæ argenti,*

*Cerussæ singulorum sextante & ʒß.*

*rursus tertio cum Coriandri, aut sempervivi, aut solani succo, dein adiecit micis panis ut Emplastri formam accipiat*

*ciat, imponunt.*

Sequenti quoque Emplastro utuntur:

*℞. Olei cecini.*

*myrtibæ aa. ℥ij.*

*Cera ʒv.*

*spum. argent. ʒiij.*

*argurinis ras. ʒvj.*

Postquam verò cessavit inflammatio aut diuturna sit, antea quàm livida pars fiat, Cataplasma ex eruda hordeacea farina imponunt. Si verò jam livida facta fuerit scarificat, & cataplasma diutius imponunt, & perfundunt aqua calida dulci, aliquando etiam marina aut muria, quandoque enim cataplasmati eadem admiscunt, postea verò relatis compositis utuntur cum animadversione, nam si diutius permanent, in pus, aut putredinem transmutationem contingere existimant.

*Herpetis.*

Cura *Herpetis* ad mentem Veterum consistit primò in bene ordinata victu ratione, secundo in materię antecedentis aversione, & inhibitione; tertio in evacuatione humoris partem affectam occupantis: quartò in ulceris sanatione. Dietam eandem nempe frigidam, ac humidam, quæ in Erysipellate describitur, commendant, circa universalia ipsis quoque idem consilium est, purgandum enim, venamque secandam esse contendunt, evacuant igitur totum corpus per medicamentum bilem educens. Dein transeunt ad *Topica*, affectis autem locis frigescentia, ac siccantia adhibent medicamenta, ab initio quidem pampinos vitis, & rubi, ac plantaginis in cataplasmate apponentes, postea verò lenticulam, hisque aliquando etiam mel, ac polentam miscunt vel sequunt.

*℞. Decoct. sol. rubi*

*arnoglossæ aa. q. f.*

*in quo dissolv.*

*sarin. bordei,*

*lupinor. aa. ʒiv.*

*pulv. rad. anulæ ʒvj.*

*M. f. Cataplasma cui add.*

*Ol. Nymphaeæ,*

*rusacæ aa. ʒvj.*

*M. & applicetur moderatè calidè, vel loco ejus ung. de liquiritia, vel atramentum scriptorium saltem applicant, quod (ut illi ratiocinantur, ratione vitrioli putredinem corrigit, ratione gallarum repercutit, & refrigerat, vel sequens applicant unguentum:*

*℞. Lacæ succidæ usta, & pulveri-  
sata ʒij.*

*Corticis pini usi & loti ʒib.*

*adipis caprilli ʒj.*

*ol. myrtin. ʒiij.*

*Cera q. s.*

*M. f. linimentum, quo partem affectam illinunt.*

*Vel:*

*℞. Aceti.*

*Aq. plantaginis aa. P. ʒq.*

*M. & applica. Sunt qui terram cimoliam, cum succo solani subactam, & ad unguenti formam redactam apponunt. Quòd si Herpes ulceratus adsit, medicamenta moderatè exsiccantia, & minimè acria esse administranda arguunt, ulcus itaque sequenti decocto abluunt:*

*℞. Herb. plantag.*

*solani,*

*bursa pastoris,*

*Centinod. aa. Mj.*

*endivie Mj.*

*Calicum virid. gland.*

*Nucum Cupressi aa. ʒiij.*

*balauft.*

*gallar. aa. ʒj.*

*Thuris,*

*malicorin,*

*myrrhæ aa. ʒj.*

*M. f. decoct. in aqua sabro-  
rum, quo ulcus ritè mundandum  
esse præcipiunt. Dein comburunt  
lanam succidam in olla nova, com-  
bustam terunt in pulverem, &  
eum s. q. aqu. rosar. redigunt in  
liquorem instar atramenti, quod  
plumis illinunt, alii ipsum atra-  
mentum applicant. Nonnulli ul-  
ceratum Herpetem illinunt pastillis  
passo solutis, aut vino tenui & au-  
stero non veteri, aut posca aquo-  
sa. Adhibent etiam glaucium & huic  
similia ex aqua, & hoc nihil ef-  
ficiente, acetum admiscunt. Sed  
& plan-*

& plantaginis succum, aut solani dilutum magnoperè laudant, aut lini semen tostum, ac vino, oleoque coctum, & tritum imponunt, aut cimoliam solani succo dilutam illinunt, & spumæ argenti trientem, succi porii cyathos septem, succi betæ tantundem, trita inungunt, ubi verò diuturna jam sunt talia ulcera, idoneum esse dicunt *Musa pastillum* & *Andronis*. Vel

*R. Lana mollis non lota, circum tedam obvoluta ac usæ 3 i 3 3.*

*Cera 3 ii j.*

recementi plumbi acetabuli dimidium adipis caprin. curat. & lok in aq. 3 ii j.

olei Myrtici 3 v.

M. Vel:

*R. Malicorii malipunci dulcis 3 v j. spuma argenti 3 v j.*

*lana non lota circum tedam obvoluta ac usæ 3 ii j.*

*Cera 3 x j.*

*Cerussa 3 j.*

*thuris,*

*alumen sciss. aa. 3 j.*

*Tin. & myrtico excipiuntur.*

*Cura Erysipelatis ad mentem Paracelsi.*

§. 14. Paracelsus curæ principium in Erysipellate esse ait, ut ligamenta stringantur cum allohol, ne concurrant alia falia, postea sperniolo mortificandum, deinceps amoris doloribus per oppodeltoch consolidandum esse contendit. Descriptio allohol est sequens:

*R. Salis anacthron 3 j.*

*Anodi 3 3.*

reduc ad formam cum oleo despicata.

Descriptio Spernioli:

*R. Spermatis Ceti.*

*Ranarum.*

*Ceresolii.*

*Iuniperi aa. q. v.*

*fiat destillatio in Sole.*

Vel:

*R. Glutinis aquatici 3 ii j.*

destillantur in aquam, cui finus mineralium imponatur, & bulliant simul per horam, aut donec in formam pulvis reducantur, adde

*Caphure 3 j. fiat unguentum,*

quo cum ligetur crus terno quoque die semel, per tres septimanas con-

tinuando. Postea sapius abluendo mundetur aqua foliorum quercii, vel aqua falsa. Curabitur optime non alias, ac si medicamentum superpositum esset: nam ejus est indolis medicina prædicta, quod tribus hebdomadibus etiam operetur, post ejus omissionem, donec omnino curaverit. Anacthron est genus salis, quod crescit in petris, veluti muscus lapidibus supernascens, nitri similitudine: non est nitrum tamen, quod à vitariis conficitur. Est sicut usnea quid, ac decoctum aqua sit, ut alumen, acidum. Postremo vitri formam accipit, spumamque producit, quam antiqui falso putarunt anacthron. Ignis Persici curam duplicem esse dicit Author, una priusquam natus sit morbus, altera cum jam est vigentesimus: ad priorem curam seq. proponit:

*R. Spermatis ranarum 15 3.*

*Caphura 3 ii j.*

*Myrrha,*

*Thuris aa. 3 j.*

Reduc ad destillationem Solis, quod sic intelligas, ponatur in vitrum ad Solem, donec liquefiant. In hunc liquorem pannos intinctos superponit loco dolenti, cum siccati fuerint, rursus intingit, superponitque tam diu, donec sedetur. Ad posteriorem curam adhibet sequent. v. gr.

*R. Therebinti. indurata 15 j.*

*Oppoponaci 15 j.*

*Colcotharis 3 ii j.*

Reduc in Emplastrum.

Bulliens etiam despumat mel, cui præcedentia cum imposuerit, inde efficit Emplastrum tenue, hoc pannis illitum imponit.

*Herpetis cura* in refrigerio consistere ait, demum remediis mucilaginosi, ad callos nodosque tollendos, postea curat per oppodeltoch. Mucilaginosum ipsius remedium est sequens, v. gr.

*R. Liquor de Mumia,*

*de Mastice,*

*de Caphura aa. 3 3.*

*Mucilag. de fenugreco,*

*de psyllis,*

*de cytonis aa. q. s.*

pro incorporatione usum huius-  
se sicut Emplastri oppodeltoch.

Refrigerium, vel insugidatio fit  
sperniolo, anodyno per quinque,  
aut sex dies, post quos mumiam ad-  
des. Aliam curam proponit Author  
nempe sequentem:

*R. Realgaris crystallini 3 j.*

*olei ardentis 3 ij.*

*cerussæ 3 ij.*

*M. f. unguentum.*

Circumponatur hoc lupi circumse-  
rentiz tantum ut in medio nihil sit.  
Renovetur singulis duodenis horis  
semel, usque ad sextum, vel octa-  
vum diem: deponit postmodum &  
permittit. Circulus ille totus aufer-  
tur per se, quo facto, lavat mane,  
vesperique hac aqua, superponit et-  
iam infra scriptum Emplastrum se-  
cundum artem Chirurgicam. Aqua,  
vel ejus lavamentum est sequens:

*R. Aquæ glutinis,*

*rosarum aa. 3 vj.*

*partbenionis 3 v.*

*M.*

*R. Olei lini 15 ss.*

*eris viridis,*

*Cera aa. quartam.*

*F. Cerotum, cui superadd.*

*Edellii colati 3 j.*

*Liga secundum artem.*

*Helmontii  
cura Ery-  
sipelatis.*

§. 15. *Helmontius* Erysipelatis ve-  
nenum ex ira Archei deducens, sa-  
nationem ejus ponit in lepore, cui  
timor, mansuetudo, fuga, & vita  
innocua. Cruor itaque, in quo est  
productum seminale paventis man-  
suetudinis, & efficiens, mortificat  
virus ex incandescencia venenosa  
natum. Etenim amores, odia, ter-  
rores, horumque seminalia produ-  
cta, sigilla, ideas, & characteres in  
rebus notavit, unde plurium occul-  
torum causas proximas adinvenisse  
gloriatur. Erysipelas quoque Apo-  
stematum maximè igneum apposita  
aqua vitæ sanari Nobiscum statuit.  
In genere ergo juxta ipsum suffi-  
ciunt remedia saponaria, & lixiv-  
ia, quæ illud extinguunt, quia  
acidum ejus causam mortificant,  
in specie verò magnetem, sive ster-  
cus humanum calide applicari ju-  
bet, quod una nocte omne aci-

dum extrahit & necat, ut vix am-  
plius deinceps redeat.

Sic & supradictum cruorem lepo-  
ris venati, & in Martio capri lin-  
teo exceptum, & calidè applicatum  
æquæ in Erysipelate, ac Herpete  
conducere ait; quasi idea & phan-  
tasia leporis tanquam animalis man-  
sueti & pavidissimi metu suo ideam  
furentem Archei sedat ac cohibet.  
*Helmontius* ridet etiam hic Scho-  
las, quod applicare jubeant refrige-  
rantia quatenus fructui, & non ar-  
bori vitiatæ remedium applicant.  
Ad acorem hunc alituosum, & in-  
de Archeum partis excandescen-  
tem placandum commendat remedia, cui  
insunt ideæ timoris, hic etiam lau-  
dat carni leporinam furno exsic-  
catam. Usum adstringentium, &  
refrigerantium contemnit, hujus-  
modi enim salibus acidis corrosivis  
volatilibus ad viscera interiora, &  
massam sanguineam, quod faciliè  
mediante latice fieri contendit, re-  
trocedentibus, tum lethalis apople-  
xia, vel catalepsis, imo & mors ob-  
oriri potest.

§. 16. *VVillifus* sudoriferis mate-  
rici in Erysipelate stagnantis per po-  
ros sufflammationem promovel, qui-  
bus opium associat: & inter Dia-  
phoretica rob sambuci plurimum  
laudat. Partii medicamenta,  
quæ transpirationem adjuvent,  
liquoremque extravasatum attenuent  
ejusque ardorem compescant & mi-  
tigent. Prioris generis sunt spiritus  
vini crocat. & camphor. in quibus  
infundantur flores sambuci. Secun-  
di verò sunt Saturnina, Minium,  
&c.

In cura *Herpetis* *VVillifus* laudat  
viperina, acidulas, lac integrum,  
& serum illius, quæ omnia miræ  
efficaciæ hoc in affectu esse asserit  
Author. Sed quum hæc plerumque  
non sufficiant, nisi ad topica con-  
fugiamus, sequentia commendat.

*R. Ol. olivar. 3 ij.*

*Theriac. opt.*

*Cera flav. aa. 3 j.*

*subl. corr. 3 i ss.*

*benzoin.*

*Styrac.*

*pulv.*

*pulv. trosc. flor. aa. 3 ij.*

*M. f. s. a. unguentum.*

Vel:

*R. Vngu. pomad. 3 j.*

*præcipit. alb. 3 ij.*

*M. f. unguentum.*

Vel:

*R. Alum. uss.*

*Sacch. canth. aa. 3 j.*

*Sperm. ceti,*

*Cera flav. aa. 3 i β*

*ol. amygd. dulc. 3 β.*

*M. F. unguentum.*

*Sylvi* *E-* multis aliis remediis præsert sudoriferis blanda imprimis, quando aliqua febricula associata est, hinc laudat Antimonium Diaphoreticum, bezoarticum minerale Martiale, Joviale, Saturninum, Tinct. Antimonii tartarizat. ocul. cancr. Ebur. phil. pp. crocum Martis, &c. quibus admiscenda vult salia volatilia ac aromatica, in quem finem sequentem præscribere solet formulam:

*R. Aqu. flor. sambuc. 3 j.*

*fenicul.*

*Card. bened. aa. 3 v j.*

*Antimonii Diaphoret. 3 β*

*Ocul. cancr. pps. 3 j.*

*laudan. opiat. gr. ij.*

*Syr. card. bened. 3 v j.*

M. detur cochlearim, atque per vices. Externè laudat cremorem cum creta mistum, & Erysipelati calidè impositum, ut & aquam calcis vivæ cum aqua florum sambuci calidè applicanda.

*Herpetis.*

Ad Herpetem Sylvius commendat sempervivum, portulac. saccharum Saturni, &c. optimum & egregium dicit esse linimentum ex pulvere subtilissimo cretæ, & cremor. lactis, quo sæpius Herpes illinatur, item si calc. viv. in aqua extinguitur, istoque liquore locus affectus eluatur.

Aut si multum exedens sit Herpes, in usum vocat remedia Morbi Gallici, nempe potiones ex salaparilla, Guaiaco, Sassafras, rad Chinæ, sanal. citrin. rad. enulæ, & simil. sudores præterea suadet. Externè verò convenire ait unguentum Saturninum, ex lithargyr. solari, & ol. oli-

var. sine igne tum in mortario plumbeo, diuturnis tritionibus mistum maximè laudat, Balf. sulphur. complementum absolvit.

*S. 18. Cartesiani* in curatione *E-* *Carthesia-*  
*rysipelatis* commodè instituenda eò *norum va-*  
studiosè respiciunt, ut lymphæ cras- *tio curadi*  
sior stagnans resolvatur, & in de- *Erysipelas*  
bitum redigatur fluorem, quo ob-  
struclio tubulorum cutaneorum ab  
ea facta tollatur, eaque de causâ ea  
interius sumenda exhibent remedia,  
quæ particularum angularium in  
lymphæ contentarum mucrones he-  
betent, absorbeant, & frangant, ut  
fibrulis uterius in hære nequeant,  
sed poris magis accommodatæ per  
sudorem faciliè expellantur, cuiusco-  
po sequens inservire potest mixtura.

*R. Aqu. fumar. 3 β.*

*spir. flor. sambuc. 3 j.*

*Electuar. diascord. Frac. 3 β.*

*spir. armoniaci gutt. v j.*

*Syr. card. bened. 3 iij.*

*M. Exhauriantur una vice.*

Vel:

*R. Aqu. scord. 3 β.*

*Rob. sambuc. 3 j.*

*Tinctur. Croc. gutt. v j.*

*Salis fumar. 3 β.*

*volat. succin. gr. ij.*

*Syr. scabios. 3 ij.*

*M. assumatur una vice.*

Forma etiam pulveris convenientia adhibent sudorifera, ut particulæ cuspidatæ pungentes eo magis inter poros eorum frangantur, & irretitæ per poros eliminentur, cujusmodi remediî sequens tyroni existat exemplar.

*R. Ocul. cancr. gr. xij.*

*Bezoard. mineral. 3 β.*

*Salis succin. gr. ij.*

*ebor. Philos. pp. gr. v j.*

*M. F. Pulvis* una vice in aqua florum sambuci saccharo parùm edulcorata exhibendus. Prospectis itâ poris & tubulis obstruclis cutaneis, ut repetentur remediis internis, non cunctantur etiam topicis, sive externis resolutionem istam lymphæ coagulata, & salium pungentium mucronatarum hebetationem, & extra poros exaulationem promovere, quod præstant volatilio-



litoribus, porosis, & blandis remediis, quorum numero inscribunt sacculos floribus hyperici, camomillæ, sambuci, chrysanthemi, herbis scordii, phellandrii, menthæ, farina volatili, creta, C. C. usto præparato, & pulverisato repletis tepidè inpositis, linteo crocato, & spiritu vini caniphorato humectato calidiuscule applicato, quam intinctionem optimè institui putant, si crocus in aqua spermatis ranarum solvatur, & tinctura hac linteum mundum saturatè imbuatur, & lentè exsiccecur, exsiccatum de novo solutioni immergatur, & denuò siccecur, hæcque immersio, & siccatio sexies repetatur, tumque linteum istud tinctum ad usum servetur. Eodem modo etiam telam sanguine leporis Martio capti imbutam, & usus tempore aqua flor. sambuci humectatam tepidè imponunt, camque valdè depradicant. Sequenti mixtura tepidè adhibita sæpius Erysipelas fe abegisse gloriantur.

*Rx. Aqua sperm. ranar. ʒ iij.*

*Spir. vin. camphorat. ʒ i ss.*

*flor. sambuc. ʒ j.*

*Tinctur. croc. ʒ ss.*

*M.* & hac mixtura Erysipelas aliquoties illinatur. Dissolvunt quoque, vel in pulveris formam redigunt olibanum, succinum, myrrham, crocum, & camphoram, iisque spiritum vini affundunt, & in loco tepidè per diem, & noctem servant in digestionem, tum liquore hoc eodem modo, ac priori mixtura utuntur. Fovent etiam partem Erysipelate infectam decocto corticum sambuci, decocto lithargyrii, myrrhæ, & lactis sulphuris, vel mixtura sequenti:

*Rx. Spir. vin. ʒ iiij.*

*aq. flor. sambuc. ʒ ij.*

*sulphur. viv. ʒ ss.*

*trochisc. alb. Rhaf. ʒ ij.*

*camphor. ʒ j.*

*M.*

Imminuto tumore, & dolore tendente, cum æger liberius incedere occipiat, ad reliquias acidas auferendas non abhorrent levia quædam purgantia, quæ glandulas intestina-

les aliquantum stimulantia excretionem lymphæ per intestina promoveant, ne tanta in copia hæc acrior chylo admisceatur, & ad membra externa devehatur, ejus rei gratia sequentem potissimum approbant formulam:

*Rx. Aqu. flor. sambuc. ʒ iiij.*

*cinamom. ʒ j.*

*Tinctur. Lalapp. ʒ ss.*

*Spir. armoniaci gut. vj.*

*Syr. de cichor. cum rhab. ʒ ii ss.*

*F. Mixtura laxativa una vice exhaustienda.* Quando pustulæ sunt excitatæ, easdem aperiant, ut lymphæ acrior effluat, & pustulas, vel tinctura croci, vel linimento ex cerussa, & spiritu vini illinunt. Ulcera facta aqua calcis vivæ abstergunt, & mundant, & unguento albo camphorato, vel ex vitellis ovorum induratis, myrrhæ, croco, camphoræ, oleo hyperici, & spiritu vini parato ad sanitatem perducunt.

In *Herpeto* lympham glandularem corruptam corrigunt, particulas *Herpetem* angulares pungentes, & rodentes abigendo internis itidem sudoriferis ex antimonio potissimum, & lignis aut radicibus chinæ, & salsaparillæ paratis, quibus liquor iste simul attenuatur, & obstructio glandularum cutanearum, sive miliarium solvitur, tum foris locum affectum abluunt decoctis lignorum, vel aqua Mercuriali, aut lixivio ex cineribus tabaci, & oleum tartari, vel solum, vel cum oleo amygdalarum amararum mistum sæpius illinunt, vel alia quædam convenientia unguenta, qualia sequentes exhibent formulæ:

*Rx. Unguenti rosat. ʒ j.*

*Præcipitat. rub. ʒ j.*

*M.*

*Rx. Cret. alb. ʒ ss.*

*Butyr. vet. ʒ j.*

*M.*

*Rx. Sulphur. trit. ʒ i ss.*

*Nitri,*

*Salis Saturni aa. ʒ ij.*

*Lapid. scissil. ʒ iiij.*

*Ol. rapar. veter. q. s.*

*M. F. Linimentum.*

Vel:

*R. Vnguent. rosat. ʒ ij.**Lacc. rub.**Mercurii præcipit. alb. aa. ʒ ʒ.**Salis Saturni ʒ ij.**Antimonii Diaphoret ʒ ij.**M. F. Vnguentum.*

Vel:

*R. Seruiorill. ʒ ij.**fell. b. vir ʒ iij.**Coq. ad consumptionem humiditatis,**F. Vnguentum.*

Imponunt etiam cataplasmata ex farina secalis, myrrha, & apio, in lacte ebutyrato parata, vel linimenta illinunt ex fuligine camini, thure, lithargyrio, scoris cupris, sulphure, baccis lauri, radice aristolochie, nitro, vitriolo, aut alumine, aliisque cum butyro & spiritu vini mistis composita. Quin sequens linimentum singularis existere dicunt usus.

*R. Tut. pp.**Ceruss. aa. ʒ ʒ.**Succi Limon. q. s.**F. Linimentum.*

*Notata-  
tio curati  
Erysipela-  
tis.*

§. 19. Curationem Erysipelatis facile assequimur obstructionem inflammatorium tollendo, hinc acidum, & coagulatum à quo excitatur infringendo, ac in tertium mutando, & sic fluxum liberiolem per canalículos promovendo, cui proposito satisfaciunt medicamentatum interna, tum externa, absque internis curatio nonnunquam frustra suscipitur, per interna enim lymphæ cum reliquis succis coagulata, ac in tubulis stagnans ad fluiditatem facili Marte redigi potest. Ex internis conveniunt potissimum Diaphoretica, & absorbentia quæcunque, quæ non tam poros aperiant, sed & succos acidos in alcalicos redigunt, & sic acidum defundant, atque hujus generis sunt alcalia, tam fixa, quam volatilia, & oleosa, conducunt ergo in Erysipelate, spirit. C. C. volat. eboris, spir. sal. armoniaci oleos. sive aromaticus, spirit. catarrhalis volatil. spir. fl. sambuc. Mixt. s. 'R. bezoard. sine acido parata, 'R. antimonii tartarifat. Essent. viperin. an-

timon. Diaphoret. bezoard. minerale martiale, imò omnia chalybeata hic conducunt, ocul. cancr. C. C. s. ign. pp. unicorn. foss. ebor. s. ign. pp. mand. lucii, Sacch. seu sal. Saturni: sed quis omnia recensere? in juniorum Medicorum gratiam unam, vel alteram communicemus formulam:

*R. Aqu. fl. sambuc.**card. bened. aa. ʒ ij.**roob. sambuc. ʒ ij.**spir. eiusdem ʒ ʒ.**Ebor. s. ign. pp. ʒ ij.*

M. detur ad vitrum, vel detur cochleatim, vel una vice propinetur. Vel in forma pulveris præscribat sequens, vel similis:

*R. Bezoard. martial.**ebor. s. ign. pp. aa. ʒ ij.**mandib. lucii ʒ ʒ.**cinab. antimonii gr. vj.**camphor. gr. iij.*

M. detur cuspidatim hic pulvis cum aqu. flor. sambuc. vel fumar. vel cum potu Theæ. Cinabarina & Camphorata egregia sunt in Erysipelate remedia. Vel sequentis Essentia detur dosis ad guttas 30. 40. vel 50. in vehiculo convenienti.

*R. spir. fl. sambuc.**cochlear. aa. ʒ ij.**Tartar.**Vitrioli mart. aa. ʒ ʒ.**Sal. armoniaci gutt. x.*

M. vel detur 'R. antimonii tartarifat. ad guttas 20. bis in die. Pro rusticis, & pauperibus sufficit seq.

*R. Alb. grec. ʒ ij.**Flor. sambuc. M. j.**Coq. ex lacte dulci aa. ʒ vj.**Colat. add.**Croci ʒ ij.*

M. quod calidè & imprimis vesperi ab ipsis bibatur.

Purgationes, V. S. tanquam noxia in Erysipelate rejicimus, hanc tamen plures in Erysipelate instituendam volunt, non ad causam tollendam, sed ad sanguinis pressionem fortiolem tollendam imprimis urgentibus maximis doloribus Erysipelati conjunctis. Diuretica verò profunt, quia & per hæc lymphæ coagulata resolvi, ac stagnans per uni-

unicam educi potest, inter quæ aliis palmam præripiunt. R. nostra Diuretica, arcanum duplicatum, & omnia nitrosa, imò & salsa, item succinata, ex gr.

R. *Ocul. cancr. pp. 3j.*

*Sal. absynth. 3j.*

*arcan. duplic. 36.*

*Sal. volat. succin. gr. iv.*

M. f. pulvis, detur cuspidatum in aqu. fl. Chamomill. sambuc. charefol. &c. Ut verò obstructio inflammatoria melius tollatur, & auferatur, parti affectæ adhibenda sunt varia localia ac topica remedia, quæ sibi quisque habeat commendata, quæ sint resolutiva, vel acidum destruentia, & coagulatum stagnansque dissolventia, ut lymphæ coagulata, & acti minimis in tubulis liberior concedatur transfluxus, hinc commendamus omnia alcalina, & absorbentia, camphorata, volatilia oleosa aqueis tamen temperata, sola sæpe aqua calida cum sapone Veneto calidè applicata, vel tantum infusum Theæ cum linteis Erysipelati oppositum sufficit; item spirit. vin. camphor. vel crocat. vel in quo flores, & baccæ sambuci infusi, seu cui eorum spiritus adjunctus fuerit, vel aliis præferimus sequens:

R. *Aqu. calcis viv.*

*fl. sambuc.*

*spir. matric.*

*vin. camph. aa. 3i ʒ.*

M. applicetur calide quadruplicatis linteis. Vel:

R. *Myrrh.*

*Oliban. aa. 3v.*

*Coq. in aq. & vin. Gall. f. q. dein add.*

*Camphor. 3ij.*

*Croci 36.*

M.

Veh

R. *Aqu. fl. sambuc.*

*Spir. vini aa. 3ij.*

*Camphor. 3ij.*

*Sal. Saturni 3j.*

qua mixtura linteum quadruplicatum imbutum, sæpius parti affectæ calidè imponatur, quo non tantum acidum peccans, & obstruens temperabis, sed & tubulos à lymphâ

acri obstructos referabis, quibus obtentis Erysipelatis symptomata, certò certius cessabunt ac imprimis ardor inductus. Si hæc præter spem non juvant, ad validiora transeundem est.

R. *Aqu. pluviatil.*

*Spir. flor. sambuc.*

*vin. crocat. aa. 3ij.*

*myrrhæ 3j.*

*Camphor. 36.*

*Spir. sal. armoniaci succ. 3j.*

*Sal. Saturni 36.*

M. calefiant parum, quo linteola madefacta parti affectæ imponantur, eaque toties renovanda, quoties frigesceri, aut exsiccati percipiuntur. Vel pro pauperibus:

R. *Flor. sambuc.*

*fol. levissica aa. Mj.*

*Coq. ex lact. dulc. aa. 3vj.*

*colat. add.*

*Spir. vini 3ij.*

*Saltastar. 36.*

M.

vel ex herb. ruta, scordii, absinth. nicotian. fiat. decoct. cui add. spir. vin. camphor. vel crocat. sic etiam conducunt linteæ saponis lixivio, vel aq. calc. viv. vel urina madefacta Erysipelati impolita.

Nescio quo anili metu absterriui hætenus Medici, ac Chirurgi, quod non audeant Erysipelati applicare remedia humida, sed tantummodo sicca: ast sciant hi scio, hæc humida volatilia magis per poros penetrare, facilius tubulos aperire, succos stagnantes ad liberiores transfluxum incitare, sicque obstructionem inflammatoriam tolli posse: ego verò omnibus junioribus Medicis Epithemata varia calidè applicanda commendo, & ex experientia videbunt, quantum Praxis Rationalis Neotericorum distet à Veterum obstinatorum irrationali. Sicca verò non rejicienda volo, sed & ea magno cum fructu sæpe applicari statuo, hisce autem nihil juvantibus, ad humida spiritibus, ac temperata confugiendum esse. Inter sicca topica eminent pulv. Erysipelatodes *Amygdali*, item ex alcalinorum classe sunt Saturni-

na, creta contusa, farina lupinorum, tritici, lini, cortices interiores sambuci cum farina Erysipelati imposita, mulierculis remedium est universale, melius verò conducet pulvis ex saccharo Saturni, cerussa, minio, thure, croco, camphora paratus, & cum lino, vel canabi applicatus: Pulvis quoque liquiritiæ, flor. sambuc. melilot. chamomill. lac virg. &c. eodem modo impositi laudantur. Ex. gr.

*R. Farin. bord. ʒ j.*

*fabar. ʒ ʒ.*

*pulv. liquirit. ʒ v.*

*Creta,*

*myrrh. aa. ʒ i ʒ.*

*Ceruss. ʒ ii j.*

*Camphor. gr. vj.*

M. externè inspergatur hic pulvis: vel sequens magis simplex:

*R. Farin. c. ʒ j.*

*myrrh.*

*ceruss. aa. ʒ ʒ.*

*camph. gr. v.*

*M. f. pulvis tenuissimus.*

Creta enim & farina sæpè sola sufficiunt, quoniam ex alcali constant, quorum particule minime cutis poros intrant, & acidum quantum possunt absorbent, pari modo sicuti colchotar vitrioli acri expositum denuò acidis saturatur particulis. Huic scopo ob alcali copiosum convenit sperma ranarum, & lintea spermate hoc probè imprægnata, ut & pannus lineus crocatus *Mysf.* conferunt. Alii laudant fel carpiorum calidè illitum, alii commendant folia raphani rusticani, quæ in forma sicca imponenda suadent.

Hic etiam cataplasmata non negligenda, quæ sæpè totam implent paginam, ex herb. rut. scord. absynth. abrotan. decoct. cui add. sal. armoniaci depurat. sal. tartar. spirit. vin. camphor. & tepide applicetur. Vel Theriaca Andromac. vel Diascordium tepidè applicetur per vires, & hinc plus commodi, quàm ex aliis percipies: mutanda enim sunt sæpius medicamenta, quia sæpe unico effectum non præstante aliud præstabit. Pars etiam Erysipe-

late affecta quinquies, vel sexies de die mastiche, & thure suffumigetur, suffimenta enim ex sabina, rad. levistici, fl. stœchad. & aliis, quæ jam in vulgus abierunt, & optima sunt. Uti enim pulveres temperant & moderantur ardorem, ita suffumigia particulis suis alcalinis volatilibus dissipant, & in motum cient stagnantes, & subsistentes particulas, ut vel in ordinem redeant, vel exhalent.

Curatio Herpetis, seu Erysipelatis exulcerati ex jam dictis constat, non multum differt à cura Erysipelatis, sal Herpetem producens acorius esse, quàm in Erysipellate, pauciorque sero esse dilutum, quare ut illius quoque curam absolvamus, necessum habemus ea adhibere remedia, quæ salium acrimoniam obtundunt, poros glandularum miliarium obturatos referant, cuticulæ angustiores poros ampliant, lymphæque penù adaugent. Herpetiscuratio variat prout ipse affectus, si adsit intemperies sanguinis falsa muriatica, vel acida, ea ( quantum possibile, ) auferenda exhibendo infanti, vel nutrici appropriata alimenta, & medicamenta. arcedinem involventium, ut decoctum radicis chinæ, & leviorum Diaphoreticorum usus sit continuus, conducunt enim omnia Diaphoretica, & Diuretica superius recensita, & externè ferè nihil tentandum, nisi in antecessum internis causis sit prospectum, quo peracto spontè sæpè curatur, quo neglecto multa sæpè graviaq; symptomata subsequuntur. Diverfa autem in usum vocari possunt tum lavamenta ex mundificantibus variis absynth. aloë, myrrh. camph. sal saturni, spir. sal. armoniaci, aq. calc. viv. & similibus constata linimenta ex unguento rosac. c. sale Saturni, vel Mercur. librato alb. se-junctim, vel simul, vel cum aliis camphor. theriebinth. ocul. canc. fl. tart. sal. armon. commixt. prout res exigit; tum pulveres aspergendi ex cerussa, lap. calaminar. tut. ocul. canc. sal. Saturn. cret. &c. Omnia quoque medicamenta, quæ in scabie præscribuntur, & hic profunt

*Herpetis.*

# CAP. VI. DE ERYSIPELATE ET HERPETE. 117

ut ol. Tartar. spir. vin. enulat. Satur-  
nina, Cinabarina, & sequens con-  
ducit pulvis Herpeti inspergendus:

*Re. Ocul. cancr. 3 j.  
cinabar. nat. 3 j.  
Sal Saturn. 3 j.  
spirm. ceti 3 j.  
camphora 3 j.  
M. f. pulvis.*

Vel illinatur balsamus Peruvianus,  
vel cum linteis carptis imponatur.  
Quandoque etiam ad fortiora acce-  
dendum est, ex gr. sequens in Her-  
pete sæpe optimum præstitit effectum,  
cautè tamen applicandum.

*Re. Sublimat opt. gr. xij.  
aqu. pluvial. 3 vj.*

*Coq. super cineres calidè in phiala  
vitrea ad dimidiam.*

Vel in forma linimenti:

*Re. Vngu. rubr. 3 j.  
camphor. 3 j.  
Mercur. præcipit. 3 j.  
ol. rosar. 3 j.*

M. fiat l. a. linimentum.

quo Herpes calidè inungendus est,  
vel theriaca, vel diascordium, vel  
spir. matricul. cum ag. calc. viv. vel  
Elix. vir. imponantur: ex salib. vo-  
latilibus impositis sæpe optimum ob-  
servavi effectum, imprimis si cum  
aqueis fuerint temperata, sic & con-  
venit sal volatile oleosum illitum.  
Suffumigia nec hic contemnenda  
sunt. Celeberrimus D. à *Gulden-  
klees* Herpetem miliarem feliciter cu-  
ravit præmissis cholagogis, & fer-  
vorem particularum emendantibus  
remediis solis paucis topicis, cera-  
to sc. Hieronymi Fabricii ex succo  
tabaci, &c. & postmodum arcano  
Valesci de Taranta applicato fun-  
ditus hæc delevit.

*Oedor*, quod derivatur à verbo Græ-  
co *oedon* & *oide*, quod significat  
tumorem frigidum, laxum, mol-  
lem, albicantem, doloris expertem  
non renitentem, per quem materia  
subtilis, seu cælestis liberè sine re-  
mora perfluere potest; describi po-  
test *Oedema*, quod sit tumor mol-  
lis, laxus, digito prementi cedens,  
indolens & albicans in cruribus præ-  
cipuè apparens, à succis, imprimis  
lymphæ effusa, & viscida, ac sta-  
gnante, vel planè à tubulis suis eva-  
sata, à defectu ætheris ortum ha-  
bens, morbiisque chronicis plerum-  
que succedens.

*Oedema  
quid?*

*Scirrhus* derivatur etiam à Græ-  
co verbo *skirrhos*, quod propriè  
tumorem durum, renitentem, ac  
indolentem denotat. Sunt, qui di-  
stinguunt inter Scirrhum legitimum,  
sive exquisitum, & non ex-  
quisitum, quem vocant *hæmorrhoides*.  
Nos verò hanc distinctionem reji-  
cimus, pro causæ enim, & loci,  
seu partis affectu ratione saltem dif-  
ferunt. Distinctio ergo in Scir-  
rhum phlegmonodem, erysipelatodem,  
oedematodem tanquam inu-  
tilem è foro Chirurgico exulare  
jubemus, cum doctrina hæc de  
quatuor humoribus *Galenicis* sit re-  
linquenda. Scirrhus ergò describi  
potest, quòd sit tumor durus re-  
nitens, & indolens absque inflam-  
matione sensim in partibus mollioribus  
genitus, partes internas æquè  
ac externas invadens, à succis spi-  
ricibus volatilibus fraudatis, fixi-  
oribus, ac crassioribus in tubu-  
lis stagnantibus, & sic partem ex-  
tendentibus obortus. Scirrhus di-  
viditur in exquisitum, & nothum  
dolentem.

*Scirrhus,*

*hinc de-  
scriptio,*

## C A P U T VII.

*De Oedemate, & Scirrho.*

§. I.

**I**Nter Tumorum genera Medici,  
Chirurgi referunt *Oedema*, sive  
*Tumor II.*

§. 2. Omnes corporis nostri par-  
tes internæ, ac externæ, quatenus  
constant ex tubulis ex uno magno  
tubo prodeuntibus, pro parte af-  
fecta Oedematis haberi possunt,  
cum collectio humoris viscosi, ac  
aquei in hac vel illa parte facile na-  
ri possit, præsertim verò in extremi-  
tatibus, & quidem pedum, hic tu-  
mor observari solet, & hoc facile  
fieri potest ob loci declivitatem.

*Parti effe-  
ctus.*

H 3 Oede-

Oedematis ergo sedes sunt *vasa lymphatica*, effectam lympham vehentia cum intemperie sanguinis viscida & pauco sale referta, hinc cum *vasa sanguifera* comprimantur, lymphatica autem distendantur, oritur pallor. Scirrhi verò pars affecta sunt glandulæ omnes, & tubuli quicunque, vel partem internam, vel externam constituentes.

§. 3. *Dignoscitur Oedema*, seu tumor oedematofus, ex iis, quæ jam superius in ejus descriptione relata fuerunt, tum ex eo, quod vestigia digiti impressi diutius supersint, & successivè iterum eleventur, tum etiam ex pallore tumoris, & ex doloris, Inflammationis, & caloris absentia, humor quippe obstruens dolorem, ac inflammationem non effugit, ex eo apparet, quod succus iste minime fermentativus est, unde patet, fibras haud tanta vi expandi, & per consequens minorem dolorem, & calorem causari. Nullus enim in hac obstructione oedematosa adest particularum minimarum motus intestinus. Hinc etiam Oedema raro suppuratur, materia enim obstruens est humor viscidus, ac crassus, qui non facile, ut chylus, coagulatur, ideoque rarissimè, vel nunquam in pus mutatur, nisi efficiatur, ut alcali, & acidum in eodem tumore invicem digladiantur, ac fermententur, non aliter, ac fieri videmus in oleo tartari per deliquium oleo Vitrioli affuso, sal enim tartari, & quodvis sal alcali acuta habet spicula, interiorum pluribus poris amplioribus est donatum, & per consequens multum ætheris secum vehit, oleum autem Vitrioli constat ex particulis acidis scindentibus, non tam porose substantiæ, porisque non tam amplis, hinc etiam tantam ætheris quantitatem non fert. Itaque si confusio duorum horum liquorum fit, magnæ oriuntur turbæ, acidæ enim scindentes particule se amplius salis Tartari poris insinuant, illisque obstructis, ætheri, quem copiosum secum vehit, viam præcludunt, qui concitatori motu in illos

ruens manifesta nobis sui transitus exhibet signa, imò cum tanto impetu partes distendit, ut si incautiùs confusio fiat, vitrum in partes dissiliat. Ab hoc itaque concitatore ætheris motu calor, strepitus, & murmura deduci solent. Fumi autem oriuntur, quia per celerem illum ætheris motum particula attenuantur, inciduntur, & resolvuntur, quæ resolutæ nobis fumos exhibent. In hoc verò Oedemate cessat hæc effervescentia, quia æther per continuatum motum novos sibi formavit poros, quos liberè, ac sine ullo impedimento transit, quamdiu enim liberè transire nequit, & vi quadam rueret debet, tamdiu effervescentia liquorum, & succorum corporis nostri durat, novis verò poris factis illa cessat.

*Scirrhi* signa Diagnostica sunt tumor durus, & renitens, ab initio minimus apparens, de die verò in diem crescens, modò lividus, modò pallidus, juxta varietatem humorum stagnantium, & exinde enaxam texturam partium, absque verò Inflammatione, calore, & dolore apparet hic tumor scirrhusus, ex quo iterum patet, succos hos non esse fermentescibiles, sed potius in ipsis cessare motum intestinum particularum minimarum, hinc est, quod nullus calor, nullusque dolor percipiatur, de quibus jam abundè egimus.

§. 4. Quemadmodum Galenici ex Galenico-biliofa fluxione Erysipelas, sic ex pituitosa deducunt Oedema, quod ipsis tumor laxus est citra dolorem. Notunt autem etiam tumores laxos fieri circa pedes in affectionibus aquæ inter cutem, & tabem, ac malo corporis habitu. Ob pituitosi ergo humoris influxum, laxum tumorem in parte aliqua oboriri statunt. Causæ primitivæ ipsis sunt omnia ista, quæ intemperiem frigidam, & humidam producere, pituitæque proventum generare possunt, ut est aer frigidus, & humidus, vidus inordinatus, crapula, &c. Causa antecedens ipsæ est temperies humida ventriculi, cerebri, Hepa-



Hepatis, & pituitæ in corpore proventus, quæ est causa Oedematis conjuncta, quatenus est, ut illi loqui amant, naturalis, & quarta sanguinis pars insipida, & alba.

*Scirrhi.* *Scirrhum* autem exquisitum à viscoso, ac crasso humore, partibus *Scirrhi* affectis adeo impacto, ut agrè avelli possit, fieri contendunt. Alii ex *ipsis* *Scirrhi* causam ab humore melancholico naturali, nonnulli à pituita crassa deducunt. Ab hepate & liene malè affectis facillè humorem vitiosum mitti posse non dubitant. Plerumque tamen à Medicis *Scirrhum* fieri ajunt, qui inflammationes & ignes sacros perfrigerant ac adstringunt.

*Paracelsi* *placita de causa Oedematis.* §. 5. *Oedematosum* tumorem *Paracelsus* deducit à liquore in parte quadam resolutò, productò ab externis causis & accidentibus, cum quisquam laesus fuerit, vel ex abundantia liquoris, sal autem quodvis resolutum in suo loco remanere statuit solum, nisi per poros transeat, quod in *Oedemate* fieri nequeat.

*Scirrhi.* *Scirrhum* verò in omnibus corporis partibus vel à sale nitroso in eas dejecto, & ibidem alienam indolem induente tumoresque hosce producente, vel à vitrioli in duri- tiam abeunte excitari existimat, quorum posteriores tumores ob vitrioli corrosivitatè aliquando in ulcera transeant.

*Helmontii* *sui rationum de causa Oedematis.* §. 6. *Helmontius* in cruore extravenato, detento & condensato esse fermentum excitativum existimat, hinc latex quamdiu cum cruore in venis existit, vel ad glandulas fertur, communi vita potitur, nec regulis hydraulicis patet. Sursum verò atque deorsum nescit, quia non habet. At extra vitæ consortium semel reiectus, jam excrementi naturam subit, deorsumque sæpè prope- rat, proprio gravatus pondere. Vilis itaque pretii latex in *Oedemate* evasit ab ipso habetur, ideoque quoties unumquodque viscus malè afficitur, statim latècem negligit, eumque à cru-

otis sui consortio excludit, fatisque sibi negotii in sui tutelam reperit domi. Ergò latex semel à sibi repudiat, vitæque sodalitiò spoliatus, & in partibus quibusvis corporis delatus, excrementi statim indolem suscipit, quin suam sibi quæ nativam. Hæc ipsa *Helmontio* est *causa Oedematis*, & non tam causam, quàm productum, latècem in *Oedemate* minùs vitæ consuetudine privum, quàm in *Ascite*, etiam rursus in venas sorberi, & ad renes labi, ut ultimam loti determinationem tubeat, contendit Author. Latex enim, secundum *Ipsum*, in cruoris massa innoxius vagatur, ad loca opportuna deferretur, distributivæ facultati promptè auscultans. Pariter licet in inoribus obsequiosus abundet, & *cedematosa* crura insilet, id fortè contingere ait. Natura enim, ut loquitur, generali nisu o- diosum sibi hospitium parit, illudque excrementi sarcinat, quæ abigere optat. *Oedemata* fieri statuit, si attractrix laborat restagnanteque latex in hepate. Eapropter *Galenicorum* opinionem, quam habent de pituita in *Oedemate* seu tumore laxo collocta, ridet, & pluribus comprobat rationibus & experimentis, eam falsam esse, sed potiùs latècem acidum & restagnantem accusat.

Pro *Scirrhi* indole & causa ritè expiscanda *Helmontius* statuit, quòd totus cruor, ut in Gas abeat, duabus aliis ad volandum opus habeat, aere & fermento, quare quoties aliquid cruoris in externo corporis ineptum sit, aut non sensim disponatur gradusque subeat, ut totum per totum fiat volatile & transvolabile, eo momento jam *Scirrhus* & *Nodus* esse conceptus arguit. *Duros* etiam *Scirrhus* ex Tartaro peregrino sæpè coalescere non dubitat, Tartarumque hunc inesse materialiter in eduliis & potibus, itemque permanere per digestionum officinas, atque proinde tandem coagulari in miseris tradit Author. Coagulata in nobis fieri per exsiccationem (excepta creta podagrica,) neque per tartarum

*Scirrhi.*

inexistentem clam, multo minus ex Microcosmi conditione saxosa aut calcinatoria. Alioqui sui initio, prout & *Scirrhus* quodlibet, itemque bolus, lutum, mucago, arena & duelech feminalibus initiis juxta *Ipsum* coagulantur ac resolvuntur, atque longè aliter solvuntur ac coagulantur, quam si pertinax & immutabilis rerum quarumlibet tartarus sua sponte in nobis peregrinum coagulum dedisset. Mucilaginem quoque in partem aliquam per Crisin delatam suscitare sapius *Scirrhus* pluribus Author comprobatur rationibus.

*Villisi  
rationes  
de causa  
Oedematis.*

§. 7. *Villisi* statuit, sanguificationem perfici tum fermentatione, tum accensione, cruorisque crasin integram permanere, dum earum utraque ritè exercetur; si verò spiritibus & sulphuribus dissipatis aut depressis, & sale à copiosiori aqua diluto, latex serosus præpolleat, infirmatur pervertiturque hæmatosis. Chylus itaque in sanguinis massam confluent, eumque cadaverosum quasi reperiens, ab illo nequaquam fermentatur, nec dissolvitur, comminuiturve: chylus ergò nullam vel saltem levissimam passus alterationem, in aqueum vitiosumque commutatur liquorem, qui indies augescens sanguinem obruit, ejusque calorem imminuit. Cruor autem curriculum suum per universam corporis peripheriam tardiori tamen gressu pergens, serum istud exuberans ex arteriolarum osculis in laxiori quadam parte deponit, illud verò spiritibus destitutum & torpidum existens, venarum orificia, à quibus referatur, subingredi non valet, & majori sua diuturniorique aggestione, impletis omnibus poris partis, in qua residet, eam in tumorem elevat. Morbus iste contingit etiam ex sanguinis accensionis defectu, quando scilicet inspirato crassiori aere paucioribusque nitrosis particulis dilato, sanguis in præcordiis ritè non accenditur, & tenuiore in illo excitata efflagratione rectè nullo modo perficitur; hocque pacto deprava-

tur cruoris latex, ac vi sua fermentativa penè exutus, chylo dissolvendo atque assimilando impar reperitur, illumque in serosum humorem permutari finit. Quum tamen sanguinis fermentatio ejusque accensio semper adeò non invertantur, ut nulla ipsi amplius superfit chylum fermentandi assimilandeque virtus, sed earum utrique aliqualis contingat imminutio, liquoris aquosi proventus semper copiosior non accidit, parcaque solummodò copia aggeritur, & in peculiari quadam parte laxioris texture aggeritur, quam in tumorem *Oedema* appellatum elevat.

*Villisi* noster de *Scirrhi* causa ratiocinans asserit, adeò copiosam interdum adefe in sanguine terrestres particulas, ut activorum ejus principiorum volatilifatio ab illis inhibeatur, & ipsius æque ac fucci nutritii consistentia spissior reddatur. Latex ergò sanguineus testudineo gradu corporis partes perluens, terreisque particulis scattens, quum ad angustos glandularum ductus per arterias delatus fuerit, eos permeare, venarumque oscula subintrare nequit. In glandulis itaque remorari cogitur, & in illis stagnare necesse habet; sed quum serosa particula præ ea, quæ pollent tenuitate, venarum orificia subire possint, à terrestribus desciscunt, easque relinquunt in glandularum vasculis, quas continua sua aggestione adimplent atque infarciunt. Liqueor verò nervosus malo fermento præditus, prævum istum succum in glandulis effusum ipsis assimilare nequaquam valet, & cum in illarum substantiam convertere, sed durum tumorem *Scirrhi* nomine venientem ex eo compingit & efformat.

§. 8. *Sylvius* in quibusvis corporis partibus tumores *Oedematosos* contingere posse asserit, eorumque causam existimat serum & pituitam nimiam, non tantum massæ sanguineæ admixtam, sed & intra partes corporis externas effusam, quod subsistens serum aut pituita

*Scirrhi.*

*Sylvii opinio, quomodo generetur Oedema.*

in parte aliqua, ibidem juxta *Ipsum* producit Oedematosos serofosque rumores in partibus particularibus, cruribus præsertim & pedibus, tum in singulis corporis partibus. Tumores hos sæpe ortum suum habuisse existimat à nimio potu, cui indulgent non pauci ob sitim ferè inextinguibilem, qua fuere affecti in quibusdam febribus & continuis & intermittentibus, imprimis durante frigore, existente tunc potu pernicioso.

*Scirrhus*;

*Scirrhus* verò tumores juxta *Sylvii* fundamenta originem sumunt ex diuturniore partium obstructione, ob sanguinis ac humorum nimiam viscositatem, coagulationem, inspissationem, aut pituitosi humoris intermixti nimiam quantitatem. Coagulationem hanc humorum induci ait ab acido nimis austero, unde sanguis ac pituita firmiorem & magis renitentem acquirunt duritiem.

*Cartesii*  
morum iu-  
dicium de  
causa Oe-  
dematis.

*J. 9. Cartesiani* à succo quodam crasso, sive lymphâ lutulenta, viscida & coagulata tubulos partium obstruente tumorem *Oedematosum* progenerari docent, ejus succi visciditatem originem accusant chylum crudiores ex ingurgitatione cibi & potus ventriculum obruente pronatum, præsertim verò vinum acidius majori in copia potum tumori huic ansam præbere norunt, quandoquidem succi acidiores alias particulas porosas & volatiliores in motu suo impediunt & in quietem cogant, sicque succos inspissari. Frigus etiam externum vehementius vel inspiratione assumtum, vel poris corporis adhærens, succorum motui in corpore obfistere, & in visciditatem eosdem cogere fatentur, quapropter piscatores, aliosque homines sæpius aquæ calidæ insistentes pedum Oedemate tandem onerari norunt, uti & illos, qui tempore pluviali & hyemali sive gelido iter aliquod longinquius faciunt, quod asthmaticis & difficultate spirandi affectis eo citius contingat, cum sanguis cum reliquis succis in machina eorum debite ventilari nequeat, & per

inspirationem frequentiore aerem frigidum aperto ore in pulmones admittere opus habeant, qui massa sanguineæ communicatus ejusdem circulationem tardiorē reddat, & multis particulis acidis angularibus ad motum intestinum minus promptis eandem inficiat, unde lymphâ tam clara à reliquis ejus succis sequestrari nequeat, sed turbida & lutulenta per glandulas transire inepta, extremis corporis partibus potissimum, & nonnunquam etiam ipsi trunco communicetur.

*Scirrhi*.

Ab ipso verò chylō ab iisdem particulis angularibus, sive acidis coagulato *Scirrhum* in parte aliqua glandulari pronasci credunt, particulis enim volatilioribus & ramosioribus à crassioribus caseosis segregatis, posteriores firmiter compinguntur, & interdum adeo incrassantur, ut in tophaceam & calculosam abeant duritiem. Nonnunquam in ipsis inflammationibus contingere dicunt, ut perversa topicorum minus convenientium applicatione volatiliores istæ chyli obstruentis particule per poros nimium dilatatos abeant in auram, quibus absumentis residuum in fluorem redigi nequeat, sed ob terrestritatem suam in tubulis quiescat & eosdem obstruat, circaque obstructionem istam novi succi, & præsertim chylosus, tamdiu hæreant, donec per diuturniorem motum intestinum volatiliores eorum sales denuò aufugiant, & terrestres partes prioribus in rubulis jam morantibus aggregentur, & rumor ita durus augeatur. Ut verò ejusmodi terrestritates in succis corporis humani colligantur, multum attribuerent censent victum crassum, frequentiore & diuturniore esum casei antiquioris, carnis infumate, piscium marinorum infumatorum, vel muria diutius conditorum, potum cerevisiæ crassioris ex aquis lutulentis, sabulosis aut calcariis paratæ, nec non vini non satis depurati, & particulis terrestribus abundantis, aerem crassio-

crassiores, sulphureum, & nebulosum aut frigidum copiosius & diutius inspiratum, qui chylum in sanguine contentum pariter inspissat. Ex diuturniore mœstitia multos succos acidos, & austeros in corpore colligi putant, coagulationi chyli aliorumque liquorum, quàm maximè accommodatos, unde externa quoque remedia acidiora inflammationi vel erysipelati finitè adhibita humores ibidem loci detentos coagulare, & tumori huic spissa ansam præbere fatentur.

*Nostræ sententia de causa Oedematis.*

§. 10. Ut & nostram de causa Oedematis addamus sententiam, dicimus & hunc tumorem esse à stagnatione humorum in partibus tubulosis, nullus enim tumor esse potest, quando corporis nostri canaliculi aperti & integri sunt, succi liberè persiluire ac circulare possunt, in Oedemate verò succi sunt magis lutosi & effæti, quàm in aliis tumoribus, humor enim in Oedemate est instar gelatinæ seu juseuli carnis frigescentis in principio ex dilaceratis vasis lymphæ & succus nervæ exstillant, & in partes vicinas effluunt, quæ dein ope acidæ acrimoniæ in materiam lutosam commutatur, non aliter ac si decocto cornu cervi affuderis acidum, quod dein mutatur in gelatinam, vel si juseculum carnis exponas acri acido à quo crassius redditur. Causa ergo immediata Oedematis est lymphæ in parte quadam stagnatio, à vase lymphatico obstructo & distento, vel ab effusione ejusdem in partem, in qua colligitur, à rupto vase, causa verò mediata est lymphæ visciditas, crassities, & aquositas, experientia enim constat, lympham ex alcalibus sulphuribusque volatilibus, & ex sulphuribus fixis ac phlegmatis constitutam esse, dum enim principia ista ordinem suum servant, justæ sunt magnitudinis & figuræ, ac motu æquali aguntur, nulla fit lymphæ in corpore remora, at quum ex plurimis causis notabilis

immutatio iis omnibus accidere possit, nec mirum quoque si lympham aliquando in partibus stagnare videamus. Succus enim Oedematosus seu lymphæ ob crassitiem & aquositatem suam non facile ab æthere agitari potest, non mirum proinde est, quod in tali tumore non graves subveniant inflammationes aliaque symptomata. Subsequitur quidem Oedema morbum chronicum, & acutum nulla causa evidente prægressa, nisi quod in morbis chronicis & acutis maxima sit spirituum animalium deperditio, tenuis contingit illorum reparatio, volatiliores sanguinis particule dissipantur, & sale volatili oleoso sanguinis deficienti necessariò lymphæ crassa ac effæta remanet, imò partium fermentationes seu motus particularum minimarum intestinus cessat. Saliva autem phlegmatis (quæ in morbis acutis aut chronicis dissipata fuerit), æquè ac par est non abundans, alimentis sufficientem non conciliat fluiditatem, acidaque illius, ut & salia crassiores adeptæ molem alimentorum tenuiores particulas subite nequeunt, easque intemperatas ferè dimittunt. Alimenta in ventriculum delapsa, & leviores tantum in ore passæ præparationem, æquè ac par esset à fermento stomachi non dividuntur & comminuantur, quum per morbi decursum vel ejusdem violentiam notabile contigerit alcalicorum phlegmatumque detrimentum, & fermentum ventriculi nihil aliud sit, quàm liquor ex alcalibus acidis & phlegmatis compositus, si liquor iste, qui à sanguine secernitur, alcalicis & phlegmatis fuerit, depauperatus, alimentorum salia aptè non dividet, nec eorum sulphura, uti necessum foret, dissolvit, unde accidit, ut chylus, qui ex hac massa ita fermentata, oritur, crassus fiat ac viscidus, talis autem chylus ad duodenum appellens, & intestinorum tubulum excurrentes, à succis in illorum cavitatem de-

fluen-

fluentibus non corrigitur. Bilis siquidem, quæ ex multo alcalico fixo, paucis volatili, paucis sulphure, paucissima terra, & copioso plegmate constat, satis abundantibus alcalicis phlegmatisque ditata, chyli acida, ut conduceret, non absorbet, nec convenientem fluiditatem illi impertitur, succi cum ex Pancreate, cum ex glandulis intestinorum tunicis insertis emanantes, & ex alcalicis volatilibus sulphuribus, phlematisque constituti, alcalica satis copiosa non possident, nec phlegmatis ea, quæ requireretur, abundantia prædita, residua chyli acida, ea qua par esset ratione, non absorbent, sulphura sufficienter non dissolvunt, chyli particulas reliquas, ut conferret, non diluunt, nec juxtam mixturam illis conferunt. Is itaque chylus sanguini permixtus, ab isto corrigi nequit, omnesque succi ab hoc separati, ejus indolem participabunt.

Quum ergo sanguis lymphæ fons existat, hæc illius indolem redolere debet. Si autem potior particularum volatilium sanguinis portio avolarit, crassiores tantum, inter quas primas obtinent *acida*, ad motum ineptiora, & sulphura crassa remanent. Lympha ergo, quæ ex sanguine à glandulis separatur, particulis suis volatilibus fraudatur, & ex crassioribus tantum sulphuribus, quibusdam acidis & phlegmatis constat, sed paucis resistantibus alcalicis in lymphæ, quæ sulphura ejus dissoluta detineant, acidis in illorum ramis, sese implicantibus, & phlegmatis illa circumducentibus resistere nequeunt, quare coagulantur, & conglobantur, & in vasorum lymphaticorum angustiora orificia delata, in illis cespitant, eaque obstruunt, novæ lymphæ adveniendi obicem ponunt, quæ quum ulterius progredi nequeat, hoc in loco remoratur, perpetuoque affluxu vasis tunicas distendit, partesque adjacentes in tumorem elevat cedematofum; ac verò tanta fit interdum lymphæ in

vasæ collectio, ut fibris tunicarum illius amplius sese extendere non liceat, cessanteque elatere, & continua facta lymphæ in tunicas impulsionem, fibræ tandem disrumpantur, vasæque contentum liquorem effundant, vel quoque temporis tractu delicatiora acida lymphæ à sanguine communicata, remanentium alcalicorum poros subeant, saliaque producant, quæ vasorum tunicas impetentia fibras illorum discindunt & dilacerant, vasisque aperturam inducunt. Quando ergo adest intemperies viscida, terrestribus sanguis & succus in remotissimis minutissimisque tubulis facile sistitur, unde obstructio totalis sine dolore acuto, quia partes terrestres & viscida prædominium obinent, hinc partes salinæ acutè incarcerationæ, & quasi sicuti ensis in vagina reconditæ sunt. Quando verò Oedema oritur, nulla prægressa causa evidente, sex quoque res non-naturales vulgò dictas merito accusare debemus, omnia enim ea contriunt, quæ vel volatiliora alcalica dissipant, aut abundantiora acida sanguini ac succis inferunt, quæ jam in capite de Inflammatione satis fusè explanata sunt; & quum lymphæ à sanguine tanquam fomite, ut supra vidimus, originem ducat, illius constitutionem emulati debet, paucisque in illo existentibus alcalicis copiosisque acidis compositionem ejus ingredientibus, ad visciditatem coagulationemque prona sit, vel acrimoniam assequitur. Cum proinde debita inter sanguinis particulas non est proportio, ac proin intestina ejus agitatio ritè non procedit, prevalentes (cum nec chylosarum seu viscidarum fiat attenuatio,) particule crasse viscosæ, terrestres sibi mutuo facillè adherent, sibi quæ ea de causa in angustissimis, licet laxis, à corde remotissimis tubulis, h. e. in extremitatibus, manibus pedibusque sistuntur, quos tum totaliter obturant, vixque ulla inter ipsas fit fermentatio, paucis acutis omnino involutis, nul-

lum nisi gravativum cum sensu frigoris excitant dolorem, cumque sensum & sensum coagmententur, pedetentim intumescit pars Oedematosa tum dicta, pallida ob compressionem vasorum sanguineorum, tubulis ultra tonum expansis à materia viscosiore, quam in universali Poedemate seu Leucophlegmatia, ubi visciditati major conjuncta aquæ & salis copia, illic autem major visciditas cum acido adesse videtur, manente aliquandiu fovea digito impressa, viscidis particulis tardè tandem locum, quo expulsi erunt, repitentibus.

*Scirrhi.*

Materia obstruens si magis, quam prior, fuerit crassa, viscosa, resinosa, prout artius vel copiosius poris tubulifera infarsita, vel plures simul circumvicinarum partium, præprimis glandularum, tubulos intortos obfesserit, recen-ter, aut à longo tempore, fugatis interim lubricis aquosis aliisque subtilibus, cum magis vel minus notabili quantitate particularum salarum, terrestrium vel acidarum conjuncta, majores durioresque (interdum tophaceos & calculosos,) producit *Scirrhor* exquisitos vel nothos dolentes: Porro *Scirrhi* non raro oriri solent in partibus Inflammatis post intemperstivum refrigerantium ac repellentium usum, non dispari ratione, ac gangræna post applicationem albuminis ovi cum bolo, imò multi tumores à nimium calidis resolventibus, fluidas potius expellentibus, quam crassas dividendibus, seu attenuantibus, *scirrhosi* fiunt magis, vel minus pro materie, & partis varietate.

Causa ergò *Scirrhi* est succorum coagulatio, eorumque in parte aliqua, præsertim glandulosa, stagnatio & induratio, acidum enim coagulando materiam in duritiem adigit. Jam superius demonstravimus, Inflammationem fieri à tubulorum obstructione à sulphuribus, à medicamentis acidis coagulatis, & ab alcalicis iis-

dem saturatis orta. Si enim pro remediis, quæ acida absorbent, motum succis stagnantibus communicent, poros strictiores dilatent, ea adhibeantur medicamenta, quæ acidorum penum adaugeant, succorum cespitantium motum inhibeant, porosque obturent ac stringant, qualia sunt repellentia, materia compactior redditur, obstructioque validior fit. Prorumpens autem materia subtilis, accedentes spiritus animales, subtilioresque sanguinis in vasis circumjacentibus contenti particulæ impingentes, in succos illos stagnantes, tenuiores tantum in motum agunt eorum partes, easque ad exitum determinant; at quum alcalia volatilia, sulphura volatilia, phlegmataque, ea sint particulæ, quæ ad motum magis sunt pronæ, motu donatæ ab aliis desciscunt, & per poros effugiunt. Crassiora verò salia ab alcalicorum cum acidis connubio genita, crassa sulphura & terrestres in parte remanent, quum autem continetur materie ætheræ, spirituum animalium, & volatiliorum sanguinis vicini particularum in succum stagnantem appulsus, nec crassiores illius particulæ ab iis attenuari nec comminui possint, acida in alcalicorum poros altius ab ipsis adiguntur, & sulphurum ramis fortius involvuntur, saliaque in partis fibras compulsa, illas mutuò inter se artius adiungunt, earumque interstitia angustiora faciunt. Sed quum sulphura salium aculeis superextendantur, & terrestres massæ isti permixta eorundem salium spicula obtegat, partium fibrilla à salium insultibus vindicantur, nullusque, vel levis excitatur dolor, durities ex eo prodit, quod evaporatis volatilibus alcalicis, reliquæ particulæ juxta se invicem quiete remaneant, sulphura ab alcalibus, ut antea, nequaquam dissoluta, coagulentur, motuque destituantur, dissipatisque phlegmatis, aliæ particulæ à se invicem



cem semotæ non detineantur, & undique pressa propius ad se invicem acedant, ac rara parvaque relinquunt interstitia. Sic quoque validiora discentia medicamenta parti alicui inflammatae incaute & sæpe applicata, & per poros ad succum in illa parte stagnantem delata, tenuiores ejus particulas in motum concitant, irritatis partis fibrillis, frequentiusque iteratis illorum vibrationibus, magis volatilifatur succus stagnans, eliminanturque per poros subtiliores ejus particulae, crassioresque in parte relictae arctius inter se ununtur, fortioresque faciunt obstructions, quæ durum producunt tumorem indolentemque, salium illas facientium aculeis sulphuribus absque terrestreitate obiectis.

Remotæ causæ sunt res non-naturales malè à Medicorum vulgò ita dictæ, quæ & suum symbolum ad excitandum hunc affectum afferunt; aer enim calidus, & exastuans concitantiorem motum succis concilians, illaque vehementius rarefaciens, tubulorumque fibrillas fortius pungens; ex illorum vasibus eruptionem infert; aer autem iste fervidior succum extravasatum volatilifando, partisque poros ampliando, succi subtiliores partes abripit, ejusque crassamentum ex salibus sulphuribusque crassis, & terra compositum in parte relinquit, consumtis ergò tenuioribus particulis, à quibus reliquæ in motu conservabantur, & exhaustis phlegmatis, à quibus dissolutæ detinebantur, hæc undique à materia subtili pressæ, & à continua fibrarum partium ambientium vibratione compulsa, arctius invicem connectuntur, crassioresque constituunt moleculas, quæ pertinaciores in tubulis efficiunt obstructions, à quibus tumor excitatur durus, & indolens *Scirrhi* nomine veniens.

Aer frigidus particulis duris,

rigidis, & acutis donatus, fibrillarum poros subiens illos ocludit, earumque interstitia angustiora reddit. Salia volatilia per insensilem transpirationem exire solita, obturatis poris, angustatisque fibrarum interstitiis avolare nequeunt, sanguinique, chylo, vel lymphæ remixta, rapidiorem motum illis communicant, validiusque ea exagitant, & tenuiores subtilioresque ipsorum particulas evaporare faciunt, subtilioribus ipsis exhalatis, acida alcalicorum crassiorum poros subeunt, sulphuribusque ramis intricantur, eaque coagulant. Salia ergò ab acidorum cum alcalicis unione orta, & sulphura ab acidis coagulata ad restrictos tubulos delata in iis remorantur, eoque obstruunt. Materia subtilis, spiritus animales, & volatiliores vicini sanguinis particulae tenuiores, si quæ adhuc supersint, partes exagitant, & à reliqua massa separant, ac per poros amandant; crassiores ergò tantum particulae remanent, quæ arctius inter se conjunctæ durum efficiunt tumorem, qui nullum adjunctum habet dolorem, salium aculeis nudis non existentibus.

Cibi acidi, & acerbi copiosiora sanguini impertientes acida, salium in eo abundantiam promoveant, sulphurumque majorem adducunt coagulationem. Salia ergò illa, sulphuraque ista coagulata, ad angustiores vel minus robustis fibris pollentes tubulos ducta, in illis obstructions faciunt, nullo ipsis concessio ob molem exitu. Stagnante igitur in parte humore, tenuiores ejus particulae perpetuo, quo donantur, motu evaporantur, crassioraque salia, & sulphura coagulata cum terrestreitate in parte subsistunt.

Cibi nimia terrestreitate, aut visciditate, five crassioribus sulphuribus, iisque copiosioribus prædictis

Scirrhum procreare valent; si enim terra in ea adsit abundantia, ut à phlegmatis dissolvi nequeat, repletisque aliorum elementorum sanguinis, vel succorum ab illo segregatorum, interstitiis, copiosa adhuc supersit, ad arctiores tubulos delata, scabraque superficie donata illorum poris affigitur, ipsisque adhæret: angustioribus ita factis tubulis, succus ad illos perveniens in cursu suo impeditur, subtiliores ejus particule exhalantur, crassiores stagnant, alcalia ab acidis saturantur, sulphura ab iisdem coagulantur, terrestresque particule in consimiles impingentes, iis adnascuntur, tubulorumque obstructionem, ac partis tumorem adaugent. Potus eadem habenda est ratio, quæ cibi.

In vehementiori motu, frequentioribus iisque validioribus fibrarum partium in sanguinem vibrationibus, hic rapidiori agitur motu, nimisque attenuatur ac rarefit; eadem de causa copiosiori tenuiorique sanguine ad cerebrum appulso, abundantiores in eo progignuntur spiritus, & ad partes majori vi determinantur, à quibus adaugentur sanguinis motus & rarefactio: quod chylo & lymphæ etiam evenit, durante rapidiori tali motu, minutiores sanguinis, chyli, lymphæve particule majori parte exhalantur, reliqua verò massa tenuioribus hisce orbatâ particulis, à quibus in motu conservabatur, & crassiores solummodò possidens, quietior redditur torpidiusque fluit: acida crassiorum alcalicorum poros subeunt, iisque inhzrent, sulphura ab alcalicis amplius, ut antea non dissoluta, ab acidis coagulantur, & ad angustiores tubulos devenientia in illis retinentur, illosque obturant. Continua per motum humori obstructi communicatum dissipatio, subtiliorum particularum, terra tantum cum salibus & sulphurebus coagulatis remoratur. In quiete debiliores sunt fibrarum partium in sanguinem vibrationes, ideoque particule ejus, ut par esset, non

comminuuntur ac atteruntur, nec à se invicem aquæ ac ex re foret, separantur ad justam succis fluiditatem conciliandam; paucus sanguis isque crassior ad cerebrum apportatur, paucioresque hæc de re in cerebro producuntur spiritus, & minori, quàm requireretur, copia ad partes conflunt, coctiones ob spirituum penuriam deterius peraguntur, nec particule, ut deceret, à se invicem extricantur. Motus ergò sanguinis, sufficientibus non affluentibus spiritibus animalibus, nullo modo intenditur, neque partes ejus volatilisantur aut rarefunt; acida ex alcalicorum poris nequaquam deturbantur, nec à sulphurum amplexibus abripiuntur, sed potius altius in illa adiguntur à pressione, quam undiquaque patiuntur. Salia ergò & sulphura coagulata ad angustiores tubulos appellentia, in illis retinentur, cosque obstruunt, penitusque exhaustis tenuioribus particulis exsurgit tumor.

Somnus nimis & laboriosus diutius multum conferre potest ad producendum hunc affectum, in somno enim levis fit partium corporis motus, tubuli cerebri viscidior lymphæ oclusi paucos admittunt spiritus, quo fit, ut sanguinis circulatio aliorumque succorum lentius progrediatur: loquor enim hic de laborioso & morbofo somno, in naturali enim somno omnes succi celerius circulantur.

Vigilæ quoque symbolum suum asserunt, ad producendum scirrhum: in vigiliis enim spiritus animales absumentur, & fit sæpe in partes uberior spirituum animalium influxus, majusque eorum contingit detrimentum; corporis partes frequentiori eoque validiori agitantur motu, fibrillæque magis iteratis in sanguinem vibrationibus suis illum tenuiorem rapidioremque efficiunt; particule sanguinis attenuatæ ad exitum sunt procliviores, & à reliqua massa copiosiores desciscunt: acida verò dominium obtinentia crassiorum alca-

alcalicorum remanentium poros imprægnant, sulphuraque ab acidis non dissoluta coagulantur, atque ab iis obstruuntur arctiores tubuli. Exhaustis itaque per continuum motum phlegmatis, reliquisque particulis subtilioribus, crassa tantum supersunt salia, sulphura coagulata & terrestreitas, à quibus Scirrhus pronascitur.

Si Jucci corporis ab aliquo viscere secerni soliti, vel ob majorem crassitiam, vel ob nimiam visciditatem in eo stabulentur, id est, si abundantioribus salibus crassis, aut copiosiore terrestreitate, vel uberioribus crassis sulphuribus ab acidis coagulatis præditi in eos perveniant tubulcs, qui angustiores fuerint, quàm ut transitum illis permittant, retinebuntur in illis vel salia ista crassiora, vel sulphura coagulata, vel terrestreitas, in iisque obstructions efformabunt, quæ à nova & consimili adveniente materia accrescens, perdurante verò particularum obstructum in parte remora, quod subtilius in iis superest, ab illis separatur, & exalatur, parumque magmatis restitatur, à quo nascitur Scirrhus.

Sic & animi pathemata causa præcæterica existunt Scirrhi, profundior enim durabiliorque mœror graviorque tristitia Scirrhorum plerumque causæ sunt. Anima enim tunc temporis unico tantum eique tristi objecto attenta, paucos amandat in corporis partes spiritus, sanguis illis non ditatis testudineo fertur gressu, paciorque ad cerebrum devehitur, quod fit, ut parciore in eo procreentur spiritus, tubulorum fibrillæ spiritibus non distente concidunt, illosque angustiores efficiunt, ac sanguinem difficiliter admittunt, nec illius circulationi properandæ, ejusque attenuationi promovendæ vibrationibus suis opitulatur: sanguine ergo requisita spirituum abundantia carente, particulisque illius sufficienter non volatilifatis, succi fermentitii ab illo secretivo-

latioribus particulis, à quibus ad munia sua peragenda maximè adjuvantur, satis abundè nequaquam ditati, alimentorum digestiones imperfectè operantur, crassiores alimentorum partes aptè non penetrant, nec dividunt, phlegmatisque salia terramque soluturis viam, ut par esset, non aperiunt. Cum sufficientia non adsint alcalia volatilia, alimentorum acida, uti conveniret, non absorbent, eaque compedibus soluta in alimentis reliquunt. Sulphura coagulata ab acidis non liberantur alcalicorum; quorum adest penuria, ministerio: chylus ergo ex tali massa elicitus, & venas lacteas subingressus, nullo negotio in illorum angustioribus moram trahit, vel quadam ex illius crassioribus sulphuribus ad arctiores glandularum tubulos devenientia, in ipsis remorantur, quàm ob molem eos præterfluere non valent. Hic verò chylus sanguini commixtus, & universas corporis partes cum eo pervagans, ad angustiores earum tubulos appellens, in iis crassiora sua salia, aut coagulata sulphura deponit, illosque obstruit: nec lymphæ à sanguine separatæ feliciore contingit fors; à sanguine crassiora salia, & sulphura ab acidis coagulata mutuatur, à quibus quadam illius vasa obstruuntur, humoribus itaque istis in partibus obstructis remanentibus particulæ illorum tenuiores, & ad motum aptiores evaporantur, solumque superest crassamentum, à quo progignitur Scirrhus.

§. II. Oedematis prognosis dubia est, quod per se prodicens mali est ominis, morbi enim chronici subsequenter indicia præbet; si verò tumor pedum Oedematofus phthisin vel hæmorrhagiam, vel hypercatharsin, seu dum hæc seribo, exemplum novi, succedit, pessimum est signum, & mortis sæpè adventum denotat; ubi lymphæ vel sanguis omni suo sale volatili fuerit fraudatus, &

suble-

subsequitur tumor œdematosus, uplurimum lethale existit signum. Ubi verò homines temperamentum roboris habent, in iis ratò lethale est. œdematosus hic tumor, diu tamen durat. Sic etiam particulares tumores œdematosi haud sunt periculosi. Rarò suppurantur hi tumores aquosi, propter visciditatem succorum stagnantium & defectum particularum volatilium & alcalicarum. Aliquando tamen ob nimiam compressionem vasorum nervorum, & salis volatilis defectum, in succis Oedemata transeunt in gangrenam & sphacelum, prout itale quid simile videmus contingere in Hydropicis.

*Scirrhi* quoque curatio difficilis est, ob materiz crassitiem, siccitatem, & particularum ejus intimiorem unionem & obstructionem pertinacem, & nulla sæpè est expectanda, imprimis si sensu penitus careat; sed aliqua adhuc salutis superest spes, si sensu aliquali donetur, ex hoc enim apparet, quòd obstructio non sit totalis, sed quædam fibræ & tubuli adhuc suum succum nervum & quidem volatilem oleosum recipiunt; hinc si *Scirrhi* sint in debilibus & emacitis corporibus, res periculi plena est. *Scirrhi* cum notabilem in se contineant salis vel acidi vel corrosivi copiam, simili existente sanguinis ac succorum constitutione, cum aliqua omnium functionum depravatione in subiectis ætate vel alia de causa debilibus, facillè at pede pressio in caneros degenerant, superveniente dicti salis vel acidi vehementiore motu: (vel si tandem fermentationem suscipiant, vel quando in tubulis circumvicinis, &c. oritur Inflammatio seu Erysipelas, vel quando intempestivè emollientia & discutientia fuerint applicata, &c.) quo tempore ardor ob speciem Inflammationis introductam sentitur, hinc particule acutæ scindentes commotæ, hic illic nervorum pro-

pagines dilacerant, unde dolor acutus pungens, scindens, partisque fibrillas disnectunt, omnis humoris adventus præcluditur, ipsaque gangræna, si non Sphacelus, (indicante id colore atro vel livido partis & venarum vicinarum partim, vel totaliter compressarum;) inducitur, sensim vel festinanter partes circumjectas inficiens, pro majore copia, acutè & motu corrosivorum, ipsaque subiecti dispositione, donec tandem magis prosperpens mors subsequatur. *Scirrhi* si ad suppurationem perveniunt facillè transeunt in Cancrum vel Fistulam pravam & ferè incurabilem.

§. 12. *Dieta* æquè in Oedematoso tumore ac in *Scirrhoso* observanda est, aliàs sæpè frustra medicamentis ages, cum ingurgitando cibos incongruos & aquam frigidam hauriendo affectus hos tantum augeas. Eò enim his in tumoribus pertinacibus curatio dirigenda est, ut succi spissiores ac aquosi incandantur ac sensim dissipentur, in quem finem Aer eligatur temperatus, contra fugiatur nimis calidus ac frigidus imprimis hyemalis, hyems enim œdematosi maxime noxia est.

Cibi sint copioso sale volatili repleti, & conducunt aromatici ac dulces gelatinæ alique, quæ succum nutritivum augent, eumque sale volatili replent. Potus, sic Theæ vel Caffè, in aqua tepida, in qua prius rad. chin. & lign. Sassafras fuerint cocta, vel vinum generosum, vel Gallicum, vel Hispanicum, modice tamen haustum.

Vigilæ & somnus non excedant mediocritatis limites. In motu seu exercitio semper sit æger, equitando, modò curru vehendo, modò ambulando se exerceat, sed ne quid nimis, per vehementiores enim motus corporis volatiliores avolant particule, remanentibus viscidioribus noxiis. Excreta & retenta sint in statu suo ordinario, exulent verò purgantia.

Ani-

Animi passiones omnes hic nocent, imprimis terror, ac morror.

*Galenicorū* §. 13. *Diata* pertractata, nunc curatio *Oedematis* phar-

ma-  
*dematis*.  
ceuticam, & quidem primum *Galenicorum*, qui *Oedema* curari asserunt, vel per resolutionem, vel per suppurationem, vel per indurationem: Primum requisitam ordinant *Diata*: Secundo humorem pituitosum præparant, & evacuant: Tertiò topica applicant, accidentia, & symptomata corrigunt. Secundæ intentioni satisfaciunt, decocti hyssopi in Hydromelite facti §. 1v. cum oxymelle scyllitico singulis diebus cubitum eunti propinando, dein sequens, vel simile phlegmagogum exhibent.

℞. Fol. fenn. s. fl. §. §.  
mechocann. alb. §. ij.

xxib. §. j.

agari §. in petia ligat. §. ij.

myrobal. chebul. aa. §. j.

infunde omnia per noctem in

11 aqu. hyssop. §. 1v.

Manè facta levi ebullitione in colat. dissolv.

Mann. el. §. j.

el. Diaphenic. §. ij.

M. F. potio.

In hoc affectu tam frigido non convenire ajunt venæ-sectionem, nisi fiat à mensibus retentis, in quibus aliquando eam permittunt. Topica *Ipsæ* sunt primò *aqua*, & *acetum*, unde ad *Oedema* curandum spongiam posca imbutam cum ligamento leniter stringente imponunt. Initium verò deligandi ab inferioribus partibus ducunt, & ad superiores partes progrediendo desinunt, spongiam verò novam esse oportet, si talis non sit ad manus, eam, quam habent, nitro extergunt, & melius etiam lixivio, quod stillatitium vocant. Si horum usu tumor non subsidat, paululum aluminis miscent. Valere ad idem ajunt mollissimum ex lucerna linamentum hoc eodem humore imbutum, & impositum, glaucium quoque utile esse narrant. Si verò inveteravit *Oedema*, particu-

lam oleo prius inungunt, deinde spongiam ex lixivio imponunt, arctiusque constringunt, atque ita tumori laxo medentur. *Ita* etiam *saivam* tumores hosce mirabiliter digerere, & comprimere scribunt. Idem præstare terram omnem pinguem, & magis etiam *Ægyptiam* volunt. In *Galenicorum* gratiam unam, & alteram adjiciemus formulam:

℞. Lixivii acerrimi §. ij.

aceti §. §.

olei §. ij.

M. Intingunt calidè lintecola, & *Oedemati* applicant. Quòd si tumor ad declinationem venerit, sequenti, vel simili utuntur cataplasmate:

℞. Sulphuris,

Farine fabar. aa. §. i. §.

stercoris columbini §. i. §.

mellis communis §. j.

decoct. rad. asphodeli q. s.

Coqu. ad consistentiam cataplas-  
matis, quod bis de die renovant. Alii tantum sulphur cum axungia suilla miscent, & inungunt. Alii Diachylon cum gummi commen-  
dant.

Quando *Oedema* ad maturatio-  
nem devenit, illud aperiant in loco inferiori, servata fibrarum re-  
ctitudine, vel ferro, vel corrosi-  
vo, vel medicamento rumpente,  
dein ulcus apertum mundificant,  
& digerunt terebinthina, vitello  
ovi mixta, cum pauca quantitate  
gummi ammoniaci in aceto soluti.  
Facta digestionem ulcus carne implent  
cum ungu. basilico minore lintecolis  
inuncto, & applicato, tandemque  
cicatrizant. Dolori occurrunt per  
unguenta relaxantia: ut unguen. de  
althæa, cum oleo anethino, cha-  
momæliano, lil. alb. Quòd si tumor  
in duritiem abierit, emollientia im-  
ponunt.

Scirrhum curant *Galenici* primò *Scirrhi*,  
*Diata* calcificante, & humefcente,  
secundo causæ antecedentis præpar-  
tione, & evacuatione, in quem fi-  
nem sequens, vel simile ordinant  
Melanagogum:

℞. Herb. adianth. nigr.

*epithym.**ling. cerv.**cusc.**capill. Ven. aa. Mß.**Myrob. Indor.**agaric. rec. troch. aa. 3ij.**fol. fen. f. st. 3.ß.*

His omnibus superaffundunt.

*Aq. fumar. bull. 3v.*

Stent per noctem, manè facta unica ebullitione, in expressione Colat. dissolvunt

*Manna el. 3iß.**Confect. Hamech. 3iij.**M. f. posio.*

Deinde, si malum oriatur ob hæmorrhoides obstructas, illas aperiant, & si ob menstrua retenta, provocant illa: si sanguis in toto redundet, aperiant basilicam sinistri lateris, foramine sat amplo, ut sanguini sæculento detur exitus: si obstructions in hypocondriis adsint, eas reserant adhibitis primò præparantibus, deinde evacuanti- bus, quæ sæpius repetenda esse volunt.

Ad Topica accedentes medica- menta, digerentia adhibent unâ cum emollientibus juncta. Inter digerentia recensent scenumgræcum, simum caprillum cum posca. Inter mollientia autem magni æstimant hoc in casu adipem, & medullam cervinam, item adipem taurinum, hircinum, & ursinum, item am- moniacum, bdelliumque, & styra- cem. Horum usu duritiem dissol- vunt additis digerentibus.

De volucris commendant adipe- m asnerinam, & gallinæcum, ac phasianum. Verum in tendinibus, ac ligamentis, lapidem igne candefa- ctum acerrimo aceto extinguunt, in quem finem æstimant lapidem pyritem, vel molarum. In hoc affectam partem commoveri vol- unt, quo exhalantem vaporem suscipiat, & postea rursus molli- togium imponunt medicamentum. Oleo tamen tenui ab initio, non aqua, partem perfundunt perpetuo singulis diebus, aliquando etiam altheæ, aut cucumeris silve- stris radicem in oleo incoquunt,

& applicant. A balneo verò in totum ipsis ægris abstinendum esse suadent, aut saltem a frequenti. Ubi verò Scirrhus moderatè fue- rit emollitus, ammoniacum pin- guissimum acerrimo aceto dilutum parti illinunt ad multos dies: post quos rursus mollitorio utuntur, quod galbanum, & opopanaca pinguisima recipit. Inter talia au- tem maximi faciunt id, quod ex perna fit, & Amythaoni inscribitur; aliaque in strumis commen- data.

§. 14. *Paracelsus* Tumorem *Oede-* *Paracelsi*  
*matosum* nullo modo vult aperiri; *curam in*  
sed defluxiones intrinsecus per Mer- *Oedemate*  
curium laxativum averti, posthæc externa sequenti modo applicari suadet.

*R. Caricar. 15j.**ol. granor. Junip. 3iv.**Farin. fabar. 3vj.**M. F. cataplasma super ignem.*

quod Tumori aquoso superponatur quanto calidiùs pati valeat æger. Commendat etiam sequens, vel si- mile Emplastrum.

*R. Farin. fabar. 15j.**sem. psyl.**cydonior. aa. 3j.**consolid. mat. 3iv.**Vini & aceti q. s.**F. Empl.*

In Scirrho quocunque sanando *Pa-*  
*racelsus* ex terebinthina, & litha-  
gyrio parata maximè æstimat, ad-  
hibito simul studio, ne in Can-  
cerum abeat.

§. 15. *Helmontius* Laticis igno- *Helmonti-*  
rantiam multam medendo, somnia *natura in*  
in oedematibus fuisse esse scribit, *Oedemate*  
turgidis nimirum sero eruribus,  
fossulam prementis digiti retinendi-  
bus, & manè evanescentibus pi-  
tuita à *Galenicis* ridiculè putata,  
nocturna digestionem in cruorem ver-  
sa. Et cum Author noster laticem  
acidum, & restagnantem ac-  
cuset, Oedemata sanare lapillum  
Butleri contendit. Externe verò  
radicem bryoniæ confusam, & in-  
star cataplasmatum applicatam admo-  
dum esse credit utilem, sicuti in  
aliis tumoribus aquosis sæpè salu-  
tare



tare præstitit auxilium.

In *Scirrhis* curandis gummata applicanda vult Author, quæ maximè resolvunt, in quæm finem laudat etiam sequens unguent.

ꝑ. *Ol. laurini* ꝯ viij.

*Olibani,*

*Masticis,*

*Gumm. Arabic.*

*resin. abiegna* aa. ꝯ iij.

Destillantur, dein repetatur destillatio, & quidem cineribus clavellatis, & habebis balsamum egregium.

In *Scirrho.*

Ubi affectus internus externum petit subsidium, ut *Scirrhus* unguina, de foris lapide calefacto, vel arena calida foveri jubet, idque se didicisse ait contuendo paleam, in aeno aquæ tepentis, sursum, ac deorsum velut à calore subter accenso commotam deambulantem; ideoque potenti calore appositâ unguenta animari, & spiritum suum cruori nostro jungere suspicabatur primum, deinde comperit, sic malum foras elici, sistique impulsionem symptomaticas. Et quæcumque Balnea agunt in toto, hoc idem calefacta foraque unguina absolvent in parte sine totius jactura. Later enim fovens, juxta Authorem, pellit odorem emplastri intrò attrahitque foras, quæ alias pigriora hærent, iterumque cum cruore spiritus impetus faciens attrahitur, dispergitur à calore, aliisque succedit suo loco, vim medicaminis haurit, & velut ebulliens intrò, revolvitur.

*Villisi  
modus  
vandi  
Oedema.*

ꝑ. 16. Quum *Villisi* prædictum affectum, Oedema nempe ex vitata chylosi, et hæmatosi provenire dicat, hinc ad affectum hunc curandum aquè interna, ac externa commendat. Inter interna, stomachica aromatica, item Elixir proprietatis, & Diaphoretica aliis præfert; sed quum serum non solum per poros sudoriferorum beneficio expelli debeat, et eorum secretio per urinas etiam sit promovenda, supradictis remediis diuretica adjungit. Tumori autem exter-

nè applicat cataplasma ex absynth. roremarin. origan. calaminth. chamom. &c. in lixiv. comm. vel vino decocta, quo decocto Tumor Oedematofum fovet. Cui usui inservit etiam aqua calcis vivæ, uti & lixivium ex cineribus samentorum.

*Scirrhus* verò Author statim imponit resolutentia fortiora discutientibus moderatis permista, ut sunt Gummi Ammoniac. Galban. &c. Ammoniac. ad hunc affectum tollendum plurimis extollit laudibus, sive solum in usum revocetur, sive cum empl. diachylo, vel aliis commistum. Si hæc debiliora fuerint, ad Empl. Vigon. dupl. cum Mercurio recurrendum esse jubet.

ꝑ. 17. *Sylvius* curam Oedematis *Sylvii* modum consistere ait in seri, aut pituitæ evacuatione, hinc præter purgantia phlegmagoga Author commendat varia diuretica, quæ simul impediunt novam pituitæ productionem, ac corrigunt simul acidum noxium, emendantque cætera inde orta vitia in sanguine pituitosiore, ac lerosiore, ipsum incidendo, & attenuando, in quem finem aliis medicamentis præfert omnia salia volatilia, & aromatica, quippe quæ & acidum temperant, & pituitam, seu serum incrassatum incidunt, hacque imprimis ratione juxta *Ipsum* urinas movent. Post hæc sudorifera commendat, quæ cum serum, tum pituitam foras propellunt, & sanguinem crassum incidunt, inter quæ cuncta volatili sale turgentia vegetabilia laudat, ut sunt radices apii, bardan. pimpinell. zedoar. chin. imperator. salisparill. fol. capill. Vener. scord. summ. cent. min. melilot. fl. chamomill. sambuc. lign. Guajaci, Sassafras, quercus, Juniperi, buxi, bæcc. Juniper. sambuc. ebuli, diascord. &c. Atque ex his varia forma parat medicamenta interna sudores moventia. Præter hæc commendat etiam Antimonium Diaphoreticum, Bezoarticum minérale ex eodem Antimonio, sed cum Mercurio sublimato in butyrum

prius destillato, hinc cum Nitri spiritu fixato confectum. Laudat quoque Bezoardicum Lunare, Solare. Salia etiam volatilia, atque olea stillatitia ex partibus animalium parata summopere aestimat. Præter hæc interna, & forinsecus quædam applicanda suadet Auctor, imprimis hic commendat balnea, tum aquæ dulcis, tum variorum decoctorum, tum spiritus vini, & laconica dicta. Sic quoque fatus ex aromaticis, & sale volatili constantibus vegetabilibus parare, & calidè applicare jubet, vel suffumigia varia ex iisdem, & gummosis instituit, emplastra, ac linimenta ex resolventibus parata magnipendit, ut sunt Carmin. Diachyl. de bacc. Lauri, de Gumm. Ammon. ungu. dialth. C. Ol. Philosoph. macis, &c. aliaque resolventia sæpè recensita.

*Scirrhus.*

*Sylvius* prælaudatus in affectibus *Scirrhis* ad viscositatem humorum corrigendam, in cidendam, & attenuandam, & sic obstructionem ab iisdem productam fortiorem resolvendam salia præscribit volatilia, frequentius in vino, vel liquoribus aliis convenientibus assumenda, siue sint ex animalibus deprompta, siue in vegetabilibus detineantur. Ad magis verò attenuandos, & leviter etiam evacuandos humores illos viscidos, & tenaces pillulas suas laudat magistrales ex gummi galbano cum resinis, castoreo, croceo, aloë rosata, & trochiscis alhandali compositas, alternis diebus deglutendas.

Externè olea & unguenta inungit emollientia, & dissolventia ex oleo laurino, Philosophorum, vel cataplasmata ex plantis aromaticis parata, nec non Emplastrum Carminans resolvendis humoribus inspissatis perquam aptum. Sic quoque omnia gummosa, & volatilia externè tumoribus *Scirrhis* imposita magnè aestimat.

*Cartesiano* §. 18. *Cartesiani* maximum locum in cant. studium in *Oedemate*, ut humor, siue lymphæ illa lutulenta, & coagulata quantocius resolvatur, at-

que fluidiore facta potiore ejus parte, recrementa crassiora, & reliquorum succorum miscelæ incongrua tum per urinam, tum per sudorem eliminantur. Hoc verò eorum propositum, quo citius obtineatur, attenuationi lymphæ crassioris sedulo incumbunt remediis internis, in materiam lutulentam particulis suis volatilibus, mediante æthere subtilissimo easdem excitante, faciliè agentibus, quoscumque tubulos perreptantibus, & calorem ob suppressum motum inductum in succis resuscitantibus, quem scopum sequenti ferire tentant vino medicato.

*Rad. Imperator. 3 ii j.*

*Valerian.*

*enul. 22. 3 ij.*

*eryng.*

*aristol. 22. 3 i β.*

*Salsaparill.*

*contrayerv.*

*fraxinell. 22. 3 j.*

*Herb. salw.*

*chamedr.*

*scabios.*

*verben.*

*menth.*

*fol. rorismar. 22. M β.*

*summit. thym.*

*centaur. min. 22. P j.*

*flor. sambuc.*

*schœnanth. 22. P β.*

*sem. dauci 3 ii j.*

*ligni fraxin. 3 ii β.*

*Sassafr. 3 i β.*

*Salistartari 3 j.*

*abynth.*

*armoniack 22. 3 β.*

*costi amar. 3 ij.*

*cinamom. 3 j.*

*F. Species* pro Nodulo uni & dimidiæ mensuræ vini impendendo. Locum, in quo æger decumbat, calidum esse volunt, ut calor externus cum remediis intro assumtis simul coopereretur, & tum quovis manè de prædicto vino 3 ij. ægro oedematoso propinant. Absumto eo, & urinæ fluxu satis promotum, ad sudorem eliciendum progrediuntur, exhibentque ægroto de sequen-

quenti mixtura quotidie duo cochlearia :

*R. Aq. Angelic. ʒi ʒ.*  
*rorismarin.*  
*chamedr. aa. ʒi ʒ.*  
*Spir. Iunip. ʒiii.*  
*flor. sambuc. ʒi ʒ.*  
*Tartar. ʒi.*  
*Arm. cinamomif. ʒ ʒ.*  
*Syrup. Scord. ʒi.*

*M.*

Internis hisce simul jungunt externa, frequentesque instituere iubent frictiones panno lineo calefacto, & succino, mastiche & gummi sandarachæ probè infumato; fomentationes etiam suadent ex herbis salviæ, origani, foliis rorismarini, baccis lauri, juniperi, floribus sambuci, camomillæ, semine cumini, stercore columbarum, sulphure & Sale Armoniaco, quibus peractis spirituosa penetrantia & fortiter solventia illinunt, ut coagulatio lymphæ dissolvatur, humorque fluidior redditus vel ad ductus urinariorum devehatur, vel per poros partis affectæ exstillet, ubi tamen sedulo advertere præcipiunt, ne humor falsior fibras cutis erodat, & inflammationem vel gangrænam in eadem suscitet, laudantque sequentem imprimis mixturam spirituosam.

*R. Spir. Iunip. ʒi ii.*  
*flor. sambuc. ʒi ʒ.*  
*Essent. Valerian. ʒ ʒ.*  
*salv. ʒ iii.*  
*Spir. Camphor. ʒi.*  
*Ol. stillat. cumini ʒ ii.*

*M.*

Cataplasmata etiam imponunt ex herbis scordii, rutæ, foliis rorismarini, floribus camomillæ, sambuci, baccis lauri, stercore galinarum, farina lupinorum, fabarum, semine cumini, sale Armoniaco & croco cum lixivio & spiritu vini parata, vel emplastrum de baccis lauri sequenti modo præscriptum:

*R. Emplast. de bacc. lauri ʒ ii.*  
*ol. stillat. cumini ʒ ii.*  
*camomill. q. f. promalaxat.*  
*D. in usum.*  
*Tomus II.*

Mutato Oedemate particulari in leucophlegmatiam universalem, sive anasarcam, cum magno seroti tumore malum hoc ut plurimum experti sunt incurabile, quod nullis remediis, etiam aliis penetrantissimis & maximè solventibus potuit emendari.

Scirrbo tumori fortiora adhuc adhibent emollientia, particulis volatilibus spirituosis prædita, internaque commendant aperientia ex martialibus, aliisque cephaceam materiam destruentibus, ea de causa sequentibus speciebus medicatum vinum extollunt:

*R. Aq. petroselin. ʒiii.*  
*apꝑ ʒ ii ʒ.*  
*bardana ʒ ii.*  
*peucedani,*  
*Ireos aa. ʒ i.*  
*Herb. Calamenth.*  
*rut.*  
*scord.*  
*Agrimon.*  
*parietar. aa. M ʒ.*  
*flor. anthor ʒi.*  
*cort. fraxin. ʒiii.*  
*Petrioli Martis ʒi.*  
*ocul. cancer. ʒi ʒ.*  
*sem. levisic. ʒ i.*

D. ad Chartam pro nodulo uni mensuræ vini impendendo. Hoc absunto sequentem mixturam quovis die bis, manè & vesperi, ad cochleare unum exhibitam pro majori dissolutione materiæ incrassatæ maximè judicant idoneam.

*R. Aq. genistæ ʒ i.*  
*puleg. ʒ vi.*  
*rorismarin. ʒ iii.*  
*Essent. scrophular. ʒi ʒ.*  
*croci Martis ʒ i.*  
*Spir. Arm. carvat. ʒ ʒ.*  
*Syrup. scabios.*  
*sumar. aa. ʒ ʒ.*

*M.*

Pulveres etiam laudant ex oculis cancerorum, crystallis tartari, croco Martis, Sale succini, & ejusmodi aliis paratos. Inter topica deprædicant primo spirituosa ex essentia scrophulariæ, spiritu gummi Ammoniaci, sal. Arm. cum calce

viva parato, spiritui camphora, matricali, cataplasma ex facibus vini cum sulphure & semine carvi, ex farina fabarum cum semine sinapi, deinde oleosa, ut oleum petrae album, succini, silicium, Philosophorum, & tandem unguentum de arthanita, emplastrumque de gummi Ammoniaci, quod cum pauca quantitate butyri antimonii mistum etiam tumores solvit quam durissimos.

vel Aqu. fl. sambuc. chamæpyth. quæ Essentia nuper curavi virum 50 annorum Oedemate laborantem, adhibito externo Emplastro de cuniino cum ol. Tart. & succin. malaxato: incidentia ex variis radic. herbis aromaticis, baccis & seminibus oleosis egregiam asserunt opem; sic etiam pulveres incidentes non contemnendi sunt.

*R. Ocul. cancr. pp. ij.*

*spermat. ceti 3℥.*

*rad. ari. j.*

*Sale absynth.*

*Sal. Armon. de par. aa. gr. xij.*

*fecul. brion. 3℥.*

*C. C. volat. gr. vj.*

*M. f. pulvis cuspidatim exhibendus.*

Decoctum radices bryoniae saepe solum sufficit interne exhibitum ad Oedematosos curandos affectus. Hic etiam omnia ea conveniunt medicamenta, quæ in Hydrops proficua sunt, cum verò hæc alibi ad nauseam dixerimus, ea repetere non libet, tantum addamus pauca de Mercurialibus, quæ graviori in casu circumspicere tamen usurpata efficacissima sunt, incident enim & educunt viscositatem sale vel potius acido sætam, per glandularum salivarium tubulos (cum viscosis transmittendis forsitan nullæ in corpore aquæ sint aptæ viæ seu partes) dilatatos à prægrediensculis Mercurii particulis magis vel minus, prout majori vel minori copia spicula acida acutiora, vel secus, vel magis vel minus extra ordinariam earum superficiem eminent. Salia volatilia diu usurpata omnem sæpè in Oedematosis Tumoribus implent paginam, oleosis & incidentibus juncta.

Externæ etiam Topices applicatis viscosæ, stagnansque materia etiam est attenuanda, fluidiorque reddenda, tum actuali calore, tum particulis activis simul cum diluentibus adhibitis, ita ex gr. fomento vel balneo ex Sulphure, Sal nitro, cineribus clavelatis, sale armoniaco, absynth. ruth. cicut. malv. fl. chamomill. sambuc. & similibus vi-

no

*Notura.* §. 19. Perspectis aliorum sententiarum de Cuta Tumorum Oedematosis ac Scirrhorum, nunc & nostram deponamus crisin. Curatio ergo Oedematis principalis est interna, & in sanguinis ac scorum intemperiei correctione, obstructionumque reseratione versatur, introducendo in sanguinem & succos tales determinatas particulas, quæ impedimenta sufficientis motus sanguinis tollunt, aminiculaque ejusdem restituendi suppeditant, & obstructiones reserando occasionem debite per partes circulationis sanguinis exhibent. Tumores ergo hi aggrediendi sunt remediis incidentibus & simul attenuantibus, succorum crassitiam & stagnationem resolventibus, ut fluorem pristinum recipiant, & tubuli ab obstructione liberentur, quod præstari potest fixis Diaphoreticis, & salibus simul volatilibus incidentibus armoniacalibus, quodvis angulare domantibus, & fixam inde coagulationem destruentibus, adeoque tali vel simili mixtura curatio inchoanda est:

*R. Aqua absynth.*

*aperitiv. aa. 3 j.*

*menth. 3℥.*

*Essent. agrimon. 3 ij.*

*centaur. min. 3 j.*

*Spirit. Sal. Armon. 3℥.*

*Syr. scord. 3 vj.*

*M. detur cochleatum.*

Vel:

*R. Tinct. Hexpart. sine acid. parat.*

*3 ij.*

*Spirit. Juniper. 3℥.*

*M. detur ad 30. guttas in vino.*

no vel urinæ incoctis pars affecta calidissime fovetur, vel immergitur, fasciis longioribus debito strictius deliganda, quo vasorum amplitudo debito major auferatur, h. e. quo debita vasorum Diametri proportio respectu floris continendi restitatur. Fotum sequentem extollit Dn. à Guldenclee.

℞. *Herb. potentill.*

*arthemis.*

*pilosell.*

*betonic.*

*salv.*

*rorisn.*

*origan.*

*absynth. aa. M j.*

*fl. chamomill. M i β.*

*cent. min.*

*summ. aneth. aa. M j.*

*bacc. lauri 3 j.*

*Iunip. 3 iv.*

*salis marin. 3 i.*

Coq. in Aqu. pro Fotu.

Si autem adhuc fortiora desiderentur auxilia, applicetur cataplasma magis vel minus resolvens ex his vel similibus, ruta, absynth. scord. cicutat. aneth. cucur. rad. bryon. cort. sambuc. ebul. bacc. lauri, fl. sambuc. chimom. sem. anis. fœnicul. cumin. Sal. nitr. Sal. Tart. fab. tost. gum. Ammoniac. Labdan. Ex quibus omnibus vel Epithemata, vel Essentiz, vel Extracta, vel Cataplasmata, vel Fomenta, vel Emplastrâ parari possunt, quo præstantius nullum est sequenti de Labdano.

℞. *Ol. olivar. ℥ i β.*

*Lithargyr. aur. ℥ i 3 iv.*

*Coq. s. a. ad consistent.*

*add.*

*Cera citrin. 3 xi.*

*Colophon.*

*resin. pinia. 3 ii.*

*Gum. Galban.*

*Ammoniac. aa. 3 i β.*

*Elemi 3 i.*

*Labdani 3 iii.*

*Ol. Lauri 3 iv.*

*Axung porcin. 3 ii.*

*Cervi 3 i.*

*Storac. calam. 3 β.*

*rad. irid. flor.*

*bryon. aa. 3 ii.*

*Sem. cumini 3 i.*

*Bacc. lauri 3 vi.*

*Flor. chamomill.*

*melilot. aa. 3 ii.*

*Herb. sabine,*

*f hy-ni aa. 3 β.*

*M. f. l. a. Emplastrum.*

quod egregias possidet vires in tumoribus quibuscumque discutendis, imprimis in cedematosis sequens *Ceratum de Cumino* nobis in usu esse solet.

℞. *Cera citrin.*

*Empl. Diapalm. aa. 3 viii.*

*ol. lil. alb. 3 xi.*

*ungu. martias. 3 iv.*

*sem. cumin. subtiliss. pulv. 3 v.*

*Sal. Armon. depurat. 3 β.*

*M. f. l. a. Empl.*

Conducet etiam Emplastrum Diaphoreticum *Mynsichii*. Hic quoque proderunt suffumigia ex resinosis ac gummosis volatilibusque instituta, & à tumoribus excipiendi, vel oculi imponantur ex prædictis speciebus parati, additis sale Tart. & Armon. Alii commendant raphanum, alii fermentum panis, alii rutam pedibus Oedematosis imponenda. Liqueores quoque spirituosius externè illinendi sæpè sufficiunt, ut sunt Spirit. vin. Camph. lumbricor. flor. sambuc. Sal. volat. oleos. & similia.

*Scirrhi* vix nisi initio sui curationem suscipiunt, hinc eò incumbendum est, ut succi indurati emolliantur, coagulum spissius resolvatur, & quicquid magis, quam decet, ad motum excitetur, ita enim non modò omnia reddi fluidiora speramus, sed & poros simul fore apertos, & evaporationem debitam re-mentorum iri promotum, eaque propter digerentia propinamus. & tubulos obturatos reserantia, in quem finem interna & externa exhibenda sunt remedia. Inter interna conveniunt, quæ vim volatilisandi habent, ut sal. volat. viperar. Essent. viperin. Zvelf. Tinctur. Antimonii Tartaris. Spirit. Sal. Armon. aromat. chalybeata seu Martialis quoque conveniunt, ut Verriol.

Mart. Tinctura Martis aperit. Tinctur. Tartari, liq. terr. fol. Tartari. Vina medicata paranda sunt ex incidentibus & aromaticis, ex. gr.

*R. Rad. aron.*

*pimpinell.*

*enul. aa. ʒ. ʒ.*

*Herb. abrotan.*

*calaminth.*

*maioran.*

*Salv. aa. M. ʒ.*

*ʃ. ʃlachad. Arab. Pii.*

*bacc. Iunip. ʒ. iii.*

*limat. Mart. ʒ. ʒ.*

*cast. lign.*

*cinamom. aa. ʒ. ii.*

*Sal. Tart. ʒ. iii.*

*Sal. Armoniaci ʒ. iii.*

*M. f. species* pro nodulo unimenturæ vini imponendo : vel ex crystalli Tartari, croco Martis aperit. & Sol. fulminante fiat pulvis, cuius dosis est quantitas in mucronecultri contenta, in sequenti vel simili vehiculo propinanda.

*R. Aqu. apertivo. ʒ. ii.*

*cinnamom. bugloss. M. ʒ. i.*

*Tinct. Iuniper. ʒ. iii.*

*Spirit. Iumbric. ʒ. i.*

*Vitrioli Mart. ʒ. ʒ.*

*Syr. scord. ʒ. i.*

*M. detur ad vitrum.*

Vel:

*R. Ocul. cancr. pp. ʒ. i.*

*croco. Mart. aperit. ʒ. ii.*

*arcan. ʒpl. ʒ. i.*

*Camphor. gr. iii.*

*Sal. cent. min. ʒ. ʒ.*

*M. f. pulvis*, qui per vices exhiberi potest. Tinctur. Vitrioli Mart. in uteri Scirrho communicata etiam hic conducet. Quoad externam curam Scirrhii attinet, idem difficilis est, quo enim magis emollitio tentatur, eo sepius simile malum latius extenditur, discutiendibus fortioribus etiam ita indurantur hi tumores, ut tandem degenerent in materiam quandam calculosam. Prout autem partem internam vel externam, vel secus lacentem obfesserint, recentes, vel inveterati cum pluribus adjunctis variæ generis acutis, vel discuti-

& emolliendi vim habent, ) vel fortè fortuna suppuratione tentanda ; sic post debitam fomentationem aliquando non frustra cataplasma ex rutha, absynth. malv. fl. sambuc. ebul. rad. bryon. bacc. lauri, sem. cumin. feniculi. Sal. Tartari, Nitri, subis, &c. vel malleagma ex gummi Ammon. bdellio, galbano cum terebinthina sæpè & Mercurio, vel Empl. de Ran. c. Merc. quadrupl. vel Empl. de cicut. cum gumm. Ammoniac. vel unguent. archanit. cum Theriac. & succo Bryoniæ, pluraque similia applicanda esse monemus. fortiora enim hic affectus requirit remedia, quam tumor Oedematosus, Empl. Divinum, de Labdano, de Cumino, cum aliis juncta sæpè magnum edunt effectum, modo tumor exsistat curabilis. Emplastrum nostrum de herba Theeparatum in dissolvendis tumoribus rebellibus egregium est, quod est sequens :

*R. Gummi. Galban. ʒ. iii.*

*Sagapen.*

*Ammoniac. aa. ʒ. ii.*

*Solv. in ol. terebinth.*

*add.*

*Gumm. Elem. ʒ. i. ʒ.*

*ol. C. C. ʒ. vi.*

*Tacamahac. ʒ. ii.*

*Tart. fetid. ʒ. i.*

*Camphor. ʒ. i. ʒ.*

*Myrrh. ʒ. iii.*

*Pulv. herb. Theæ ʒ. iv.*

*Sperm. ceti ʒ. ii.*

*Picis ʒ. vi.*

*terebinth. ʒ. v.*

*colophon. ʒ. ii.*

*Sal. volat. sicc. ʒ. i.*

*Tart. ʒ. ʒ.*

*Cera q. l.*

*M. f. l. a. Emplastrum* quod resolvit & discutit pertinaces ac scirrhosos tumores, confert & plurimis aliis affectibus externis ; vel

*R. Spir. formicar. ʒ. ii.*

*camphor. ʒ. iv.*

*Sal. persicar. ʒ. i.*

*M.*

quo remedio illinantur Tumores Scir-



Scirrhus. Qui Scirrhus in perfectum transit cancerum, nullis externis remediis ( nisi forsan valde exiguus in parte quadam externa, ) curatur, cum sit perfectus Sphacellus, qui tantum iis ( ut ajunt ) exacerbatur, h. e. introducta majori agitatione, facillimè ulterius proserpit, verum si latuerit tali in parte, quæ excissionem admittit, nullis circumstantiis impediens, totus quantus radicaliter extirpandus est; si autem nec externis remediis debite tolli possit, nec ferro locus sit, vix quid tentandum, imò nec internis quidem, cum à minima agitatione virtus ejus circumvicinas inficiat partes.

morbis enucleandis prolixiores sunt, & quidem ad nullum usum inde resultantem, ad utiliora absque ambagibus nos conferamus. Cancer vulgo describitur, quod sit tumor lividus, durus, ab initio parvus, renitens, dolorificus, in partibus glandulosis obveniens, ab acidis, Vetriciosis sale alcalino subtili junctis particulis, & ipsas glandulas devorantibus, productus.

Nos verò cum breviter describimus, quod sit gangræna glandularum à succo sensim ac sensim acidior, & acriore facto partes adjacentes corrodente, cum dolore partis affectæ molesto oborta.

*Cancer quid?*

Differentiæ quoque Canceri multiplices sunt, alius occultus est, seu non exulceratus, alius manifestus, sive exulceratus, alius quantenus indolens, alius doloris plenissimus, alius lentus, alius citò prodians, alius superficialius, alius profundus, alius concentratus, alius dispersus; alius totum obidet corpus, cujus Elephantiasis exemplum esse potest ex mente Arabum, alius duntaxat partem aliquam glandulosam occupat; v. gr. mammam, labia, nasum, pudenda, &c. Alius ex occasione externa prodit, ut compressione, contusione, &c. alius ab interna oritur causa.

§. 2. *Locus affectus* seu sedes nativa vel subjectum, quod vocant, *Pars affecta*, Canceri sunt *partes* omnes corporis nostri *glandulosæ*, quæ maxime dominio huic subjacent, quæ glandulæ ex vasculis aut exiguis vesiculis, liquore à sanguine diverso repletis sunt coagmentatæ, sed quia hæcenus nullum est vas, quod aliquid ad glandulam afferat, præter arterias, quæ ad illam sanguinem advehunt, igitur credimus, liquorem istum quandam esse portionem sanguinis arteriosi, quæ ab eo separata fuit vel à vasculis, vel à vesiculis & quæ in ipsorum cavitate cumulata est, unde accidit, ut liquor ille semper à glandula effluat per canali-

cu.

## C A P U T VIII.

### *De Cancro seu Carcinomate.*

#### §. I.

**A**Rtis nostræ Apollinæ Proceres de nominibus magis, quam de rerum momentis solliciti, huic affectui, sumpta à Cancro in aquis degente similitudine *Canceri* nomen indidere, vel ob capacitatem, qua rei semel prehensæ hamulosas chelas pedesque ita insigit, ut difficilis sit extricatio, graveque effugium: vel ob venarum subnigrarum, tanquam radicum viroso fermento gravidarum dispersionem, qua pedes Canceri marini divaricatos exprimit, quam verò significandi diversitatem, ut & alia Philologis & Lexicographis potius relinquamus. Dicitur & Carcinus, item tumor canerosus, Carcinoma non exulceratum, phagadana, item lupus ( *der Krolf* ) ulcerato magis tribuitur. Noli me tangere dicitur, quia malum hoc tangendo sapientis exasperatur, & exulceratum significat cancerum. Missa ergo Etymi indagine, qua plurimi auctores in

culum, qui ab ea proficiscitur, & quem canalem excretorium nominamus. Differentia, quæ intercedit inter liquorem istum & sanguinem, ab illa sententia nos deterere non debet. Quum enim sanguis ex principiis heterogeneis constet, certa quadam portio unius, vel plurium ex hisce principiis, à sanguine segregari potest, & excipi cavitare vasculorum aut vesicularum glandularum. Et quia sanguinis principia in hoc liquore sine debito numero, sive ea, quæ par est, proportionem, ut sanguinem conficiant, non adsunt, liquor, qui ex hac coagmentatione exsurgit, debet esse liquor à sanguine differens. Omnes ergò glandulosæ partes si refertæ sunt liquore corrosivo, facillè corrodi possunt, ex quibus mamme compositæ sunt, quæ reliquis sunt capaciores, ita ut juxta *Paracelsum* ad solas mammas foeminarum, & scapulas virorum sedes Canceri restringatur, uti alias etiam affectuum injurias fomitis instar in se suscipiunt mamme: cancer etiam nec labiis, genis, oculis, axillis, inguinibus, partibusque genitalibus in lascivix poenam parcit, nec ostia penitus labis hujus immunia existimamus, licet alia forsitan facie & nomine, *Cariæ* scilicet, veniat.

*Diagnosis.* §. 3. Ut Canceri *Diagnosis* paucis attingamus, notum est, quod Cancer occultus ab inirio vix nisi per specialiora irritationis indicationes, punctiones, &c. oculatissimo etiam Medico suspicionem movere potest; sunt, qui præsentiam Canceri occulti ab initio colligere fatagunt, si nempe leniens & emolliens Medicamentum tumori imponatur, & post duas vel tres horas tumor non cedat, sed in spongiosam abeat substantiam, crescente dein malo; sed nec huic fidendum est, nam haud malum faciendum est, ut inde eveniat bonum. Cancer verò nobis manifestus apparet, non tantum ex tumoris inspectione, sed quoque si

dolor nunquam desit, & noctu exasperari soleat. Exesa autem cute si prorumpit, fit ulcus horrendum, cavernosum, & hinc dicitur *Cancer exulceratus*, estque inæqualis cum tuberculis & carunculis; deinde dolor ferè est intolerabilis, & æger non aliter dolorem percipit, ac si mille aciculis pungatur. In artatu est durus & obstinatus, aliquando etiam mollis, maximè enim foetet Cancer exulceratus, ex quo effluit materia foetida ac ichorosa, interdum flava, labia ulceris sunt crassa, pratumida, foris inversa, venarum & arteriolarum extremitates à glanduloso ac corrosivo liquore exeduntur ac corroduntur, hinc larga sæpè sanguinis profusio sequitur, carnes vicinæ depascuntur, sæpe ita, ut absumentis musculosis partibus in ipsam thoracis cavitatem inspicere possimus, imprimis in Cancro mammarum, febris adest lenta cù secessionem particularum ac turbatam sanguinis mixturam, cibi quandoque est fastidium, sæpè & animi deliquium, in pluribus tandem subsequitur hydrops, quam excipit ipsa mors. Quæ omnia phænomena tristia observavimus in virgine honesta Hep dicta placidè & piè demortua. Alium puerum in vicino pago *VVolfsanger* dicto vidimus, cujus nasus, labia, oculi & tota facies ad collum usque, horrendo ac abominabili sanè spectaculo erant depasta, qui & sic miserè vitam suam finivit. Plures alios quoque contemplati sumus, inter quos plures reperimus, in quibus vermiculi vivi ac mortui prodierunt. Confer etiam *Ephem. German. nostr. Ann. 2. observ. 148.*

§. 4. Circa hujus affectus gravissimi Canceri causam magnæ occurrunt difficultates, & dissidia apud Authores, imò adeò ipsis occulta fuit ejus causa, ut *Platerus* maluerit ignorantiam suam hic fateri, quam credulæ assentiri Antiquitati.

Tota enim *Antiquitas Galenica* Can-

*Ætiologia  
Canceri  
causam  
Galenica  
est.*

Cancrum ab atra deducit bile, hinc accufant Jecur calidum & ficcum, lienisque intemperiem calidam & ficcam, quæ juxta ipsos congenerem profert sanguinem, ablegatque, ad partes exteriores, ibique Cancros phagadenicaque ulcera producit. In omni corporis parte Cancrum nafci poffe dicunt, verum in mammis mulierum maximè abundare, eò quod laxæ fint & materiam quàm craffiffimam promptè fufcipiant. Ex atra enim bile effervefcente Cancros produci ftatuunt *Veteres*, & fi bilis acrior fuerit cum exulceratione, quapropter colore etiam nigriores fint inflammationibus citra tantam caliditatem. Venas verò repleri, & circumcirea tendi ad fimilitudinem pedum Cancri animantis fcribunt, unde etiam hanc appellationem morbus habet. Cancri ergò *caufe* remotæ, ad mentem *Veterum*, funt omnes eæ, quæ fanguinem aduftum generant & melancholicum, ut funt carnes infumatz, allium, porrum, capæ, legumina, vigilie, &c. Internæ verò funt obftructiones, v. gr. hæmorrhoidum, menftruatorum, calida jecoris intemperies & lienis imbecillitas: caufa conjuncta eft fanguis aduftus melancholicus, feu melancholicus præternaturalis, qui ubi acrior eft redditus, ac contumacior in venis impactus, & putrefcit, Cancrum facit exulceratum, ubi verò mitior eft, non exulceratum producit.

*Paracelsum.*

§. 5. *Paracelfus* ftrenuus ille Reformator ponit *caufam* Cancri in Colchotare vel Realgare Microcōmico, prout enim Colchotaris conditio eft, circum fe rodere ac abedere, quum ab eo feparatum fuerit, à quo temperatur, ac tum pro fitu fuo corporis aliqua parte fuam tyrannidem exercere: non fecus Colchotarinum fal acutum eft materia producens Cancrum, fub hac videlicet differentia, quòd viris ex hæmorrhoidalibus fluxionibus, fœminis autem ex menftrualibus obveniat. Ex his colligit, Canci

fitus & loca non alibi fore poffe, quàm ubi fluxus ejusmodi fibi centrum faciunt. Nec alio fe fe loco ponere poffunt, quàm ex hæmorrhoidibus inter fcapulas, & ex menftrualibus ad pectus. Notat etiam, fluxus menftruales acutiffima falia continete. Quare fi corrofiivi falis in matrice fieret hujusmodi feparatio, ut à menftruo fejungeretur, Cancrum, ut fuprà dictum, & pravam lentiginem ibidem oriri poffe non dubitat. Effe etiam in hujusmodi fale realgaris quendam concurfum fcribit, qui quidem in fale Calebino minimè fit. Cancer ergo *Paracelfo* eft Apoftema, quod ex hæmorrhoidalibus effluxionibus provenit in viris, atque mulieribus ex menftruatorum corrofiivo fale meatuum in locuftis manifeftato, cujus falis duplex eft, plumofi videlicet ac arfenicalis differentia. Idem Author in Cancro fal caufticum virulentum, & necrofin partis affectæ producens accufat, innuitque his verbis Germanicis: *Dann fo das Saltz ſich erhohet und befondert ſich, was iſt es als ein freſſend ding, wo ſein hoſſart ligt, da naget ſie und friſſet, aus dieſem freſſen und nagenda entſpringendie Ulcerationen, Cancer, Cancrena.*

§. 6. *Helmontius* in pluribus *Paracelfi* fidelis afſecta, Cancrum à fale alcalico corrofiivo deducit, lumen enim ait, formale virulentum fubnatum in vita noſtra, fit ipſum vivens, adeoque prout Archeus rabidus fermentaliter contagium eternum fufcipit, ita & in Cancro aberrans, fe transplantat in furors, quibus carnem topicè infeſtat. Nam uti ille loquitur, ſive deferantur intrò, per accidens externum, ſive verò intus ſuſcitantur, adeoque hætenus aliquàliter differant, quoad initium principiativum. Quædam ſubito ſe propagant in totum, & necem mox inferunt, alia verò topicum venenum exercent, eò quòd horum proprietas eſt penetrare ex natura veneni, ſe dilatat tantum juxta præſcriptum fui veneni. Cancrum

crum quoque à contusione factum in muliere notavit Author. Verrum tamen Cancrum ad mentem Paracelsi in ubere & utero mulierum dumtaxat esse statuit. Cancrum etiam in carne acutissimi sensus, & continuæ excisionis esse scribit, hinc à sale caustico ejus causam deducit proximam.

Villifium.

§. 7. Sanguis ex Villifii opinione materiam nutritioni necessariam supeditat, succus verò nervosus formam ipsi confert, illamque partibus assimilatur, ac in earum substantiam convertitur: atque hoc pacto refarcitur detrimentum, quod passæ fuerunt partes, ipsarumque accretioni impenditur opera; dum siquidem nervosi humoris crasis inculcata subsistit, nulloque vitio inficitur, sanguinis particulæ nutritioni accretionique dicatur debita congenerique donantur forma, & proportionata partibus exhibetur alimonia. Alieno verò & heterogeneo quodam fermento latice nervoso commistus humor, ab arteriis pro alimento suffusus, degenerem induit formam. Si enim ob exhaustos depressosve spiritus, copiosoremque aquosarum particularum ab intensiori sulphuris efflagratione dissipationem, sal nimis evahatur, fluoremque patiatur, sanguis atrabiliarium diathesin consequitur ab exaltatis salibus fixis, crassioribus sulphureis in massa residuis conjunctis. Cruor verò ad glandulas perveniens, crassiores atque coagulatas, quas sibi admittas habet particulas, per arctos ipsarum canales abripere non valens, eas in ipsis deponit. Liquor autem nervosus eadem, qua sanguis, labe infectus, per fibras nerveas ad partes, in quibus relicta fuit atrabiliaria ista materia, & nutriendis partibus improporcionata, appellens, tumorem ex ea cudit, qui ob similitudinem ipsi Cancer denominatur. Villifius ergo à liquore acetoso instar liquorum à buxo & aceto exstillatorum Cancrum produci statuit.

Sylvium. §. 8. Sylvius Cancrum produci

existimat in glandulis, partibusque glandulosis ab acido acri. Docuit enim ipse abundè, in glandulis succum subacidum à sanguine secerni, eundemque succum acidum in ipsis contemperari à spiritibus animalibus per nervos ad easdem delatis, & si acidum reddatur in corpore acrius atque in glandulis fecerni solitum, quoties redundat, facilius partes has ladet, quam alias. Ab acri enim acido Cancrum generari comprobatur, quia cum comitari solent dolores lancinantes acidi acris proditores, item quoniam acidum concentrantibus ac contemperantibus eundem leniri contendit.

§. 9. Cartesiani glandularum obstructionem ad Cancrum producendum, quam maximè existimant accommodatam, quam inferre volunt liquorem viscidum è sanguine per arteriolarum meatus in ductus glandularum delatum, abs quo cum segregatio & transitus lymphæ per easdem impediatur, tumores primò in glandulis suscitari dicunt tenaces absque ulla corrosione, sed quum lymphæ non valens transire diutius circa obstructions istas detineatur, subtiliores particulas ab æthere sapius commotas tandem à reliquis secedere & exhalare, quibus absumentur particulas acutas & mucronatas, ante à blandioribus ramosioribus & porosis iisdem intermixtis sub jugo servatas, dominium adipisci, & angulis suis non modò succis & fibris firmius inhzere, sed eorum etiam extremitatibus acutis fibras destruere & erodere, quæ ramenta angulis quibusdam intermixta, sanguini ex destructis arteriolis effuso communicentur, & miscelam ex diversis istis succis constituant, quæ per venas debetè nequeat transfluere, nisi ubi venæ istæ magis dilatantur, & propterea sanguinem istum corruptum, & plurimis particulis angularibus acutis, sive acidis, refertum, & in venulis circa tumorem istum sive

Cartesiani.

sive glandulas obstructas constitutis hærentem, pedes illos cancerinos subatros intuentium oculis exhibere, cum radii lucis in poros venularum istarum distensarum quidem, sed simul etiam obstructarum incidentes aliquomodo suffocentur. Ex vellicatione quoque fibrularum membranarum, & nervosarum à particulis istis angularibus dolorem induci, & si portio quædam succi chylosi reliquis acidis immisceatur, suppurationem partis cancerosæ cum salutari quodam eventu & canceri extirpatione, dum omnino circumcirca cancerum istum contingat, subsequi docent. Lapsum sæpe aut percussione affectui isti anam præbere affirmant, quatenus violenta ista concussione textura unius vel alterius glandulæ destruat, & lymphæ percolatio inhibeatur, liquor verò hic circa tubulos destructos diutius hærens corrumpatur, & acidam istam acquirit dispositionem, quod itidem contingat, si tuberculum aliquod glandulosum diutius & fortius unguibus scalpatur, ut hoc etiam modo tubuli quidam destruantur, & succorum diversorum debita impediantur segregatio, & per distinctos suos ductus ad varias corporis partes distributio, volatiliores enim partes faciliè secedunt, & asperiores angulares arctius copulantur.

§. 11. *Norin* *Cancro* explicando, ejusque causam perspectam reddendo supponimus, per glandulas fieri secretionem liquoris, quem glandulæ à sanguine sequestrant, eumque semper eundem esse. Attamen idèò imaginari nullo modo debemus, omnes glandulas consimilem separare liquorem. Experientia demonstrat nobis maximas differentias inter liquores, qui à variis glandulis excernuntur, quod satis testatur, diversas glandulas varia ut plurimum separare principia à massa sanguinea. Sed cum hæc menti non planè satisficiant, nullatenus fortasse inconsultum erit, modum pervestigare, quo glandulæ à sanguine segregant liquores,

qui ab ipsis manant. Ut propositum in hac conquisitione successum obtineamus, animadvertimus, arterias in glandulæ corpus sanguinem advehere, huncque compositum quoddam esse ex plurimis particulis heterogeneis, quasdam ex particulis istis heterogeneis ab arteriarum cavitate egredi, & in cavitate vasculorum, aut vesicularum, quæ glandulam constituunt, colligi. Unde concludimus, adesse meatus, à cavitate arteriarum ad vasculorum vesicularumve cavitates pertingentes, eoque meatus ita esse dispositos, ut nullum aliud sanguinis principium illos pervadere queat præter ea, quæ sunt absolute necessaria ad eum componendum liquorem, qui ex singulis glandulis sigillatim emanat. Tales meatus, sive talia foramina *Pori* dicuntur ac nominantur. Sed quia liquor, qui è glandula effluit, ex particulis heterogeneis constat, necessum est, ut omnes pori singularum partium non sint consimiles. Quæ de causa prout liquor glandulæ cujusdam compositus fuerit ex sulphuribus, alcalicis, phlegmatis, aderunt quoque habita proportionem, in arteriis hujusce glandulæ pori apti ad liberum dandum exitum alcalicis, sulphuribus, vel phlegmatis, si verò acres acidæ vitriolicæ, Sale alcalino subtili junctæ particulæ glandulas perfluant, necessario ex corrodingo ac stagnando tumorem Cancrosom producere aptæ natæ sunt, quia hæ particulæ non sunt oleosæ, & spirituosæ, sed potiùs terrestres acres corrosivæ, tubulos corrodingentes quovis, ex quarum particularum vitiosarum miscelâ Canceri materia producitur, absque dubio hæ particula crassæ ac tardiores tubulis cuspidibus suis nimis se infingentes tardiores ad motum sunt, & nunquam per tam angustos meatus, & tubulos perfluere possunt, sed potiùs in glandulis stagnant, & sic obstructionem Cancrosam pariunt. Causa ergo Canceri potissimum est succus glandularum corrosivus aquæ fortis similis, qui tubulos cum carne, &

membranis corrodat absumitque. Accretio particularum harum corrosivarum est lenta, quia in magno ramo, ex quo glandulæ oriuntur, non facile stagnant, sed pededentim minimis in glandulis cumulantur hærentque, reliquæ verò particulæ cum reliquis rursus circulantur massa. Causæ ergo omnes Cancrum producentes sunt obstructionem hanc Cancrosam efficientes, & sunt vel Externæ, vel Internæ. Externæ sunt vel à fortiori glandularum contusione, vel pressione, inæ tubuli glandularum obstruuntur, lymphaticus liquor sale corrosivo fixo refertus conservatur stagnatque, & sic faciliè Cancrum producere potest: Dein data porta succi hi corrosivi magis corroduunt, & sæpè sibi apertam faciunt viam, sique Cancrum exulcerarum constituunt. Cancros etiam sæpè oriri videmus ex pertinacibus obstructionibus, quales produci solent per repellentia Medicamenta partibus glandulosis imposita, quale quid in fœmina, dum hæc scribimus, observavimus, quæ ex tumore glandularum mammarum, per abusum repellentium Medicamentorum incidit in Cancrum, quia succi sale acido abundantes glandularum tubulis magis impinguntur, & quasi implantantur.

Causæ Internæ sunt dispositio nativa & obstructio in glandulis ipsis, quæ & oritur à sanguine viscido terrestri sale fixo & acido referto, à quo haud melior lymphæ à glandulis separari potest, in quibus stagnant succi, & de die in diem acriores redduntur, & continuo discedendo ac corrodendo planè aliam texturam in glandulis immedicabilem efficiunt. Hisce deductis jam paucis quoque phenomenon Cancrum comitantium rationem reddamus, ut accuratius Tyrones indolem Canceri percipiant.

Si autem tantus corrosionis non adfuerit gradus, majorque fluiditas in humoribus contentis in par-

te affecta non ita profunda, sed cuti propiore, nec nimis firmæ, sed laxioris texture, non ipsæ sphæcelus seu Cancor, sed potius exulceratio exoritur canerosa (à malignitate sic dicta,) fistulosa proserpens cum variis Symptomatibus, prout ipsa materia corrosiva variat, cum continua vellicatione & exesione, hinc succorum copioso affluxu cum pure tenui, acri, valde foetente flavo, livido, pro diversis vasculis exesis, diverso, & sæpè à sanguiferis vasis exesis cruento, superveniente sæpè febri; animi deliquiis, &c. à materię alius attenuatis, & intra sanguinem receptis particulis variè eum turbantibus. Differt hæc exulceratio non nisi gradu ab iis, quæ scorbuticis sæpè eveniunt, variantes inter se secundum diversos dissolutionis & corrosionis gradus, per quos etiam à gangræna differunt, quæ sæpè erosionibus gingivarum scorbuticis supervenit, (hic loci nomine Cancræ aquosi ob sinus salivales, insignita:) imò & maculæ lividæ in scorbuticis, non sunt nisi gangræne species leviores.

*Dolor* est in Cancro exquisitissimus, imprimis in exulcerato, quoniam particulæ inter se fermentantes fibrillas nervosas concutunt rumpuntque, nihil enim magis dolorem excitare potest, quam particulæ acidæ ac salis hic abundantes, pungentes, scindentesque figuras possidentes, prout videre est in fermentatione & commotione acidorum cum alcalicis. In glandulis istis obstructis idem est apparatus, hinc succi acres ac corrosivi redduntur, quibus acutis particulis instar cultellorum tubuli & fibrillæ inciduntur ac disceduntur, unde necessariò *continuus dolor* oboriri debet.

Materia etiam in Cancro detecta sæpè ita foetet, ut non tantum adstantibus, sed & ipsi egro nauseam pariat, ex qua apparet abundè, quod hic affectus paucis tantum differentiis à Gangræna differat,



rat, quia in hac idem fœtor observari solet. Fœtor ergo hic non aliunde oritur, quàm à secessione oleosarum & volatiliū Sulphurearum particularum.

Per plures quoque annos sæpe delitescit *Cancer*, quia ipse oritur à viscoso humore, & sale acido & corrosivo, atque hoc corrosivum interdum per plures, quàm 20. annos ita obvolutum jacere potest, ceu constat præter experientiam nostram ex Tulpianâ observatione aliorumque; certum ergo, *Cancrum* sub forma exigui tuberculi per longum temporis spacium delitescere, & tandem inopinatò prorumpere posse, prout plura novimus (cei dictum est) exempla, eam verò ob causam hoc accidit, cum scilicet illud acidum corrosivum à vinculis viscosi humoris, quibus antea obtegebatur & alligabatur, liberetur, & aculeis suis cuspidibusque incipiat pungere, scindere ac corrodere.

*Materia diversitas*, quæ effluit ex *Cancro* exulcerato, consistit in dissectione diversorum vasorum seu tubulorum, quia in nonnullis tenuior & albidior, in quibusdam crassior conservatur succus, imò dissectis vasis sanguiferis, ipse sanguis in forma sanguinis rubicundi emanat, imò arterioli ruptis sanguis cum impetu, & indistans exsistit, ceu id sæpius in agris vidimus.

Febris lenta in *Cancro* ortum suum habet ab iisdem particulis corrosivis acidis resolutis; in massam sanguineam derivatis, ibidem ejus mixturam turbantibus.

*Deliquium animi* facilè hoc in casu accidere potest, quoniam per fermentationem succorum stagnantium plures acide particule ad massam sanguineam mittuntur, quæ eò delatæ ipsum coagulant inerasantque, sicque sanguinis circulationem ad tempus impediunt, & sic deliquium animi atque Syncope inducunt.

*Pars Cancrosa* apparet livida, & nonnunquam cineritia, qui color

oritur à nonnullis acidis subtilibus particulis per rubulos minutissimorum Capillarium vasorum sanguiferorum penetrantibus, sanguinem in suo cursu, in parte affecta impediētib; & texturam cutis variantibus; quo incidentes radii colorem istum lividum exprimentes.

*Callositas labiorum*, ac durities *Cancro* eodem modo se habet, ac superiori Capite abundè diximus de Scirrho.

Nonnunquam & *Vermiculi* tum vivi, tum mortui in *Cancro* observati fuerunt, quod phenomenon nonnulli Medicos aliosque ad hanc opinionem traxit, ut existimaverint, causam *Cancro* exulcerati imprimis esse færaginem, seu copiam parvulorum venenatorum vermiculorum carnem devorantium, & simul ipsi corruptionem conciliantium, hinc dicunt esse causam, quòd tam citò per ambitum devorent carnem; & hujus rei hanc esse causam addunt, quòd unicus vermiculus in charta exceptus, intra unius horæ spatium 30. similes producat: in hunc finem nuper frastulum carnis corrosæ cancrose exscindi curavi, & microscopio armatus vermiculos nullos observare potui, sed eorum loco, potius viscidum humorem gelatinæ similem perspexi.

S. VI. Nunc itaque detecto damno hospite, in ejus *Signa Prognostica* paucis inquiramus, ex quibus non magnum habebunt solamen agrotantes; ludit enim medicantes & ipsos deludit *Cancer*, hinc Chirurgorum dicitur opprobrium, qui quo intimius affectis partibus implicatur, eò & pertinacius heret & mordacius torquet. Per annos sæpe latet plures hoc malum, quòd corpori magnam inurit noxam, ratio hæc est, quòd acidum & aleali per allisionem vel pressionem aliarum viscidarum ac tenaciarum particularum in suo motu impediunt, quo minus fibras partium continentium, ita citò discindere vel secare queant.

ant . Nullus verò est morbus , qui agris majorem incutit metum , quàm *Cancer exulceratus* , nullusque est qui Chirurgum magis fatigat , quàm hoc malum . Hinc verò omnes practici malum hoc incurabile dicunt , imò ipse *Paracelsus* , qui aliàs sit benignus in prædicando est , & ubique jactat se omnes morbos curaturum esse , in *Libro verò de Apostemate* c. 3. inquit : Cancer successu temporis corrodit fodiisque restâ cor versus , mortemque repentinam in sua molitur periodo ; illum circumfusus hoc & albis fama jugalibus , illeque multo pretiosus auro foret , qui dirum potentum imprimis carnificem tollere possit carcinoma , dum veluti vultures apud inferos Titi dissepant jecur . Exemplo suo etiam comprobavit veritatem maximus Græcorum Doctor *Hippocrater* , dicens § 6 aph. 30. Quibus occulti Canceri adsunt , non curare melius est . Curati enim citius intereunt , non curati verò longiore tempore vivunt : hinc an curabilis Cancer sit , an secus , maximè controvertitur , possibilitatem verò docent Auctororum plurimorum exempla , præsertim *Helmontii libr. 30. de idæis morbos. §. 38.* num verò hisce fides sit adhibenda , judicent nobiscum Practici . Distinguendum autem esse existimamus inter partem affectam , sic v. gr. in utero , intestinis , oculis , palato , &c. curationem vix admittit Cancer. *Helmont. l. alleg. n. 37.* inquit : Interim nil actum , nisi furor ille Archei ideas germinans siluerit , natumque inde persistans virus suffocetur . Neque enim occiditur per corrosiva , imò ne quidem in ulceribus , nisi & corrosivis vis necandi insit , utpote quæ furorem aliàs magis accendunt , quàm placent aut interimunt . Ex quibus Canceri curationis difficultas satis liquet . Unde etiam illud *Nationianum* :

*Curando fieri quedam peiora videmus  
Vlcera , quæ malini non tetigisse sunt .*

Hinc quoque enatum illud Proverbium : Cancer remedia mitiora contemnit , fortioribus exasperatur . Sic quoque *Platerus* inquit : Si Cancer primum inceperit , & adhuc exiguus sit , nec negligatur , ( uti ferè sit , cum nonnisi à peritis Medicis tunc cognoscatur : ) ipsius incrementum difficultè impediri , si adauctus sit , ægerimè , & , si ad summum pervenerit , nunquam curari posse , & , si exulceratus sit , nisi possit funditus & integer extirpari , & , si longo tempore sæpè perdurare possit , lethalem esse . Mitiorè certò nostro judicio Cancer meretur prognosin , nempe exteriores corporis partes obsidens , faciliè cultro extirpari potest , vel aliis remediis acre corrosivum corrigentibus , interjectis ut impediatur , ne alibi pedes figat . De quibus in paragrafo de cura agente dicturi sumus . Rarissimè enim hic affectus curatur imprimis exulceratus , præsertim in loco inconveniente & operationi instituendâ inidoneo existens .

§. 12. Expeditis iis , quæ Theoriam concernunt , ordinis ratione ad ipsam curationem , & quidem primò *Dieteticam* accedamus , si ne enim ordinata vivendi ratione reliqua præsidia frustra admoveri , quis non toto observat die ? *Dietæ* verò nobis , eci centies dictum , sub rerum sex non-naturalium vulgò ita dictarum siculo offertur , quorum singulas paucis perstringamus .

Aer sit temperatus ac ab omni impuritate liber , copiosa materia subtili refertus , à quo succi nostri corporis imprimis lymphæ aliique attenuantur ac fluidiores redduntur . Omnia alimenta ac potulenta sint superfluo alcali ; & sale volatili oleoso referta , vitentur angue pejus viscida ac acida , terrestria ac sale fixo corrosivo prædita , quia hæc sanguinem & succos nostros , imprimis in glandulis incrassant ac coagulant , ineptosque ad circulationem reddunt , unde

*Dietæ :*

unde facile succi in glandulis stagnare ac Cancrum producere possunt. Sanguis enim noster constat quidem ex sexcentis particulis, ut plurimum verò ex sale alcali volatilibus, si accedat acidum sal, tum incrassatur sanguis, similimodo, prout apparet, si oleum Tart. per deliquium inspissatur per affusionem spir. vitrioli acidi, spicula enim Acidi in canaliculis alcali hærent, dein particule acidæ in corpore nostro possident acres figuras in omnibus lateribus secantes, quæ oleosas particulas discindunt, & incidunt. Si enim sanguini evasario affundas acidum quandam liquorem, ipse apparebit statim niger & spissus, imò si infunderis acidum in venam alicujus animalis, morietur in momento, ceu nuper in cane hoc institimus experimentum. Contrarium observatur in sanguine, si aqua ex sale Armonico vel nitro compositum ipsi affuderis, hinc sanguis apparet rubicundus & fluidior redditur. Sed ad rem, hoc in affectu nocent admodum falsa, quorum particule sunt instar longarum durarum, circa quas aquæ anguillates succos nostros circumvolvunt, qui tot salinis particulis aggravati sucet sanguinem in motu suo tardant, hinc plures scorbutici morbi, præprimis verò Cancer ortum suum habere possunt, vitentur ergo carnes muria conditæ, fumo indurata, halesces, brassica sale condita, &c. Omnia verò alimenta & potulenta, quæ nec nimis calida; nec nimis frigida sunt, h. e. quæ ex subtili alcali cum subtili oleo circumsepta, sunt optima, quæ sanguinem vix mutant & relinquunt in mediocri fluore. Nimis calida sanguinem nimis activum & fermentantem reddunt, quòd plures particule subtilissimæ avolent. Nimis pinguis nocent, ut sunt farcimina, petasones, lardum, caro suilla, anguillæ, anseres, legumina, cæcus vetustus, &c. item omnia saccharata, quia viscidum acidum in se continent, hinc ad obstructions cancerosas

producendas disponunt succos nostros. Cibi ergo sint boni succi, & sale volatili oleoso turgidi. Potus sit Infusum Theæ vel Coffæ, vina acida & cerevisiæ vetustæ angue pejus vitentur. Conceduntur vina Gallica ac Hispanica, aliaque sale acido fixo haud prædita.

Somnus hic ad reparandos spiritus animales maxime proficiuus erit, qui omni ope procurandus. In Cancro mammarum non super dorsum decumbendum est, ne pressione hac spiritus animales circulantibus impendantur.

Motus magis conducit, quam quies, hinc exercitiis dediti raro Cancro afficiuntur, sanguis enim cum succis nostris redditur motu fluidior, quiete verò fit crassior, & ad motum ineptior. Post partum motus nescit nimius, aliis cibi in ventriculo non sufficienter digestivi eiciuntur.

Alvus servetur lubrica, sique aliàs solennis & consueta evacuatio fuerit suppressa, omni opera promoveatur. Veneris usus rarus sit. Excernenda ad consuetudinis leges mensuranda.

Ira, moestitia, terror, aliaque animi pathemata maxime certè nocent, & in praxi quotidie effectum tristem observare licet, sanguinem enim & succos nostros facile coagulant, & ad motum tardiores reddunt. Qui ergo sanitatem amant, ii semper hilaritati, quantum possibile, studeant, omni opera & in Deum Q. M. fiduciam suam ponant, certè quòd Dei voluntas bona sit, suosque nunquam deserat, & quòd tandem cum carne sua resurrecturi sint, & visuri Filium Dei, in summa gloria in iudicio apparentem, & fruituri aterna vita. In lætitia enim & gaudio talique fiducia longè liberius, & felicius procedit sanguinis fermentatio à copiosiori spirituum animalium influxus adjuncta, unde succorum ac spirituum copiosior distributio per totum corpus, quàm quidem in mœrore ac tristitia, ubi propter minorem spirituum anima-

lium in fibras fermentatio sanguinis, illorumque distributio per totum corpus valde imminuuntur.

§. 13. Cura *Galenica* ipsius *Cancris* in eo consistit, ut incipientes *Cancris* augeri prohibeantur, in quem finem causam peccantem, nempe atrabilarium humorem evacuant, priusquam in parte affecta confirmetur. Evacuunt autem primum, si nihil prohibeat, per venæsectionem: deinde per purgationem, ab initio ex simplicioribus, quale est epithymum, quod quatuor drachmarum & dimidii pondere, ex sero lactis aut aqua mulsa dant: postea verò ex hiora, quæ nigrum veratrum recipit. Vel præscribunt prius Apozema præparans seq. vel simile.

*℞. Scolopendr.*

*Adiant. nigr.*

*Capill. Veneris*

*Fumar. aa. Mj.*

*F. Decoct. in ℔ iiii. aq. fumar.*

*vel lactis caprini. Incolat.*

*dissolv.*

*Syr. de Scolopendr.*

*de pomis Regis Sapor. aa. ℥ i.*

*Byzant. ℥ vi.*

*M. F. Inlapium.*

De quo singulis mane ℥ iv. exhibent: & postea sequenti melanagogo præparatum evacuant humorem adustum.

*℞. Decoct. præcedent. ℥ iv β*

*in quo infund. per noctem*

*fol. senn. s. ℥ iiii.*

*Myrob. Indar. ℥ ii.*

*Rad. hellebor. nigr. ppt. ℥ i.*

stent per noctem, manè, facta una aut altera ebullitione, in colat. dissolv.

*Syr. de pomis c. fol. senn. ℥ β.*

*Confect. Hamech ℥ i. β.*

*M.*

Ad locum affectum etiam varia applicare jubent, vitando exasperantia aut mordentia; sequens verò commendant:

*℞. Ol. rosarum*

*Omphacin.*

*Succ. solan. aa. ℥ ii.*

Quod tandem in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo agitant,

donec conctescat & plumbeum acquirit colorem: dein add.

*Lythargyr.*

*Cerusse aa. ℔ β.*

*M.* cum oleo & f. l. a. linimentum. Vel urticam contundunt, & cum succo solani inixtam superponunt, sola etiam ruta folia cum passulis à nucleis libetis confusa applicant.

Ad locum verò ulceratum absque offensione adhibent solani succum linteo molli duplicato in ipso tincto ac imposito. Fotinsecus autem supra illud lanam teneram circumdant, quæ ipsa succo sitimbuta, & diligenter provident, ne illa rescicetur, ita ut frequentius succum affundant. In ulceratis *Cancris* diurnius uti solent Medicamento ex pompholyge. Semen quoque Raphani domestici contusum, & cum aceto mixtum applicant. Hisce non juvantibus, si patientes sint fortes & juvenes, ad terrum accedunt.

§. 14. Juxta *Paracelsum* in cura *Cancris hæmorrhagiales* menstrualesque fluxiones amovendæ sunt per Physicum: demum per Chirurgum anodyno mortificandum erit, vel quater, ut in Noli me tangere fieri dicit: postremo descriptione consolidativa eodem loco posita curandum. Gluten aquaticum in aquam ubi reduxeris, accipit semper ad unam libram Colchotaris ejus ℥ i β. *florum aris*: proportionem hanc à quantitate Colchotaris observando, mixta simul ulcerique vel *Cancro* superposita maneant, donec putrescant: quod plerumque juxta ipsum fieri solet in quatuor diebus. Deinde amovendo superponit mundificatum sequens:

*℞. Picis navalis,*

*Visci pini,*

*abietis aa. ℔ i.*

*ex locustis de latice ℔ i β.*

*Larigna quar. i.*

Mixta liquefiant cum ceræ & olei partibus aequalibus, ut ambo sufficiant ad emplastri compositionem: quod isto, non alio quovis, extrahi poterit. Dein su-

perponit pulverem hunc.

*R. Pulv. ex succo chelidoniae  
Parthenionis  
Centaureae aa. ʒ ʒ.  
Mumiae ʒ i.*

Mane vesperique ligat.

Anodynī ipsius descriptio est seq.

*ʒ. Spertioli,  
Succi solatri aa. ʒ i.*

*Liquoris de firnis vel verni-  
cis ʒ ʒ.*

Reducatur in formam Un-  
guenti.

*Helmon-  
tium.*

§. 15. *Helmontius* existimat, so-  
lum attractum lapilli Butleri, tan-  
quam remediū potentissimū esse ad  
extinguendum *Canceri* virus ab in-  
dignato *Archeo* ortum, quia ex-  
terna remediū oblinitis, quadam  
consecutione contiguitatis, totum  
domat *Archeum*, non secus ac dens  
rabidi, etiam si optimē invento,  
deterfus tamen rabiem quandoque  
adfert. Commendat etiam gluten  
de Aquatico *Paracelsi* i. e. *Ranam*  
integram vel *Bufonem*, per *Blas*  
*lunare* ipsius plenilunii, & frigus  
hybernū atrocissimū in albam  
& crystallinam conversam, supra  
baculum in campo aperto loca-  
tam, per unicam noctem, manē  
liquatum *tragacanthum* referentem,  
cum forma seu figura pristina.  
Laudat quoque *Author* in *Cancro*  
*Colchotar vitrioli* prius aliquam-  
diu in cetha ad mollescendum re-  
positum, dein cum farina avenae,  
& lacte in Cataplasma subactum,  
quod juxta ipsum *Cancrum* tollit  
necatque.

*Willisium.* §. 16. *Willisius* ad crassiores ac  
coagulatos humores educendos  
commendat pilulas Tartar. Querc.  
vel de succino Crat. cum ammo-  
niac. vel sequens Apozema.

*R. Rad. polypod. q. ʒ iii.*

*Herb. ceterach. ʒ ii.*

*Fol. fen. ʒ ʒ.*

*Santal. citrin. ʒ ii.*

*Coq. in Aqu. fontan. ʒ xiv ad ʒ x.*

*addend.*

*Agaric. ʒ ii.*

*Rhabarb. ʒ ii ʒ.*

*Colat. clarificata add.*

*Syr. de pomis purgant. ʒ ii.*

*M. Hujus Apozematis ʒ iv. ac-  
cipiat æger, repetendo intra 3.  
vel 4. dies semel.*

Varia quoque hoc in morbo  
commendat absorbentia, ut sunt  
oculi *cancer. Corall. margarit. E-*  
*bur.* ppt. Item inter alterantia &  
refert prælaudatus *Noster Chaly-*  
*beata*, imprimis acidulas ferratas  
seu martiales, quia maximo nie-  
lancholicis hæ aquæ esse solent so-  
latio, copiosè enim epotæ sangui-  
nis tincturam salino-sulphuream  
eluant, ejusque mala fermenta  
destruunt, & viscerum sordes ab-  
stergunt obstructionsque reserant,  
& per consequens sanguinem puri-  
fificant.

Inter Externa, Saturnina omni-  
bus reliquis præfertur.

§. 17. Cura *Canceri* ad *Sylvii* men-  
tem in eo consistit, ut acidum  
concentretur ac contemperetur.  
Concentrant autem: juxta *Ipsum*  
potenter Acidum *Acre creta*, san-  
guis *draconis*, coralia, oculi  
*Cancrorum*, mandib. lucii piscis,  
item opium, item quodvis sul-  
phur metallicum aut minerale fi-  
xum. Ex quibus aliisque varias con-  
cinnat formulas.

*Sylvium.*

§. 18. *Cartesiani* saltem instituunt  
in *Carcinomatè* curationem, qua  
particulæ illæ angulares acutæ &  
succī acidi hebetentur, mitigen-  
tur & obstructions glandularum,  
quantum possibile est, referen-  
tur. Hac de causa sudorifera  
commendant, & remedia poro-  
sa & volatilia, ut anguli par-  
tium acuti, quibus humores pec-  
cantes reserti sunt, intra poros  
remediorum frangantur & sic he-  
betentur, deinde visciditas incida-  
tur, & succi in convenientem re-  
digantur fluorem, ut ita simul  
glandulæ obstructæ reserantur, &  
ubivis patula liquoribus reddatur  
via. Maximè verò in *Cancro* non-  
dum exulcerato proficua judicant  
vina medicata, vel decocta her-  
barum multo sale volatili reserra-  
rum, cum tota inde purificetur  
massa sanguinea, crassi & ad mo-  
tum torpidiores succi in debitum

*Cartesia-  
nos.*

fufcitantur fluorem, & proinde tubuli quicumque faciliè aperiantur & permeabiles reddantur. Hujusmodi verò vino fequentes imponunt species.

*R. Rad. Scrophular. 3ß.*

*Contrayerv. 3ij.*

*Scabiol. 3ij.*

*Salfeparill. 3iß.*

*Bardana 3iß.*

*Herb. geran. Ruperl.*

*fumar.*

*chelidon. min.*

*agrimon.*

*centaur. min.*

*card. bened.*

*scord. aa. Mß.*

*Flor. sambuc. Piß.*

*Perficor. Pj.*

*Rasur. lign. Colubrin. 3ß.*

*Sem. Phellandr.*

*levistic. aa. 3ii.*

*Salis fulig. 3i.*

*Jovis 3ß.*

D. ad chartam pro speciebus unimenfuræ vini impendendis. Succis ita ad sudorem fatis aptatis, & crassioribus eorumdem impuritatis per urinam rejectis, pulveres exhibent diaphoresin largiorem promoven-tes, qualem fequens proponit formula.

*R. Antimonii diaphoret. gr. xvi.*

*Chelar. canc. 3ß.*

*Mercurii Solaris gr. iiii.*

*Campbor. gr. j.*

F. Pulvis in fequenti vehiculo una vice exhibendus.

*R. Aq. fumar. 3ß.*

*Essent. enul. 3i.*

*Spir. flor. sambuc. 3ß.*

*Syr. scord. 3iß.*

*M.*

Premiſſis hiſce ſubjungunt exter-na quædam penetrantia, & glandu-las obſtruſtas aperientia, quæ per poros ingredientia ſuccos viſcidos incidant, attenuent, & fundant, uti ſunt emplaſtrum de ſpermate ceti, & raniſ cum Mercurio Vigo-niſ, baſſamus ſulphuriſ, oleum myrrhæ, ſpirituſ tabaci, unguen-tum nobile Mynſichi, vel ſequens, imprimiſ ſi incrementum aſſumere conſpiciatur.

*R. Rad. ariſtol.*

*virid. ar. aa. 3iii.*

*Minii 3ß.*

*Aſenic. cryſtall.*

*Auripigment. aa. 3ß.*

*Opii*

*Campbor. aa. 3ii.*

*Ung. porcini. 3ii.*

*F. Unguentum.*

Sectionem tamen accomodatiffi-muni exiſtere dicunt remedium Cancri adhuc incipientiſ, quo fundituſ exſtirpetur, ne unquam aliquod capiat incrementum, at in majori, ubi multæ jam à ſan-guine impuro repletx ſunt venæ, & copioſæ tumori huic ſubjacent arteriæ, operationem hanc pericu-lo haud vacare quàm liberrimè proſitentur. Deſtruſtiſ etiam plu-rimiſ glandularum fibriſ, & arte-riolarum extremitatibuſ chylum ad-vehentibuſ, ut tumor jam conver-tatur in ulcuſ, nec hoc ipſum in-crementum acquirat, & parteſ de-paſcatur viciniſ, nullum intermit-ti volunt ſtudiuſ, ſed frequentio-reſ inſtituere jubent fomentationeſ ex ſpiritu matricali, vel decocto Theæ, ſcrophulariæ, contrajervæ, ſcordii, nicotianiæ, ulcuſque ab-ſtergere mandant liquore mellis ad Antimonio abſtraſto *Ang. Sala*, vel liquore mercurii præcipitati at-tingunt, pulvereſque inſpergunt, quarum poroſ ſucci acidi in ulcere contenti copioſe ingredientur, ex ſale Joviſ, vel Saturni, creta, ceruſſa, pompholige, lithargyrio, thure, & ut parteſ fibroſæ jam corruptæ à ſaniſ ſeparentur, illa adjungunt, quæ motu celerrimo ab æthere agitata eaſdem abradant, diſſecent, & ſejungant, quorum adſcribunt numero amalga-ma mercurii, auripigmentum arſenicuſ, ſublimatuſ, calcem vivam, vel butyrum antimonii, quantuſ eſſentiam arſenici, oleum antimonii ſaccharinuſ, oleum mercurii dul-ce, & hujusmodi alia, quæ ſe-quentes in ſe comprehendunt for-mulæ.

*R. Plumbi uſt. 3iii.*

*Ceruſ. 3iß.*

*Anti.*



*Antimonii crud.* ℥ij.*Pomphol.**Camphor.**Salis saturni* aa. ℥j.*Ol. nicotian.* ℥j.*Succi eiusdem* q. s.

*F. s. a. Linimentum in mortario plumbeo, quoulcus Cancrosum studiosè illinatur.*

Vel :

*℞. Lithargyr.* ℥ij.*Auripigment.* ℥ij.*Vetrioli alb.* ℥iij.*Mell. despum.* ℥vj.*F. Unguentum.*

Balsamum etiam Lithargyri studiosè illitum egrediam navare operam asserunt, nec stercus improbant humanum, cum succi corrodescentes optimè hoc domentur. Ad sanationem, vel si hæc penitus pro voto obtineri nequeat, ad præcautionem, ne incrementum sumat, nec vitæ insidias ponat ulcus hoc aliàs satis destructivum, sequens approbat unguentum.

*℞. Litharg. aur.* ℥ij.*Minii* ℥j.*Mum.* ℥vj.*Salis saturni* ℥ß.*Camphor.* ℥ij.*Ol. ros.* q. s.*F. Unguentum.*

Hiscæ subjungunt emplastrum diapompholygis, vel diasulphuris, ulceri huic maximè convenientia.

*Nota Cæ-  
ori ex no-  
stra sen-  
tentia.*

§. 19. Præmissis aliorum curationibus, & Nostram Pharmaceuticam ac Chirurgicam aggredi libet. Huic itaque pernicioso & glandulis ut plurimum incarcerato Sanitatis hosti erundo ac destruendo acienda sunt ingenii organa, iisque referenda delitescendi Adversarii fores. Attemperantibus & imprimis corrosivam acidam istam acrimoniam in succis demulcentibus Medicamentis hostis iste aggrediendus est, inter quæ palmam aliis præripiunt omnia alcalia vel volatilia vel fixa, item temperantia & oleosa, diaphoretica, quæ omnia acidum acre corrigunt, & ex corpore eliminant, cinnabarina, cancrina,

*Tamur. II.*

tartarea, saturnina ac camphorata, item nitrosa, calybeata, testacea ac sexcenta alia commendantur hoc in affectu atroci. In juniorum Medicorum gratiam, & Nos unam & alteram communicemus formulam, & quidem in forma decocti, imprimis ubi dolores urgent.

*℞. Rad. chin.**sarsaparill.**liquirit.* aa. ℥vj.*Rasur. lign. Guaiac.* ℥iß.*Fol. alth.**Flor. papav. err.* aa. M. j.*Capit. papav. alb. c. seminib.**N. 3.**passul. exacinat.* ℥iß.*Coq. secundum artem ex s. q.**Aq. simpl. postquam per noctem*

infusa fuerunt, Colat. *℞. ℥XL.*  
Det. S. Apozema, de quo calidè bibatur aliquando vitrum plenum.

Vel :

*℞. Rad. chin.* ℥iij.*gentian.**contraieru.**enul.* aa. ℥ß.*angelic.* ℥ij.*Herb. scordii**card. bened.* aa. M. ß.*Sem. eiusdem* ℥ß.*Infund. & coq. inf. q. Aq. commun.*

*& Vin. in vase bene clauso ad Co-  
lat. ℥ IV. Edulcoratur syrupo scor-  
dii.*

Interponatur sequens vel simile sudoriferum, imprimis si dolores maximè urgent.

*℞. Aq. Flor.**card. bened.* aa. ℥iß.*cinam* ℥ß.*Ocul. cancr. ppt.**Antimonii diaphoret.* aa. ℥ß.*Opii correct.* gr. ij.*Syr. scordii* ℥ß.

*M. pro una vice hauriendus po-  
tus.*

Vel :

*℞. Koob. Juniper.* ℥ß.*Sal. C. C. volat.* gr. xij.*R bezarti.* ℥ß.*Aq. scordii* q. s.

K 3

M. F.

*M. F.* diaphoreticum una vice assumendum . Omnia enim remedia , quæ in Peste & Gangræna solent præscribi , & hic proderunt , eò enim semper respiciendum est , ut obstructio illa canerosa tollatur , & lymphæ à sale acido corrosivo fixo liberetur , in quem finem sequentia sanguineam massam depurantia commendamus .

*R. Elix. vitæ* ʒij.

*Spir. Cephal. volat.* n. d. ʒj.

*Tinct. corallor.* ʒij.

*M.*

Vel sal volat. oleos. quodvis conducet : vel in forma pulveris sequens conferet .

*R. Cinabar. nat.* gr. iv.

*Ocul. cancr. ppt.* ʒß.

*Sacch. saturni* gr. ij.

*Camphor.* gr. j.

*M. F.* Pulvis singulis vespertinis horis assumendus .

Vel :

*R. Antihæst. Poteri* ʒß.

*Arcan. dupl.* gr. v.

*Laudan. opiat.* gr. j.

*M. F. Pulvis* .

Vel :

*R. Sem. melon.* ʒij.

*Aq. heder. terr.*

*bellid.* aa. ʒij.

*F. emuls. add.*

*Ocul. cancr. crud.* ʒj.

*CrySTALL. tart.* ʒß.

*Sacch. saturni* gr. ij.

*M. f. l. a.* Emulsio cochleatim & per vices exhibenda .

Varia martialia edulcorantia interponenda sunt , aliaque acidum acre in succis existens corrigentia , & per diuresin eliminantia , quale sequens egregii erit usus .

*R. Rad. scabior.*

*enul.* aa. ʒß.

*polypod.* ʒv.

*sarsaparill.*

*china* . . . aa. ʒiij.

*Herb. fumar.*

*scordii.* .

*Veronic.*

*scolopend.*

*senecion.* aa. M. ʒ.

*Flor. sambuc.* P. ij.

*Flor. hyperic.* P. j.

*Rasur. santal. citr.* ʒvj.

*sassafras.* ʒß.

*Guaiaac.* ʒij.

*Cort. eiusdem* ʒß.

*Vetrioli mart.* ʒiij.

*Sal. tart.* ʒij.

*Sem. dauci* ʒß.

*M. dentur ad 6. ʒ. Vinigenerosi* .

*R* Antimonii tartarifat. viperin. Zvvelseri vetrioli mart. , aliaque plura interponenda sunt . Acidulæ quoque martiales & nitrosæ non neglegendæ sunt , cum consilio Medici potæ . Si in primis viis lateat amurca viscida , eas eluendas volumus , sequenti lenitivo .

*R. Pulp. prunor.* ʒj.

*resin. lalapp.* gr. iij.

*Merc. dulc.* gr. xv.

*M. F. bolus* .

Mercurialia enim sæpè optimum præstant effectum , prout in omnibus tumoribus , sic præprimis in Cancrosis . Aliàs nocent purgantia , quia malum latet ut plurimum in partibus solidis , & si centies purgabis , Cancrum non curabis . Eodem modo V. S. nocebit , quæ enim nihil aliud efficies , quàm ut agro aliquid de ipsius vita demas .

Si febris urgeat , interponi potest sequens vel similis mixtura cochleatim assumenda :

*R. Aq. menth.* ʒv.

*Diascordi.* Syllv. ʒj.

*Antimonii diaphoret.* .

*Ocul. cancr.* aa. ʒj.

*Elix. vitæ* . ʒvj.

*Laudan. opiat.* gr. ij.

*F. Mixtura* .

Si dolores intensi sint , opii dosis augeri , ut & Camphora addi potest , quæ sæpè plus præstat , quàm opium . Detur sæpius crySTALLI mont. ppt. ad ʒß. cum laud. opiat. gr. ij. n. ʒ. Curatio ergò Cancro , si quæ ob loci congruitatem fieri potest , ut plurimum duobus remediis perfici potest , unum est culter , qui tutissimus & compendiosissimus , & ægri malè sanitati suæ confusunt , qui remedium hoc metuunt protrahuntque , donec res non amplius integra est . Alterum remedium sunt

sunt Medicamenta caustica, quibus malum crustis absumitur. Ulcus Cancrosum, quod Cancrum apertum (quo jure non quæro,) vocitant, cum vix curationem, si omnia jam depasta fuerint, admittat, præstat sæpe palliari, quam curari, atque illud remediis lenioribus externis, (non posthabita internè sanguinis ac succorum correctione jam superius dicta,) ut unguento saturnino cum Camphora superimpositis stupis, spir. theriacali Camphorato, vel similibus madefactis, non tamen nimium efficacibus, qualia partim discutiendo quasdam sanguini redderent particulas ejus mixturam valè turbantes, partim viscidis à longo tempore involatus in vicinis adhuc tubulis quiescentes corrosivas in motum suscitando efficerent, ut citius omnia (ne quidem nervis vel tendinibus, unde immanes dolores, vel sanguiferis majoribus exceptis) erodendo prosperer ulcus, (si tamen de vera curatione ratiocinari licuerit) abblandientibus favorabilibus quibusdam circumstantiis, in iis, qui nimium diu non tardati sunt, corporeque sano & vegeto, sive temperamento roboris sunt præditi, si commoditas loci permittat per ferrum, ut commodiorem & breviorẽ viam, malum integrum simul, cum portione partis sanæ auferatur, quod si non admittitur, per iterata caustica quasi per multos cultellos, illud, quod una, vel altera sit incisione illic efficiendum, ut malum corticatum eradicetur, caustica verò sine periculo applicentur carni & glandulis, non autem tendinibus, nervis, vasibus sanguiferis majoribus, à quibus proin cavendum. Præterea inter vel præter caustica (Experientia teste,) valde ad excitandum efficaces compertæ sunt rigidissimæ, acutissimæque acidorum corrosivorum particule, poris vel amplexibus particularum mercurii vel antimonii firmiter inhærentes, quarum molem cum augent, circumquaque eminentes scindunt,

pungunt, & ob figuram irregularem corporum interstitiis sat diu & firmiter inhærentes, ab aquis elui ferè renuunt, quæ cum non augeant agitationem particularum acutarum in ipsa parte, sed potius ob dissoluta stamina, ob secessionem introductam, &c. sistant, optimo aliquando cum successu ad malum funditus eradicandum applicantur, hoc respectu in usum vocari possunt Aq. divina, Tr. vel lavamentum ex aq. calc. viv. mercurio librato, spir. theriacal. Camphor. extracto colocynth. absynth. Ol. Guajac. cum balsam. Peruv. &c. Possunt etiam pulvres ex aristoloch. ocul. cancr. sal saturni & pluribus aliis appropriatis aspergi, donec ulcus malignum redditum & benignum, eodem ut simplex modo, curetur.

\* Hic verò omnia unguenta, cataplasmata farinacea & spissa vel unctuosâ nocent, quamvis salibus volatilibus fuerint mixta. Sequentia & similia lavamenta calidè ter vel quater de die linteis quadruplicatis applicari possunt.

℞. Aq. Regin. Hungar. ʒij.  
Calc. viv.

Decoct. Guaiac. aa. ʒv.

Elix. vite ʒij.

Sal. volat. oleos. ʒiʒ.

Camphor. ʒij.

Bals. Peruv. ʒʒ.

Ol. sassafras ʒij.

Mercurii librati ʒʒ.

M.

Sequens quoque Balsamus externus, à pluribus magni æstimatur Cancro illitus.

℞. Balsam. aurei

Zolfo cum spir. tereb. par. aa. ʒj.

Pulv. opii. crud. ʒij.

M. & f. bals. quo illine Cancrum non exulceratum & exulceratum. Balsamus Aureus sequenti modo paratur.

℞. Zolfo viv.

Sal saturni aa. ʒʒ.

Camphor.

Borrac. aa. ʒij.

Ol. amygd. amar. ʒij

add.

Ol. Talcī ʒij.

M.

Omnia enim remedia externa acridum acre temperantia, obstructiones Cancrofas referantia, & Cancrum induratum resolventia egregia sunt. Superfedeamus Practicorum Catalogum Medicamentorum digerentium, catharticoꝝ, diaphoreticoꝝ, uno verbo, universalium in medium proferre, utpote pharmacorum pro impetrando fine minus idoneorum, inefficacium ac ineptorum. Sunt quoque, qui statuunt veram ac geminam Cancri curationem consistere in mercurio, non quidem vulgari crudo & indigesto, sed singulari quadam encheiresi parato; ex ejusmodi prosapia dicunt esse pulverem istum indolentem à viro quodam Juliaceſi unumquemlibet Cancrum sanante adhibebitum, & ab *Helmontio l. de Ideis morboſ.* notatum; sed si verum, de quo valde dubito, dolendum est, præparationem ejus cum Artifice fuisse sepultam. Salivationem ope mercurii peractam sæpius profuisse testantur monumenta Medicorum. In quem finem alii sequeſtem commendant Essentiam quotidie ad guttas 20. & plures usurpandam.

R. Essent. vulnerar.  
hyperic. aa. ʒii.

Solut. myrrh.  
aloe aa. ʒi.

in spir. vini solut. ʒiii.  
Mercurii precipitat. ʒß.  
M. f. l. a. Essentia.

Mercurius enim est acidorum dormitor strenuus. Saturnum quoque in laminas redactum, & Cancro nondum exulcerato impositum palliativè felici cum successu adhibebitum fuisse testatur *Observ. 161. Ephemeridum German. Ann. 14. & v.* ubi notatu dignum quid occurrit, quod scilicet lamina ejusmodi plumbea intra duos menses erosa, & in medio in albicantem pulverem reducta fuerit. Alii optimo cum successu laminam plumbeam mercurio vivo illinunt, sicque Can-

cro non exulcerato, ut & exulcerato imponunt. Quod de Arsenico, antimonio, aliisque mercurialibus scribunt, ex eodem fluit fonte, quia non nisi ratione particularum mercurialis vires exercent suas, hinc sequens balsamum egregius est.

R. Cinabar. antimoni ʒi.

Ocul. cancr.

Sal. saturni aa. ʒi.

Sperm. ceti ʒii.

Camphor. gr. v.

cum balsam. Peruv. q. s.

M.

Vel:

R. Plumb. usq.

Terr. Vetricoli dulc.

figulat.

Cerniss. lot. aa. ʒi.

Sal. saturni

Merc. dulc. aa. ʒi.

Thurr.

Myrrh.

Extr. aristoloch.

Consol. mai. aa. gr. v.

Ol. vitell. ov.

Balsam. Peruv. q. s.

F. balsam.

Celeberrimus *Poterius* præscribit Balsamum suum mercurialem indies Cancro illinendum.

Sunt, qui in Cancro curando Cancros fluviatiles, item ranas ac bufones magni æstimant, de quibus videantur *Paracel. Helmontius, Aquapendens Fabr. Hildanus*, qui in eum finem unguentum ex ranis viridibus, quod ab his laudatur, ab illis culpatur, composuit. Alii sunt, qui extollunt stercus felis Cancris fluviatilibus antea nutritæ. Decoctum calc. viv., sal. è capite mortuo fuliginis ab Authoribus commendantur. Ex vegetabilibus Geranium, Polytrichon, Chæresolium, Solanum, Cicutam, Plantag. pomaque putrida laudibus evahunt.

*Celeberrimum Muyr* in ulcere Cancroſo ora aut alias corporis partes occupante proficuum dicit pulverem ex ranis aquatilibus, gammaris & C. C. uſto compositum.

Sulphura mineralium anodyna fixa & opiate pro mitigando dolore, & pro

& pro cura palliativa. prae aliis profunt; sed quis quæso omnia recensere remedia, sunt enim innumera, & ferè totum replent librum, quæ ab Auctoribus commendantur. Nullum verò mihi tutius & melius remedium videtur, quàm culter & caustica, ad quæ semper ægri, ab initio præsertim, à Medicis incitandi sunt, quæ caustica cum cautela applicari possunt, inter quæ facillè palmam aliis præripit Oleum meum antimonii sol. ratum externè Cancro labii appositum, vel arsenicum correctum alii applicant, omnia autem caustica cum cautione apponenda sunt, & si Inflammatio suboriat, statim Medicamentis idoneis recurrendum & non timendum est, quod malum aliquando revertatur, ceu observavit Celeberr. *Vedelius* l.1. f.2. c.7. *Amant.* Med. domito sic apparenter Cancro, partibus vi corrosivorum destructis, & fontibus lymphæ velut exsiccatis, malum tamen non æquè cessasse. Sic etiam sectio ipsa male instituta sæpe in Cancro incurabili recidivam minatur, ceu non ita pridem in cive hujus Civitatis tumore oculi Cancroso laborante observavi, cum is ab empirico non ritè excinderetur, propediem repullulabat, & quidem cum majore tumore: ast hic Cancro non ritè exsectus fuit, plures enim mammas Cancrosas abscindi vidi, absque ulla recidiva. Sic quoque *Fabric.* *Hildanus* totam mentulam Cancro exulcerato laborantem feliciter se sectione sustulisse scribit, ego Cancrum labii inferioris feliciter Limburgi ad Lhanam excindi curavi, forpice scilicet tollendo Cancrum cum bona labii parte simul, ac uniendo labia vulneris, ut in labio leporino, quod & conspexit Cl. D. Muys celebrisille Chirurgo-Medicus, qui etiam in Cancro crystallum montanum tam internè quàm externè usurpatum efficacem remedium dicit, quia acidum egregiè temperat. Unguentum verò Ægyptiacum jute meritoque in Cancro cu-

ra rejicit. Si à sectione vel caustico applicato remedio sanguis nimium stiller, applicari potest illico liquor stipticus vel noster, vel *Drelincourtii* sequens.

℞. Alum.

niri

Vetrioli aa. ℞ii.

M. c. album ovor. n. ii.

ut omnia inter se fluant.

Vel inspergatur sequens Pulvis stipticus.

℞. Bol. commun. ℞ii.

Gallar. immatur. ℞i.

Vetrioli de Cypro

Campbor. aa. ℞i.

M. F. Pulv.

Vel seq. Aq. stiptica.

℞. Limat. mart.

Ol. Vetrioli aa. ℞ss.

M. & effervescant, postea add.

Alum. ℞ii.

lap. hamatit. ℞i.

æris usq. ℞ii.

Iterum effervescant, postea add.

Aq. commun. ℞iii.

M. & percolatur.

Aq. stiptica, quæ æquè guttatim internè, quàm externè usurpanda est.

## CAPUT IX.

De Scabie, Lepra, Græcorum  
& Arabum, Impetigine, Al-  
pho & Leuce.

§. I.

NÆ l' diversæ oriuntur in corporis nostri diversis partibus obstructions, ut & ex his dependentes diversis affectus cutanei, tam pro diversitate particularum obstruentium, quàm ipsarum partium, in quibus obstructio est suborta. Si enim à sale quodam obstruantur tubuli cutanei, & vascula excretoria in glandulis cutis miliaribus, oriuntur Scabies, Lepra, Impetigo, Alphus & Leuce, qui

qui affectus valde deturpant extimam nostram vestem, simulque clam vitæ insidias struunt. Nec in proprio deserviunt corpore, sed & in alia impetunt, propagare gestientes virosfum ichorem & disseminare amplius, adeoque, & inuisi sunt hi affectus. Noctu graviores sunt, interdiu scediores, semper ingrata sunt symptomata. De quorum affectuum ac symptomatum ratione ordine tractaturi sumus, ut tyrones eos clarè ac verè perspiciant intelligentque. Pauca ergo prius de Nomine, antequam ad realia accedamus, in usum Tyronum addere libet, de Etymologia non solliciti, de Synonymia tantum dicemus, quod Scabies dicatur aliis pfora & quidem à Græcis, Germanis, *der Sünd die Srahe*. Scabies alia dicitur humida, seu serosa; alia sicca seu pruriginosa. Omnis verò scabies est maligna & contagiosa.

*Scabies quid?* Scabies describi potest quod sit obstructio tubulorum cutaneorum, imprimis excretoriorum, in glandulis cutis miliaribus, cum capillarium vasorum lymphaticorum obstructione, vel etiam disruptione à sale quodam fixo acido oborta.

*Lepra.* Lepra valde congenere & affinis affectus est cum Scabie, ita ut hæc nil aliud sit, quàm mitior Lepra, gradu enim tantum differunt. Est enim Scabies ad Lepram Græcorum quasi via, ut Lepra Græcorum ad Lepram Arabum seu Elephantiasin, si nempe sal acrius, & abundantius, pluresque & profundiores afficiat glandulas, sicque morbus diutius protrahatur. Sic etiam squamulae in Lepra generantur, quæ in Scabie non conspiciuntur, ex qua fur furacea tantum decidunt recrementa. Dicitur & Lepra ab his squamulis quasi *λεπρα*, i. e. squamosa.

*Lepra Græcorum quid?* Lepra Græcorum describi potest, quod sit obstructio scabiosa vel totius corporis, vel certæ alicujus partis, sicca, fur furacea, squamosa, vehementissimè pruriginosa, à salinis Tart. fixis coagulativis, in sanguine & succis præexistenibus & ad glandulas cutaneas delatas, ibidem obstructio-

nem pertinacè producentibus, oborta.

*Elephantiasis seu Lepra Arabum* non nisi gradu differt, & una alia malignior est & vehementior, aliamitior & benignior est pro salis acrimoniæ gradu, à cujus cum humoribus miscella, & inde exorta textura cutis colorum istorum diversitas petenda est, & non à quatuor illis famolis humoribus, prout Veteres explicarunt, & juxta humorum varietatem more solito novaindiderunt nomina, quæ à sanguine fuerit producta, Alopeciam, quæ à pituita, Tyrcam, quæ à bile, Leoninam, & quæ à melancholia reliquis majorem Elephantiasin nominarunt. Juxta Recentiorum magis intelligibilium Principia describi potest Elephantiasis, quod sit obstructio scabiosa pertinax ac maligna, cum desiccatione totius corporis, crustis & tuberculis duris, maculis lividis & ulceribus, à sale quodam fixo ac corrosivo humori viscido ac terrestri implicato, & in cutis tubulis glandularum profundioribus hærente eosque dilacerante, ortum trahens.

*Impetigo* aliis *Lichen* volaticum, mentagra, aliis *Herpes squamosus* dicitur, pro quarum squamarum diversis, colore, crassitie, consistentia, &c. & ulceris, cujus sunt recrementa, profundioris, vel superficialis varietate variè denominatus est *Impetigo*, vel *vitiligo*, cujus species esse videntur *Alphus*, & *Leuco*. Hæc gravior cum altius descendat, & (vel copiosiores albidioresque producit squamulas,) vel tantum cutem obstructionibus vexando (hærente in tubulis materia in squamas concretura) maculas producit albas, ipsas pilorum radices aggrediens; illic levior, gradu tantum minore differens. Dicitur autem adesse *Impetigo*, quando ex una vel pluribus erosis producta pustula succus erodens circumquaque æqualiter vel minus, (prout majorem minoremque invenit resistentiam, & hic vel illic perviaz ad sint obstructiones vel secus, circumvicinas aggreditur glandulas, & la-

*Elephantiasis seu Lepra Arabum,*

*Impetigo.*



& latius usque serpens profert acervos orbiculares, vel variiformes, ulcusculorum fundentium materiam, mox in squamas nonnihil albidas concresecntem. Describi ergo potest *Impetigo*, quod sit obstructio scabiosa cum tuberculis planioribus pustulosis ferè niagis proserpentibus, à sale fixo, acido, ac acri glandularum cutanearum tubulos obstruente, oborta. Cum *Alphur* & *Leuce* gradu tantum differunt, facile eorum descriptio dari potest. Duplex *Impetiginis* genus à Celso constituitur, unum mitius, alterum ferum. *Impetigo* mitior minimas cutis pustulas exasperat, & non tam citò serpit, cum fera *Impetigo* celeriter ad vicina serpat, & pruritus vehementiorem habeat comitem.

*Pars affecta.*

§. 2. Affectus hi cutanei idem agnoscunt *Subiectum*, & cum duplex Scholæ constituant *Subiectum*, primum sc. & secundarium, *Subiectum* ergo *Primum*, seu adæquatum dici potest totum corpus, & potissimum sanguis cum suis succis, qui sanguis cum perenni suo fluxu, & refluxu minima corporis alluat, & pervadat loca, & pressione adjuvet, non potest non labem suam ipsis affricare, & particulas suas feculentas in ipsis deponere glandulis cutaneis, ac miliaribus dictis, & eorum vasculis excretoriis, non aliter ac in tubulis, ac canalibus artificialibus, liquoris, quem vehunt, secreta quædam lateribus adhærent, at jam prout pars quævis corporis vasis pluribus, & angustioribus, aut aliâs majori aliqua, ad impuritates has sanguinis remanendas pororum dispositione prædita est, ita & iidem suscipiendis, & hospitandis aptior existit. Potissimam ergo sedem affectus hi figunt in cute, ejusque membranis, præcipuè verò in glandulis miliaribus, earum tubulis, & vasculis excretoriis cum capillaribus vasis lymphaticis. Quod verò *Scabies* in membranis locis magis hospitari soleat, ratio hæc est, quod scilicet membranz poros habeant constantes, quibus se accommodare dis-

facilius possunt particule rigide, unde facilius in ipsis herere quoque debent. Quare etiam *Helmontius* rectè *Subiectum* Scabiei solam pellem constituit, exclusis omnibus visceribus, & Hepate. Cum enim Scabiem contraxisset ex *Chirothea* Scabie infecta, & per reiteratas purgationes adeo macilentus, rævus, & lassus evasisset, ut vix stare potuerit, & nihilominus Scabies permanferit, Scabiem non ex vitiosis, biliosis, & adustis humoribus, aut ex Intemperie Hepatis, sed solo contactu *Chirotheæ* sibi molestam fuisse optimè judicavit. Reliqui affectus etiam cutem pro subiecto agnoscunt, in istis verò glandulæ profundiores obstruuntur, ac afficiuntur; cutis enim nihil aliud est, quàm contextus quidam retiformis, qui constituitur ex innumeris filamentis vasorum sanguiferorum, nervorum, tendinumque mira arte invicem implicatis, per quorum spatia vacua ordine parallelo emergunt ductus quidam excretorii à *Stenone* primum observati, à glandulis subjacentibus orti, & papillæ quædam pyramidales à nervis prodeunt, quæ à molli lymphæ ex ductibus illis exudante perpetim rigantur, & in cuticulam tutelæ ergo superjacentem per tenues fibras protenduntur. Has cum Celeberrimo *Malpighio*, illarum Inventore, pro immediato tactus organo agnoscimus. Animadvertendum adhuc, quod præter jam recensita in Cute, mirabili recte, ope microscopii. detegantur porri duplicis generis majores alii, qui plerique pilos sibi insertos subinent, & minores, quæ spatia ab aliis relicta occupant.

§. 3. Incipientis Scabiei signa sunt, si percipitur pruritus vehementis, qui quasi prodromus Scabiei est, item delectatio in scalpendo, dolor verò post confricationem, cutis, & cuticulæ corrugatio. Præsentis jam signa visui sese offerunt, & cognoscuntur ex miserrimo ægri statu, & molestissimis cruciatibus, præsertim noctu, dum ægri in lecto incallescunt, & fermentatio major

*Diagnosis Scabiei.*

excitatur . Cutis asperatur , interdum prurit , roditurque . Pustulæ aliquando majores , aliquando minores , modò sicciore , modò humidiores sunt , aliz quasi confluentes . Pustulis ruptis & apertis fiunt ulcuscula , quæ sanie & ichore evacuatis obdurescunt in crustulas , quibus tegitur , squamosas , & scabendo furfuracea secedunt ; deturpatio verò cutis minor est , ac in Lepræ speciebus , cum in his crustæ squamæque longè sint majores , & exulceratio longè profundior , & malignior : ut plurimum infantes ac pueri Scabie inficiuntur , nec adulti atque senes ab ipsa tuti sunt .

*Diagno.* *Lepra* Græcorum pruritus habet in separabilem , & tantus hic est , ut etiam ægri vehementissimè scalpendo nullo modo juventur , sed potius omnis generis ulcera & phlegmonas accersat , quod cutem exasperet , & subjectam ei carnem multò quàm in Scabie profundius depascatur , quia profundiores afficiuntur glandulæ , & materia est hic acrior , quàm in Scabie , unde & squamulas producit , quales in Scabie haud generantur ; dicitur & Lepra ab his squamulis , quia cutis in cortices quasi squamasque resolvatur .

Nunc ad veræ Elephantiasis seu Lepræ Arabum Diagnosin pergamus , in qua eò accuratius versari nos decet , quo magis interest , accuratum judicium ferri de suspectis in hominum consortio aut tolerandis , aut inde excludendis .

Incipientis hujus affectus signa ut plurimum sunt ab initio obscura & aliis morbis communia , eadè veluti anguis sub herba lateat , nihilominus tamen aliquatenus illam produnt lassitudo , & segnities spontanea totius corporis , mentis ignavia , stupiditas cum summa in somnu proclivitate , cuiusque tamen frequente interruptione . Insomnia metus & tristitiæ plena , & sæpè incubo vexantur ægri , aliisque affectibus soporosis : sic quoque leprosum somnambulone novimus , in

venerem alii proclives sunt , ut ipsi aliquando priapismus ac satyriasis accidat , respiratio est difficilis ac tarda , exspiratio gravis ac foetida , pulsus parvus , tardus & sæpè inæqualis , sitis intensa , appetitus debito minor . Alvo supra modum astricta laborant insecti , urinæ aliquando jumentorum lotis similes , cutis crassior , durior ac asperior redditur , color faciei , & totius corporis lividus apparet . Flatuum ac ructuum copia , à vitiosa nempe digestionem alimenta in substantiam viscidam ac tenacem mutante , quæ sæpè ope fermenti resoluta , dum amplius spatium requirunt , nec per poros obstructos exitum habent , data porta per superiorem & inferiorem gutturem erumpunt ruuntque .

Inrescentis hujus affectus atrocissimi , & quasi è latebris suis prodeuntis signa diagnostica multo jam manifestiora sunt , & quasi patæ victoriæ vexilla in facie primum , cæu cute tenuissima donata , & aeris frigido poros quosvis constringenti , & fuliginum aliorumque recrementorum exclusionem impediendi maximè exposita , apparent . Quantum enim transpiratio per poros cutis impedita sanitati noceat , testantur abunde monumenta Medicorum , nisi enim à sanguine exirent varia corpuscula , quæ aerem comprimendo materiam subtiliorem eò determinarent , ut locum ab ipsis derelictum occuparet , foret , ut sanguis sufficienti nullatenus donaretur agitatione , ut aeris gravitati resisteret . Insensibilem ergo transpirationem in singulis corporis nostri partibus perfecti quis negabit ? Imò si ea quæ exhalantur , & evaporant , oculis percipi possent , foret , ut corpora nostra nubem semper circumdata apparent : eum Celeberrimo ergo *Sanctorio* , Medicinæ Staticæ Auctore confirmamus , copiosorem materiam à corpore nostro externi per insensibilem transpirationem , quàm per urinas & secessus , & ex octo alimentorum libris , quas quotidie quis

quis usurpabit, quing; per poros avolaturas. Oritur autem secundum nonnullos in Elephantiasi, in partibus inferioribus mollibus, & spongiosis narium primò lenticula, quæ crescendo in tumorem insignem, ac deformem nares attollentem exsurgit, unde pinnae narium dilatantur, patulæ, simæ & salebrosæ redduntur, parte verò superiori ab his ipsis tumoribus coarctatus nasus respiratori obest, & dispirationem causatur; similia deinde tubercula ex rubro sublivida, indolentia, & quæ loco moveri possunt, in facie etiam, fronte præsertim, & genis exsurgunt, partesque omnes faciei scedè intumescunt cum maculis crebris vivido-nigricantibus interspersis, quæ à sanguine ob tuborum illorum præsentiam in motu suo impedito & stagnante oriuntur. Frons crassescit, & contugatur, supercilia præ tuberositate deorsum pendunt, palpebræ tumidæ, & inversæ conspiciuntur, malæ crassescunt, ac intumescunt, labia prætumida prominent, mentum crassescit, aurium pinne in ambitu torundiores, & contractiores apparent, auricula verò tumidior, & parotides circumjacentes in insignem tumorem elatæ conspiciuntur. Aspectus torvus est, oculi ex flavo rubent, pellicula si ve unguis adnascitur oculis & sæpe visum tollit, oculi sæpe in orbem agi videntur, capilli, & pili depluunt. Tubercula quoque granulosa flavescentia, vel sublivida in lingua depressa, & in palato ac faucibus spectantur, quales grandiores non raro in porcis cernuntur, deglutitio inopedita est, voxque rauca, vix raninæ item temporum, & alarum corporis partium, præprimis inferiorum ob acclivem, & difficiliorem sanguinis crassi, ac acidæ per illas motum tumentes, nigricantes, & varicantes sanguine illo propria visciditate, ac aciditate admixta stagnante, apparent. Tubercula per totam capitis pilosam partem, per collum, artus, & totum corpus reliquum disperguntur, & in brachiis cubitum:

manuumque summitatibus, in pedibus verò femora, & genua potissimum occupant, idque præpe articulos, qui copiosis glandulis gaudent. Adest insuper scæda cutis, in artubus imprimis extremis, & capite piloso, Scabrities, & inequalitas etustis quibusdam, & squamis albis quandoque sublividis, inde aliquando depluentibus, & cutis aliquando dehiscit in plantis, & digitis pedum, succedè tandem partium corporis consumptio, unde ossa, scapulae præsertim alarum instar prominent. In vigore morbi constituti ægri exhibent tubercula jam dista, & totam cutem nigrescentem. Tumores tandem excavantur in fœda ulcera, quæ cutem profundè penetrant, lata sunt, ac serpentina, labrisque callosis, & prætumidis prædita, & sanguinem, si contrescuntur, faciliè profundentia; nullum tamen sensum, quod mirandum, hæc ulcera habent, non minis ac tubercula ista, etiam si acus ad magnam profunditatem adigatur, aut aqua fervens affundatur, non tamen uratur pars, quod certum indicium est gangrænæ illæ occupantis, aut fibrarum nervearum partis materia viscida adedè infarctatum, & ab acido succo ita arrosarum, ut spiritibus animalibus sensus primarii Auditoribus nullum amplius cum partibus liberum commercium, quod in tota cute quandoque obtinet. In dictis ulcusculis, & vermiculi observati fuere, non secus, ac in gangrana, quia instar lupi rapacis omnia membra dilacerat, ac devorat, hinc bestia illa sævit in ipsa ossa, & decidunt sæpe manuum, & pedum digitus, imò nasus, & genitalia, radices quoque unguum digitorum arroduntur, funduntur, ac dilacerantur, odoremque cætrum, ac cadaverosum spirant: Febris quoque adest hectica.

Perpectis his, restat ut ex illis eruamus certa, & pathognomonica signa, quibus nixus firmum aliquid Medicus iudex infectorum pronuntiare possit: sed si rem accuratè perpendo, ex ingenti hoc numero vix

vix aliqua pauca sunt, quibus omnino fidendum sit, nisi plurima alia signa concurrant, & sequentia esse possunt.

1. Nodose, granulose, tuberosæ, & sublividæ protuberantiæ in facie, lingua, artubus, & quandoque reliquis in partibus molles, & indolentes.

2. Ulcera profunda, callosa, ac fetida, acum sine perceptione doloris admittentia.

3. Horrenda, & terribilis ista faciei deformitas superius descripta.

4. Quando omnia, & quidem generosa Medicamenta frustra adhibentur.

Alii addunt, elephantiacos noctu toto corporis habitu splendere, quod ramen falsissimum esse hactenus observavimus.

Diagnos.  
Impetig.  
nis.

In *Impetigine* mitiora observantur signa, summa tantum conspicitur cutis asperitas cum multa prurigne, squamis, & furfuribus, & si alba simul appareant macule, simulque squamulæ albidæ decidunt, & si quoque altius descendat, & profundiores afficiat glandulas. Dicitur & *Læuce*, quam simul pilorum radices aggreditur. *Alphus* verò cognominatur, quando cutis est aspera, & albo colore in superficie tingitur. Affectus enim hi, eorum jam superius diximus, gradu tantum differunt.

Galenicorū  
opinio de  
causa Scabi-  
e.

5. 4. *Galenici causam* Scabiei explicantes, dividunt ipsam in humidiores, & sicciores. Humidiores enim generari volunt à sanguine cum admixtione phlegmatis falsi. Sicciores verò fieri à sanguine bili flavo commixto. Ut plurimum Scabiem excitari per contagium statuunt, nec non à cibis salis, nimis calidis, & aromatibus acutis, & amaris. Tenuiora enim ajunt quidem excrementa in sudores assumpta, ita cutem egrediuntur: verum crassiora, atque ideo difficiliter exitum inveniunt, dicunt ibi in cute subsistere, & ita paulatim discuti: & hinc prurigines, & scabiosos deducunt affectus.

*Elephantiasis*, *Leontiasis*, *Satyria-*

*sis*, seu *Lepra Causam* veteres de-  
ducunt à crasso, viscoso, ac atra-  
bile redundante sanguine, & pitui-  
ta multa falsa, ac acida. Cause e-  
nim externæ ipsæ sunt omnia illa,  
quæ sanguinem Atrabilem & Me-  
lancholicum gignunt, & inde viti-  
osam nutritionem causare possunt:  
ut caro porcina, communicatio  
saniei, & spiritus elephantiaci.

Apprehendi autem hac affectione viros magis, quam feminas dicunt, atque inter illos magis, qui crassum, & viscosum, ac atrabile refertum sanguinem habent, & qui abundant pituita falsa, ac acida, item qui victu crasso, & ægrè concoctili utuntur, & qui in otio degunt; non minus verò iis, & qui multis exercitiis inordinatè utuntur, & per hoc sanguinem inspissant: itemque iis, qui cibos assidue in ventre corrumpunt: quod verò regionem attinet: hujus mali inducricem, esse ajunt illam regionem quæ valde calida, tum quæ vehementer frigida est: & altera quidem ob id, quod sanguinem adasceret: altera, quod frigore suo eundem congelet, & perspirationes prohibeat, ac insitum calorem suffocet.

*Lepram Græcorum* itidem *Galenus* *Lepra Gra-*  
ci ex melancholico succo, & seli-  
equum.

qua Cacochymia enasci contendunt, ubi verò serosi, tennes, & acres humores aliis crassis succis admixti, ad cutem, tanquam ad commune emunctorium à partibus internis rejiciuntur, *auxum*, i. e. *Impetigines*, generari dicunt, quæque brevi in Scabiem, ac *Lepram* transire statuunt. Remotè omnia conferre dicunt, quæ humores possunt reddere acriores, quibus accedit cutis constipatio à frigore.

*Alphum* Veteres deducunt à pituita alba, quia color cutis in hac specie albus est, serè subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur, interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. *Melan* colore ab hoc differre dicunt, quia niger est, & umbræ similis.

*Leu-*

Leucen verò Alphi habere aliquid simile dicunt, sed magis albida est, & altius descendit, in eaque pili albi, & lanugini similes sunt.

*Leucus.*

*Leucen*, sive *Vitiliginem albam* à pituita lenta, ac glutinosa in summa cute impasta *Galenici* oboriri sibi persuadent, quia iis, quæ pituitam evellunt, curari solet. Hinc *Leucen* dicunt transmutationem cutis ad colorem albidiorum, à viscosa, ac glutinosa orientem pituita. *Vitiliginum* generationem ejusdem cum *Leuce* speciei esse scribunt, verum illas ad profundum usque corpus mutare, ut etiam pili similes nascantur. *Vitilignes* verò in cutis superficiei consistere ajunt, præterquam, quòd etiam ipsæ moram trahentes, ad profundum usque procedunt, ut etiam pilos albos producant propter subjectum humorem. Nam ex pituitoso humore albas, nigras verò *Vitilignes* ab atrabilare fieri haud dubitant.

*Paracelsi opinio de causa Scabiei.*

*S. 5. Paracelsus Scabiem* procedere ait ex sale liquoris, quod in spumam transmutatur, aut in locustis exsiccat, & super cutem non aliter, quàm sal super urticam extrinsecus adhæret. Non secus illud, *Scabiei* nempe, vel pruritiui, in extremitates erumpit ex liquore varias in cuspides, prout in urtica videtur. Altera via, inquit Author, progreditur ex sanguine sal, & rodit cutem, carnem ac ossa prorsum una cum venis, ligamentis, nervis, juncturis, &c. *Scabiei* plures species juxta salis diversitates describit. *Scabiei* originem etiam provenire ex cruoribus resolutis haud dubitat, quibus accessisse ait alumen minerale scissum, à quo etiam pruritus, Sapharum, & furfurum deducit.

*Lepros.*

*Leporam Græcorum* à sale arsenici simili, vel à sale vitrioli plumosi deducit.

*Elephantiasis.*

*Elephantiasin* ex hæmorrhoidali liquoribus mensuri produci ait, vel nutrimenti descenditibus ad locustas membrorum. Quamlibet *Elephantiasin* serpere ait in modum Naphthæ, solum verò codificet ab hac illam, quod ejus sub-

stantia liquorque simul nascantur. Si ex menstribus, vel hæmorrhoidalibus morbus iste processerit, flavam aquam; si ex liquoribus, rubicundam proficere perhibet. Omnis enim *Lepra* juxta ipsum frigidior existit natura atque prapinguior, neque fieri potest, ut unquam cum Medicaminibus concilietur. Plures quoque *Lepræ* species Author constituit, Leoninam videlicet, Elephantiam, Alopeciam, Thyram, Morham, & Undimiam, quas omnes ad eandem medendi rationem redigit.

*Impetiginem, Alphi, & Leucen* *Paracelsus* oriri contendit ex cruoribus resolutis, quibus accessit alumen minerale scissum, & pro varietate salis peccantis, vel *Impetiginem*, vel *Alphi*, vel *Leucen* produci existimat.

*Impetiginis, Alphi & Leucis.*

*S. 6. Juxta Helmontium Scabie* *Helmontii* pellis inficitur, ut cutis nequeat alimentum deputatum in propriam vertere alimoniam, sed in falsum ichorem traducat, qui est pruritiui & urticalis salis, hinc *Helmontius* existimat, quod omnis *Scabies* non intrinseca petat remedia, sed solum topica, quæ sunt enecando pruritiui salis, adfert in se ipso experientiam. Cum enim *Scabiem* contraxisset ex Chirotheca *Scabie* infecta, & per reiteratas purgationes adeo macilentus, raucus, & lassus evasisset, ut vix stare potuisset, nihilominus *Scabies* permansit, hinc concludit, contra *Galenicorum* sententiam, non ex viciosis biliosis, & adustis humoribus, neque ex intemperie Hepatis, sed ex solo Chirothecæ contactu *Scabiem* productam fuisse. Impossibile enim ipsi videtur, quomodo *Scabies* ex contactu contracta, quadrantis horæ spatio ante intemperiem Hepatis induci posset ab intemperie, ut sic effectus esset ante causam; potius ergo ab acido latice tanquam fermento, & semine in pelle existente causam *Scabiei* proximam deducit. Et ut breviori circino comprehendam omnia, causa *Scabiei* ad mentem *Helmontii* est vitium, & contagium pellis virulenta.

lentum proprium, non verò Jecoris Principio scilicet interno spontaneo, five externo, fomite contagioso aliunde haustum, & transplantatum in contactu sc. corporis, lintei, vel suppellectilis infectæ, in pelle tangentis concepto.

*Lepra.*

*Lepræ Causam* quod attinet, *Helmontius* dicit, *Lepræ* insensibilitatem subjective esse in habitu carnis, effectivè in quodam veneno, quod est cruentum anodynum glaciale propemodum mortificans, & Archeum inficiens, & tædida contagio in regione sudorifera communicabile; hoc venenum, juxta ipsum incipit ab extra, ubi sentiunt interinos dolores, & externum frigus & calorem, hinc venenum hoc foris sedem habere contendit, quoniam spiritui sensitivo fermentatum ab innato calore foris protruditur, atque aliqua ex parte frigori respondet, licet non in qualitate prima elemental; alio titulo est glaciale & mortificat per modum gangrænæ, verum duntaxat partem, quam ulcere signat. Imò nec etiam inde se procul dilatat confestim, quia est ex veneno glaciali constringente insensibilitatis Austore. *Lepra* ergo juxta ipsum, venenum habet anodynum non quidem soporativum, sed glaciale propemodum, mortificans cum infectione spiritus sensitivi, ideoque potenter contagiosum, præcipuè in regione fervida, ac sudorifera.

*Impetigines*

In *Impetigine* pruritivum fermentum in Pelle latere statuit, hinc *Impetigines Lichenæ* pellis vitia esse ait à pruritivo jam dicto fermento oborta, quæ si partem aliquam obsederint, pertinaciter eam ulceroso pruritu defœdant.

*Alphi, & Leucæ.*

Cùm juxta *Helmontium* latex pluribus usibus destinentur & officiis, sequitur eundem etiam exorbitantem totidem, & plurium adhuc morborum causam fieri occasionalem, salsuginem nempe, acridinem, ac putridi commisiones ab internarum partium sordibus infectas suscipit, multasque ideo pellis exoriationes, *Alphum* sc. & *Leucæ* exci-

tant, prout & in pelle suas, atque varias pruriginis producant. Errare itaque Scholas inscitia latius credit, quæ hos defectus in Jecur insons referunt, eiusque intemperiem incusant; nec advertunt, quod unica ovis totum gregem Scabiæ infestet, absque Jecoris labe ulla, quodque absterfisse manum linteo, quo Scabiosus est usus, Scabiem propaget citra Jecoris contagium, aut defectum ullum.

*§. 7. Scabiem* oriri contendit *Villisius*. *Villisius* ex humore lymphico acido salino factò in glandulis cutaneis constanter residente. Sanguis vero, è quo lymphæ depromitur, talem acido-salvæ diathesin consequitur, vel ex alimentis uberiore sale refertis, & in ventriculo non ritè volatilifatis, vel à spiritibus debita copia cruorem non irradiantibus, nec saltem amplius coercentibus. Quum enim novissime serosus latex è sanguine elicitus salibus turgescens ad glandulas cutaneas, per quas foras erumpere debet, pervenerit, cum liquore in illis jam contento fermentat, quia cum ipso facillè nequaquam uniri potest, illi congenet non existens, & post fermentationem in alienam concrescunt materiam, quæ ob crassitiem poros cutis, quos pervadere nequit, opplet, atque obturat, & cutem in acuminatos tumores elevat, qui tum mole, tum numero augescunt à sero perpetim adventante, & à sanguine in vasculis suis à tumoribus istis compressis retento, & in cursu suo impedito. Fibræ autem nervæ in glandulis miliaribus dispersæ à salinis particulis, quibus pori omnes sunt infecti, vellicatæ, inordinatum spiritibus animalibus motum conciliant, molestique pruritus sensum excitant.

Ventriculi fermentum nonnunquam tantoperè depravatur, ut alimentum ingesta protervè concoquantur, & malè digerantur, ipsorumque principia inter se confusa ritè non expendantur, neque explicentur. Crassior ergo, rudis-

*Causa lepræ.*



que ex massa ista conficitur chylus, qui in sanguinem datus, ab ipso nequaquam subigi assimilarique potest; sed suffocatis quasi spiritibus ipsius, ab illius adventu, tardior in motu suo redditur. Particulę salinę, quę abundantes & pleręque fixę aut minus volatiles omnibus alimentis insunt, erudę minimeque exaltatę sanguini commixtę, spissiore cum circulationique minus habilem, & ad obstructions in universis partibus, quas perlustrat, producendis aptiores efficiunt. Depressis autem spiritibus, sulphureque in semetipso implicato, sal nullo amplius freno cohibitus sese in libertatem vendicat, & ceterorum principiorum jugo excusso, eorumque consortio privatus ad fluoris statum pervenit, fixusque penitus evadit, atque coagulatur. Sanguis itaque spissior factus fixisque salibus refertus, passim in tenuioribus partium tubulis cęspit, crassasque ac coagulatas salium particulas relinquit; quarum aggerie à novis perpetim advenientibus augefcente, partium cutisque pori ab illis opplentur ac distenduntur, & in tumorem elevantur. Quum enim salium istorum superficies spiculis horrida existat, partium, in quibus continentur, texturam destruunt, earumque fibras dissolcant, atque cutem in squamulas discindunt. Succus nervosus quum à vitio isto immunis non persistat, fibrarum nervearum canales, per quos circulator, in finibus obstruit, spirituumque influxum in partes exteriores impedit, earumque sensum obtusorem reddit.

*Causa Impetiginis.* Villisus negat Impetiginem produci ab humore merè cutaneo, vel contagio, vel à quavis alia causa depravato. Afferit verò in cruoris massa nonnunquam ob salis fixi fluorem passi abundantiam quasdam fieri concreciones acidofalinas, quę quum nec edomari, nec comminui aut atteri possint,

sanguinique innatantes cum ipso circulentur, ad cutem compulsi ejus poris inhærent, quos opplent, & in tumorem elevant, atque in superficie pustulas producant. Sanguinis enim crasi penitus vitiata existente, & sale in ipso imperium obtinente, novę sunt indefinenter salinę concreciones, quę priorum vestigia prementes ad corporis habitum perveniunt, ubi ipsis adiuntur, & pustularum in superficie prominentium aggeriem adaugent. Spiritibus à sale hoc pacto in cruoris massa prapollente prorsus depressis, sulphurisque inflammatione & exaltatione præditi, illius coagulationes indies augefcent, & materia tartarea in sanguine uberius progignitur, quę perpetua circulationis lege per arterias versus cutem delata, primarum pustularum molem adauget, novasque in superficie producit. Sed si sanguineus latex totus quasi tartareus evadat, in omnibus sanguiferis vasis in corporis habitu dispersis tartareas istas concreciones relinquet, ex quorum stupenda illa coactione in immentum exsurget pustularum aggeries, universęque superficies squamosa seu leprosa incrustatione obducetur: & tum humor cutaneus vitiati istius liquoris contagio corruptus, cum ipso associabitur, morboque vehementiori atque pertinaciori efficiendo auxiliares manus conferet.

Dum cutis & cuticulę pori liberi & aperti persistunt, humoresque excrementitii ad glandulas miliares, per quas foras prorumpant, appellentes, debita fluiditate gaudent, cutis lævis ac polita, & concolor permanet. Quum verò mitis ille humor in glandulis cutaneis hospitans, interdum nimis exauriatur, aut vitiolus fiat, vel cutis cuticulęve textura densior evadat, earumque porum à prava victus ratione, tum à duriori labore, aut vehementiori frigore constringatur: humor ferofus, qui per cutis foramina, continua evaporatione foras eliminari

*Causa A'phi.*

debet, præpedita via in cutis poris retinetur, & coacervatur, ejusque aggestio à nouo indefinenter adveniente accrescit. Quum enim in poris cutis non addit sufficiens vis omnibus serosis particulis continendis spatium, nec pateat ipsis exitus ob densiorem cuticulam, è poris cutis erumpentes sub cuticula expanduntur, & cuti suppositæ applicantur, illiusque colorem immutant: nigro liquidum eam tingunt colore, si Sulphura quædam crassiora & adusta admixta habcant, alio verò si liquor lymphicus purus & putus fuerit, humor autem serosus per poros exhalari solitus sale, sed volatiliori naturaliter turget, sed si vicietur, fixior fit, & acorem quandam contrahit, salisque ejus spicula paulò crassiora atque duriora evadunt, qui cutis cuticulæque poros tum sibi angustiores reperiens, in illis hæret, & remoratur; sed quum illius aculei illis infixi remaneant, forisque prominent, cutis asperitas contingit. Si verò cuticula densior fuerit, particulæ serosæ sale utut volatili imprægnatæ, eam pervadere nequeunt, & sub illa remorari coguntur, sed quum ad evaporationem continuo tendant, spicula sua cuticulæ poris inferius paulò apertioribus insigunt, quæ ad exteriorem superficiem pervenientia, eam asperam & inæqualem reddunt.

*Causa  
Leucæ.*

Liquor serosus è sanguine per glandulas cutaneas secretus, & per cutis poros foras emanans, sale volatili turget, & indole sua mitis est & oleosus: cutis itaque benigno illo humore irrorata æquabilis terfaque permanet, & quamdiu per poros suos liberum exitum ei præbet, cuticulæque pori satis patuli illius evaporationem non impediunt, nulum contingit cuti ab ipso detrimentum. Sed quum corrumpi possit liquor ipse, pororumque cutis ac cuticulæ, uti & earum texturæ dispositio immutari possit, variis decastrationibus imprimis *Leucæ*, pluribusque aliis affectibus obnoxia fit cutis; abundantiores autem in hu-

mores serosi existentes salinæ particulæ spissiores eam faciunt, & ad evaporationem ineptiores, ille verò crassioribus pollens particulis in cutis poris remanere cogitur, & in iis stagnare, sed quum perenni fluxu novæ prioribus adjiciantur hæ ab illis è poris, quos occupabant, extruduntur, & versus cuticulam propelluntur, quam tum ob propriam molem, tum ob eam densiorem permeare non valentes, in subjectam cutem decidunt, & super externa ejus superficie expanduntur, cujus innatum colorem pervertunt. Salia enim in sero diluta aculeos suos in majoribus cutis poris, per quos exeunt pili, insigunt, earumque radices erodunt & destruunt, ac illorum delapsum inferunt, sicque *Leucen* constituunt.

§. 8. *Sylvius Scabiem feram, Lepram, Impetiginem, Alphum & Leucen* gradu tantum inter se differre ait, hic & non multum juxta ipsum horum affectuum causæ differunt. Causam enim Scabiei, Lepre aliorumque cutaneorum affectuum esse humorem acrem dicit, simulque glutinosum, & potissimum acrimoniam acidam esse causam reputat, humores etiam istos acres acidosque in corporis superficie hædere vult aliquando propter pituitam glutinosam ipsis admixtam, aliquando propter aliquod in Dieta vitium patratum. Cutis enim rube dinem & apertionem Ipse ab acri mordaci, & ad falsedinem muriaticam tendente humore deducit, qui simul tenax existit, & hinc facîle concrefcit & accrescit vestimentis, indusiis, aliisque linteis parti affectæ proximis.

Existimat igitur Author, in Lepre acre maximè viscidum glutinosumque in corpore præexistens ad corporis superficiem cum circulant sanguine propulsum ibidem fissi. Et cum duo sint acria ab Authore primùm inventa, salsum scilicet, & acidum, hinc pro diversitate hujus acris & reliqui glutinis modò *Lepram*, modò *Impetiginem*, modò *Alphum*, modò *Leucen* obori-

*Juxta Syl-  
vium ca-  
usa Scabiei, Le-  
pre, Impetiginis, Alphi & Leucæ.*

odoriri contendit. Cæterum hæere dicit illos humores acres acidosque in corporis superficie aliquando propter pituitam glutinosam ipsis admixtam. Notat quoque idem Author humorem acrem ex læsa cute partes vicinas, quibus glutinositate sua adhæret faciliè inficere, ac similiter afficere, quo nomine serpere solent hi affectus; quin ratione eadem vitium hoc contagiosum reddi comprobatur, dum iste humor alios attingit, ac præcipuè infantes & pueri, quorum humores pituitosiores, quàm in adultis, facilius juxta ipsos, simili afficiuntur corruptione, illamque servant, hinc Scabiem, Leporam, Impetiginem aliaque ut plurimum contagiosa pronuntiat, quia alios contactu suo inficiunt, adhærente sc. humoris acris & plus vel minus glutinosi parte alterius cuti, quàm penetrat, & allabentis sanguinis sanæ partem corrumpit, atque in cute permanens, daturum sæpe malum patere posse contendit.

*Cartesiani  
norum iu-  
diciū de  
causa Scabi-  
e.*

§. 9. *Cartesiani* etiam hic in pristina sua persistunt opinione, statuuntque *Scabiem* ab obstructione oriri tubulorum cutis, quòd iisdem succi inhæreant spissi & viscidum à particulis quibusdam cuspidatis & taliter figuratis, ut certis quibusdam tubulis pedum, manuum, aliorumve corporis artuum inhæreant, quorum cavitati superficies eorum correspondeat, in motu impediti. Ex enim particula cum pro diversitate figurarum & tenuitatis vel crassitie diversos constituent acidorum gradus, vario quoque modo alios succos, quibus immiscentur, in motu impediunt, & fibras tubulorum, per quos fluere solent, afficiunt. Quippe cum plures ejusmodi particula viscido humore inhæreant, quæ cuspidata & acuta non tantum utrinque, sed etiam tenuiores sunt, celerius quidem, sed non ita vehementer ab æthere pertransiente commoventur, quam si pluribus gaudeant mucromibus, & majorem etiam habeant molem; etenim priores ita agitate

à visciditate non adeò difficulter se junguntur, & plures perforant fibras, verum subtiliores tam magna non efformant foramina, unde parve solummodò in cuticula excitantur pustule, quæ faciliè aperiuntur, & paucum effundunt pus; crassiores autem ex multis constantes aciebus ab æthere, cujus motui aliquantum resistunt, vehementius agitate, fibras plures in uno quodam districtu fortius dirumpunt, ut chylus etiam ex cavitatibus suis effundatur, qui cuticulam foramen istud obtegentem distendat, & pustulas majores cum ambiente quadam inflammatione efformet. Dilaceratis etiam & destructis ab acidis illis succis glandulis, cum ductibus suis lymphæ effluit, & partes humectat, quæ Scabiei species vulgo humida dicitur. Apertis verò pustulis, si acutè illæ particule, sive succi acidi, chylum inficientes vicinas semper fibras non modò cutaneas, sed subjacentes etiam musculares erodant & devastent, scabies redditur ulcerosa. Ex eisu verò fructuum horatiorum in corpore ejusmodi succos coacervari norunt, cum qui in corpore existunt ab iis faciliè incrassentur. Propagari frequentius morbum hunc per contagium aliis etiam concedunt, quandoquidem spicula cum succis corruptis effluentes per contactum, sudorem, aut linteaminum usum aliis faciliè communicentur, quæ poris cutis inherentes tubulorum obstructionem, & succorum cutaneorum corruptionem spe citius introducant.

Majori succorum viscidorum copia, & particularum angularium & rigidarum, sive acido-salarum iisdem inherentium adscribitur *Lepora* causam, quatenus ad unum penè omnes totius corporis tubuli & glandulæ ab iis obstruuntur, & sales acidi glandulis cutaneis firmius inherant, atque aculeis suis fibras cutaneas pungendo pruritus excitant, ad quem sedandum quando cutis scalpitur, ea jam arrosa fa-

*Lepora.*

cile dissolvitur, succique corrupti ex denudatis suis ductibus lentim effluentes superficiei adherent, & in tantum augmentur & indurescunt, ut levi ab tactu squamarum instar decidant, siquidem lympham, utpote causa earum materialis, adeo crassa existat, & lubricis suis particulis cum spirituosus orbat, ut neque ad fluorem prompta existat, neque superficiei corporis firmius agglutinetur, sed particulis rigidioribus plena facile dissiliat. Antequam verò adeo indurescat lympham, sed viscidior saltem in glandulis cutaneis & in specie ipsius faciei, brachiorum & coxæ hæreat, tubercula efformari indolentia & mobilia referunt, quibus morbus hic primum se prodatur, quibus cum cutis exterior satis est repleta, faucium & radices linguæ tubulos viscido ejusmodi succo repleti, uti & aliarum tandem partium, atque ab acutioribus particulis fibras cutaneas erodi, ulceraque plana & lata tum in naribus, tum in aliis membris excitari, donec tota massa sanguinea corrupta sit, & succus chylosus vitiatum ad tubulos perveniat, & nullum partibus conveniens distribuat alimentum, unde & destructis glandulis pili decidant, & è locis punctis nullus sanguis effluat, cum arteriolæ succo quodam viscido repletæ sint, nervi relaxentur, ut nullus sentiatur dolor, & color vividus, ob sanguinis & succi chylosi purioris defectum, deperdatur, donec arteriæ tandem & venæ coarctentur, ulcera verò nasum depauperantur, & asperam arteriam occupent, vitamque finiant. Ungues etiam ob nutrimenti corruptelam istam findi, intorqueri, & ungularum brutorum in modum excrecere dicunt. Colligi verò prave illos succos in corpore profitentur ex mala victus ratione, cibis non satis coctis sed crudis, multum infumatis, salitis, aliisque foedis, aere impuro, & id genus aliis diætarum aberrationibus suo loco breviter latius enumerandis.

Tenuiore verò existente lymphâ, sed ab acido in motu impedita, &

in glandulis primò paucioribus, deinde pluribus hærente, & eadem in cute obstruente, fibrasque vellicante *Impetiginem* fuscitari referunt, cujus particulæ cum ab æthere materia celerius moveantur, tubera ista in superficiei calida & rubicunda reddi dicunt, & cum successivè lympham istam obstruens augetur, tubera illa augeri, uno post aliud succrescente, & posterioribus priora in altum prementibus, ut botrum referant, donec lympham exsiccata, & particulis falsis rigidioribus exsistentibus, cuticula dehiscat, & succi indurati squamatim decidant.

*Alphum* sive *Vitiliginem* orium habere censent ex corrupto chylo & sanguine, qui si partim adhuc bonus existat, & in cute ejusque glandulis earumve interstitiis tum partes corruptæ spissiores, tum bonæ fluidiores & butyrosæ dispergantur, partes spissiores & ad motum pigriores cuti adherentes, sed eidem assimilari non valentes, guttas repræsentare albas, Alphi nomine notas, quæ nec asperæ sint, nec squamosæ, nec ulceratæ, nec dolentes, nec frigatæ rubcant; si verò succus quidam accedat acidus, fibras & glandulas cutaneas destruens, ut radii luminares suffocentur in iisdem, coloremque fuscum præsentent, *Melælar* produci innuunt, vel *Morphæam* nigram: uti si omnimodò destructis hinc inde glandulis pili decidant, & lympham ex diruptis suis canalibus effluens albidior coaguletur, & radii lucis incidentes immutati remittantur, *Leucen*, sive *Morphæam* albam pronasci, in qua fluidiores adhuc paucae remanentes particulæ pilorum progeniei insufficientes, & ad cutis superficiem delatæ ab ambiente aere comprimantur, & prout in motu fuerunt coagulentur, sicque superficiei in hærentes lanuginem ejusmodi, qualis mala cydonia, vel folia populi albi investiat, exhibeant.

§. II. Eadem ferè *Scabiei* causa, me iudice, est ac Erysipelatis & Herpetis suprà jam recensitæ, glandula *Scabiei*,

dula enim hic aquæ ac tubuli lymphatici subcutanei obstruuntur & eroduntur, sed tamen profundiores, quam Erysipelatis; varix enim & hic oriuntur pustula, & ulcuscula quæ prout diversa est sanguinis humorumque intemperies, ipsius cutis diversa textura laxior, vel confictior, etiam pro eorum minimis diversitatibus ratione siccitatis, humiditatis, acridinisque majoris vel minoris, figuræ, magnitudinis, vel pertinaciæ, vel quatenus cum aliis morbis conjunguntur, vel eos subsequuntur, varia sunt variisque insignita nominibus, ita ex. gr. ab usu nimio fructuum ( licet ordinariò per contagium disseminetur, ) æstivorum præprimis acidiusculorum, austeriorum, ut uvarum, &c. obortæ in cutis tubulis intortis, angustis vel constantioribus membranosis, ut circa manus regionem, obstructions & dein erosiones pro acridinis gradu & copia conjuncta majori vel minori visciditate, vocantur *Scabies* seu *Psoa*, magis vel minus *humida* cum materia purulenta, ichorosa & sæpè ab erosivis vasivis sanguiferis cruenta: vel *sicca* cum squamis vel crustis majoribus vel minoribus, pro multitudine diversorum vasculorum exesorum, materisque visciditate, cum pruritu vel dolore ac ardore, decedentibus pustulis novæ succedunt: vel quia materia ex iis sanguini communicata aliqualem secessionem, atque hinc ob tubulorum angustiam novam obstructionem causatur: vel quatenus materia sub crustis novos erodit tubulos: cumque hæc materia aliquatenus sit tenuis, & volatilis per sudorem alterius corpori, & hinc sanguini communicata, vel lymphæ in cutis extremis existenti, talem in sanguine producit mutationem, ut sal vel æcidum præcipitetur, hoc est, ut hæreat angustis in cutis tubulis, ob aeris injurias foras avolare nequeat, mox exulcerationibus se proditurum; vel cum ob conjunctas viscidas particulas manibus, &c. al-

terius hominis facillimè adhæreat, & quasdam epidermidis vel cuius fibrillas abscindendo ab iis incinctorum resiliens reinnetur citius vel tardius, pro sui tenuitate, acutie, &c. aique subiecti dispositione, vel accedente aeris mutatione instar fermenti succum lymphaticum in mixtura, ( qui dein sanguinem ) turbando, tubulosque ejusdem erodendo, labe scabiosa est infectura. Hinc liquet, cur visciditati involuta & stagnans in cutis tubulis aliquando certum tempus requirat, antequam in actum dedicatur; adhæc cur Scabies desisse visa vel curata ob consolidatas exulcerationes, cerio revertatur tempore. Sal ergò acidum coagulans & obstruens est in *Scabie* subtilius, quam illud, ex quo & per quod furunculi generantur, & magis in superficie hæret, affectus enim hiantum gradibus differunt, quia eadem ferè conspiciuntur phænomena, pustulæ enim scabiosæ circa furunculos æquè apparent, ac in *Scabie*. Sal acidum subtilius in *Scabie* adeste constat ex eo, quòd hic affectus aliis faciliè per sudorem communicari possit, uti quotidiana notum est experientia, hinc faciliè explicari potest, quomodo Scabies aliis communicetur, non verò furunculi; supponi ergò debet, quòd sudor Scabiosi manibus vel aliis corporis nostri partibus communicetur per tubulos, cujus sudoris particulæ fermentibiles cum lymphâ ibidem contenta ad cor mediante sanguine reveantur, ibidem appellens sanguis particulis peregrinis repletus instar fermenti exotici, necessum est ut ejusmodi vitiosa sanguinis ac succorum mixtura in peculiari genere vasorum discernatur ac comprehendatur, & cum nullæ ad hanc materiam viuosam recipiendam aptiores sint, quàm ipsæ glandulæ cutanæ, quia cum his vasculis in motu, ordine, & figura magis conveniunt, quàm cum aliis. Et ut accuratius Tyrones rem hanc intelli-

gant, supponant, 45. libras succorum cum sanguine in toto nostro corpore subsistere, & plures quam millia diverforum canaliculorum, in quibus succi vehuntur, reperiri, ac quodlibet vas repleri, sique aliorum circuletur succus, propediem alio adveniente succo repleri, ita ut quodlibet vas juxta suam capacitatem & magnitudinem ex communi alveo adimpleatur. Ex quibus facile ratio peti potest, cur Scabies potius in tubulis cutaneis, quam in aliis corporis partibus producat. Certum est in Scabie non semper totam massam sanguineam esse viciatam, uti vulgò à Medicis creditur, qui propterea statim confugiunt ad purgantia, cum tamen nil quicquam istis efficiant. Sunt enim plures homines Scabie infecti, quoad cetera sanissimi, potest ergo esse, quòd aliquod fermentum lateat in poris cutis, quod solum fixum in sanguine à particulis reliquis præcipitet, adeoque cura tantum est instituenda ad huncce solum per poros cutis evacuandum.

Opinio hæc nostra de causa Scabiei non Novitatis argui debet, nuper enim incidi in Librum *Iacobi Sadoleti Episcopi & Cardinalis de Laudibus Philosophiæ intulatum, & Anno Christi 1541. impressum*, in quo de Scabie sequenti modo disserit: *Scabies est morbus vulgaris, & omnibus notus, quem Pforum Græci vocant, nos verimus Scabiem, cum sanguis accrescens sparsim è cute conatur erumpere, & quacumque funditur, propter acumen stimulis pungit inficitque corpus, & insciendo pruritus acris ciet, qui sunt quasi fermenta quedam, & nondum appropinquantis doloris*. Ex hisce patet, veteres Philosophos prægustum veritatis jam habuisse. Nunc pergamus ad explananda in Scabie obvenientia phænomena, & quidem paucis. Ex pruritu satis superque constat, materiam, ex qua Scabies produci-

tur, non esse adeò crassam ac tenacem compactamque, sed quòd particula volatiles faciliè per allisionem aliarum particularum alloquentium appellantur, sed quoniam appulso totius massæ sanguineæ nimis debilis est, hinc tantum cum mitt & blando popysmate allidit, à quo fibræ tantum leniter tanguntur ac pulsantur, exinde *titillatio* oritur. Pruritus nocturni causa est calor, dum enim cooperti sumus, corpus nostrum continuo transpirat, hinc fermentatio in succis stagnantibus oritur, & sic particula in glandulis affectis commoventur, & ejusmodi producant pruritus molestum.

Si pustulae decidunt, aliz regenerantur, ratio hæc est, quia ab attenuata pustula nonnullæ particulae peregrinae sanguini iterum commisceantur, qui rursus huc delatae eundem edunt effectum, & producunt affectum. Reliqua phænomena facile explicari possunt.

Ad causas Scabiei mediatas remotiores nunc festinandum est, inter quas eminet Aer: hic nocet aer nimis nitrosus, frigidus, qui ad coagulationem succorum producendam aptus est: imprimis vetò morbisfer Autumnus, qui corporis nostri succos ad plurimos disponit morbos, præsertim ob assumptos fructus horarios tum temporis abundantes, nihil enim magis hoc in affectu nocet, quam abusus ejusmodi alimentorum acidorum & salinorum, de quibus & aliis paragrapho de *Dieta inferioris latius & fufius acturi sumus*.

Si totum corpus Scabie fuerit infectum, & sanguis ita inquinatus, ut per universam cutem obstructions, & hinc faciliè continuæ exulcerationes fuerint exorta, vel tante fuerint tenuitatis & acridinis, ut continuo circumvicinos aggrediendo tubulos tum erodendo, tum speciem Erysi pelatis ac grangræ levioris

*Causa Lepra.*



ris introducendo, tandem per totum corpus fuerint diffusa, ubique continua foetida crustacea & squamosa ulcera, dicitur adesse Lepra, atque à similitudine, (cum adeo sæpè fuerit crustosa cutis, ut Elephantiasis eam repræsentet) Elephantiasis, qui affectus optimo jure Cancer totius corporis, seu Gangræna omnium glandularum dici meretur, cujus causa proxima sunt particule terrestres & viscidæ Tartaro sive oleo quodam fixo & acri de indole acidorum prægnantes. Viscidas enim ac terrestres particulas peccare, præter testimonium oculorum & manuum quod easdem in sanguine demonstrat, etiam evincit pertinacitas morbi, tuberculorum & tumorum durities & tenacitas, eorumque, ut & ulcerum & quandoque totius cutis insensibilitas. Sic etiam acres & austere particule quando à crassis succis præcipitantur, nec propter rigiditatem, qua gaudent, in mandris, sive tubulis partium solidarum accommodari debite possunt, sed illis constanter infixæ hærent, necessarii aculeis suis, prout sc. illæ magis vel minus fuerint rigide & acutæ, continuū pruritus & etiam dolorem, fibrillas nimis discindendo, in mente excitare possunt. Sal etiam acidum in Lepra adesse probatur à corrosione partium carnosarum & ipsorum ossium, item à colore obscuro & nigricante totius corporis leprosum, & præcipuè illorum sanguinis, qui similis est ei, quem spiritus acidi minerales in venas carnis vivi vel alius animalis per siphonem injecti producunt, spissum sc. & atrum, contrarium verò edunt effectum salia alcalia volatilia & fixa injecta, ut sunt spir. sal. Armoniaci, C. C. ol. Tartari per deliquium, quæ sanguini infusi colorem exaltant, quod quilibet in vino experiri potest, sal enim volatile C. C. vino infusum illud intensiuscenscit facit. Sic quoque no-

tabilis extat observatio apud *Marcellum Donatum*, si ipsi fides adhibenda sit, quod sanguis ex vena secta Elephantiasis laborantis emissus ipsam congelaverit aquam.

Lepra quoque aliquam habet asinitatem cum Scorbuto, Cancro & Lue Venerea, qui affectus omnes eundem oriuntur ab acido coagulativo, quare sæpè morbi in hunc vel illum commutari solent, sed in Lepra acidum hoc vitiosum ab humore terrestri ac viscido implicatur ac infringitur, unde non nisi lente rodit & mediante illa visciditate corporibus aliis tenacius adhæret, & volatili suo acido per contagium se propagat.

Certum enim est, cum humor iste tenax ac terrestris tunc sal acidum in massa sanguinea abundant, & proportionem excedant, illius mixtionem non tantum pervertunt, sed & motum ejus turbant. In Leprosorum ergo sanguine ac succis particule sunt ad motum ineptiores, quadratæ vel ramosæ & rigide viscido inhaerentes, imò aliquando instar palorum inter reliquias ad motum promptiores ubique infixæ, illarum motum impediunt, imò particule salinæ acide cum reliquis concretescendo illas præcipitant, & instar lactis coagulant, hoc autem haud impedit, quo minus motu sanguinis ac succorum ordinario ita turbato & impedito, extraordinaria ejusdem fermentatio adesse possit, cui etiam tribuendum est, quod humor malignus, qui in profundioribus & magis absconditis lateat glandulis, velut in domo Plutonis delitescat, jam internorum victor, superficiem corporis invadat, ibique trophæa sua erigat, variis ac crudelissimis Symptomatum conspicuis. Contingit quoque simili modo, quo Tartarus & faeculentia in musto fermentante ad latera dolii, recrementa ista crassa & salia coagulata ad latera vasorum lymphaticorum ductuum glandularum excretoriorum,

& Peripheriam corporis pellantur, ubi ferofitate adhuc excepta, & diluta, minutiffima etiam vafa capillaria subire poffunt, qua ratione cutem, & glandulas lympham filtrantes, ac fegregantes replent, ibi à lymphâ per poros, vel aliorum evadente, derelicta, nec ob crassitiem per poros externi, nec minuta venarum oscilla cum sanguine reliquo subingredi poffunt, herent itaque in angustis illis, & ab aliis pari modo subsequen- tibus pressa, & invicem aggesta, partem in fœdos atollunt tumores, ibique magis, magisque exsiccata majorem acquirunt malignitatem, & acrimoniam, atque erosione ulcera excitant insanabilia, insensibiliaque.

Causæ remotiores, & ansam huic affectui præbent, ut Aer, qui calidior, & siccior remotè suum symbolum conferre potest, hinc Ægypto, teste etiam Galeno, endemius est, & in Asia, Africa, & Hispania frequentior est Lepra, quam nostra in Europa, crebrius tamen occurrit in Gallia Narbonensi, & Aquitania, Germania item superiori. Nocet quoque aer frigidior, qui succos incrassat, viscidumque auget, vel acior, qui particulis salinis ex terra imprægnatus, vel putris, ac fœtidus. Lepra, & tempore Veteris Testamenti maximè communis erat, nunc verò fuerit à certa aeris constitutione, vel Dei punitione, id Theologis discutendum relinquamus.

Mala victus ratio ipsum morbum producere valet, vel tantum ad eum recipiendum corpus disponere potest; sub hac classe referuntur cibi pessimi, salini, ac acidi, vel singularibus particulis præditi, & omnia ea, quæ chylum viscidum acidum salsum, & terrestrem suppeditant, ut sunt carnes, ac pisces fumo indurati, aut muria conditi, pisces butyro frixi, fungi, bulbi, caseus vetustior, panis furturaceus, aut nimis acidus, le-

gumina nonnulla, carnes non coctæ, quibus Tartari vesci solent, hinc & Lepræ obnoxii sunt; nocent etiam cerevisiæ crassæ ac vina tartaro crasso fœcunda, usus spiritus vini & aliorum spirituum sulphureorum. Somnus quoque & vigilæ nimis, ut & quies suum asserunt symbolum, quò etiam referri poffunt. Excreta & Retenta extraordinariè se habentia. Denique animi pathemata vehementiora ansam Lepræ dare poffunt, quæ ceu fulmina sanguinem & succos percutiunt, & inter ea imprimis, quæ spiritus figunt, debitam eorum ex cerebro in partes subiectas emanationem, sanguinisque in corde expansionem & rarefactionem impediunt, & per consequens succis crassis ac acidis plus justo augendis occasionem dant, ejusmodi sunt tristitia ac mœror, cutis immodicæ, &c. Contagium quoque facillimè producit hunc morbum, quod vel ab ortu, vel post nativitatem communicatur, undè Elephaniasis vel hæreditaria vel æcclitica dicitur. Primò igitur hæreditate ad invitos etiam transeunte hoc malum possidetur, alterutro Parentum vel utroque etiam semina morbofa suppeditante. Patris enim semen cum nihil aliud sit quam chylus spiritibus alcalibus volatilisatus, illorum diatheses morbofas facillè recipere & conservare potest, nec impedit, si cum Harvæo Anglo spiritum tantum genitalem ad ovum immediatè (non verò prius per totam sanguinis massam & dein ad ova delatum, prout quidam opinantur:) pertingere, illudque fœcundare credamus, cum haud difficulter percipi possit; spiritum illum in universali hac totius corporis corruptione à Principiorum suorum, sanguinis, succorum ac spirituum labe planè immunem esse non posse, sed misasmatibus, seu particulis nonnullis exoticis, characterem affectus continentibus necessariò conspurcatum existere debere, quæ cum

cum instar fermenti venenati se habeant, teneras ovuli partes facile in indolem suam deflectere possunt, & tubulos succosque ita disponere, ut eadem labe infans afficiatur. Mater quoque, quæ in opere hoc generationis haud omnino se passivè habet, ut Veteres somniant, suum addit symbolum, dum præter ovum, cum primam foetus materiam, nutrimentum etiam illi in utero suppeditat, succum nempe chylosum, neutiquam autem sanguinem menstruatim aliàs excerni solitum, prout Arabes fabulantur.

Sic & post natiuitatem contagium huius morbi suscipitur, non duntaxat per leprosum, aut eum, quibus usi sunt, contactum, sed & per halitus tum ex toto eorum corpore & glandularum poris, tum imprimis ex ipsis ulceribus foetidis in aerem sparsos, & cum eo per tubulos corporis subeuntes, & sanguineæ massæ communicatos, eandemque producentes mixturam sanguinis ac succorum. Leprosus etiam per coitum communicatur, item per oscula, linthea, vestes, pocula, &c. per hæc enim subtilior veneni huius pars per fermentationem abrafa, & leni alicui viscositati involuta, poris cutis se insinuat, & secundum ductum vasculorum illius excretorium in glandulas, & hinc mediantem lympham in sanguinem deferretur, quem paulatim vi fermentativa in indolem suam convertit & degenerare facit.

Ulcuscula verò in *Impetigine* nec ut in Leprosia contagiosa sunt, nec ab externa causa contagiosa oriuntur, sed à sanguinis & succorum certa dyscrasia seu intemperie introducta, vel ab erroribus in Dieta, vel à morborum quorundam non rite curatorum reliquiis, ut scorbuti, luis Venereæ, &c. vel à parentibus traducta, cum qualis parentum sit sanguinis & humorum mixtura, talis per semen propagatur, & per alimentum foetui communicetur; porro nec ita, ut in

Leprosia, (saltem non ordinario, si gravissimam speciem exceperis,) per universam cutem diffusa sunt, sed tantum hanc vel illam, vel aliquas corporis partes obsidet *Impetigo*, cujus materia ichorosa ex orificiis vasorum expulsa tenuibus vel aquosis particulis, ab aere vel corporis calore, vel ætheris celebriori (ob præsens *Erysipelas*) transfluxu, &c. fugatis, diversimodè citius vel tardius concrevit varias in squamulas, prout unus vel plures tubuli glandulæ unius miliaris erosi transmittunt copiosius vel paucius chyli portionem resinolam, viscidam magis vel minus acutioribus salis, vel acidis, vel humidis permixtam, si autem capillaria sanguinem ad vel à singulis glandulis vententia, pluresque glandularum plurimum vasorumque tubuli fuerint erosi, simul copiosorem fundunt materiam in varias transformandam crustas.

Sic quoque sal istud in tubulis cutaneis hærens, cum humoribus serosis ibidem existentibus aliam efficiunt texturam, ita ut pustulæ nigro tingantur colore, quia particula hæc salinæ ob densiorem cuticulam stagnantes, è poris cutis erumpentes sub cuticula expanduntur, & cuti superpositæ applicantur, illiusque colorem immutant, & sic oritur *Alphus*.

Quod si simul sal istud acre contingat ad glandulas minutissimas pilosas, easque acrimonia sua erodat, ut pili exeant, & decendant, oritur affectus *Leuce* dictus. Affectus enim hi parum inter se ratione causæ differunt.

§. 11. Sequuntur ordine horum *Prognosis*, affectuum *Signa Prognostica*, & primo *Scabiei*. Scabies non tam periculosa, quam molestissima, nec per se lethalis existit, nisi in curatione error committatur, retropulsa enim peiora sæpe producit symptomata, imò in infantibus & pueris nonnunquam ipsam mortem, sic observavi palpitationem cordis, anxietates,

*Causa Impetiginis, Alphæ & Leucæ.*

Epilepsiam, tussim convulsivam, convulsionem, diarrhoeas, Apoplexiam, aliaque mala exinde producta; sic quoque in filia decem annorum ad Scabie repropulsa salutum sancti Viti, seu salutationem convulsivam vidi. Aliquando pectoris dolores, & catarrhi suffocativi ex Scabie repropulsa in praxi nostra quotidie animadvertimus. Bona aliquando est Scabies, ut *frignum*, quatenus sanguis liberatur ab impuritatibus, & segregatur in glandulis: mala vero, est ut *causa* quatenus abundare ejusmodi salinas fixas particulas in M. Sciae reliquis succis denotat, quae autem diversimodè descendunt: pessima quoque Scabies est, si caput obstruat. Quo plures occupat partes, (universalis quasi,) eò pejor, quo foedius exasperat, eò deterior. Scabies ergo quo asperior est & magis prurit, & plures partes afficit, eò difficilius tollitur. Scabies quae in ulcera imprimis pedum transiit, curatu difficillima est. Scabies, *sicca* difficilius quam *humida* curatur. Neglectum hoc malum facili Marte in Impetiginem, Leporam & Elephantiasin nonnunquam incurabilem transiit.

Omnis verò Scabies est maligna; hinc & saepius multum in cura taceat negotium, quia quamvis cetera salva sint in corpore, superficialium tamen tubulorum & vasculorum curaneorum tanta est obstructio, ut saepius quo magis sudant Scabiosi, eò magis in cute descendunt.

Elephantiasin incipientem tanquam monstrum in incunabulis haud difficulter curari, sed ubi jam altas egerit radices, vestigiis violentiae suae cuti impressis, rem multo jam difficiliorem & periculosiorem esse notum est, quamvis spem omnem curationis, necdum abjicere debeamus, sed quando ad summum malignitatis acumen adscenderit, insanabilem planè esse, prout etiam quae hereditaria est, quae nunquam in totum extirpari

potest, cum ejus principia primis jam focus staminibus combinata, arte nimis partibus adhaerent: unde hos & confirmatos Elephantiacos & Leprosos spem curationis abjicere jubemus, cosque quemadmodum olim Veteres mortuos suos Diis subterraneis consecrandos judicaverunt. Hinc & in nostra Germania ejusmodi leprosi propriis aedibus in viâ Regia extra civitatem extructis inhabitare solent, ut melius extra consortium aliorum hominum vivere, & elemosynam à transeuntibus petere queant.

Prognosis *Impetiginis*, *Alphi*, & *Lencer* magis vel minus est periculosa & curatu difficilior, prout ipsa causa, videlicet actedo vel crassities fuerit major vel minor, vel prout combinati fuerint cum aliis morbis; si introrsum vergunt, periculum indicant maximum, aliàs quantum indicant materiam peccantem, propter fermentationes sufficientes posse ad circumferentiam corporis expelli, bonum exhibent signum.

§. 12. Multum sanè ponderis ad felicem affectum horum atrocissimorum curationem situm est in congrua ac legitima *Dieta*; quae id quandoque praestat, quod Medicamenta nequeunt, imò pluribus morbis fomes quasi praecindendi potest. Aer ergo sit ante omnia purus, salubet & lucidus, Euro perflabilis, multo aethere relictus, vitetur omnis aer foetidus, crassus, turbidus ac nimis frigidus, ut & pravis nebulis atomisque conspurcatus. Alimenta sint bona succi, & facili digestioni, carnes animalium juniorum, avicularum, vel vervecinae, vitulinae, jusculisque incoquantur herbae aromaticae, fugiantur nimis salae, acres, fumo indurate, & carnes crude, &c.

Potus sit hic imprimis calidus Theriac vel Coffea cum decocto lignorum paratus, quo solo potus plures vidimus curatos. Cerevisia tenuis probe defaecata & aromati-

*Dieta*

*Alimenta*

cis condita, ut sunt radices Enulz, herbz scolopendr. fumar. cort. Guajac. citri, &c. vina acida Rhe-nana, Franconica, Neccarina, Mosellana, Baccharacensia, quæ omnia in se continent acidum sal fixum, maximè noxia existunt Con-cedi verò potest Gallicum, Hispa-nicum, & cō dictum.

Motus sit modicus & deambula-tiones. præsertim post pastum insti-tuta. Quies nimiam & vita seden-taria sæpe nocet, hinc interdicien-da est, quia inde tenax ac viscidus producitur sanguis. Alvus respon-deat spontè, vel artis beneficio ad officium redigatur.

Venus nullo modo concedenda; chylus enim optimus cum spiriti-bus planè his absumentur, tunc in tubulis remanet duntaxat sal fixum ac acre viscido inherens obstrues-que. Sunt, qui statim post coi-tum in deliquium animi incidunt, ceu nos quædam novimus exem-pla. Excernenda omnia iusto tem-pore reddantur, ne obstruendo sanguini ac succis nostris coagula-tionem afferant.

Animi passionès vitentur, ira & indignatio ad sanè rationis tru-tinam mensuranda sunt, Medicus animum egri mœrori & tristitiæ de-ditum certa curationis spe soletur ac demulceat.

§. 13. Galenici quoad Scabiei cu-ram, à purgatione semper initium ducunt, & sunt ex iis qui purgan-tibus præmittunt preparantia humo-res ex herbis fumar. endiv. cichor. borrag. lupul. Epithymo aliisque parata, & in sero lactis caprini ad tertiaz partis consumptionem deco-cta & dein edulcorata. Pro purga-tione commendant omnia melana-goga phlegmagogis mixta, ut sunt massa pilular. de fumo terre, extr. agar. cochiar. pulv. Syrius. Prius etiam sanguinem educunt, postea exuberantem humorem, ubi antea cum extenuarunt & concôxerunt, exhibitis potionibus meatus ob-structione liberantibus, Medica-menta purgantibus expellunt, ac demum ad præsidia, quæ loco affe-

cto accommodata, accedunt.

Inunctionibus exsiccantibus & discutientibus summe cuti inheren-tes humores digerunt ac evacuant. Balnea prodessè dicunt, ea maximè, quæ sua sponte prorumpunt & ni-trum ac sulphur, & ejusmodialiam qualitatem recipiunt, quæ abundè exsiccare & dissipare credunt, post quæ convenientia innumeraque un-guenta, linimenta quæ præscribunt, ex. gr.

℞. *Salvia*

*Olea Aethiop. lachryma* aa. ʒʒ.

*Cori. rad. capparis,*

*Gummi* aa. ʒviij.

benè trita coq. cum aceto & oleo q. s. confectumque inung. crebrò in Sole.

℞. *Succin. ad. asphodeli* ʒiv.

*Sulphuris ignem non experti,*

*Manna* aa. ʒv.

*Nitri* ʒʒ.

M. Trita madefaciunt cum aceto acerrimo, ut in succum solvantur, & crebrò illinunt.

℞. *Colophon. arid.*

*Pingued. bovis & gallin.*

*Ol. laurin.*

*Sulph. ignem non experti.*

*Cera pura*

*Resin. Terebinth.* aa. ʒʒ.

Subacta tervefaciunt cum oleo rosa-ceo, & illinunt in Sole. Sequen-tem illinitionem admodum mirabi-lem in Scabie dicunt.

℞. *Lauri amara folior. tenerum* ʒii.

Benetusa quoq. cum oleo consum-mi ad tertias, dein colant, & spe-cies abijciunt oleo, atque admi-scent.

℞. *Cera alba* ʒiii.

& elixant, quoad dissolvantur, postea insperg.

*Sulphuris ignem non experti tri-ti* ʒi.

bene confectum illinunt in Sole, Vel:

℞. *Succi squillæ* ʒiii.

*Cera pura* ʒii.

*Olei rosacei* ʒiv.

*litharg.*

*ceruss.* aa. ʒiii.

*pietr. liquid.* ʒʒ.

*helysmatir, seu scorie argen-ti Syriaci.* aa. ʒii.

Trita irrigant cum aceto, & cocta ad consistentiam illinunt in Sole frequenter.

Sequentem quoque illinitionem Scabiei admodum esse probatam scribunt.

*R. Farine ervine  
lupinorum.  
sanigræ. aa. ℥ii.  
cicer. nigr. ℥i.*

Trita excip. cum melle, & confecta illinunt in Balneo.

Ova decem in aceto acerrimo macebant, quoad omnis ipsorum testa marcescat & mollescat. Dein coquant cum rosaceo, & aceto lavigatis adjiciunt lithargyr. ℥ss.

Sed quis queso hæc omnia describat?

In siqua verò Scabie commendant seg.

*R. Ceruss.  
amyl.  
rad. anchusæ aa. M. ℥.  
Cera  
olei aa. ℥ii.*

*M.* Si verò Scabies est humida, sequens laudant.

*R. Ol. rosac.  
laurin. aa. ℥i.  
Pulv. Nitri  
sulphuris aa. ℥i.  
Styrac. ℥ss.*

*M. F. linimentum.*

*In Leprosæ  
seu Elephan-  
tiasis.*

*Leprosæ seu Elephantiasis* confirmatam, & altas agentem radices, & quidem exulceratam tanquam Cancrum totius corporis incurabilem esse contendunt, ubi verò in principio est affectio; ut neque aliqua partium decidat, neque ulcerata sit cutis superficies, neque etiam tumida eminentia plurimum insurgant, verum turpis solum sit facies, ita tamen, ut non valde indecorum aspectum præferat, curare tentant. Non pauci per solam capitis unctionem, plerosque qui ita inceperunt, prohibere conantur, ne ab affectione superarentur. Statim igitur incipiente morbo venesectione utuntur, cum repetita sanguinis detractione, atque hoc magis in verè, quando maximè & gignitur affectio, & exacerbatur. Pau-

cis autem interpositis diebus, novem aut decem, purgant ipsos pulve ex colocynthide, non una vice, sed sæpè, juxta rationem Medicamenti dosin adaugent. Purgationem quoque ex hiera iis commodam esse dicunt.

Rursus autem diebus circiter 10. interjectis, serum lactis scissum ipsis dant. Sequentibus verò diebus lacte non scisso, aut recens multo ægros alunt, purgationem ex veratro albo bis vere, autumno verò semel instituunt. Materiam peccantem ad ventrem ac intestina deducunt, & ex alto evacuantibus ac transferentibus humores utuntur, siccant ac adstringunt cutem. Leves igitur cucurbitas ad os ventriculi, & ad præcordia affigunt, & iisdem quoque partibus dropaces adhibent. Paucos autem tempore interposito rursus reflectendum esse ajunt, initio à purgatione per hieram sumpto, omitta venesectione, ex qua majus detrimentum, quam utilitatem ullam futuram esse, perhibent. Dein ad specifica transeunt & potiones sequentes plures laudant.

*R. Aceticyath. N. ℥.  
cedric*

*Succ. brassicæ crud. cyathi. aa. N. iij.* Mixta hæc dant manè & vespèri. Velehibent pulv. folior. Sideritidis herbæ ad ℥j. in vini cyatho uno: C. C. ℥j. & aceti scyllicæ. cyathi mensuram bibendam præbent quotidie, post matutinam deambulationem, aut sequens Eleqtuarium.

*R. Scilla affata ℥v.  
Mell. q. s.*

*M. ad formam eclegmatis.*

Aut exhibent succi cyrenæici ervi magnitudinem melle & butyro dilutam, aut remanenti eboris drachmæ dimidium cum vini cyathis duobus, aut cumini Aethiopici drachmas tres cum melle velut eclegma. Præ omnibus autem hoc in morbo efficacem esse dicunt Theriacam ex viperis, & potam, & sorisencusillitam. Si verò habere possunt ipsa animalcula, nihil adeò efficacax esse, velur viperarum carnes coctas



coctas comestas ex albo jure, facta coctura per aquam copiosiore, & salem, & porrum, & anethum usq; ad spinarum separationem, abscissis prius capitibus, ac caudis ipsarum, ad digitorum quatuor mensuram, exemptis etiam intraneis ipsarum, pelleque detracta. Quo remedio ut plurimum in Gallia, & Italia Medici moderni uti solent in morbis ferè omnibus desperatis, & in iussulis viperas vivas etiam decoquunt agrisque propinant manè, & vesperti. Quin & Theriaci sales idem prestare ipsis censentur, cum obsoniis sumti: si enim ipsi utantur, squamas veluti corticem quandam de cute ipsorum discedere promittunt. Caterum post curationem intrinsecam Smegmatis in balneo utuntur ex decocto betæ, aut sænigræci cum aphronitro, aut sapone, aut myrobalano, & quandoque etiam pilothris. Detergere etiam dicunt postulacum cum aceto tritum, & tenuè sempervivum, & rumicis radices aceto coctas, & alumen cum sale, & sandaracha, aquis portionibus in vino, & oleo lentiscino: & id quod ex alcyonio, nitro, sulphure, & myrti folia paratur, cum aceto tritum, & illitum, & quod ex sepia testa usta & pumice, nitro, cimolia tosta, gummi & galla omphacina, partibus partibus parant, siccum inspersum, aut cum aceto affricatum. Sed etiam sequens mirificè juvare credunt.

*R. Radic. Rumicis M. j.*

*Nitri ℥ Lx.*

*Thuris ℥ xxv.*

*Sulphur. ℥ xxij.*

*Cum aceto Aegyptio illinunt.*

Efficax esse etiam sequens perhibent.

*R. Auripigmenti ℥ x.*

*Sulphuris viv. ℥ viij.*

*Coffi ℥ xij.*

*Calcis viv. ℥ lvi.*

*Cera ℥ v.*

*Baccar. laurivaridar. ℥ xij.*

Hec omnia populi foliorum succo aut crasso decocto subigunt, & mellis spissitudine habentia illinunt.

Cataplasma enim imponunt, si tu-

midæ eminentiæ, aut inflammata, aut exulcerata fuerint, quod parant ex alica cum succo polygoni, aut plantaginis, aut helixine trita; sed & milesia herbæ viridis folia, cum axungia tusa, & imposita mirificè opitulari perhibent. Exulceratis autem partibus imponunt Emplastra varia, id quod ex diaphryge paratur, & Melinum ex vino, & coriacium, & quod fit ex aceto mulso. Pastillus etiam Andronius, & pompholyx, & cadmia illis prædicantur. Caterum ad spirandi difficultatem in elephantiacis asellos sub vasis aquariis quinque, aut sex ex aquæ mulsæ cyathis tribus bibendos præbent. Aquarum verò naturalium usum velut maxime necessarium eligunt, aluminosarum præsertim, & ferrosarum, & si fieri potest, frigidarum. Conferre etiam ipsis easdem in potu annuunt, eandemque vim habere etiam arenæ marinæ usum, & omnia exudatoria, ac sudorifica. Habitationes ipsorum Elephantiaoorum quàm longissimè removendas esse ab urbibus, & in mediterraneis, ac frigidis locis statuendas esse asserunt.

*Lepre Medicinam facientes Galenici venæ-sectionem primum instituunt, si corpus humorum copia redundare vident, sin minus omnino tamen purgationem per ea, quæ atram bilem evacuant, præscribunt. Forinsecus autem utuntur in communi quidem veratro utroque, & calce lota in usum sicca seposita, usu verò expetente aquam diluentem strigenti spissitudine illinunt.*

*R. Salvia.*

*Olea Anthipicæ lachr. aa. ℥ viij.*

*Cort. rad. cupparis.*

*Gummi. aa. ℥ xij.*

*F. Linimentum, quod illinunt cum aceto in sole.*

Lepas autem privatim remove-re ajunt anemonas appositas, radicem vitis albæ, compositam verò hanc farinæ loliacæ chornicem, cardamomi albi drachm. 4. spumæ nitri drachm. 1. atramenti futorii drachm.

drachm. 8. asphodeli radicis media drachm. 4. terunt in aceto & cerati crassitudine illinunt, loco ex nitro preparato.

*℞. Radic. asphodel. ʒ vj.*

*Sulphur. vivi.*

*Manna aa. ʒ x.*

*Nitri ʒ viij.*

*aceto diluta illinunt.*

Præteritis cum aceto vitellis & sulphuri ceratum adjiciunt. Quia & argenti spuma cum aceto, & rosaceo trita, ut emplastri formam accipiat, Leporam depurgant. Sed & ex lapatho smegmata, & pleraque ad Elephantiacos descripta in communi etiam ad lepras, & Scabiem contumaciorem facere ajunt.

*Alphi* curationem sequenti medicamine peragi promittunt *Veteres.*

*℞. Aluminis scissilis ʒ iij.*

*Nitri ʒ iv.*

*Myrrha arida contrita ʒ vj.*

*M.* dein in balneo super Alphonum inspergunt farinam ex faba.

Incidunt etiam cutem nonnquam, & materiam intus contentam eximere tentant.

*In Alpho.* Illos verò *Alphos*, quos Melanas vocant, sanant, quum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, & fabam sine oleo, in balneo ante sudorem inspergunt, tum genus id vitiliginis defricant.

*In Impetigine.* In *Impetiginibus* Medicamenta vehementer siccantia commendant, proinde post totius corporis evacuationem simplicia ipsis competere ajunt, ut sunt cicer, veratrum, erinaceus in petris degens, pix cerato ac resinæ admixta, crocodili terrestres sterces, & sturnorum, ubi solam oryzam ederint. Multi verò hoc solo *Impetigines* in mento, aut etiam alibi curare satagunt: Triticum multum incudi ferventi imponunt, & defluentem ex ipso liquorem adhuc calidum *Impetigini* illinunt, ac puerorum *Impetigines* saliva hominis assidue confricant; ad has etiam facere dicunt pruni gummi illitum. Inveteratæ verò *Impetigini* Viticis folia trita cum aceto imponunt, aut eodem modò capparisa folia. Composita verò hæc, ut

sulphur cum thure, aut cum ammoniaco aceto dilutum illinunt, sicuti etiam Pastillos plures in eum finem componunt, ut sunt sequentes.

*℞. Sulph. vivi.*

*spuma nitri aa. ʒ β.*

*canchryos ʒ j.*

*Terunt cum aceto, & partem affertam illinunt.*

*Vel:*

*℞. Veratri alb. ʒ j.*

*farin. lupinorum.*

*buccinorum ustorum,*

*nitri aa. ʒ iij.*

*M. illinunt, & affricant.*

Ad fortiora sæpe confugiunt levioribus nihil juvantibus.

*℞. picis.*

*rad. bellæb. alb. trit.*

*ol. rosar. aa. p. æq.*

*M. f. l. a. unguentum molle.*

Ad Excoriantia quandoque deveniunt, ut est applicatio folius picis, & violenta ejus detractio.

*Vel:*

*℞. Aeris ussi,*

*fol. viticis.*

*liuargyr.*

*nitri aa. ʒ j.*

*sulphuris vivi.*

*rad. Veratri alb. aa. ʒ β.*

*æruginis ʒ ij.*

Terantur omnia separatim, c. s. q. olei rosacei, & ceræ citrin. F. linimentum, quo remoto mundificant unguento viridi, vel Apostolorum, deinde ad cicatrizandum imponunt ungu. de tutia, vel de minio, vel Empl. de lapide calaminari.

*Leuces* Curationem Veterum quod attinet, hi non omnem *Leucem* dicunt curabilem, sed dignotiones ipsius tales habent. *Leucem* in superficie non ultra cutem perungunt, & si quidem sanguis fluxerit, curam recipere ajunt: si vero humor lacteus effluit, incurabilem esse pronunciant. Quidam igitur unctionem per ferrum in *Leuce* probant, & alia, quæ per adustionis modum solum adhibent: alii verò & ex unctione dolorem, & ex hac cicatricem veriti, quæ non minus

*In Leuce.*

minus quam ipsa Leuce decorem vitaret, crustam inducentibus Medicamentis utuntur, qualia etiam concolorem cicatricem efficere tradunt: alii etiam horum difficultatem reprobantes, Tincturas adhibent, & sequentibus compositionibus uti solent:

*R. Adarces,  
Canchryos,*

*Sulphuris vivia a. p. æq.*

singula tusa, ac cribrata seorsim, dein cum aceto simul ad multos dies levigata in Sole illinunt.

Progressu vero temporis adjiciunt parum quid de veratro, & de galla.

Fici nigra virgulta aceto macerata, & levigatis aphonitri, sulphuri vivi, myricæ fructus, singulorum æquales portiones admiscunt, & nitro præfrictis illinunt, ac insolant, cavendo ne exulcerentur. Alii calce viva sufficienti ad fici folia admixta utuntur, & ubi defricueris, inquirunt, Leucas veratro albo, donec exudarint, reliquo corpori concolores fient, quæ de caufa etiam sinopide, aut meliade terra easdem illinunt, aut cubus simul innitentibus perpunctione facta, donec cruorem fundant, sinopide cum aceto illinunt, aut præfrictas fici succo recenti illinunt, & folia ipsius aliquantum confricant.

*Paracelsi  
cura in  
Scabie.*

§. 14. Paracelsus in Scabie abstinentum esse ait à potionibus, digestionibus, purgationibus, à diaphoreticis, ab exsiccativis, & morbillorum unguentis, sequentia vero in Scabiei cura commendat.

*R. Aluminis rupei ℥ j.*

*aluminis Armeni ℥ ss.*

*F. Mixtura pro Scabie.*

*R. Aluminis plumosi.*

*Entalia a. ℥ ij.*

*F. Mixtura pro pruritu.*

*R. Alkali de albuminibus,*

*Salis fusæ a. q. v.*

*F. Mixtura pro furfuribus.*

*R. Vitrioli*

*aluminis scissi a. ℥ ss.*

*Fiat Mixtura in Sapharis.*

Hæc etiam ipsa prodesse ait in Lepre Græcorum.

Elephantiam vero terminari in ulcus cavernosum asserit, quò membri consumtio transit ad principale membrum, & inde sequi mortem haud dubitat. Juxta Ipsum ergo triplex est Elephantiz cura: quarum una est hæmorrhoidarum: secunda menstruorum provocatio: tertia liquorum exsiccatio:

*In Elephantia.*

Leprosos laxativis ulla non purgari vult Author. Quod enim est oleum ad aquam, hoc idem est ad mentem Authoris, Medicina ad Leporam; quare plenam, atque perfectam aggreditur curam, præparationem nempe regenerationis, & id ipsum juxta præscriptum Spagyricæ Tincturæ in hunc modum: Principio mundanda esse ait metallaleprosorum interveniente Tinctura, in qua duplex Tinctura, & duplex Lepra delirescit, rubea sc. & alba, hanc Lunarem, illam Solarem appellant Spagyrici. Priorem ex Tinctura Solis, posteriorem vero ex Tinctura Lunæ accipit. Hic non existimat operæ pretium esse observari ea, quæ Veteres de origine Lepre scripserunt, cum eadem Praxis adferat. Porro inquit, qui velit Spagyricè consulere Lepre, videat, ne cum his, qui Mercurium Solis, quem plerique Spagyricorum primam materiam appellant, (aurum potabile falso crediderunt,) aberraret. Ille asserit, Leporam rubeam à Mercurio Solis, albam à Mercurio Lunæ sanari. Hoc opus, hic labor est, ut Mercurium exacte conficias. Postremò, pergit, etsi Mercurius ad ringenda metalla non profusus sufficeret, valeret tamen in corpore, ut illud sanitati restitueret. Sunt præterea alia quædam arcana, quorum de vita longa fecerat mentionem, quæ Leporam ex aquo tollunt.

*Alphum, Impetiginem, ac Leucem In Alpho,* Author curari asserit per sua arca-impetiginea, mortificativa, & mundificativa, imprimis seq.

*R. Vitrioli*

*aluminis scissi a. ℥ ss.*

*F. Mixtura. Vel:*

*R. Alkali de albuminibus,*

*Salis*

*Salis fusillaa.*

*F. Mixtura.*

*Helmontii* §. 15. *Helmontius* ad Scabiem curandam præ aliis interna commendat salia urticaia, acidaque enecantia, & eliminantia, magni enim estimat sua sudorifera, imprimis Mercurium diaphoreticum, aliaque ipsi solennia. Omnia enim, quæ deterfosam facultatem ex copioso nitro habent, etiam laudat, unde cruorem deterfosum illius salis pruritivi reddunt. Remedium unicum externum hic extollit, unguentum nimirum præcipuo è Sulphure paratum, quod contagio inimicum tollit omnem propemodum Scabiem, cui addit radices Ellebori albi, & baccas lauri, quo unguento partes Scabie infectas sæpius illini jubet.

*Lepram.* *Lepram* Author dicit esse malum difficilis sanationis, propter contagium glaciale, ac ferè mortificans, spiritusque sensitivi oppressivum, hinc testatur, quòd *Lepram* nemo mortalium curaverit unquam, qui non potius sit liquore Alcahest, qui sit radiosissimæ præparationis, nemoque, etsi artis gnarus fuerit, ad ejus consecutionem perveniet unquam, quem Altissimus speciali dono non eò duxerit, particulari enim privilegio sit oportet electus, ac dotatus, si potiri illo medio debeat: per quod sc. juxta Ipsum, tam sensitiva, quàm insensitiva sub lunaria æqualiter penetrantur, usque in radicem seminalem, atque intrinsecam primi Entis. Idcirco etiam cuncta sub se domat, & commutat absque reactione patientis, agentisque depauperatione. Lepra ergo ad mentem Ipsius difficulter sanatur, eò quòd venenum glaciale confermentetur, ceu dictum, spiritui sensitivo, unde remedium debet habere accessum ad prima nostri constitutiva, ubi venenum est superando, & glaciem hujus hiemis novo Vere suffundendo, id quod præstant Ipsius arcana, ut sunt Arcanum Corallinum, Tinctura Lili, &c. de quibus jam alibi dictum est.

Ad *Impetiginis* pruritivum fermentum extirpandum, ac enecandum commendant *Helmontiani* liquorem sequentem Mercurialem saccharatum.

*R. Aqu. Plantag. 3 vii.*

*Rosar. 3 ij.*

*Mercur. sublimat.*

*sacchar. alb.*

*Spir. vini aa. 3 ℔.*

*M. add.*

*Aqu. fortis 3 j.*

*M.*

Cum penicillo liquore intincto tingendum volunt locum affectum, & quidem sæpius de die.

Internè etiam aequè hoc in casu, ac in *Alpho*, & *Leuco* ad Laticem exorbitantem reducendum, & falscedinem, seu acridinem in pelle peccantem enecandam depradicat *Helmontius* Mercurium suum diaphoreticum, & parare solet ex Elleb. alb. & bacc. lauri varis linimenta.

*Alphum, & Leucum.*

§. 16. *Villifius* tum internis, tum *Villifius* ar-externis remediis *Scabiem* curare maturam ad promittit. Mox ab initio venam præstigidam fecat, & deinde purgans Medicamentum exhibet. Pro portu ordinario sequenti infuso uti jubet.

*R. Summit. Tamarisc.*

*fumar. sec. aa. M. iij.*

*rad. lapath. acut. sec. 3 vi.*

*Cort. solan. lignos. 3 ij.*

Incis. & contus. misc. & in dolium quatuor congiorum cerevisia tenui plenum injiciantur. Sed quid internæ auxilia sine externis nihil, aut parum proficiant, sequens unguentum præscribit.

*R. Ungu. enulat. sine Mercur. 3 iv.*

*Pulv. Sulphur. 3 ℔.*

*Ol. Tartar. per deliq. q. s.*

*M. f. unguentum.*

Si verò pertinacior fuerit Scabies, ad unguenta Mercurialia recurrit.

Etiamsi *Villifius* *Lepram* ut plurimum incurabilem esse denunciaret, Viperinorum usum longum tamen suadet. Acidulæ etiam, uti & serum lactis juxta Ipsum profunt. Chalybeata quoque optimi esse usus promittit. Hic etiam decocta lignorum cum Antimonio crudo in nodulo concluso, laudat, & tan-

*Lepram.*

& tandem curationem ejus per salivationem Mercurialem tentandam efficit:

*Willifus* ad horrendæ *Lepræ* profligationem convenire dicit post universalia, sc. phlebotomiam, & catharsin, serum lactis, acidulas chalybeatas, herbarum expressiones succulentas, immò & salivationem; & omnibus alijs ex Viperis parata Medicamenta anteponit, aliorumque serpentum carnes elixas, & loco cibi ordinarii commestas mirum asserre auxilium asserit.

*Alphum,*

Si *Alphus* ex pororum constrictione ortum ducat, *Willifus* tunc diaphoretica juvare promittit, quibus poros constrictos aperit. Si verò ab humore lymphico vitiato affectus hic producat, illi corrigendo & alterando operam navat. Sed quum Medicamenta externa talibus descædationibus delendis sint apprimè necessaria, sequenti utitur ad cutim detergendam.

*℞. Lixiviũ de sale Tartari minüs saturati ℥iv.*

*Olei amygd. amar. per express. fact. q. l.*

Oleum lixivio in tali proportionem misceatur, ut totus liquor lactescat, ac ita persistat. Mixture hac illinantur partes Alphi affectæ manè ac vespere.

*Leuce.*

Particulis salinis in *Leuce* cuti inhærentibus demulcendis, iisque foras eliminandis & poris cutis aperiendis Author operam navat, in quem finem sudorifera, diuretica aliaque commendat. Deinde hoc Medicamento partem inungit:

*℞. Camphor. inci. ℥ii.*

Teratur in mortario vitreo, sensim affund. succ. Limon. unius, deinde adde vin. alb. ℔i.

*M. f. colatura, & Camphora residua petia ligata, in vitro suspendatur, & servetur ad usum.*

*Sylvii pro-*  
*cessus in*  
*curatione*

§. 17. *Sylvius* in curatione Scabiei eo reserit, ut acrimonia acida  
Tomus I L

da & pituitosum glutinosum corrigitur, in quem finem extollit salia lixiva & imprimis blandiora vel fixa, quale in calce viva reperitur, vel volatilia ex omnibus animalium partibus parabilia, utroque enim remedii genere usus est feliciter & plures facillè curavit Author. *Scabiei* curationem plerumque solis externis absolvi vult, & quidem absque internis Medicamentis ullis, nisi observentur præterea alia in humoribus vitia, imprimis si *Scabies* producta fuerit à sudore quovis modo impedito, in quem casum sudoriferis blandis ac sæpius exhibitis denuò viam parat humoribus in superficie hærentibus, ibidemque ita corruptis, ut *Scabiem* feram producant. Ubi verò crasseo modo ad cutim propulsus fuerit humor acer, idemque ob admistam pituitam tenacem ibi hærens *Scabiem* produxerit, cæteris functionibus ritè se habentibus curationi ejus non ità incumbit, cum temporis accessu spontè evanescat. In curatione aquè *Scabiei* ac reliquorum affectuum, nempe *Lepræ*, *Impetiginis*, *Alphi* ac *Leucæ* instituenda omnia ea laudat Medicamenta, quæ cutis poros servant apertos, quin eosdem aperiant, quæque humorem acidum temperant, glutinosumque incidunt & abstergunt, sicque partem affectam restituunt, & consolidationem promoveant. Maxime verò cavendum esse ait, ne adhibita Medicamenta ullo modo cutis poros occludant, humoremque peccantem ad interiora repellant, unde sæpè in *Scabie*, aliisque cutis affectibus plurima gravia mala, febres nempe, asthmata & Epilepsiam, & post eam sæpe mortem produci ait. Aliis ergo Medicamentis Author præfert sola salia volatilia sed blandiora, quorum ope plures curavit hisce morbis cutaneis obsessos & quidem feliciter, satque citò, & facillè. Dandum quoque esse operam monet, ne crustæ facillè à partibus subjectis, imprimis in *Scabie*, separentur, cum sub

*Scabiei*;  
*Lepra*;  
*Impetiginis*,  
*Alphi*, &  
*Leucæ*,

ipsis felicius contingat cura tota. Eadem de Scabie fera, item de Lepra, Impetigine, Alrho, & Leuce dicta vult, cum iisdem salibus volatilibus affectus hi sensim decedant.

Cartesii  
neri ratio  
curandi  
Scabiem,

§. 18. *Cartesiani* in curatione Scabiei ad succus viscidos, & acidus maxime advertunt animum, ut iidem attenuentur, & eliminentur, tum per sudorifera, tum lavia quædam cathartica, præsertim si glandulæ intestinales ejusmodi visciditate, & particulis angularibus acutis repletae sint, ita enim easdem cum viscido humore simul evacuari, & sanguinem cum chylo ab iisdem præservari promittunt. Diaphoreticis tamen potiorē adscribunt potentiam in subvertendis istis particulis mucronatis cuti inhaerentibus, & glandulas ejusdem destruentibus, & hac de causa non diu cunctantur, sed protinus ad eorum accedunt usum, propinquo, vel decocta ex lignis Guajaci, sassafras, fraxini, radicibus chinæ, scabiosæ, Lapathi acuti, enulæ, herbis fumariz, cardui benedicti, persicariz, centaurei minoris, floribus sambuci, aquilegiæ, vel pulveres ex antimonio diaphoretico, cerula antimomiali, sale fumariz, scabiosæ, Tartari, sulphure, vel alias quasdam misturas, ex quibus diversas componunt formulas, quarum sequentia quædam existant exempla.

℞. Antimonii diaphoret. gr. xij.

Salis fumar. ℞

volat. C.C. gr. ij.

M. F. Pulvir.

℞. Aq. Persicar.

senecion. aa. ℞ij.

Essent. Enul. ℞ij.

Spir. flor. sambuc. ℞ss.

℞. Antimonii ℞j.

Syr. fumar. ℞ijss.

M.

Præmissis internis hisce, quibus glandulæ earumque ductus obturati optimè referantur, & succi viscosi non modò attenuantur, sed cum particulis mucronatis iisdem inhaerentibus foras ejiciuntur,

etiam ab extrâ remedia adhibent suctos illos sævientes domantia, & devastationes cutaneas ab iis jam factas restaurantia, quorum de numero primum locum penes ipsos merentur balnea vel ablutiones ex decocto rad. bryoniæ, lapathi acuti, aristolochiæ, serophular. ari, herbarum persicariz, saponariæ, agri-moniæ, parietariæ, nicotianæ, foliorum betulæ farinæ lupinorum, sem. staph. diagr. sulphuris, &c. in cerevisia tenui, vel ex aqua calcis vive, in qua aliquid mercurii dulcis fuit dissolutum, vel alto quodam decocto mercuriali, quæ omnia calidiuscule, vel saltem tepide sunt adhibenda, & post eorum usum cutis leviter tantummodò linteolo quodam detergenda. Fortiora si deliderantur, ad unguenta procedunt, qualia sunt enulatum cum mercurio, mercuriale Ang. Salæ, antemoniale cum mercurio ejusdem, Medicamentosum *Mynsichti*, de lithargyrio, de turtia cum lacte sulphuris & sale tartari, vel quæ sequentes exhibent formula.

℞. Flor. sulphuris ℞iii

butyr. non salit. ℞iii.

℞. xij. ℞i.

mercurii præcipitat. ℞ss.

M.

℞. Ol. Nuc. jugland. rancid.

sulph. aa. ℞i.

succ. apii q. s.

F. Ca. Unguentum.

℞. Unguent. alb. camphorat. ℞ii.

sulph. ari. ℞ii

sapon. Venet. ℞ss.

lithargyr. ℞ii.

nitri ℞i.

Mercurii dulc. ℞ii.

calceæ viv. ℞iii.

M. F. Unguentum.

Vel sequens D. D. *Vogelsangii* elegans, quo Scabiem manuum sæpius pro voto zgrorum abegit.

℞. Ol. bal. ananin. recens express. ℞ss.

salis tartari ℞ss.

lactis sulphuris ℞ss.

Ol. d. Ligni Rbod. gr. viii.

Spatula aliquoties agitando redigantur omnia in Linimentum subalbi-



albidum, quo locus affectus bis de die inungatur.

Pustulas aperiant, & chylum corruptum in iis latentem linteo- lo leviter exprimunt, hinc aqua mercuriali vel calcis vivæ abluunt, & vnguento Medicamentoso inun- gunt. Ulcera non minus aqua cal- cis vivæ, vel spiritu camphorato e- mundant, & pulverem ex radice fu- mariz bulbosæ, albo græco, oliba- no, myrrha, & cineribus ossium inspergunt, tum emplastro diasul- phuris imposto debite consolidant. Indusium quoque sulphuratum nul- latenus continentur.

Elephan-  
tiasin &  
Lepram.

Fortiora quædam in usum du- cunt in *Elephantiasin* tum Arabum, tum Græcorum, siue *Lepra*, qua- les ægros à sanorum consortio sepa- ratos volunt, & sudoriteris tracta- ri diutius continuatis, si forsitan in principio ulterior succotum coa- gulatione & omnimoda acescentia prohiberi queat, consummatos enim in- nem sapius de perfecta curatione concipere spem nullatenus igno- rant. Sunt vero remedia, quæ le- prosis & elephanticiis convenire existimant, decocta ligni Guajaci, theriaz sulphureæ, nitrosæ & mar- tiales, antimonium crudum, & se- nectæ serpentum cerevisiæ imposita, pulveres ex nitro & floribus armo- niaci, unicornu solare, flores mer- curii argentei, Theriaca tum An- dromachi, tum Saxonica *Mysichiti*, Tincturam ex floribus reguli anti- monii. Externè admodum conven- ire existimant balneum illud ab- stergens, purgans, rarefaciens & digerens *Rondeletii*, quod componi- tur ex beyonia, cucumeris asinini, serpentariæ, enulæ aa. ℥ss. cum radi- cibus, lapathi acuti, acetosæ, bor- raginis, buglossæ, saponariæ aa. Miii. cum radicibus, fumariz, lupulo- rum, endiviæ, cichorii, plantagi- nis, aa. Mii. lupinorum, corticum fabarum, hordei integri aa. P.ii. ro- sar. rubr. flor. nenuphar. trium flor. cordial. tamarisci, aa. Miii. flor. cha- momill. melilot. aa. Mii. in aqua fon- tana & pluviali decoctis, post quod el. busonum inungunt.

Eadem quoque procedunt ratione in *Impetigine*, cui etiam sublima- tum præcipitatum conferre credunt, vel sal mercurii, & foris unguenta adhibent post balnea, quæ picem liquidam in se continent, præser- tim illud, quod paratur ex carne vervecina radice lapathi trajecta, & picæ liquida perfusa, in veru assa- ta, liquor defluens servatur ad usum. Unguentum sequens valde approbant.

Ba. Ol. Junip. nux.

lavi. per deliq. aa. ℥ii.

Petrioli Roman.

salis commun.

sulphuris. trii. aa. ℥iii.

litharg. aur. ℥iiii.

Cera q. s.

M.F. Unguentum.

Mercurialis substituant, si priora parum efficiant, adhibentque ad singulas drachmas præcipitati albi unguenti rosacei unciam, & invi- cem probe miscent.

Pariet & in *Alpho* ejusque spe- ciebus, adeoque in ipsa etiam *Leu- ce* sudorifera fortiora approbant, qualia sunt præter superius recensita bezoardicum solare *Mysichiti*, Tin- ctura ex mercurio antimonii cum sol. Tinctura ex floribus antimonii. Externè locum affectum oleo buso- num illinunt, vel balsamo lithar- gyrii terebinthinato, aut liquore mercurii vivi, nec unguentum de nicotiana hoc in casu adeo impro- bant, quamvis inveteratus affectus fortissima etiam reiiciat remedia.

Alphow  
& Leu-  
cam.

§. 10. Si respicias ea, quæ Nos de causa *Scabiei* diximus, facili Marte Tibi etiam nostra apparebit cura, quæ nostro judicio consistit in temperando acido, & diluendo sa- le fixo acido, in cutis glandulis miliaribus ejusque ductibus excre- toriis hærente, simulque resolen- do succo ab iisdem coagulato, quæ omnia obtinere possumus per *Incidentia*, cathartica leniora, *Diluentia aquosa*, *Diaphoretica mitiora*, & *Diu- retica blandiora*, quò enim materia tendat, eò ducendam esse hæte- nus omnes judicaverunt Medici. Ex classe *Incidentium* Nos præ aliis

Nostra cura  
in Scab.  
bie.

commendamus tartarea , armonicalia & amara . In Juniorum gratiam sequentem vel similem apponamus formulam .

*Rx. Cryſtall. tart. ꝑſſ.*

*Pulv. ari. enul. aa. gr. v.*

*Sal. armoniaci depurat. gr. ii.*

*M. f. pulv. detur in triplo .*

Essentia trifol. fibrin. & Elix. nostr. polychrestum , cum spir. matric. paratum egregia sunt .

Inter *Cathartica leniora & blandiora* commendamus , quæ scilicet non ad sanguineam perveniunt massam , fortiora enim purgantia proſcribimus , hinc novimus exemplum , quod viro 40. annorum scabioso pulvis Jalappæ ꝑj. cum erem. tart. ꝑſſ. fuerit exhibitus , absque hypercatharsi eodem mane quo assumerat , mors subsequuta est . Alias scabiosos centies vidimus purgatos , remanente in exterioribus cutis glandulis Scabie . Concedi tamen possunt mitiora , ut sunt infusum passulatum cum foliis fenn. Elect. nostr. laxans cum mercur. dulci decoct. fol. fen. cum Rhabarbar. quod & per se vel cum aliis potui ordinario imponi potest . Quod attinet *Diluents aquæ* ea sæpe omnem implent paginam , si sint simul temperantia , sal enim istud acidum in glandulis subcutaneis existens maximè diluunt temperantque , ex quibus potus Theæ tantum omnia superat , quantum lenta solent inter viburna Cupressi , salia enim acria diluit , ac acidum viscidum temperat , circulationem sanguinis ac succorum promovet ; potest etiam hic potus parari cum decocto Guajaci , sassafras , rad. chinæ , enulæ , &c. & sic præstantior erit , potus quoque Capheæ egregius est . In hunc finem & varia destillata ex herbis & succis antiscorbuticis parari possunt , vel ad præscriptum *Dn. à Gùldenkleæ* dentur singulis matutinis & vespertinis horis Mixturæ temperantis ac diluentis sequentis ꝑiii.

*Rx. Aq. fumar. ꝑiv.*

*cichor.*

*andiv. aa. ꝑiii.*

*Succ. recent. ex cochlear.*

*nasurt.*

*fumar.*

*cichor. aa. ꝑiii.*

*Sacchar. q. i.*

Digerantur & filtrentur .

Vel dentur varia cum sero lactis infusa à Medicis Præcticis ad nauseam hinc inde descripta , & inter Antiscorbutica relata .

Salibus hisce dilutis & temperatis audaciùs ad Diaphoretica blandiora accedere possumus , cum sic diluta & quasi subtiliora facta salia faciliùs per poros cutis , mediantibus sudoriferis , eliminari queant , in quem finem conducunt omnia salia volatilia , ex. gr. sal. volat. C. C. eboris , viperar. quæ viperina aliis palmam præripiunt , item sal. volat. urinæ armoniaci , item salia alcalina fixa , ut sunt antimonium diaphoret. bezoart. miner. Martiale , Joviale & animale C. C. Philos. calc. Eò enim in curatione Scabiei incumbendum est , ut superficialium tantum tubulorum & vasculorum cutaneorum obstructio tollatur , quod obtinetur aliquando per Tincturam antimonii solar. à guttis x. ad xx. cum decocto ligni Guajaci exhibitam . Cernissa antimonialis sequens in Scabie curanda egregii usus est .

*Rx. Reg. antimonii part. j.*

*Nitri part. iiij.*

*M. f. pulv.* qui detonetur , edulcoretur , & exsicceetur , Dosis à ꝑſſ. ad ꝑj. quovis mane . Imò ipsum antimonium crudum exhiberi vel potui indi potest . Viperina semper interponenda sunt , & ipsa viperæ jufculis carniū incoquit & sic assumi possunt . Axungia viperina tum internè tum externè maximè confert , quæ cum conservâ fumar. vel rosar. aliquoties exhibita Scabiem quancumque certò curabit , modò non sit adulterata , prout in Gallia hoc remedium plures vidit curatos Frater meus *Jacobus VVilhelmus Doléur* .

Si Scabies retropulsa est , & particule hæ vitiosæ & exoticæ vel massæ sanguinæ mixturam turbant , vel

vel succos reliquos, imprimis nerveum coagulant, ac acrimonia sua salina in istis succis varia & vehementiora producunt Symptomata, eò annitendum, ut per diaphoretica iterum ad sedem priorem, cutis sc. glandulas expellantur, in quem finem sequens vel similis præscribi potest Mixtura.

*R. Ag. fumar.*

*℞. sambuc. aa. ʒiʒ.*

*℞. antimonii tartariʒi.*

*℞. essent. myrrh. ʒi.*

*lignor. ʒiʒ.*

*sal. volat. viperar. gr. iv.*

*spir. campbor. ʒi.*

*Syr. de fumar. ʒvi.*

*M. & detur cochleatim, & quidem per vices repetendo.*

Vel sequens Domini à Guldenkle.

*℞. Ag. fumar.*

*℞. sambuc. aa. ʒiʒ.*

*sulph. aurat. gr. xi.*

*spir. ebulli ʒi.*

*Theriacal. ʒʒ.*

*M. pro una dosi.*

Vel sequens Juniperinum:

*℞. Roob. Juniperi ʒi.*

*Sal. Juniperi gr. xii.*

*Spir. eiusd. ʒi.*

*c. Ag. Junip. vel ℞. sambuc.*

*F. potiuncula una vice assumenda.* Pauperculz hisce in locis ad Scabiem expellendam uti solent sulphure vivo ad ʒi. aliquoties assumpto. Scabies sicca & maligna non aliter curatur, quam Lues venerea per decocta lignorum, rad. salaparill. sal. Guajac. spir. matric. extracta aliaque specifica capite de Lue venerea petenda.

Quandoque mediante sero per Diuretica blandiora educuntur particulz istz salinæ & acidæ Scabiem producentes, hinc Tinctura tartari cum essentia lignorum, item serum lactis cum herba fumaria, pro pauperibus sæpè sufficit; & cum potus Thez tanquam optimum diureticum inclauerit, capropter & hoc nomine conducet. Inter reliqua blandiora Diuretica referimus sequentia.

*℞. Ag. bellid.*

*Fragar. aa. ʒiʒ.*

*Tamus I I.*

*spir. nitri ʒʒ.*

*℞. tartari ʒi.*

*Syr. de 2b. rad. ʒʒ.*

*M. detur cochleatim.*

Vel detur liquor noster diureticus & Tart. & nitro paratus ad ʒo. guttas, vel Tinct. antimonii in Aq. card. bened. succus quoque Betulæ tempore veris exstillans conducet, qui salinas particulas in humoribus existentes circumvolvunt & cum urina educunt, quod etiam præstat decoctum contra Scabiem *Myns.* vel ejus loco decoctum sum. pini, vel dentur spiritus seq. Balsamici guttæ ʒo.

*℞. Spir. C. C. ʒvii*

*gumm. pini clarissimi ʒiv.*

*M. & destilla iuxta modum chymicum:*

Vel:

*℞. Terebinth. inspiss. ʒi.*

*gumm. Ammoniac. ʒʒ.*

*asel. ppt. gr. xx.*

*ocul. cancr. ppt. ʒʒ.*

*Balsam. Peruvian. gr. v.*

*M. f. pilule* pili minoris magnitudine cum pulv. rad. liquirit. inspergendæ, & 2o. pro unica dosi assumenda.

Ad Classẽ Diureticorum etiam pertinent Acidulæ & Thermae ad leges Medicorũ assumptæ, quæ & hic opem spondent. Peraclis hisce omnibus & instituta pro causæ varietate electione dictorum remedium Internorum, ad Topica seu Localia Externa accedendum est, quibus sæpè solis Scabies, & absque Internis à plebejis curari solet, hinc tantum ex sulph. vivo cum axungia porcina unguentum parate norunt, quod sæpè cum fructu; nonnunquam verò cum tristi effectu illipiunt. Sulphur verò sanat Scabiem non ob adjunctum spiritum acidum, nam ille solus nequicquam hic proficit, sed ob reliquam sulphuris substantiam, quæ saturata non est tanta acidi quantitate, quin ei facillè possit longè plus adhærere humoris acidi in Scabie peccantis. Sic etiam Mercurius,

curius, magnus iste acidi domitor seu magnes, sine acido Scabiem semper tollit, plura enim commendantur linimenta contra Scabiem, quæ pro basignoscunt Mercurium vel ejus præcipitata, album, viride, rubrum, &c. prout malum fuerit pertinacius. Emplastrum etiam mercuriale, & sæpè zonæ inclusum, nam circa corpus gestatum Hydrargyrum tollit omnes cutis descædationes scabiosas, quæ si refractariæ, & nullis ordinatis auscultent remediis, in usum vocentur simul remedia Lii Veneræ ac Scorbuti dicata interna. Tartarea & myrrhata externè sæpè omnem implent paginam & sunt tutissima, ut & Camphorata. Sequens nobis solenne est.

*R. Vngu. Enulat.*

*sapon. Venet. aa. ʒi.*

*Sulphuris viv. ʒi ʒss*

*Sal. armoniaci depurat. ʒi.*

*camphor. ʒss.*

*Merc. dulc. ʒi.*

*ol. Terebinth. q. s. f. linimentum.*

Vel in forma liquida sequens, vel similis applicari potest.

*R. Aq. calc. viv. ʒv.*

*Spir. vin. Camph.*

*matrical. aa. ʒi.*

*R myrrhb. ʒiii.*

*ol. tartar. per deliq. ʒʒ.*

*M.*

*Hartmannus* linimenta varia ex tartaro, pulvere pyrio, Camphora, pice liquida, resina pini, Tereb. &c. parata summopere commendat. Ab aliis laudatur sequens.

*Rt. Sapon. Ven. ʒiv.*

*Sal. armoniaci ʒʒ.*

*flor. cedr. N. i.*

*M. c. aq. rosar. f. linimentum.*

Hæc nil juvantibus nonnulli ad fortiora transeundum esse judicant, seq. vel simile præscribentes.

*R. Mercur. sublimat. ʒi.*

*Vngu. nutrit. f. c. ʒiv.*

*M. exadè.*

Linimentum Cosmi Slotani à *Guilhelmo Fabricio* descriptum à pluribus magni penditur.

Optimo vero cum successu, &

Balnea tum naturalia, tum artificialia institui solent, ut quasi eluantur salia ista acida coagulativa fixiora. Inter naturalia laudantur ea, quæ multo sulphure, & bitumine, vel nitro sunt imprægnata, & hinc Emblesenses, Aquisgranenses, Carolinæ, & in vicinia VVisbadenensæ Geismarienses, aliæque ubivis terrarum scaturientes Thermæ. Sed cum non cuivis contingat adire Corinthum, & ut plurimum pauperes magis, quibus curta est suppellex, quàm divites Scabies afficiat, eapropter istis balnea commendamus artificialia, qualia ex Malva, Scabiosa, Saponaria, Nepetha, Fumaria, Betonica, rad. oxylapathi, Farina Lupinorum, Furfuribus in Aq. decoctis parari solent, quibus addi potest nit. sulph. & sal. Ex.gr.

*R. Rad. Helen. ʒii.*

*oxylapath. ʒiii.*

*Herb. fumar.*

*saponar.*

*scabios.*

*nepeth.*

*Pol. helen. aa. Mii.*

*Tabaci Mi.*

*sulphur. crud. ʒʒ.*

*Racc. lauri ʒi*

*Nit. ʒʒ.*

*M. pro Balneo.*

Sic etiam infestis ex iisdem speciebus componi possunt, inter quos sequens laudatur:

*R. Herb. scabios.*

*fumar.*

*agrimon.*

*malv.*

*cent. min. aa. Mi.*

*Fl. chamomill. Miv.*

*rad. sapat.*

*corr. rad. frang.*

*sulph. viv. aa. ʒʒ.*

*Sal. comm. ʒi.*

f. decoct. ex aq. fluviatil. pro infessu septimanatim bis repetendo.

Lavamenta quoque à lixivio Reguli antimonii ejusque scoriarum, vel ipsius antimonii, vel aq. divini vel virid. *Hartmanni*. Tinct. Tabaci, aqu. ferrariorum &c. sæpissimè solà.

Sola illinitio Aque Reg-Hungariz, vel spiritus vin. Camphor. vel spiritus matricialis Scabiem curatam observavimus. In quem finem quoque pro delicatis Aulicis & virginibus varia smegmata & saponis odorati parari queunt, quibus reliquæ residuæ abluantur ac abstergantur. Ex.gr.

*Sapon. Venet. 3 j.*  
*Syrac. calam.*  
*lap. medicamentos. aa 3 ij.*  
*rad. roseor flor. 3 j.*  
*N. M.*  
*cinam. aa. 3 ss.*  
*pulv. Santal. alb. 3 j.*  
*ase. dulce 3 ij.*  
*caryophyll. 3 j.*  
*Mosch. gr. iv.*  
*ol. Tar. q. s.*

*Gura in* Lepra Græcorum, quæ est intentio Lepa Gra. sior scabiei gradus, hinc in Curæ eorum.

planè hi affectus non differunt, eadem ergo in Lepa hac Græcorum conducunt, quæ superius fusi descripsimus, modò sudorifera aliæ Incidentia medicamenta sint paulò fortiora. Hic ergo præ aliis conveniunt viperina, ac Antimoniata cum Mercurialibus fixioribus, cinnaharinis, aliisque ad nauseam jam dictis, & externis Topicis recensitis. In Scabie æquè ac in Lepa Græcorum Venæ. Sectionem proferimus, quia causam morbi lege circulationis tollere nequit, sed sanguis, spirituositate ejus parte emissa, reliquus crassior evadit. Non minù inefficaces sunt cucurbitulæ siccæ ac scarificatæ, fonticuli, hirudines, &c. quæ omniatantum inutiles & in torturam agrorum tantum excogitata proci- nus rejicimus.

*In Ele-* Ad hostem *phantiasis*, in latebris suis limosis latentem eruendum, vix arma ulla restant, & in hoc obtinendo oleum & opera perditur: ast tentare licet eum aggredi remediis potenter incidentibus, attenuantibus, visciditatem succorum resolventibus, & sic particulas in remotissimis tubulis impa- ctas, & quasi incuneatas è sede sua dimoyentibus, quibus indicatio-

nibus omnibus satisfaciunt potus Theæ, & possunt asseverare, quod nemo hoc potus genere utens unquam Lepra affici possit, potus quoque Capheæ egregius est, item decoctum lignorum calidè assumptum, & cum spiritu sal. armoniaci & camphoræ permixtum. Incidentia optima sunt armonicalia & Tartarea cum aromaticis quibuscumque permixta. *Diuretica* nec hic negligenda, sed paulò fortiora, quàm in Scabie sunt, optima sunt, quæ constant ex alcalibus volatilibus & fixis, quæ acidum peregrinum, quod sanguini justò crassiores consistentiam conciliat, ac seri & excrementorum per Renes secessum impedit, absorbendo, tum rigiditate particu- larum suarum tubulos renales obstruendo, effectum suum præstant, quibus addi possunt, quæ lubricitate partium suarum vias aperiunt, & aliis formulis præsertim millepedes adjunguntur. Si hisce medicamentis in recenti malo, crassior fucci peccantis pars subducta videbitur, tum felicio- re fidere ad *Sudorifera* accedere poteris, quæ reliquas particu- las salinas fixas, poros & glandulas cutis obstruentes convellunt, cum serositate, quam eò confluere faciunt, ex corpore eliminant. Cavendum autem ne hæc in usum vocentur, antequam sangui- ac succi à nimia asperitate diluta sint, ne sanguis nimis inflammetur & morbus exacerbetur. Dentur ergo hic in principio morbi mitiora ac humidiora, quæ humilitate sua salia diluant, & in sinu recondita educant, quæ parari possunt ex herbis & radicibus copioso sale volatili præditis, quod cum acido sanguinis vitioso fermentet, & illius cum parti- bus terrestribus concretiones dissolvat, addendo in progressu sal. volat. C. C. eboris, succin. fuligin. viperar. eboris, serpentum nostrat. spir. theriacal. quæ tandem amari possunt remediis majore rigiditate præditis, & acidum po-

tentius domanribus, ut antimon. Diaphor. Merc. Diaphoret. Bezoart. Min. Joviale, Martiale, pulvis Poterii cum Nitro, antimonio & Jove confectus, quem si commisceas cum resina Guajaci præstantissimum habebis sudoriferum. Antimonium Sole, cerussa antimonii, Tinctura antimonii, & pulvis meus Mercurio Antimonialis, quo nullum in Lepra datur præstantius remedium, & dum Hanoviz Praxi operam dedissem, mihi & Chirurgus *Wedeling* puella 10. annorum de pago *Steinheim* dicto prope Hanoviam sito, oblata fuit, cujus totum corpus crustosis squamis obdutum erat, quæ puella solo hoc pulvere sudorifero Mercurio. Antimoniali ad grana x. & ultra de die in diem propinato curabatur, & singulis matutinis horis, & quidem post sudorem, manipulus & plus squamarum in lecto reperiebatur, quæ tam diu deciderunt usque ab omnibus liberata fuit, & nunc optime vivit. Tinctura antimonii etiam egregia est, & detur sequenti modo cochlearium :

℞. Tinct. antimonii ℥ii.

Aq. A. sambuc. ℥iii.

M.

Axungia viperina cum conserva fumariz sæpius exhibita etiam egregii in Elephantiasi erit usus, multo enim sale volarili gaudet, cujus ratione crassitiem ac tenacitatem succorum incidendo ac resolvendo, acidum obtundendo & ex corpore educendo, & hic sanguini ac succis justam consistentiam mixtionemque restituendo effectum suum sortitur: haud dissimilem præstant opem serpentes nostrates in jure decocti & assumti, item millepedes. aliæque animalcula, sale volatili turgentia, ut bufones eorumque sal volatile. Inter panacæas referunt Balsam. sulph. Antimoniatum sine Marte, ol. Mercurii Diaphoret. Merc. precipitat. rubr. calcinat. magn. Mercuriale Paracelsi. Inter Lepræ arcana etiam refertur Tinctura Lunæ, seu potius Cupr. Helvetii, qua

dicunt ipsum sceminam Elephantiasi laborantem, & ab omnibus Medicis derelictum feliciter curasse: paratur verò Tinctura hæc ex sal. Armoniaci & Vetrolo, quæ detonentur in crucibulo, & dein. extrah. spir. vini, hinc fit viridis, & si ei affuderis aliquot guttas ol. Tartar. per deliq. tunc apparebit coerulea instar Tincturæ Lunæ, & hæc dicitur ista decantata Tinctura. Alii jactant præcipitatum pulverem Solarem Rappii. Alii extollant liquorem Alcahest, nonnulli panacæam albam. Num fidem mereantur judicent ii, qui tot egregia possident arcam, Nos enim his destituimur.

In Elephantiasi V. S. Cucurbitulas, Hirundines, Vescicatoria, Setacea, Cauteria, castrationem & similia dolorosa nocumenta potius, quam medicamenra teijcimus. Cucurbitulæ enim & Hirundines sanguinis partem tenuiorem saltem eliciunt, Vescicatoria verò & Cauteria seu Fonticuli sanguinis ac chyli partem tenuiorem & fluidiorem absument, & reliquos humores magis incrassant, & sic malum potius augent, quam immiununt.

Hæc in Elephantiasi etiam *Externa Topica* in usum trahenda sunt. Primo igitur duritiem & scicritatem cutis emollire ac corrigere, sal istud fixum viscidumque è glandulis cutaneis quantum possibile dissolvere, illisque exitum procurare conemur, quem scopum obtinebimus per balnea aquæ dulcis tepidæ, quæ optimum salium menstruum esse potest, imprimis si & ipsa aqua sale quodam adjecto auctior & præstantior reddita fuerit. Laudamus etiam hic Thermas bituminosas & Sulfureas. Defectu autem Thermarum Balnea artificialia parari possunt ex Scorriis Antimonii cum nitro & Tartaro, vel seq.

℞. Ciner. Bufon. q. sad Balneum.

Sulph. commun. ℥ii.

M. & coq. in Aq. communi, add.



*Solut. Myrrhae Zi.*

*ungu. mercurialis Zi.*

*M. pro Balneo.*

Ægyptii Reges in hoc morbo ex sanguine humano balneum parant; alii balneo primogeniti, (audaci nimis consilio,) aut alio in quo cadaver putrefactum fuit, uti solent. Alii locum Lepra infectum secundina recenti fortiter fricant. Fotus verò, semicupia & cataplasmata ad emolliendos partium externarum tumores commendantur; à balneo linteolis deterfus æger sequenti vel simili utatur linimento.

*Ba. Axung. viperar. Zi.*

*urfi ʒß.*

*ol. laurin. Zi.*

*succ. fumar.*

*veronic.*

*nummular.*

*seabios. aa. Zi.*

*pulv. rad. aristoloch. o ʒß.*

*nitr. Zi.*

*litargyr. sol. ʒß.*

*Cui add. potest*

*Merc. præcipitat. rubr.*

*fuliginis,*

*sulphuris.*

*M.*

Si his omnibus haud obtineri potest, ut tumores leprosi evanescent, ferrum arripiendum est, vel causticus utendum, qualia sunt lapis infernal. merc. sublimat. ol. Antim. ritè destillatum & rectificatum.

Ulcera verò aq. mercurialia *Rulandi* lavari, aut decocto *Guajaci*, aut succis plant. nummular. &c. mundificari possunt, cicatricem inducas stiptico *Paracelsi*. Ubi autem gangræna jam partes corripit, abstinendum est ab omnibus unguentis & emplastris, & si sphacelus accedat, cultro vel ferra membra sunt abscindenda, ne pars sincera trahatur.

Sunt Leprosi qui Priapismo & Salacitate laborant, & in Venerem maximè prona sunt, ad hoc symptoma curandum varia specifica præscribi solent, ut sunt aq. Nymphetæ, sal. saturni, aq. castitatis,

*Myns. Succus Lactucæ*, emulsio cannabina, pulv. crystall. &c. imprimis verò Nitrum in aq. Nymphetæ solum à *D. Guldenkleæ* laudatum singulis matutinis ac vespertinis exhibendum est.

*Impetiginis* gradus intensior *ferus* dictus vix ullam admittit medelam, etsi ulli salivationi à Mercur. excitata cedit, quæ Mercurialia validissimè omnem ferè succorum acridinem, æquè acidam ac salisam visciditati conjunctam per ductus salivales evacuat, imò præterquam quòd multum acidi intra suos poros vel amplexus suscipiunt, ipsos glandularum cutis erosos tubulos ampliando, & aliquorum filamentorum decussatim eos nestentium extremitates solvendo efficiunt, ut facilius major humidi copia eos transiens acutas acres eluat, viscidasque diluat particulas, quo consolidationi sufficiens sternitur via. Ad humorem serosum acrem mordacem cum crassioribus & terrestribus particulis maritarum eliminandum conducent srum diluentia ex cichorio, endivia, fumaria, borragine, polypodio, in sero lactis caprino decocta, ut & interpositis catharticis blandioribus Mercurio dulci junctis. Elixir *Antihyponchondr. nostr.* maximè hoc in casu confert, ex iisdem enim paratur herbis & radicibus.

In *Impetigine Leviori* seu *Lichenæ flechten*, qui est levissimus Herpetis & Serpiginis gradus, omnia ea conveniunt, quæ commendavimus in Scabie, imprimis illa, quæ depromuntur ex fumaria, antimonio, imprimis hic noduli purificantes conveniunt.

Inter Topica excellunt in quacunq. *Impetigine* aq. sperm. ranar. florum omnium, lac sulphuris, ol. ovorum, decoctum calc. viv., liquor mercur. saccharat. *Minsyckti*, unguentum Medicamentosum Nobile *eiusdem*, ungu. ex saturno, ex ol. tartar. camphor. & ceruss. & empl. cinnabarin. sal. saturni, camph. & balsam. sul.

*Curam in Impetigine.*

sulfur. decoctum. & infusum *Poterii* omnia Mercur. hic profunt. Partibus impetiginosis applicari potest sequens:

*R. Succ. semperviv. ℥ii.*

*creta pulv. q. s.*

*Sal. Saturni ℥i.*

*M. f. linimentum.*

Quod si pruritus molestus fuerit conjunctus imponatur *Prævotii* unguentum, quod describit in *Medicina Pauperum*, vel tentetur Experimentum *Iselii* ex rectemento ferri. Spirituosactiam hic eximii erunt usus aqua nempe calc. viv. cum spir. matricali & camphora, vel cataplasmata calide imponenda.

*Cura in*  
*Alpho &*  
*Leuce.*  
In curatione *Alphi* & *Leuce* eodem modo, ac in Scabie dictum est, incedas, affectus enim hi cutanei tantum secundum magis & minus differunt: hinc omnia quæ superius in Scabie commendavimus, & hic prodesse inculcamus, imprimis incidentia, disluentia, diuretica ac diaphoretica, imprimis etiam hic potum *Theæ* cum decocto lignorum laudamus, una cum viperinis. Externè verò imprimis ad maculas albas valet unguentum rosaceum cum mercurio præcipitato, camphora cinnabar. ac balsamo Peruviano. Hic etiam profunt ol. tart. per deliq. spir. matric. cum ol. amygd. dulc. item lac Virginis, absque aceto parat. ungu. ex calc. viv. sulph. viv. item aq. sperm. ranar. item aq. Regiæ Hungar. Balsam. divin. vel.

*R. Ungu. Pomat. ℥vi.*

*Merc. viv. ℥ß.*

*Aq. fortis ℥ii.*

*M.*

Vel:

*R. Ungu. Pomat. ℥i.*

*Sal. volat. C. C. ℥i.*

*Elix. vitæ ℥ii.*

*Zolf. vvo.*

*Sal. nitri aa. ℥ii.*

*Spir. sal. armoniaci ℥i.*

*M. f. linimentum egregium.*

In *Leuce* conveniunt præter jam dicta in Scabie, interna acrimonia absorbentia, ut Ebur. scilicet ign. parat. Epatic. rubr. spec. diarrhoi.

Abb. Diatrion. Santal. & sexcenta alia. Balnea fiant ex rad. lapath. sulph. & sal. nitr. Curatur enim eodem modo ac Scabies & Impetigo, quæ remedia omnia si hic repetere-mus, nauseam tantum pareremus Lectori, quare cramben biscoctam apponere non libuit.

## CAPUT X.

*De Phlyctenis, Sudaminibus, Epi-*  
*nythidibus, Termintho, Essere,*  
*Psyltracio, Ficu & Talpa*  
*Topinaria.*

§. I.

**T**umorum, Tuberculorum ac Pustularum Cutem nostram detracantium adeò. multa & varia sunt genera, ut numerus eorum in ducentos viginti sex, recensente *Iohanne Philippo Ingrassia de Tumoribus, Tract. 1. cap. 1. com. 2.* excrescat. Unde dubium quandoque videtur, quo nomine hic vel ille tumor aut pustula sit indigitanda, cum & in ipsis nominibus interpretandis non parva occurrat difficultas. In juniorum Medicorum verò gratiam sequentes explicaturi sumus pustulas, distinctionem vix admittentes.

*Phlyctenæ* dicuntur & *Phlyctides*, *Phlyæna*. Germanis *hitzpochen*, *hitzige Blattern*, aliis *das wilde feuer*, *Nachtbrandt*: sunt pustulæ in summa corporis planitie & superficie enascentes, à tenui sanie in cute stagnante, eamque sua acrimonia salina erodente, pungente, & urente, unde aliis dicitur *Ignis silvestris*: sunt enim vesiculæ quædam citò erumpentes nec adeò dolentes, humore flavo vel subalbido repletæ, pustulas ab unctione aquæ-ferventis inductas referentes.

*Sudamina*, Græcis *Hydroa*, aliis *Papulæ rubræ*, mordicantes, sudorales, aut sudorosa, cum ex sudore

*na, Hydroa, Papulæ rubræ.*

ze proveniant . Germanis dicuntur *Grubelsucht* *Scharvulen* : describi possunt , quod sint pustulæ post sudorem abortæ , à fibrillis & ductibus propter acridinem discissis & in cinnocinis resiliens , indeque in cavitatem evasato succo nutritio vel lymphæ productæ .

*Epinyctides*, *Pustula nocturna*.

*Epinyctides* sive *Pustula nocturna* , à nocte ita dictæ , cum noctu oboriri soleant , doloremque sæpe producunt insignem . Germanis dicuntur *die nacht blattern* . *Plinio* dicitur pustula livens & noctu inquietans . Sunt ex pustularum genere colore sublivida & nigricantes , quandoque subalbida cum vehementi inflammatione & dolore , vix fabam magnitudine excedentes , & pro specie carbunculi habentur hæc pustulæ : describi possunt , quod sint pustulæ , quales ab aq. fervente excitantur , sua sponte nocte præsertim in cute erumpentes , ab acerbis salinis humoribus tubulos cutaneos perfrumpentibus obortæ .

*Terminthas*.

*Terminthas* cutis etiam dicuntur eminentias plerumque in tibiis & cruribus productæ , colore ex nigro & viridi rotundæ , interdum non absimiles fundi herpeti exulcerato . Germani istas vocant eminentias *die braune Blattern* ; describuntur , quod sint tubercula parva à salinis ac corrosivis succis cutis glandulas ac tubulos corrodentibus , & cavitatem parantibus oborta . *Scorbuti* ac *Luis Venereæ* comites esse solent hæc tubercula .

*Essera*, *Saire*.

*Essera* , ( quod vocabulum Arabicum est , & apud *Abinsinam* & *Serapionem* legitur , ) dicuntur etiam ab aliis *Saire* , *Pemphinx* , *Bulle* , *Ampulle* , *Ephantismata* , Germ. *die Nesselsucht* , & sunt pustulæ parvæ Scabiei bullarum instar vel squamarum eminentes , nisi quod carnem habeant exuberantem . *Paracelsus* vocat hæc pustulas , *squamulas pedicular* , easque ex vaporibus Talci vel *Cachionix* deducit , hinc morbum familiarissimum esse

metallifossoribus scribit *Tr. de vlc. & Apost. cap. 47.*

*Psyractia* indiguntur papulæ vel vesiculæ utplurimum in capite à tenui minusve acri lymphæ tubulos cutaneos ibidem corrodentem obortæ , unde à *Phlyctenis* in hoc tantum differre docent *Authores* .

*Ficus* vel *Ficosis* , vel *Ficatio* , item *Tumor Ficosus* , aut *eminentia Fico* , aliis *Marisca* , qui tumor nasci solet in oculo ejusque palpebris , vel in mento , vel in ano , ( à *Thymo* sola magnitudine differens , ) vel in digitorum extremis protuberans , item in utero proveniens ; nonnullis dicuntur *Gondylomata* . Describi potest , quod sit tumor cum excrecentia quadam carnea à succis viscidis , imprimis nutritio , stagnantibus , obortus .

*Talpa* dicitur etiam *Topinaria* , est tumor scabiosus cutis capitis ac faciei proprius , sæpe pus seu chylum album coagulum in se continens , & ob acrimoniam serpendo cuniculos instar Talpæ create efficiens ; sed etiam tumoræ rotundum exhibens , quales Talpæ terram subfodiendo efficiunt . Vocatur etiam *Testudo* , consert *Bonetti Med. Sept. L. 1. S. 1. c. 9. p. 13.* Quam Testudinem verò alii ob figuram differentem à *Talpa* differre scribunt . *Paracelsus* Testudinem & *Celsam* dicit , hoc ipsi est id , quod huc atque illuc discurret . Quibus omnibus tantum ingenia Tyronum fatigantur , & Tubercula hæc optimo jure sub uno nomine , me iudice , comprehendere poterunt : sed nunc Veterum vestigia semel calcata incedere cogimur .

5.2. *Pars affecta* harum pustularum sunt utplurimum cutis , cuticulæ seu epidermidis tubuli ac glandulæ miliares , eò enim delati succi salini acres scindentes ac corroderentes , faciliè ejusmodi pustulas producere apti nati sunt . In pluribus quoque jam dictis affectibus cutaneis exigua cutis vascula lympham

*Ficus*, *Ficosus*, *Ficatio*, *Tumor Ficosus*, *Marisca*.

*Talpa topinaria*.

*Pars affecta*.

pham continentia afficiuntur, quæ sæpe acescens lymphæ faciliè in his vasculis excretoriis stagnare, & diversi generis tubercula excitare valent.

*Diagnosis.* §. 3. Quod *Diagnosis* horum Affectuum cutaneorum attinet, eos accuratè describere, hoc opus, hic labor est, melius enim depingi, quàm describi possunt, &, si mihi vacasset, Tyronibus Chirurgiæ in pictura quoscumque tumores & varii generis pustulas hoc in Opere descriptas, imò & ulcerum diversitates clarè ante oculos representassem, ut ex figura cum suis coloribus differentias animadvertissent. Negotia verò aulicæ & practica non permiserunt hac vice hæc omnia ad vivum ita proponere: hinc *Diagnosis* more solito clarè ac perspicuè, quantum possibile, non tradamus.

*Phlyctenulæ.* *Phlyctenæ* ergò cognoscuntur ex suis vesiculis in cute extrema citò erumpentibus, nec admodò dolentibus, in quibus succus flavus & subalbidus chylosus continetur, & ferè similes sunt pustulis illis ab ustione aquæ ferventis productis.

*Sudamina.* *Sudamina* sunt pustulæ, quæ in sensus incurrunt nostros, sunt enim rubræ, mordicantes & ut plurimum post sudorem, & tempore æstivo, quo homines faciliè sudoribus infestantur, item sæpè in iis animadvertuntur, qui statim post sudorem se acri frigido exponunt, vel qui sudore Anglico vel sudore colliquativo laborant.

*Epinyctides.* *Epinyctides* sunt pustulæ, quales ab aqua fervente excitantur, sua sponte nocte præsertim in cute rumpentes. Interdum sunt sublividæ & nigricantes, nonnunquam rubræ & albæ cum inflammatione vehementiori atque dolore, vix sæpè magnitudinem excedentes.

*Terminthi.* *Terminthi* cognoscuntur ex eminentiis seu tuberculis colore ex nigro & viridi rotundæ plerumque in tibiis & cruribus oboriuntur,

& ferè hæc tubercula herpeti exulcerato sunt similia.

*Essera.* *Essera* cognoscuntur ex pustulis parvulis in cute erumpentibus cum squamis bullarum instar, carnem simul habent exuberantem instar hyperfarcoseos.

*Pydracia.* *Pydracia* faciliè patent ex vesiculis seu papulis Phlyctenis ferè similibus, à quibus vix differunt, hæc pustulæ in se continent lympham tenuem acremque, quàm faciliè deinceps effundunt.

*Ficatio.* *Ficatio* seu *Marisca* cognoscitur excrecentia aliqua carnea sabæ majoris, seu ficus magnitudinem non multum excedente, quæ oritur non tantum in ano, sed etiam mento, utero, digito minore, vel oculo, imò etiam in aliis corporis, nostri partibus.

*Talpa.* *Talpa* verò cognoscitur ex tuberculo seu tumore rotundo instar *Talpæ* acervi, sub quo etiam cutis effossa est, existentibus scilicet succis corrosivis tubulos corrodentibus, & cavitatem seu fossulam sibi comparantibus.

§. 4. *Causas* horum morborum quod concernit, veteres *Galenici* primò *Phlyctenas*, (quæ ipsis sunt vesiculæ quadam citò erumpentes, humore flavo refertæ, bullarum instar lividæ, pustulas ab ustione aquæ ferventis inductas referentes,) à copia humoris cui conjuncta est bilis fervida sub cuticula collecta & illam distendens, produci ajunt. Sanguinem quoque menstruum, cum diutius retinetur, & postquam biliosus evadit, similes sæpè tumores excitare docent. Alii ex Veteribus causam continentem ponunt in sanguinem nimis serosum ac biliosum, qui à natura ad corporis superficiem detradatur, præcætaractica verò juxta *Galenum* sunt omnis generis cibi multum bilis ac feri præbentes.

*Galenici* *Sudaminum* causam à nimio seroso sanguine ad cutem delato & ibidem coercito deducunt, serum per sudorem e-

*Essera-*  
*rum.*

*Pydracia-*  
*ciorum.*

*Ficatio.*

*Talpa.*

*Ætiologia*  
*secundum*  
*Galenicos*  
*in Phly-*  
*ctenis.*

*Sudami-*  
*nium.*

evacuati impeditur, & hoc plurimum ætate contingere assentunt.

*Epinyctidum.*

Causa *Epinyctidum* juxta Veteres à causa Phlyctenarum non multum differt, & tantum in eo consistit, quòd hæc exulcerationes cutaneæ nocte magis, quàm die fiant & infestent. Sunt & alii, juxta quos Epinyctis à sanguine adusto & hepate calidiore oritur.

*Terminthi.*

*Galenus* & ejus sequaces *Terminthorum* causam rejiciunt in humorem atrabilarium à natura in partes inferiores seu ignobiliores tibias vel crura expulsum.

*Effera.*

*Effera* causa juxta Veteres duplex est, in quibusdam sanguis nimis cholericus, in aliis pituita falsa atque nitrosa, in aliis serum falsum existit, tale enim acre juxta ipsos mordax & mobile est, ideoque facile ejusmodi tubercula producit, citoque dissipatur & evanescit, *Forestus* in suis *Observat.* hunc affectum ad Epinyctidas retulit.

*Psydraciorum.*

*Psydraciorum* causa ad mentem *Galenus* differt à causa Phlyctenarum in hoc, quòd harum pustularum seu Phlyctenarum causa sit acrior ac tenuior illarum scilicet Psydraciorum sit magis crassum ac minus acce, hinc etiam pustulæ summam cutem exedentes subalbidæ, duræ, acutæ ac ferè indolentes, & sæpè in capite oborti.

*Ficus.*

*Ficus*, quatenus denotat excrecentiam aliquam carniam, & quidem vel in oculo ejusque palpebris, causa juxta Galenicis consistit in pituita crassa dulci ac insipida, quatenus verò sumitur pro excrecentia tumorosa in ano, & idem cum Thymo significat, originem trahit ex sanguine fæculento crasso atque melancholico, item isti ficus, qui sunt eruptiones ulcerosæ rotundæ, subduræ, rubicundæ, dolorosæ eos ab eadem deducunt causam.

*Talpa.*

*Talpa* metaphoricè significat Tumorem pituitosum in capite, & quidem juxta Neutericos aliquot. *Galenus* dum de Atheromate, Sca-

tomate & Meliceride agit, meminit quidem, quòd adhuc tumorum species, in quibus res aliz contineantur, quæ non humorum modò, sed & solidiorum quorundam corporum proprietates repræsentent, verum inquit, quòd rariis occurrant, ideoque illos nominibus nec vocabulis propriis non donavit, ideoque diversâ nomina, inter alia etiam *Talpa* seu *Testudo* ab aliis excogitata sunt, cujus causam ponunt in pituitam viscosam ac inspidam *Guido* Talpam magis refert ad Atheroma, quàm Meliceridem, affirmatque, quòd Talpa sit ipse Tumor, qui vocaretur Testudo, & cum alba materia reperitur, hoc in Tumore pituitam viscidam æquè pro causa agnoscit.

§. 5. *Paracelsus* causam Phlyctenarum, Sudaminum, Epinyctidum, Terminthi ac Psydraci minerali esse inquit, & quidem corrosivam, quæ enim corrosivæ sunt, illæ juxta Authorem in depascentes novasque formas abeunt, pustulas nempe, Phlyctenas, Escharam, Sudamina, Epinyctides ac Terminthos ulceraque his similia efficientes. Pustulæ enim, juxta Ipsum, per se suaque natura nil nisi crustæ, seu Escharæ sunt: ex una enim eademque materia istas fieri contendit, quamobrem cum Cossi, Saphaci, &c. similiter sese habeant, ipsorum naturam quandoque pustulæ hæc imitantur, nam ex natura salis, ex qua omnes crustæ sunt, singula ista generantur. Differentias verò ac proprietates quibus singula insigniuntur, ex Spermatibus ac Mineralium variis corruptionibus ortum habere Author contendit. Itaque cum chaos ad constitutionem Microcosmi concurrat, pro diversitate ejus pustulas variare haud dubitat, nam perinde ut mannæ jam hæc, jam illa qualitas præcellit, sic pustularum symptomata diversa evadunt, quædam cum laxatione, quædam cum vi Diaphoretica, quædam cum anodyna virtute, multis cum

*Paracelsi opinio de causa harum pustularum.*

in colore, tum primis qualitibus differentis concitate ingruentes, uti manifestius explicat ipse Author.

*Esferas* Paracelsus provenire ait ex vaporibus mineralium extrinsecorum, ubi calx inciderit aut cachimia, hinc *Esferæ* juxta illum favire solent in eos, qui salia montana, vitriolum aut cuperosam excoquunt, vel cuprum effodiunt, liquefaciuntque. Fodinarum artifices morbo simili tumpulmonis cordisque passionibus doloribusque torquentur. Cum igitur in spiritibus mineralium heret hic morbus, nullum per se terminum facit, inò potius in uno statu permanet. Si enim nodus quispian tumorque vermiculos pediculorum instar ederet, qui postmodum in latum extenderentur, crustasque rubecas, ut sunt squamæ piscium producerent, *Esferas* fore judicat.

*Ficum* Paracelsus ex hæmorrhoidali sanguine ut plurimum oriri contendit, cum nutritius humor separatus est à substantia sanguinis, & per porum suum emunctorialem penetrat extra materiam propriam, transit in exetescentiam, quæ *Ficus* denominatur.

*Talpa*, seu Testudinem, seu Celsam, (hoc est id, quod huc atque illuc discurrit,) ex salibus accidentalibus coagulata esse dicit, notat etiam, cum Celsa ex corpore suo transit in coagulatum, vagationem suam retinere secundum coagulationem.

*Helmontii* §. 6. *Helmontius* Phlyctenarum, opinio de Sudaminum, Epinyctidum, Ter- causa ha. minthi, *Esferarum*, *Psydracii*, rum pust. allarumque pustularum *Causam* ad- scribit Latici fermento quodam salino acri infecto, à quo in pelle coagulatur latex, & inde facile excitari has pustulas contendit.

*Villisi* §. 7. *Phlyctenarum* progeniem tribuit *Villisus* particulis salinis fixioribus in sanguine majori copia aggestis, quæ per glandulas militares à cruoris massa secretæ, ad po-

ros cutis, ut per eos foras evaporentur tendunt; sed quum ea, qua donantur, crassities earum exitui obstat, sub cuticula herent, cutisque poros adimplent atque in ea coacervantur, augescenteque illarum aggestione cutem & cuticulam in tumorem elevant. Fluorem verò affecute dominiumque obtinentes cutis fibras acredine sua vehementissimè vellicant, ipsasque erodunt.

*Sudamina* ex *Villiso* oriuntur ab humoris lymphici per cutis foramina exeuntis ac sudorem producentis, particulis crassioribus sub cute remanentibus; illæ enim à novis perpetuo advenientibus versus superficiem compulse, nullumque sibi liberum exitum adinvenientes, sub cute crescant, illam extollunt, & pustulas in ea procreant. Crassiora verò illa lymphæ salia nerveas cutis fibrillas, in quas impingunt, lancinant & convellunt, doloremque pariunt.

*Villisus* opinatur, insensilem transpirationem equè non exerceri noctu atque interdiu, nec tanta copia & pari libertate humores excrementitios per cutem exhalari. Quando enim sanguis abundantiorebus, iisque minus volatilifibus turget salibus, serosus ille humor, qui ex ipso à glandulis cutaneis separatur, viscidior contingit, & ad exitum ineptior. Quum enim noctu pori superficiei minus patuli existant, spissior illa lymphæ per ipsos viam sibi parare nequit, & sub cute remorari cogitur: & in ipsa aggesta eam in tumorem elevat. Sanguinis verò vasis ab humore isto excrementitio in cutis substantia stagnante compressis, cruor in suo motu retardatur, qui idcò moram faciens mox corrumpitur & excandescit, inflammationemque parit, cui adjungitur dolor à salibus nerveas cutis fibras pungentibus inductus.

*Villisus* *Terminum* progigni *Terminum* contendit ex sanguine corrupto & coac-

*Sudami-  
num.*

*Epinycti-  
dum.*



& coagulato in minores grumos concrefcence; tales enim grumuli cum reliqua cruoris maffa per univerfum corpus delati, & ad superficiem per arteriarum ofcula protrufi, in partibus à corde longè diffitis, ubi fanguis minori motu agitur, in cute defiguntur, atque remorantur, ejusque interftitia opplentes eam in tumorem extollunt: Liquor verò nervofus adveniens talem depravatam fanguinem in partium fubftantiam convertere non valens, tubercula ex eo efformat. Sal autem, quod tales in fanguine concretiones produxit, à calore partis actuarum fibras circumpoftitas aculeis fuis impetit, easque erodit & exedit, ac foveam fibi excavat.

*Effetatum.* Effetari oboriri vult *VWillifius* ex humore lymphico in acido-falfam indolem comutato, fub cute, quam in tumorem elevat, aggefco, & è fanguine ex vafis à tali acriore humore erofis erumpente, atque cum ipfo commixto, & à fucco nervoso in extuberantem carnem cum pufiulis à ferofo liquore exortis convertit.

*Pfydracia.* *Pfydracia* provenire ait *VWillifius* ex ferofo humore per cutis foramina exhalari folito, paulò quam par eft vifcidiori & acriori. Liquor autem ifte, quum cutis poros ob fpiffitudinem fubire nequeat, fub ea retinetur atque colligitur, illamque in tumorem elevat, acredineque, qua prædita eft, fibrillas ejus diffeccat ac difcindit.

*Ficus.* *Ficus* originem adfcribit Author nofter fucco nutritio fpiffiori, ob vifciditatem fuam in parte quadam residentem. Liquor enim nervofus ad locum illum accedens humoremque nutritium mollioribus particulis refertum ibi aggefco reperiens carnem fupfluum flaccidamque ex illo producit.

*Talpa to-* *Talpam Topinariam* fieri affe-  
*pinaria.* rit *VWillifius* à fero copiofiori in fanguine aggefco, abundantique

fale, eoque fluorem adepto, referto, quum enim fanguis recrementa fua in variis emundatoriis deponat, & in glandulis cutaneis portionem feri, quo gravatur, relinquat, poros cutis, per quos foras eliminari debet, infarcit & obftruit, fi falbus craffioribus fixioribusque fcatcat. Cutis ergò fpiracula pervadere non valens, & fub ipfa remorari neceffe habens, in illius interftitiis coacervatur & congeritur, eamque diftendit, atque extollit. Salia autem mole gaudentia & acutis cufpidibus donata, fibi, oppofitas fibras exedunt & difcindunt, cuniculosque continuata actione fua in partibus agunt.

§. 8. Quamvis *Sylvius* non ex poffeffo de hifce diverfis egerit pufiularum speciebus, attamen ex ipfius principiis facile caufæ earum deduci poffunt, folem enim hoc in opere omnia Authorum complere, quæ omiferunt. *Phlyætnas* itaque, *Epinyctides*, *Terminthos*, *Efferas*, *Pfydracia*, aliasque pufiulas produci credit à partibus fucci pancreatici acrioris tum humoris forma ad cutem delatis. Pufiulas dicit alias fquamofas & fcabras, alias acrem liquorem fivè ferum fimul effluentes, alias nullum, fed fccas effe, aliquando pruritus moleftum habere conjunctum, aliquando nullum aut levem duntaxat. Non deducendas proinde vult pufiulas venericas à fale lixivo vel fixo vel volatili, fed ab acido plus minusve frafco ac temperato. Prout namque illud plus aut minus intringitur, gravius idem aut levius fæviat in cutem, atque pruritus graviorem aut leviorem produceret. Ubi autem acidum illud acre magis eft concentratum, pufiulas juxta ipfum produceret magis aridas: ubi contra idem eft magis folutum minusve concentratum, pufiulas produceret madidiores ac ferum aliquod ftillantes, imò celerius serpentes. Ab Acidi ergo acrimonia plures deducit pufiulas.

*Sylvii co-*  
*gitata de*  
*caufa ho-*  
*rum tu-*  
*berculo-*  
*rum.*

*Cartesiani*  
*motum r. s.*  
*tiocinium*  
*de causis*  
*Phyſiæna-*  
*rum.*

§. 9. *Cartesiani* ortum pustularum præsentium adscribunt succis cutaneis, chyloso nempe nutritio, & lymphæ vitiosæ se habentibus, adeoque tum in motu impeditis, & uno vel altero loco circa glandulas inter cuticulam & cutem firmius hærentibus, tum particulis acutis angularibus reſertis. Ità *Phyſiænas* fuscitari autumant, dum chylus nutritius lymphæ acidiori dilutus ab externa quadam causa, frigore nempe, igne, vel medicamenti ad superficiem corporis allicitur, & cutim perforando cuticulam distendit atque in tuberculum propellit. Cum verò particula illæ acutæ subtiliores sint, & non tam copulatæ, quàm huc illuc disperſæ, pustulas etiam non adeò magnas, sed minores & plures emergere pronunciant, nisi temporis tractu cuspides istæ acutæ ab æthere frequentius agitatæ plures diffingant & erodant tubulos cutaneos, & hinc pustulas augeri, & in sulcis liquores corruptos colligi, qui diversis particularum in se contentarum figuris modò radios luminares dispergant, modò suffocent, modò variè reflectere cogant, & propterea diversos etiam pustularum harum conspectui dari colores. Quasculumque etiam corporis partes huic morbi generi obnoxias esse asserunt, ad quas lymphæ pertingere solet, adeò, ut nec oculorum tunicæ ab eo degant immunes.

*Sudamin-*  
*um.*

*Sudaminum* originem imputant lymphæ resolutæ, & cum sudore quidem extra poros cutaneos ejectione, sed ob causam quandam externam, præsertim diuturniorem obstructionem circa cutem collectam, cujus particula acutæ sive acres cutem erodant, vel fieri docent, dum inter sudandum corpus detegatur, & frigus externum ambiens poros cutaneos subito occludat, ut lymphæ & liquores eliminationi destinati inter cutem & cuticulam restare cogantur, & coagulati pustulas & ma-

culas producant. Quod verò, iuxta *Hippocratis* effatum, plerumque genitalium partium summam cutem occupent, hoc ideo fieri censent, quoniam partes hæ ob partes adjacentes, femora præsertim, continuo foveantur calore, & ad glandulas inguinales major lymphæ deferatur copia, unde perpetuo quodam maceant sudore.

*Epinyſtidæ* fuscitari credunt à lymphæ glutinosiore tubulos cutaneos obstruente, cui adhæreant multæ particula læneolatæ acutissimæ fibras cutaneas dilacerantes, & propterea magnum dolorem & tandem etiam ulcuscula producentes, in quibus lymphæ ista glutinosior tanquam in sulcis colligitur. Noctu verò tum oriri, tum maximè ex cruciari volunt, quod tum temporis liquor ille crassus ob caloris defectum tardius commoveatur, & globuli secundi elementi fibras cutaneas versus lanceolas illas fortius præmant, unde & major obstructio, & fortior dolor exoritur, radii etiam luminares suffocantur, & ater in illis color vel lividus conspiciuntur.

*Epinyſti-*  
*dum.*

*Terminthum* ex succo chyloso crassiore & spissiore in tubulo quodam stagnante & fibras cutaneas valde distendente produci docent, unde non modo tuberculum exurgat, sed cum ex lymphæ variz quædam ei associantur particula diversarum figurarum, cuspidatæ & porosæ, pro earundem motu & situ diverso interdum fibrillas quasdam cutaneas diffingit & pustulas excitat, tum radios lucis quosdam suffocari, quosdam verò leviter refrangi, & colorem inde emergere atroviridem, quo tubercula ista superbiunt, & figura sua terebinthi fructum representant.

*Termini-*  
*thi.*

*Esferas*, *Pemyhynges*, sive *Am-pullas* excitari volunt à lymphæ multis particulis angularibus mucronatis reſerta, in plurimis glandulis cutaneis hærente, & tubulos ob-

*Esfera-*  
*tum.*

admisceatur de chylo crassioripor-  
tio quidam, quæ poros angustan-  
do soli materiz ætherez subtilissi-  
mæ transitum permittat, hæcque  
celerius commota fibrillas variè  
verberando inflammationes producat.  
Cum verò lymphâ nondum depaupe-  
rata sit salubris suis volatilibus  
benignis & partibus spiri-  
tuosis, adeò succum chylosum  
crassiorē brevi attenuari & resolu-  
vi, angulosque acutos mitigari di-  
cunt, ut tubercula etiam brevi re-  
cedant, sed quoniam ista resolu-  
tio & mitigatio non sufficiat ad  
fluiditatem plenè restituendam,  
propterea eadem citò satis redire  
assiciunt, & sæpe levi quadam de  
causa externa subito refrigerante,  
aut terrore incutiente, unde fi-  
bræ cutineæ contrahantur & po-  
ri angustentur, in scenam de no-  
vo produci.

*Pydrac.* *Pydracia* octum trahere putant  
à simili quadam tubulorum obstru-  
ctione à lymphâ crassiori, sed  
particulis mucronatis non adeò re-  
serta, indurata, & præsertim in  
glandulis cuticularibus capitis se-  
dem figente, quapropter tubercula  
hæc duriuscula quidem, sed mi-  
nus dolorosa esse fatentur, quòd fi-  
bræ cutis membranosz non adeò per-  
pungantur.

*Ficus.* Quocumque in corporis loco ex-  
crescat *Ficus*, eundem à succo nu-  
tritio sive chyloso crassiore prona-  
sci statuunt, dum aliquo in loco  
nimium augetur & stagnat, ut fi-  
bræ propterea valde exten-  
santur, & nonnunquam nervosa quidam di-  
rumpantur, hinc liquor nervosus  
copiosius effluens chylosum fortius  
ad exteriorem corporis superficiem  
propellat, cui cum novus assiduò  
succedat, extuberantiam hanc ul-  
terius ajunt capere augmentum, &  
succum intus contentum adeò in-  
terdum inspissari, ut ob siccitatem  
in granula sicuum semini non absi-  
milia secedat.

*Talpa.* *Talpa* oriri existimant à chy-  
li sive succi lactei particulis cras-  
sioribus & coagulatis inter cutem  
& cranium potissimum collectis,

eò quòd ductus chylosi sive lactei  
à particulis acutis lymphæ corrup-  
tæ prius sint erossæ, & liquor ex  
iisdem effluens acidior chylosum  
coagulet, qui stagnans cutem in  
tumorem distendat, lymphâ verò  
acrior relictis particulis illis ad ef-  
fervescentiam & motum ulterius  
ineptis, ad vicinas partes serpens  
mediante materia ætherea cum suc-  
cis earum de novo confusum in-  
eat, fibras dirumpat, destruat, &  
effusum chylum, ut priorem denudò  
coagulet, siquæ novam producat  
protuberantiam, instar talpæ terram  
perforantis, & tumulos in eadem  
projicientis.

5. 10. Pervenimus denique ad ho-  
rum affectuum cutancorum causam  
*Nostri*  
*nostro iudicio* deducendam, & in ge-  
nere dicimus, ubi contigerit, quòd  
vel propter abundantiam particula-  
rum crassarum salinarum vel acida-  
rum magis vel minus corrosivarum  
*sententia*  
*de causa*  
*harum*  
*pustula-*  
*rum, &*  
*in specie*  
*phlyctæ-*  
*nosum.*  
in toto sanguine & humoribus, vel  
propter librationem fortuitam ab  
igne aliore externo vel interno,  
hic illic in poris tubulisque cutis  
quæ longius à corde distat, inju-  
rusque externis magis est obno-  
xia, fiat obstructio, illico diversi  
generis oriuntur maculæ vel albi-  
cantes, vel nigricantes, livide,  
cæruleæ, rubescentes, vel etiam si  
major gradus corrosionis adfuerit,  
oriuntur pustule & ulcuscula, qua-  
tenus videlicet fibrille propter acce-  
dinem abscisse in cincinnos resi-  
liunt, lymphæque nutritioni alijs  
dicata in cavitatem deponitur, quæ  
igni exposita vel aeri facilè exsiccatur,  
utpote viscosa & gummosa.  
Pro diversitate rursus harum pustu-  
larum & ulcusculorum ratione ma-  
joris vel minoris humiditatis aut  
acredinis, hos vel illos lacerant cor-  
roduntque tubulos.

Porro pro minima harum pustu-  
larum diversitate, ratione figuræ, ma-  
gnitudinis, vel pertinaciæ, vel qua-  
tenus cum alijs morbis conjungun-  
tur, varia iis imposita sunt nomina,  
& causæ aliqua diversitas occurrit,  
hinc paucis & quidem nostro judi-  
cio ita sunt deducenda.

§. 11. *Phlyctena* possunt dici species inflammationis minimæ, cum tuberculo, afficiuntur enim hic vascula lymphatica continetia lympham prægnantem diversis particulis salinis acutis, & viscosis chyli obvolutis, quæ eò delata tales pustulas cutem elevando excitant, propter eorum tubulorum texturam magis vel minus compacta dilatari possit, cum fiant pustulæ vel majores, vel minores. Sic ab externis causis vel frigore coagulante incrassanteque lympham, vel etiam ab internis succis salinis ac terrestribus particulis scatentibus, in fermentationem faciliè transeuntibus itidem excitantur.

*Causa Sudaminum.* Cum per cutem porosam necessariò continua peragatur transpiratio, hinc facile fieri potest, ut cum lymphæ aliisque succis, salinarum acidarum terrestresque particulæ simul eliminantur, quæ verò nimis crassæ exitum haud invenientes in glandulis cutaneis stagnare coguntur, hinc obstruuntur tubuli, qui & dein eroduntur, uti & sæpius in aliquibus sudantibus ab impedita transpiratione ejusmodi pustulæ *Sudaminum* nomine insignitæ oboriuntur, cum enim tubuli eroduntur, exsiliat lymphæ vel ichor tenuis, vel chylus remanente viscidior in cuticula textura ista mirabili & sudamina representant, frigore quoque externo accedente, imprimis si corpus nostrum prius sudore maderit, faciliè succi in tubulis glandulosi cutaneis existentes coagulantur, & sic hujus generis pustulæ producuntur.

*Causa Epinyctidum.* Causa *Epinyctidum* est itidem particularis inflammatio, & cum ut plurimum hic affectus nocturno tempore excitetur, & dolorem intensum comitem habeat, necessariò sequitur, ipsum oriri ex obstructione tubulorum angustiorum varique intortorum, in glandulis cutaneis à secedentibus ex cæterarum contubernio particulis imprimis acutis irregularis texturæ, & quidem pungentibus, sicque dolorem inferen-

tibus; fibrillis sc. inde irritatis, & in cinninos adactis, à fortiori etiam acido succo sigente Livor inferitur.

*Terminibus* oboriri solet, lymphæ si sit debito acrior, absuntis & fugatis ab ære aquosis & volatilibus particulis, effusa enim lymphæ acris fermentescens, punctione particularum acutarum in fibrillas nervorum pruritus & sæpe dolorem excitant, & pro majore vel minore acredine sanguinis ac succorum, acrior vel secus alias vicinosque tubulos erodens, imò si conjuncta est lues venerea ipsosque capillorum radices exedens, vel *Scorbutum* comitans, eadem enim ferè est causa Luis Veneræ, ac *Scorbuti*, sal enim acre ac corrosivum in sanguine ac succis existens, & ad cutem delatam ejus tubulos cutaneos erodentibus, imprimis verò in tibiis & cruribus existens.

Cum *Effera* squamulas conjunctas habeat, ex hoc phaenomeno pro certo concludi potest, quod lymphæ in *Effera* sit debito viscosior, absuntis particulis aqueis & tenuibus, concrevit in squamulas seu crustulas, imprimis si adfuerit sanguis & lymphæ salinis particulis rigidis referta.

*Ptydracia* haud multum in causa differunt à *Phlyctenis*, cum obstructio sit in hoc casu in subeilioribus & superficialibus cutis glandulis, & lymphæ est etiam tenuior & acrior, epidermidem faciliè elevans & inter eandem & cutem se effundens, sicque papulam vel vesiculam producat.

Causa *Ficus* latet sæpe in sanguine & succis, cum debita inter sanguinis particulas non est proportio, ac proin intestinus motus (seu intestina agitatio,) non ritè procedit, prævalentes enim (cum nec chylosarum, seu viscidarum fiat attenuatio,) particule crassæ viscosæ, terrestres & salinæ vel acidæ sibi mutuò adherentes faciliè, levique de causa in angustissimis à corde remotissimis tubulis, n.

*Terminibus causa.*

*Effera causa.*

*Ptydracis causa.*

*Causa Ficus.*

e. in extremitatibus digitorum, vel alibi in cutaneis tubulis iſtuntur, & ſic in inducunt, hic enim major viſciditas cum acido adeſſe videtur.

**Cauſa Talpa.** In *Talpa topinaria* lymphæ acrior aliquando viſciditatem conjunctam habet, hinc acredine ſua quidẽm tubulos corrodit & evaſatur, ſed ob viſciditatem lentẽ gradum ſimul facit, & ſic ſub cute ceu Talpa ſub terra fodiendo hunc affectum producit.

**Prognofis Phlyctenatum.** §. 11. *Phlyctenæ* quamvis ex ſe periculo vacent, ſapẽ tamen ſi non ritẽ tractantur, in herpetem degenerant.

**Sudamina.** *Sudamina* nullum periculum inferunt, ſed cùm deformitatem inferant, à ſexu ſequiore ſapẽ curatio exoptatur.

**Epinyſtidum.** *Epinyſtidis* quoque periculoſa ſunt, ſed maximam deſœdat onem cuti inferunt, & facilẽ exulcerantur, quæ exulceratio haud difficilẽ curatur.

**Terminithi.** Si *Terminithus* luem Veneream non comitem habeat, nil periculi adeſt, ſed facilẽ in herpetem exulceratum tranſit, & difficillimẽ ſapẽ ſanatur, imprimis ſi ſcabiem vel praticam luem conjunctam habet.

**Effera & Pſydracia.** *Effera* & *Pſydracia* carent omni periculo facileque curantur, at facile etiam redeunt.

**Ficis.** *Ficofis* eſt affectus diuturnior & difficilior curatu, quia humores viſcoſi ac tenaces non facile ſunt diſſipabiles.

**Talpa.** *Talpa* eſt etiam curatu difficilis & facilẽ in ulcus, ſeu fiſtulam tranſire poteſt.

**Diatæ.** §. 12. *Prognofis* perſpecta nunc ad *Curam* Diætrericam nos conferamus.

**Diætrericæ cura.** Cùm verò omnes hi affectus vel ab obſtructione, vel ab eſione producantur, neceſſariò *Diætrericæ* cura eò dirigenda eſt, ut obſtruſtio & eſio impediatur, hinc aer ſit temperatus; cibi ſint boni ſucci & optimẽ nutrites, fluidi ac caſidi, exulent frigida aliventa, exſucca, viſcida ac terreſtria, ſalina, aci-

da, muriatica, quæ ſimul obſtruſtionem & eſionem inferre poſſunt. Potus eſto calidus, imprimis Theæ vel Caffæ, vel alius De-coſti, ſantalini, vel lignor. vel ſi placet cereviſia ac vinum, variis aromaticis ac reſinoſis marituntur, vel in vino aſſumatur aliquid ſalis volat. C. C. vel oleoſ. Sylv. vel noſtr. fugiantur autem potulenta frigida glacie refrigerata, cereviſiz etiaſz ac acidæ, item vina auſtera ac acida. Somnus, vigilia, motus & quies ſint ad juſtum modum inſtituta, excreta & ſeientia ſint mote ſolito & conſuetudo ſeu ordinatio ſanctorum ſimilia. Animi pathemata fortiora & exagitantia angue ſejuſ fugiantur, ut ita, mœtor, invidia, &c. cùm his vel exagitur ſucci bene antea mixti, vel magis coagulentur.

§. 13. Nunc *Curam* horum affectuum ad mentem *Galenicorum* examinabimus, & quidem curam *Phlyctenarum* prius exponentes, quam inſtituunt obſervando Dixtam refrigerantem, humefactantem & diurticam, dein ad Hepar reſpiciunt. Curationem ergo præmiſſis univerſalibus (ſi opus) decoſto lentium, & Epithemate ex lixivio forti cum cineribus ſagiparato, deinde oleo lini ac nucum aa. p. æq. mixto perſciunt. Quamprimum pruritus, dolor & rubor apparent, ſequens ſtatim applicant:

℞ *Bol. Armen.*

*Coriandri pulv.* ʒ. ʒ.

C. ſ. q. aq. roſar. F.

f. a. Linimentum.

Quod ſi ulcerentur accipiunt adipe ſuillam, liqueſciunt & cum ſ. q. ſpumę argenti mimuriſſi pulv. efficiunt linimentum puſtulis his applicandum, cui & ſulphuris pulv. parum addunt & ſic efficacius reddunt.

Cùm *Sudamina*, juxta Veteres, ex nimio ſero in ſanguine contento oriuntur, quod in cute coereetur, denſitur, ac per ſudorem evacuari prohibetur, hinc curationem Veteres inſtituunt primò

*Galenicorum cura in Phlyctenitis.*

*In Sudaminibus.*

hydragogis seu serum evacuantibus medicamentis : secundò topicis , & quidem Epithemate ex aq. foliorum quercus , cum aliquot granis camphorę mixtis .

*Epinyctidibus.*

Cura *Epinyctidum* ad mentem Veterum consistit primò in ordinato victu , ut nempe omnia acria acida & salsa vitentur : secundò in materię antecedentis per venesectionem & purgationem ablatione : tertio in applicatione Topicorum . Veteres ergò hisce pustulis seu exulcerationibus nectuntur brassicę , cicutę , vel solani , vel hyoscyami , vel thamni , aut plantaginis foliis cum melle impositis . Egrege etiam ab ipsis laudatur calx cum oleo ad mellis consistentiam subasta imposita , itidem Laser cum aqua omnium florum mixta . *Oribasius* verò oleosa non admittere vult , & loco olei aceto cum vino utitur , admonetque , ne acria , acida aut salsa medicamenta adhibeantur . Vitari etiam jubet fomenta , balnea & Solem .

*Termintho.*

Juxta Veteres *Terminthorum* curam similem esse dicunt medelę pustularum nocturnarum , seu *Epinyctidum* jam modò relata .

*Esferis.*

Curationem *Esferarum* Veteres tribus remedium generibus peragunt , sudore , balneo aquę dulcis , & farina secalina ; sudore enim juxta illos causa evacuat , qua profligata affectus etiam desinit : Balneo aquę dulcis humor salsus , mordax , nitrosus & cholericus mitigatur , porisque apertis sensibiliter & insensibiliter eliminatur . Si verò opus sit universalibus uti , tunc illa exhibenda esse , nec diuretica negligenda , monent .

*Psydraca.*

Curatio *Psydraciorum* juxta *Galenum* ejusque sequaces , ( præmissis universalibus præsertim cephalicis aut caput purgantibus : ) fit applicatione discutientium ac refrigerantium , æquali portione mixtorum , imprimis sequens commendant :

*Æ Argenti spuma , cerussa* aa. ʒ iv.

*aluminis , ruta folior. virid.* aa. ʒ ii.  
*ex aceto myrteoque oleo*

inungunt . Magis autem proficere ajunt ea , quę humiditate scateno . Ad *Psydracia* calidissima & fera commendant fariną fabarum ʒ ii. cum vino exceptis , & ad cerati formam redactas & illas .

*Ficus.*

*Ficus* curationem quod attinet , quatenus excrecentiam aliquam carneam denotat , præprimis Veteres intendunt suppurationem prohibere , ideoque per pilulas cochias causam , seu materiam peccantem evacuare volunt , deinde discutientibus , hisce verò non juvantibus , emollientibus ad suppurationem promoventibus utuntur . Exulceratis verò ficibus ceratum citrinum vel pulpam ficis mellimixtam imponunt . Quatenus sumitur pro excrecentia tumorosa applicant sequens .

*Æ Squam. aris , Sandarac.* aa. ʒ i.  
*Alum. sciss.* ʒ ii.

*M.*

Per se singula rettere jubent , ac cum rosaceo miscere ac imponere imperant .

Ad *Ficofar* in capite ac mento pustulas medicamentum sequens applicant :

*Æ Misyor* ʒ i ʒ .  
*chalcitidis* ʒ ii ʒ .  
*squame aris* ʒ i.  
*aluminis sciss.* ʒ ʒ .

*M.* hoc siccum loto largè imponunt . Laudant enim his in pustulis alumen scissile , flores aris , & gluten taurinum , tum squamam aris , quę dupla sit , teruntque ex aceto & illinunt . Probantur etiam ab ipsis capita menularum combusta biscocta , & cineres vnā cum aceto commixti .

Curationem *Talpa topinariae* Veteres juxta minus & magis à Stomatatum curatione differre statuunt .

*Talpa.*

§. 14. *Paracelsus* in curatione *Paracelsi* ne Phlyctenarum , Sudaminum , *cura* in. *Epinyctidum* ac *Terminthi* , aliarum pustularum sequenti modò in- *bisce* .  
cedit .



cedit. Hyemalibus instantibus pustulis per Solem, i. e. per Medicinas resolventes curationem aggre-  
ditur, è converso æstiva ingruente  
influentia per hyemalia, i. e. coa-  
gulativa remedia malum attentat.  
Sin alia forsitan intempèstivè ingru-  
ant impressiones, ut sunt grandine-  
s, ros, pruina, &c. nō admo-  
dum juxta ipsum laborare oportet,  
cūm ultrò successu temporis abole-  
antur. Quod si verò æstivali elemen-  
to generaretur quoddam Crystallo  
ac Berillo simile, tum ipsum, quod  
generatur, ferè fixum est, nec tam  
facile loco movetur, nisi illa coa-  
gulatio in tantum infringatur, ut  
nunquam deinceps ad coagulationem  
pervenire queat, namque ejus-  
modi Elementi ignis proprietas est,  
talemque naturam quandoque pus-  
tulæ referre cernuntur: corpus  
enim penetrant, ut sine negotio  
nunquam deinceps evellantur, sed  
omni ex parte Berillorum natu-  
ram referant. Simili planè ra-  
tione nimirum ventorum instar,  
dolores punctiones, vestigationes,  
&c. contingunt, itaque in curan-  
dis illis observat, ne quidquam  
attentet nisi prius exitu qua erum-  
pere possit preparato. Curationem  
ergo per suffocationem pus-  
tularum maximè improbat au-  
thor, quas pustulas cathartico-  
rum usu non curari asserit, sed  
potius commendat sua Diaphoretica  
arcana. Externè laudat Alum-  
en rupeum, plumosum, sal fu-  
sum, Entali, Vitriol. alum. sciss.  
vel sequens:

℞. *Succi agrimon.* ℥ i.

de porris ℥ β.

*olei anethin.* ad pondus omnium

F. mixtura, cui pannum intin-  
ges, hanc superponit non aspergen-  
do. Vel:

℞. *Aq. glutinis,*

*rosarum aa.* ℥ vi.

*pavibonionis* ℥ v.

M.

Vel:

℞. *Olei lini* ℥ β.

*ariviridis* ℥ β.

M. quo illinantur pustulæ.

Tomus II.

*Essarar Paracelsus* curare satagit se-  
quentibus:

℞. *Olei ex Juniperis* ℥ β.

*amygd. dulc.* ℥ i.

de cessa ℥ viii.

M. Fiat mixtura: postemum  
fit sicuti oleum de Guapco, aut  
huxo; Oleum de Juniperis non  
fieri vult per descensum, sed o-  
leum de costæ, h. e. ex figino li-  
gno. Vel:

℞. *Olei de Spica* ℥ β.

*quercini* ℥ iii.

*Axurgia catti* ℥ i.

Commisceantur: ungantur, &  
his oleis præservabuntur à spiriti-  
bus, qui morbum hunc generant,  
quia unctuositas illa non sinit hu-  
jusmodi spiritum subintrare, Na-  
tura quidem, juxta ipsum, alu-  
minis est officiumque, findere.  
Cum tamen his cutis peruncta fue-  
rit axungii, tales spiritus nullos  
recipit, qui sibi detrimentum in-  
ferre valeant.

*Ficium curam* Paracelsus dupli-  
cem esse ait, unam absolvi sterco-  
ralibus medicamentis, alteram  
verò fieri dulcibus corrosivis, Au-  
thoris verò corrosivum dulce se-  
quens est.

℞. *Olei laterini* ℥ i.

de *Juniperis* ℥ β.

ex *myrrha* ℥ ii.

M.

Corrosivum dulce mixtum cum a-  
ceto sequens est:

℞. *Olei laterini* ℥ i.

*Aque aluminosæ* ℥ β.

*Viriditatis salis ad pondus om-  
nium.* Cura de stercorebus sequen-

ti modo peragitur. ℞. Patientis  
dejectum stercus, M. cum oleo  
de vitellis ovorum. Premat pa-  
tiens ( si existant in ano, ) ut  
exeat, quibustum medicina super-  
ponatur.

In cura Talpæ seu Testudinis,  
ipsi Paracelsus & Celsus distæ,  
cavendum esse ait Author ab unguen-  
tis, unctiōibus & corrosivis. Cu-  
ra ergo ipsius talis est, ut regio  
circumdetur ejus alumine plumo-  
so, & postquam etichara decide-  
rit, superponit oppodeltoch: hac

via Testudinem putrefieri ait in ejectionem, & communibus emplastris curam concludit.

*Helmon-  
sis de pu-  
stulis hi-  
sce curan-  
dis opinio.*

§. 15. *Helmonsii* in curationibus harum pustularum pauca admodum revelat remedia, omnemque operam latici corrigendo impendendam esse sibi aliisque persuadet, qua virtute in *Phlyctonis*, *Sudaminibus*, *Epinyctidibus*, *Termintho*, *Essere*, *Psyracis*, *Ficu* & *Talpa Topinaria* præ aliis saltem nitri viribus perquam pollere existimat.

*Vvillisi  
ratio cu-  
randi  
Phlycta-  
nas.*

§. 16. *Vvillisi* *Phlyctenas* curat humorem glandulosum corrigendo fermento alterationem illius producente penitus extincto, & poros cutis referando, vena ergo secta, corpus hoc medicamine expurgat:

*℞. Sulphur. antimonii gr. vii.*

*Scammon. sulph. gr. viii.*

*Cram. tartari ℥℥.*

*M. f. pulvis.*

Deinceps sequenti cerevisia medica-  
ta uti jubet.

*℞. Rad. polypod. qu.*

*lapath. acut. aa. ℥iii.*

*fenn. opt. ℥iv.*

*Epithym.*

*Turbit.*

*mechoacann. aa. ℥ii.*

*santal. citr. ℥i.*

*sem. coriandr. ℥vi.*

f. a. præparentur, fiat sacculus pro iii. congiis cerevisiæ, post 5. vel 6. dies hauriatur, & sumatur ad ℥xii. plus minus omni mane per viii. vel x. dies. Diuretica etiam exhibet ad salus istud serum per urinas evacuandum: Diaphoretica verò imperat ad poros aperiendos, materiamque excrementitiam foras per eos eliminandam, sed quum, ut jam alicubi dictum, tales affectus vix absque topicorum auxilio evanescant, partem illinire ex unguento facto ex radicibus oxylapathi in butyro cum vino albo coctis ad vini consumptionem, & oleo Tartari per deliquium s. q. admixto.

*℞ Sudami-  
na.*

*Sudaminum* curam instituit poros cutis referando & relaxando,

crassioresque salinas particulas attenuando, & per ductus communes eiciendo. Præmissis enim universalibus, si consultum fuerit, Diaphoreticorum ope poros aperit, & deinceps balneis aquæ tepida cutem relaxat. Si verò his non cedat affectus, Diuretica in usum advocat; tandem decocto ex sulphure & vegetabilibus parato pariter, pidè fovet.

*Epinyctides* tollit angustiores poros aperiendo, & crassiores lympham attenuando, ac foras deducendo, ad quem finem liquorum decoctum commendat, aliorumque sudoriferorum, uti & Diureticorum usum laudat.

*Epiny-  
des.*

*Terminthum* sanat, præmissis medicamentis quodam Diaphoretico, carnosus istis excrecentiis inspergendo pulverem compositum xofibus sepiæ, pomphol. ceruss. & paucò alum. ust. aut ær. ust. & si hisce non pareant, ungu. Egyptiacò illas illinit.

*Termin-  
thum.*

*Esseras*, delet humorum recrementitiorum excretionem per cutis foramina promovendo, unguentoque ex unguento pomato, conchil. ust. pauc. ciner. tabac. & parva quantitate sabine pulverisat. carnem superfluum auferendo.

*Esseras.*

*Psyracia* fugat lymphaticum humorem attenuando & demulcendo, ac per vias ipsi destinatas expellendo; à purgatione verò auguratur, ipsique sudorifera subiungit, quæ si propositum finem non assecuta fuerint, ea subsequuntur Diuretica, ut sunt serum lactis, & acidulæ martiales.

*Psyracia.*

*Ficum* dissipat succum nutritium decocto quodam sudorifero subtilizando, ipsique trochiscum sequentem applicando:

*Ficum.*

*℞. Mercur. sublim. corros. ℥i.*

*opii pulv. ℥i.*

*mucos. gum. tragacanth. q. s.*

*siant Troch. l. a. magnitud. pis.*

*serv. ad usum.*

Deinde ulcus digestivo communi sanat, illudque ad consolidationem perducit.

Ulti-

Ultimò *Talpam Tapinariam* *Villifur* profligat Diureticis copiosiores serofum liquorem excernendo, falsamque ejus Diathesin sequenti vel simili electuario corrigendo.

℞. *Conseru. rad. lapath. acut.* ʒ vi.

*ocul. cancr. pp.*

*corall. pp. aa.* ʒ iii.

*Ebor.* ʒ i.

*lign. aloes,*

*santal. ctr. aa.* ʒ i β.

*sal. prunell.* ʒ ii.

*Vitr. mart.* ʒ i β.

*syr. e succ. lauil. f. q.*

F. Elect. dos. ʒ ii. cui superbibb. aqua sequens.

℞. Fol. tamarisc. q. pl. in massam confusa ponantur in olla fictili vitreata cum operculo, quæ elibano post panes extractos indita, stet per horas sex aut octo. Dein massa in colum effusa, liquor clarus effluat, cujus dosis ʒ iv. aut ʒ vi. eaque usurpari potest extra electuarium.

*Sylvii de curandis hisce tuberculis suntentia.*

§. 17. *Sylvius* in pustulis quibuscumque *Phlyctenis*, *Sudaminibus*, *Epinyctidibus*, *Termintho*, *Esseris*, *Psydracris*, & *Talpa* curandis interna commendat sudorifera, imprimis laudat decocta lignorum, & salia volatilia. Externe etiam magnificat decoctum lignorum, quo foveri vult pustulas, quæ si non sufficiunt, accedit ad falsum volatile cupri Tinctura imbutum, quo pustulas scædas & plane malignas feliciter curat. Dein quandoque ubi sc. suspectio est de huc Venere, ad fortiora transit, & pustulis applicat Mercuriorum precipitatum alicuiunguento innixtum.

*Cartesii morum medicamentis Phlyct. 18.*

§. 18. *Cartesius* talem subministrant *Phlyctenar* curandi rationem, quæ acutæ particule potissimum medicamentis abstergeantur, & extra corporis meatus eliminantur, tum tubercula aut pustulæ emolliantur, aperiantur, & materia intus collecta eximatur, posthac ulcuscula mudentur, abstergantur & consolidentur. Lympham proinde asperioribus resectam salibus ab iis-

dem liberam sudoriferis ex fumaria, scabiosa, satimonio diaphoretico, bezoardico minerali, sale cardui benedicto, spiritu florum sambuci, tinctura tartari, vel etiam decocto lignorum & ejusmodialii sudorem elicientibus, particulas asperiores mitigantibus & cum sudore ejicientibus. Pustulas postmodum ipsas attingunt spiritu florum sambuci, terebinthine, camphoræ, aqua calcis vivæ, decocto ficuum, vel linimentum ex farina fabarum, seminis fenigraci, oleo nucum & succo oxylapathi illinunt. Hæc si pustula non abigantur, easdem aperiant, liquorem intus contentum acriorem linteo tenero leviter exprimunt, ulcuscula abstergunt aqua florum sambuci, hyperici & plantaginis, in quibus flores sulphuris & sal saturni fuerint dissoluta, & unguento de tutia vel diasompholygos omnimodo tentant sanare.

*Sudamina* abigere tentant similibus sudoriferis, ut pori cutanei aperti incongruum emittant, & reliquæ incrassatæ resolutæ & fluidiores reddatæ convenientes repetant ductus, quapropter C. C. Philosophicè præparatum cum cinabari antimonii satis conveniens hic existere dicunt remedium, ad proliciendum sudorem intus assumunt. Sudore probè promotore autem studiosè abstergunt, & ipsas efflorescentias spiritu florum sambuci & succo bryoniæ cum camphora mixtis calidiusculè abluunt, & pulverem ex farina lupinorum, myrrha, olibano & lithargyrio iisdem aspergunt, abs quibus particule acres facillimè absterbentur, & cutis apprime mundatur.

In *Epinyctidibus* sudorifera laudant subtilia, poros cutaneos eisdem aperientia, lympham crassiorem solventia & attenuantia, nec non particulas angulares acutas, sive sales acidos acres mitigantia, quorum ordini includunt spiritum theriacalem camphoratum, electuarium diascordii, rob sambuci,

*Sudamina.*

*Epinyctides.*

cinabatum antimonii, Sal. volatile C. C. Pusulas etiam aperiunt, & aqua theriacali abluunt, tum unguento aureo, vel linimento ex oleo hyperici, calce viva, & camphora fanant.

*Terminatio.*

Sudorifera etiam in *Terminatio* ducunt necessaria ad lymphæ coagulata cum succo nutriente resolutionem, post quæ forinsecus emollientia adhibent, uti sunt essentia radices scrophulariæ, cum spiritu gummi ammoniaci calidè adhibita; emplastrum diachylum simplex, vel cum gummis, vel de ammoniaco Foresti. Si discuti nequeat, sed ad suppurationem vergat, eam promouent, post hanc apertioem institunt, & expressa materia purulenta spiritu matricali ulcusculum aliquoties abluunt, & impositum emplastro diapalini vel de gratia Dei debite occludunt.

*Esferas.*

Ad *Esferas* abigendas, & reditum earum præcavendum, sudorem admodum etiam iudicant proficuum, quem sequenti potissimum proliant potiuncula.

*Re. Aq. rorismarin. ʒ ss.  
Spir. flor. sambuc. ʒi.  
Ant. Diaphoret. ʒi.  
Salis scabios. ʒ ss.  
ol. distill. cort. citr. gutt. iiii.  
Syr. fumar. ʒ iiii.*

*M. exhibeatur una vice.*

Post sudorem balneum instituunt ex herbis agrimonie, scabiosæ, salviae, betonicæ, alchimillæ, furfuribus, argilla & aliis. Mixturam etiam foris adhibent ex aquis hyperici, florum sabarum, sambuci & lacte sulphuris cum camphora. Aquam calcis vivæ cum antimonio hoc etiam in morbo non credunt ineptam esse existuram.

*Psyrac.*

*Psyrac*ia abigere student. blandioribus sudoriferis, præsertim puerorum capita infestantia, quapropter sequentem mixturam apprimè convenire promittunt.

*Re. Aq. scabios. ʒ ss.  
Essent. rorismar. ʒi.  
fumar. ʒ ss.  
liq. C. C. succinat. ʒ ss.  
Syr. card. bened. ʒ ii.*

*M. d. cochlearum.*

Ipsas hæc pusulas illinunt oleo tartari, cum oleo amygdalar. amarar. & guttulis aliquot olei spicæ misto, vel creta in spiritu vini camphorato dissoluta, aut unguento aureo.

*Ficus* convenire dicunt emollientia, attenuantia & succum chylosum incrassatum fluidum reddentia, unde nec hic interna continentur sudorifera ex salibus præsertim volatilibus parata, tum externa quoque adhibent emollientia, uti emplastrum de Ammoniaco cum sulphure & camphora, de galbano, aliaque suppurationem promoventia, qua obtenta tuberculum aperiunt, materiam inrus contentam expriment, & aqua Mercuriali ulcusculum aliquoties attingunt, donec unguento diapompholygos consolidetur.

*Ficum.*

*Talpe topinaria* emollientia non minus imponunt, & materiam aliquantulum emollitam facta incisione eximunt, tum aqua sublimata ulcus emundant, & emplastro de gratia Dei ad convenientem deducunt consolidationem.

*Talpa.*

§. 19. *Phlyctenarum* curatio nostro iudicio variat pro causæ varietate. Si enim adsit intemperies sanguinis falsa muriatica, vel acida, ea quantum possibile, auferatur, exhibendo appropriata medicamenta acridinem involentia, qualia sunt decocta chinæ, aliorumque lignorum cum Thea, & simul fixiorum diaphoreticorum usus interponendus est, ex quibus laudantur antimonium diaphoreticum, ebur Philosoph. pp. C. C. eodem modo elaboratum, antihæticum *Poterii*, oculi cancr. Martialis quæcunque, &c. quorum medicamentorum usus sit per spatium aliquod temporis continuus.

*Phlyctenarum.*

Externè verò nihil tentandum, nisi prius internis causis bene fuerit prospectum, quo peracto, spontè sæpe abeunt, sed sæpe etiam externa postulant remedia, hinc spiritus matricalis sæpe sufficit *Phlyctenis* illitus, vel epichemalis instar

Rat impositus, vel aqu. calc. viu. cum spir. sal. armoniaci, vel unguentum rosarum cum sale Saturni, creta, & similibus absorbentibus, vel cum camphora, terebinth. cutia, oculis cancr. floribus sulphuris, sale tartari, aliisque commixtum. Lixivium est cineribus pini tanquam specificum laudatur: omnia verò lixiviosa id præstant. Si adest simul inflammatio, tunc unguentum diapompholygoscum camphora sufficit, ut & omnia exsiccantia, imprimis emplastrum de lapide calaminari cum camphora, & oleo mastiches malaxatum. Hic nec purgantibus, nec venesectione, nec cucurbitulis, nec scarificationibus, nec hirundinibus aliquid utilitatis præstabis. In pustulis hisce Galli solent imponere emplastrum divinum à *Barbette* descriptum.

**Cura Sudaminum.** In *Sudaminum* curatione eò auditendum est, ut prius massa sanguinea, ac reliqui succi à suis viscidioribus salinis, ac terrestribus liberentur particulis, in quem finem varia absorbentia diaphoretica leviora, imprimis verò Diuretica interna conducent, ut sunt antim. Diaphoret. bezoart. Jovial. martiale cum ocul. cancr. ebor. & unicornu fossil. &c. quæ omnia sanguinis mixturam debilitatam restitunt, acidumque temperant: interponantur varia Diuretica, Tinctur. bellid. fumar. Tinctur. Tartari, liquor. terr. sol. Tartari, crem. Tartari cum ocul. cancr. decoctum lignor. cum herb. heder. terr. fumar. & rad. aperientib. dist. eryng. enul. &c. pil. ex terebinth. cum milleped. & salibus fixis paratum. His enim remediis salis, ac terrestres acidis conjunctæ particulæ per urinam eliminantur, quæ per poros cutis excerni nequeunt.

Externa cura consistit in Sudaminum ablatione, hinc conducunt varia lavamenta ex mundificantibus parata, nempe absynth. ruta, myrrha; sit ergo sequens formula:

℞. *Aq. fl. sambuc.* ℥ ij.  
*spir. matric.* ℥ j.

*ol. tartari per deliq.* ℥ ij.

*M.* & abluantur hæc pustulæ, & quidem tepidè, hac mixtura. Vel in forma linimenti.

℞. *Ol. sambuccin.* ℥ j.  
*cre.* ℥ ij.

*Sal. Saturni* ℥ ss.

*fl. sulphur.* ℥ j.

*M. f. linimentum.*

vel ungu. de lithargyr. cum camph. mixtum, quo illinantur hæc pustulæ. Vel aqu. calc. viu. cum spir. vin. camphor. & flor. sambuci sufficit. Vel:

℞. *Aqu. fl. thil.*

*Sperm. van. aa.* ℥ ij.

*spir. theriacal. campb.* ℥ j.

*Troch. alb. Raf.* ℥ ss.

*M.* pro focu & illinitione.

*Ex. gr.*

℞. *Aqu. flor. sambuc.*

*calc. viv.* aa. ℥ ij.

*spir. matric.*

*fl. sambuc. aa.* ℥ ss.

*sal. Saturni* ℥ ij.

*camphoræ* ℥ ss.

*M. d. ad vitrum.*

applicetur hoc epithema quadruplicatis linteis, & quidem tepidè. Convenit etiam unguent. Saturni. ex lithargyr. Solar. & ol. oliuar. sine aqu. tum in mortario plumbeo diuturnis tritionibus mistum, maxime conducit. Balsam. sulphur. complementum absolvit.

Curatio *Epinyctidum* itidem consistit in depuratione *M. S.* à salinis, ac terrestribus acidis maritatis particulis, quem effectum præstant Diaphoretica temperatoria. *V. S.* & purgatio contra veterum omnium Auctorum opinionem plus nocet, quàm juvat, hinc commendamus essent. fumar. bellid. cum spir. Viterioli Mart., quæ simul particulas ipsas vitiosas per urinas eliminant, educunt quo, ut decoct. lign. sassafr. ac santal. item varia antiscorbutica remedia, & præsertim temperata egregia hic erunt remedia. Denique ad Topica deveniendum est, inter quæ excellunt Tartarea, ol. Tartari cum ol. cochleariæ guttula una, vel altera maritatum & illicitum. Sunt, qui oleum Juniperi com-

**Cura Epinyctidum.**

commendant, tanquam specificum, alii brassicam, vel cicutam parum contusam pustulis his impositam, spir. matric. spir. vin. camph. fl. sambuc. aqu. calc. viv. cosmet. item varia decocta mundificantia hinc inde dicta hic conducent.

Cura Ter-  
minis.

In *Terminis* ante omnia ad mixturam sanguinis reflectendum est, num ista sit vel acida, vel falsa muriatica, quæ prius corrigenda decoctis appropriatis chin. vel liq. fantal. vel salib. volat. sal. volat. oleos. elix. vit. ol. cochlear. vel Guajac. omnia enim medicamenta, quæ acridinem involvunt, appropriata hic sunt, leviora ergo, ac temperata Diaphoretica interponenda sunt ex antihect. antimonio diaphoret. aliisque absorbentibus, imprimis detur pulv. absorbens noster. Nec hoc in casu diuretica blandiora negligenda veniunt, ut variz Essentiæ ex herbis, & rad. diureticis paratz, vel Tartareaquevis.

Externè exulceratis hisce pustulis inspergantur varii pulveres ex mandibulis lucii, cerussa, lap. calaminar. tut. ocul. caner. cœrul. fl. sulph. sal. Tart. aloë myrrh. camph. parati: vel fiant fomes, & imponantur varia Epithemata.

*℞. Aqu. fl. sambuc. ʒij.*

*spir. matric. ʒj.*

*spir. sal. armoniaci cum calce viv. parat. ʒij.*

*℞. f. Epithema* valide applicandum.

Possunt & applicari varia linimenta, vel empl. imprimis nostrum de sabdano.

Cura Eff-  
fusæ.

In *Effusis*, sive pustulis illis parvis eadem remedia conveniunt, tam interna, quam externa, quæ in scabie commendavimus. Massa enim sanguinea multis salinis scatet particulis, quæ vel per sudorem, vel per urinam eliminandæ sunt. Hunc scopum attingemus si exhibeamus varia Diaphoretica fortiora & volatiliora iis, quæ in præcedentibus commendavimus: conducat ergo sal, vel spiritus volatilis viperarum, vel C. C. vel Tin-

ctur. antimonii tartaris. vel nostris Solaris. Ex gr.

*℞. Aqu. enul.*

*card. bened. aa. ʒij.*

*Tinct. antimonii tartaris ʒj.*

*myrrh. ʒss.*

*Syr. defumar. ʒss.*

*M. d. coctilem per vices.*

Topica hic haud negligenda sunt, sed fiant lavamenta ex herb. malu. saponar. fumar. oxylap. scabios. cum farin. lupinor. sulphur. & nitr. Vel illinantur Essenz. lixivio reguli antimonii, vel decocto tabaci, vel aqu. plantag. sacch. Saturni, Mercur. dulc. spir. matric. spir. calc. viv. adject. vel ol. Tart. cum ol. amygd. dulc. Reliqua vide *Capite de Scabie*.

In *Psydracis* imprimè conveniunt sudorifica, ut obstructio tollatur, & lymphæ corrigatur. Detur ergo sæpius pulvis noster absorbens cum antimonio Diaphoret. vel sal. C. C. volat. vel viperar. vel Tinct. antimonii Tartaris. Essent. fumar. lignor. radic. enul. lapath. acut. spir. matric. & plura alia sæpius commendata. Inter topica sæpe sufficit aq. calc. viv. cum sacch. Saturni, & camph. sæpius applicata. Linimenta quoque ex ol. sambuci, cum sal. Saturni, & camphora parati sicque applicari possunt. Ol. Tartar. per deliquium egregium erit remedium, imprimis si oleo amygd. dulc. maritetur, spir. matricis sæpe quoque omnibus aliis palmam præripit, ut & aqu. Regin. Hungariæ tepidè applicata. In eorum defectu imponatur spir. anthos. vel flor. sambuci, vel spir. vin. camphorat. in hunc finem tyronibus frequentem, aut similem commendamus formulam.

*℞. Aqu. fl. sambuc.*

*plantag. aa. ʒij.*

*sal Saturni ʒj.*

*spir. matric. ʒss.*

*camphora ʒij.*

*Balsam. divin. n.d. ʒiij.*

*M. D.*

Cum in *Ficosa timore* sanguis nimis crassus sit, ille prius incidendus, ac volatilifandus est, in quem finem conducent varis acidum temperantia, ac dein volatilifantia re-

Cura Psy-  
dracis.

Cura Fi-  
cosa.



media, ut sunt sal. volat. oleos. Elix. vit. liq. C. C. succin. bals. nervin. decoct. lignor. Præmissis his tumor hic dissolvendus est, in quem finem varii fatus, suffumigia, ac Epithemata parari queunt ex herb. rutæ, cicutar. Nicotian. sal. flor. chamom. verbasc. melilot. sem. lini fœœigræc. bacc. laur. Juniper. sal. Tartari, sal. armoniaci, ex quibus varia concinnari possunt formulæ, & tepide applicari. Vel spir. matric. cum spir. sal. armoniaci, cum calc. viua parato imponatur, vel spir. calc. viu. fl. sambuc. &c. His nihil iuvantibus, ad fortiora accedendum est, aquam nimirum quandam corrosivam, quam *Doffervasser* vocant, adijci enim potest momentum Mercurii sublimat. vel præcipitat. item Mercur. dulc. qua aqua plures curavit *Sorbaix* cap. 8. de Excrecentiis mir.

Curatio  
Talpa,

*Talpa* cuta pro causæ varietate variat, & hic conveniunt omnia ea interna superius dicta Diaphoretica, ac absorbentia, item externa recensita resolventia, ac discutientia, volatilibus oleosis, ac resinosis mixta. Utplurimum tamen Talpa sine manus operatione vix curari potest, quæ operatio fit, vel applicato corrosivo, cui incisio per totam esccharam sat profunda subjungitur, quo tamen corrosivo non semper opus est, sed statim fiat incisio, dein reliqua cutis ab ipso tumore digitis paulatim separatur, & ad fundum, seu radicem deveniatur, quo facto eximatur tota massa inspisata, hinc mundificativa cum plumacolis imponantur, donec vulnus sarcoticis consolidetur.

## C A P U T XI.

De Tumoribus Cysticis, Ganglio, Atheromate, Meliceride, Steatomate, & Emphysemate.

§. I.

**T**UMORES hi, de quibus modò tractaturi sumus, nomen suum

à diversitate materiæ intus contentæ sortiti sunt, hinc dicuntur Tumores Cystici, quia propriè includuntur Cystidi, seu tunicz, seu folliculo.

*Ganglion* describitur, quoddam sit tumor durus, indolensque cum cute sana, à tubulorum tendinosorum contorsione, & induratione, post laborem utplurimum in manibus, pedibusque obveniens. *Germanis* à duritie dicitur *Vberlein*. Ganglia nihil aliud sunt, quàm nodi in nervis, ac tendinibus. Nodi verò isti callosi, qui *Gliedstrumme* Germanis vocantur, differunt ab his duritie, & quod non in nervis, aut tendinibus existant, sed illis tantum adiaceant. Ganglia cognominantur à figura externa corpora olivaria.

*Atheroma* est species tumoris, seu abscessus cum folliculo, in quo aliquid puli simile continetur peculiari tunica inclusum. Si tumor talis, quod frequentius accidit, in capite crescat, ob firmam capitis cutem firmiter cranio circumtentam, non tam extrorsum prominere potest, sed potius tumor talis latius sub cute capitis sæpè expanditur; unde tunc *Tessudo*, item *Talpa nigra* appellari solet. Hoc in tumore materia proprio folliculo contenta, & diutius retenta, subinde acrior redditur, & aliquando ipsum os cariosum reddere potest. Tales tumores si sunt immediate supra suturas, relinquenti sunt intacti.

*Meliceris* describitur, quod sit species tumoris, vel abscessus cum folliculo, humorem melli similem in propria tunica continens.

Si verò materia in tunica propria contenta sevo, vel adipis similis sit, tunc vocatur Medicis, vel Chirurgis *Steatoma*.

Sunt & alii ejusmodi tumores cystici, qui continent vel pilos, vel carbones, vel vitra, vel chartas, vel lintamina; vel vermes, aliamque materiam peregrinam, hinc nomina ista superius dicta essentiam horum tumorum non satis explicabunt.

*Emphysema* est tumor statulentus, sub

*Emphysema.*

sub quo ventus, vel status in tubulis, vel meatibus, vel peculiari-  
bus tunicis continentur, tamen  
status isti locum ampliorem qua-  
runt, tubulos distendunt, sicque  
tumorem flatuosum *Emphysema* di-  
ctum excitant.

Certum est, quod omnes istę  
prędictę materię contineantur in  
peculiari tunica, & in hoc omnes  
ferę consentiunt, quamvis in aliis  
differant. De Gangliis multum di-  
sceptatur inter Auctores, sed po-  
tius controversia est de nomine  
quàm re.

*Pars affe-  
cta.*

§. 2. *Pars affecta* horum tumo-  
rum tunicatorum sunt partes mem-  
branosę, ac fibrosę, quę sæpę ita  
extenduntur, ut proprium sibi ef-  
formant folliculum, ad succosistos  
diversos continendos; cum enim  
membranę violentius, aut ab ex-  
terna, aut ab interna quadam cau-  
sa distendantur, facillę tunc dila-  
tantur, ac lacerantur, hinc ejus-  
modi Tumores tunicati oboriun-  
tur.

*Ganglii* verò pars affecta sunt ner-  
vi, ac fibrę tendinosę, & occur-  
runt Ganglia utplurimum in arti-  
culis, manum sc. & pedum, præ-  
cipuę verò circa juncturas appa-  
rent. Nervi plurimi in variis cor-  
poris partibus in cincinnosabeunt,  
& adeo inter se invicem intrican-  
tur, ut Anatomici tales coagnen-  
tationes *Plexum* dixerint, dein à  
plexibus proficiunt, & circum-  
circa disperguntur. Quando plures  
nervi in unum coeunt, observan-  
dum est, vasa, ex quibus consti-  
tuuntur, nullam inter se habere  
anastomosin, & eam solummodò  
in ipsorum involucrio reperiri, &  
cum nervus in plures ramos distri-  
buatur, vasa ipsius privatim in plu-  
ra non dissepuntur, sed divisio in  
ipsorum involucrio occurrit, &  
vasa, quę unico comprehensa fue-  
rant fasciculo, plurimos consti-  
tuunt ramos; quę omnia nobis  
magnum affundunt lumen ad ex-  
plicandum Ganglion inferius de  
causa petendum.

*Diagnosi.* §. 3. Parte affecta explicata ordi-

ne semel nobis proposito ad Dia-  
gnosin horum affectuum Tunicato-  
rum accedamus. Ganglion ergò  
cognoscitur ex tumore duro, reni-  
tente, inæquali, indolenteque, qui  
vel in manibus, vel pedibus mole  
sua utplurimum nucleum avellanam  
adæquat, estque ejusdem cum cu-  
te sana coloris. Post laborem ma-  
jorem homines in hunc incidunt  
tumorem. Tumor hic tantum ad  
latera movetur, non verò prorsum  
aut retrorsum, & per hoc differt  
à Melicride, & Atheromate, item  
ratione duritię, quę in Ganglio  
observatur, differt à reliquis Tu-  
moribus Tunicatis.

*Atheroma* verò cognoscitur ex  
tuberculo utplurimum in capite,  
sæpę etiam in aliis corporis parti-  
bus membranosis existente, in Tu-  
nica propria materiam pultimili-  
cem continente. Quod Atheroma  
in humero sinistro in spinam ver-  
gens ovi columbini magnitudine  
observant *Curiosi Germani Ephem.*  
*Ann. 2. Obs. 93.*

*Meliceris* cognoscitur ex materia  
melli simili, & proprio inclusa fol-  
liculo; prout *Steatoma* observatur,  
si materia folliculo proprio conten-  
ta sit sevo similis. Observatur eti-  
am, quod tumores hi tunicati Lu-  
næ phases imitentur, & utpluri-  
mum circa partes nervas radicen-  
tur, & proinde frequentius circa  
caput, collum, nucham, & simi-  
lia loca nervosa inveniantur, in  
carneis verò partibus *Sarcomata* ob-  
oriuntur. Facillę quidem patet, an  
sint proprio inclusi folliculo, quàm  
verò contineant materiam, vix an-  
tequam aperiuntur dignosci po-  
test.

*Emphysema* facillę cognoscitur,  
facillę enim digito cedit, & non  
tam durus est, quàm cedematosus  
tumor.

§. 4. *Ganglion* ad mentem *Vete- Galenico-  
rum*, manuum juncturas, ac ta- tum opin.o  
los frequentius, cubitum, & ca- de causa  
put autem rarius occupat; juxta Gangliis.  
illos quoque ex plaga, vel labore  
originem sumit, quatenus ex hisce;  
sc. plaga, percussione, nimio la-  
bore,

bore, nervosæ, & tendinosæ partes in nodum quasi, ac consequenter in tumorem coguntur. Tumorem hunc à lenta, ac crassâ pituita ori-ri contendunt. Hinc Ganglium dicunt nervi contorsionem ex plaga, aut lassitudine provenientem, in pluribus quidem corporis partibus, maxime verò in iis, quæ moventur velut est summa manus, & pes, obvenientem.

*Athero-  
matis.*

Juxta Veteres *Atheromatis*, seu Nodi causa est spiritus vaporosus; sæpe & oritur juxta ipsos ab humida, ac mucilaginosa, præsertim autem pituitosa materia, aut utraque mixta, quocunque enim modo hæc causa sub cute latitat, ac per tempus ibidem manet, natura Deastra illorum adjuvante, varias formas induit, & representat, ut modo pulsî, modò luto, amurcæ fæci similis evadat, ac propria investiatur Tunica.

*Melicer-  
idis, ac  
Steatomatis.*

Causam *Meliceridis*, ac *Steatomatis* eandem esse dicunt, nempe pituitosum, ac mucilaginofum humorem insipidum, & in proprio folliculo latentem, hinc tantum ab Abscessu differre ajunt.

*Emphyse-  
matis.*

*Emphysema*, h. c. inflatio juxta *Galenicos* ex frigido, crassiorique spiritu confatur, hinc inflationes, quod spiritus eutem intendat. Renitentur tangendo, ajunt, & hinc differre ab œdemate contendunt. Imò ipse *Hippocr.* statuit, quod *Emphysema* sit copia spiritus flatuosi in cavitatibus, præsertim veterò articulis.

*Paracelsi  
cogitata  
de causis  
tumorum  
Cysticorû.*

§. 5. *Paracelsus* Tumores hos Cysticos, ut Ganglion, *Atheroma*, *Meliceridem*, ac *Steatoma* apprimè describit sub nomine Scirrhosis, dicit enim, *Scirrhosis* est Apostema, vel nodus, qui nascitur per excrescentiam novæ generationis, quando scilicet natura superfluitatem ex centro generationis producit, accumulato postmodum in excrescentiam juxta membrum, in quo fuerit, generatur. Regeneratio juxta ipsum major est, quam ubi corpus nascitur; possibile est, ut fiat secunda regeneratio, & est pura

superfluitas regenerationis. Tumores hi juxta ipsum aliquoties in fronte nascuntur, ut nodus, in cervice, & in manibus. Quando sub collis, aut sub ventre nascitur, tunc ejus Duritiem non bene percipi posse ait. Ex mellisfluis mineralibus hosce tumores imprimis *Meliceridem* produci posse nullus dubitat.

*Emphysema* esse à flatibus cum *Emphyse-* reliquis Auctoribus consentit, & *matis*, sæpe ex accidentalibus provenire asserit, eseq; sæpe arsenicalem inflationem præter salis resolutionem, siquidem omnis inflatio sicca producatur ex arsenico puro.

§. 6. *Helmontius* Ganglion, & tu- *Helmontii* mores hos Tunicatos, seu Cysti- *de causis* cos induci vult à mucilagine ex la- *horum tu-* tice relicta, & sub propria tunica *morum o-* latente, eandemque in tantam ma- *piniæ.* gnitudinem distendente, & materi-  
am diversam exhibente.

*Emphysema* verò, seu Inflationem deducit ex statu à fermento vitioso spermatico producto, & partes varias membranofas variè tendentes.

§. 7. *Villisiur* innuit, Ganglion Villisur- oriri ex fibris à duro quodam in- *tiocinta de* strumento aut inassueto, aut diutius causa Gân- *traclato*, vel à gravi aliquo corpore *glii.* re premente, à proprio situ deturbatis, sibi que invicem propiis, & arctius admotis. Fibrarum ergò poris, atque interstitiis strictioribus hoc pacto redditis, fuliginè per ea evaporari solita retinentur, ac in illis coacervantur, ipsaque op- plentes fibrarum duritiem, ac tensionem adaugent, aquosioribus subtilioribusque earum particulis exhalatis, crassioribus verò remanentibus.

Tumores Cystici ex Villisi *Tumorum* mente progignuntur ex succo nu- *Cystico-* tritio à sale acido in illo præpo- *tum.* lente, viscidioris facti, atque coagulato, & in eujusdam arteriolæ, per quam devehitur, sine remorante. Liquor autem ille crassior, ac lentescens in vasis termino cespitans, perpetuæque aggestione accrescens,

scens, arteria parietes dilatat, fibras ejus ab invicem semovet, ac in longius protendit, amplioremque illius cavitatem efficit. Fibrarum autem arteria fines à partibus ambientibus coerciti in sese mutuo incurvantur, atque concurrunt, & adununtur, vasisque osculum obturantes folliculum ex eo efformant. Quum verò sal istud coagulans in humore nutritio dominium obtinens variz sit indolis, minorisque, vel majoris aciditatis, & sulphur in eo coagulatum crassius, vel tenuius existat: Liquor concreescens dissimilis indolis reperitur, diversaque advertitur consistentia, colorisque differentia; & varia idè fortitur nomina tumor ex tali humore coagulato exortus. Si enim materia in folliculo conclusa pulrem referat, *Atheroma* dicitur, si verò melli consimilis fuerit, *Meliceris* denominatur, at si sevo, aut adipi par existat, *Steatoma* indigitatur.

*Emphyse-*  
*matis.*

*Villisus* autumat *Emphysema* ortum habere à flatibus in vase quodam contentis, illudque distendentibus, ac dilatantibus, negat verò flatum primariam esse hujusce affectus causam, statuitque propriam illius originem deberi spiritibus animalibus in motu suo ab incongruo quodam perturbatis, qui inordinatè, & turmatim per fibras nerveas in alicujus vasis tunicas irruentes, mirè illas instant, atque distendunt, & quaquaversus extumescere faciunt. Liquore verò in vase dilatato contento à vehementiore isto spirituum impetu validius agitato, portio ejus in vapores rasescit, & in flatum amplius illud spatium implentes cedit.

*Agilii opi-*  
*nio de cau-*  
*sa horum*  
*marborum.*

§. 2. *Syllisus* Ganglii, ac *Tumorum Tunicarum*, seu *Cysticorum* causam deducit à pituita viscida ac glutinosa, proprium sibi folliculum efformante, & in parte quodam corporis coacervata.

*Emphysema* ex flatibus in vasis, aliisque cutis partibus collectis, partemque externam distendentibus orti censet.

§. 9. *Cartesiani* existimant, *Ganglion* produci à nimia nervorum & tendinum extensione, unde ramuli contorqueantur, ad latus excresecant, & simul liquor nervosus ex fibrula quadam dirupta effluat, atque circa nervum coaguletur, tandem continuo quodam effluxu cummulatus tumorem excitans. Hanc verò nervorum disruptionem ab externa quadam suscitari dicunt violentia, contusione scilicet, lapsu, distorsione, luxatione, quibus sæpius tumor hic in acceptis ferendus sit.

*Carresia-*  
*norii indi-*  
*cit de cau-*  
*sa Ganglii.*

*Atheromatis*, *Meliceridis*, & *Steatomatis* originem adscribit chylo in propriis suis vasis ab acido quodam liquore coagulato, cuius partes crassiores caseosæ inspissatæ, & continuo aliarum affluxu adauctæ tunicam vasis illius extendant, quæ ità extensa folliculum constituit materia intus contentæ. Prout verò materia hæc caseosa vel mollior sit, & aquosior, vel spissior, pinguior, aut aridior, & ratione vulvarum, quibus vas illud chylosum constat, à se invicem dispersa, ita eandem modò pulvis, ut in *Atheromate*, modò sevi, ut in *Steatomate*, modò mellis, ut in *Meliceride*, interdum etiam tophorum, carbonum, & quando plures quædam venulæ obstructæ, tandem succorum transfluxum admittere non valentes concreverunt, & invicem convolutæ fuerunt, pilorum, aliarumque rerum speciem præ se ferre affirmant.

*Atheroma-*  
*sis, Melice-*  
*ridis, &*  
*Steatoma-*  
*tis.*

*Emphysema* ortum habere dicunt à succorum quorundam tenuiorum invicem mixtorum effervescentia, veluti si lymphæ acidiusculæ, & liquor nervæ particulis porosioribus constans, in parte quadam confundantur, & medianre æthere diversæ hæ particule aducentur, tum spirituosæ à reliquis sejunctæ tubulos musculorum distendunt, & tumorem ejusmodi flatulentum excitant. Dum verò particule porosæ succi nervi superant particulas acutangu-

*Emphyse-*  
*matis.*

las lymphæ, hasque destruunt, nullam etiam inflammationem produci statuunt, quoniam materia ætherea facilem reperit transitum. Nonnunquam tumorem hunc excitari credunt, quod severa in parte ista aer distendens continetur.

*Nostrati.* §. 11. Tumor qui *Ganglii* nomine à plerisque nuncupatur, oboritur, *Me iudice*, si tubuli nervi, vel fibræ tendinosæ ab infueto labore ita distorquentur, ut succi circulantes multas obstructions pro offendiculo offendentes stagent in tubulis tendinosi, tandemque ab humoribus à tergo insequentibus propellantur usque ad membranam illam, quæ tendinem circumvestit, ubi efformata fovea colliguntur, & concresecunt, abeuntq; in duritiem eximiam particulæ viscosæ, ac terrestres, tenuioribus interim exhalantibus. Certum enim est, tumores nervis adnasci, nam corpora ista *olitaria* ab implicatione tantum vasculorum nerveorum efformantur, ea prorsus arte, qua filum, ex quo funda contexta fuit, amplius spatium terere videtur in medio fundæ corpore; ubi lapis collocatur, quàm in funiculis, qui ex utraque ejus parte exoriantur. Sic & Ganglion sæpè eodem modo generatur ac tumores tunicati, eum quis manum intorqueat, facile fieri potest, quod vas aliquod nervosum comprimatur, hinc facili Marte ejusmodi tumor producit. Sunt etiam, qui credunt, Ganglion oriri ex succo nutritio abundante, & in tumorem viscosum coactervato.

Tumores tunicati omnes oriuntur, *me iudice*, à vase chyliifero à quacunq; causa ampliato. Tunica enim illa, quæ circa hunc tumorem reperitur, nihil aliud est quàm dilatatum vasculum chyliiferum, vel vas, in quo succus, quo nutrimur, continetur, & uti *Aneurisma* fit ex arteria dilatata, & varix à vena dilatata, cum arteria, ubi aneurisma est, maximam ha-

bet dilatationem, quod & de vena in varice intelligas, sic hic dilatatur vas chyliiferum, & chylus ibidem stagnans coagulatur, & in materiam vel pulti, vel melli, vel fovo similem abit, prout enim chylus variat, & evasatio diu durat. Cause verò hanc dilatationem, & extensionem producentes, plures esse possunt, primò glandula obstrui potest, à qua obstruktionem magis illa intumescit, hinc vas adiacens compressum dilatationem, & extensionem producere valet. A causa quoque violenta vas aliquod chyliiferum, vel lymphaticum majusculum, vix enim hæc vasa inter se differunt, ad medium, aut discindi, aut rumpi potest, & tunc necessario chylus affluens, nullamque resistantiam inveniens vas suum dilatat. Sæpè enim à contusione, ictu, vel lapsu affectus hi tunicati orti observantur. Huc etiam refertur ipse succus ineptus, & per has angustias circulari non valens, qui reliquas partes membranosas dilatat, & ejusmodi tumorem pro humoris varietate, vel Atheromatis, vel Meliceridis, vel Scatomatis nomine insigniendum, producit: & cum extensio sit dilatatio in superficialibus vasis lymphaticis, fit, ut in his lymphæ reperiantur, tunc Medici nomen indidere *Hydatidum*.

Nunc etiam paucis ad affectuum Tunicatorum phenomena explicanda animum dirigamus, ex omnibus verò appareat, quod succi intalli corpore sint crassiores, imprimis chylus, qui tardius circulator, & sic stagnare cogitur. Dilatatio vasis fit sensum atque sensum, quoniam affluxus, & appulsus succorum non sufficiens est; si verò materia circa tunicas semel sibi aliquam efformavit cavitatem, & dilatationem, necessario semper plures insequentur particulæ ejusdem indolis, quæ ibidem colliguntur, & cum tempore talem constituunt Tumorem Tunicatum.

Diversitas materiæ, quæ in Tunicis hæ colligitur, deduci potest primò

Туморны  
Сурко-  
тум.

primò à conformatione vasis, in quo dilatio fit, vasa enim cuncta ob angustiam, & flexuram non quolibet admittunt succum. Juxta hanc succorum, imprimis chyli, diversitatem, diversa reperiuntur vasa chyliifera ad hanc, vel illam nutriendam partem. Sic etiam à mixtura sanguinis diversitas materiz dependet, cum in quibusdam subjectis succi sunt tenuiores, quam in aliis, ubi reperiuntur crassiores, in quibusdam succis vel est acidum, vel falsum, vel oleum, vel spiritus abundantiores; si addas & hanc causam, mutationem nempe vasis in longum & latum, quam figuram natum est vas, dum dilatatur, si enim dilatatur vasculum, vel tunica, fibrillæ coarctantur, & hinc fit expansio major, & ob majorem, vel minorem extensionis gradum etiam cavitas major, vel minor efficitur; in senectute ob fibrarum coarctationem vasa latius distendi nequeunt; in Juvenibus verò fibræ melius extendi possunt: ex quibus omnibus sequitur, peculiarem in his vasis separari succum.

Si materia stagnans vel acidior, vel oleosior, vel spirituosior, vel falsior existat, juxta horum varietatem succorum materia hisce in tumoribus Tunicatis, vel tenuior, vel spissior, vel pinguior, vel durior apparebit.

Sic etiam diuturna stagnatio hujus evasati succi hanc, vel illam faciem inducere facit; si enim particula continuò in motu suo conserventur, & inter se ratione figuræ mutantur, facili Marte fieri potest, ut oleosæ particule à spirituosissimis desistantur, & mixtura turbetur. Pressio quoque externa ansumat, ut materia in his tumoribus contenta compactior reddatur, quia particule invicem hamis & uncis combinatæ sunt, prout in oleis destillatis videre est, quæ amissis spiritibus incrassescere solent.

Si ergò ipsius materiz stagnantis cuspidis ab acido præsentipermen-

sium aliquot spatium planè distrumpuntur, vel franguntur, materia commutatur in materiam duriorē pinguedini bovina non dissimilem, & sic producitur *Steatoma*, quia acidum particulas figit volatiles.

Si verò in tumoribus his tunicae plus salis fixi quam acid: colligatur, materia pulci erit similis, quia particule fixæ talem mutationem, quam volatiles, non efficiunt in succis, hinc oritur *Atheroma*.

Quilibet ergò ex his faciliè mente assequi potest, quòd materia per tot menses latens, stagnansque in parte aliqua plures mutationes circa figuras subeat, ex quarum particularum figuris, mixtura, combinatione, motu, hoc vel illud corpus generari posse neminem latebit, qui saniorē Philosophiam modò summis degustaverit labiis, quæ materia toties mutari potest, quoties diversæ ibidem colligantur particule.

Non necessum est, si hæc, vel illa extranea in ejusmodi tumoribus tunicatis reperiuntur, statim ad Diabolicas confugere artes, quando sc. vel muscæ, vel vermes, vel pili, aliaque inveniantur peregrina, cum & hæc ex ovulis, aliisque miscelis succorum oboriri queant. Non verò omnem incantationem abesse volumus, & consistunt illa in quadam fascinatione, & Diabolus sæpè fucum facit suis præstigiis, & sapius inter puris, ac materię effluxum quadam immisceat, & supponit, quibus se mancipiis suis potentem, aliis formidabilem reddere vult: & cum sæpè hæc non fideliter referantur à circumstantibus, & nimis credulis, ac garrulis, plura hac vice addere non libet.

Quod verò proprii folliculi generationem, seu productionem attinet, ipsum sequenti modo generari videtur. Fibræ crassæ, aut laceratæ, & sic à se invicem separatæ, ut in naturalem unionem haud amplius redigi queant, à nutrimento distendantur in largius, ac pro-



tenduntur, hinc emittunt fibras, quæ mutuò concurrentes, talem constituunt membranam, quæ membrana nutrita & dilatata cum tumore incrementum capit, quoniam succus transfudans non ordinario situ transponitur, sed coagulatus coacervatur simpliciter, materia aut sero, aut pulvi aut nielli similis efformatur. Juxta Lunæ phasēs hi tumores Tunicati augeri vel minui observantur.

*Emphyse-  
matis.* Causa *Emphysematis* seu *Tumoris Flatulenti* est obstructio pororum à quacumque causa oborta, cum sæpè crassiores & copiosiores vapores per poros obstructos transire impediti, *flatus* constituunt. Flatus enim nihil aliud est, quam vapor crassus in cavitate musculorum, vel aliarum partium conclusus, compressusque, qui distendens expandensque partem membranofam, in eam veluti ventus impellitur, sicque *Emphysema* constituit.

*Prognosis.* §. 12. Quod *Prognosis* dictorum affectuum concernit, magis vel minus curatu difficilis est, prout ipsa causa, videlicet crassities fuerit major vel minor. Cum Ganglion non vitæ exitum minetur, attamen est affectus curatu difficilissimus, qui nec emollientibus, nec discutientibus aliisque specificis volatilibus obedit, hinc affectus hic ægros sæpè ad vitæ finem comitari solet, quia indolens est, non magni æstimatur, nec Chirurgi opera imploratur.

Sic etiam Tumores Tunicati absque periculo per plures gestantur annos, & lento progrediuntur gradu, medicamentis etiam rarissimè cedunt. Sponte tamen nonnunquam suppurantur, & modò in ulcera sordida & fistulosa abeunt, modò accuratior cura insectis explicanda radicitus tolluntur. Atheroma interdum in putrefactionem abit, & quemadmodum ulcus ad basin se extendit, quo venæ sæpè eroduntur & periculosa hæmorrhagiæ causæ existunt, imò duas sanguinis libras effusas esse ex Athe-

romate aperto legimus in *Ephem. German. Ann. 2. obs. 93.*

Omnes hi tumores Cystici sunt ferè sine periculo, attamen, quia sæpè enormem excrecentiam, nonnunquam deformitatem inferunt, curandi sunt.

*Emphysema* pro loci varietate variat, faciliè aliàs curatur, non verò aperiendus est tumor flatulentus.

§. 13. Si æger ritè curari vult, oportet, ut & exacta utatur Dieta, si enim sanguis & succi imprægnati sunt multis viscidis, tenacibus ac terrestribus particulis obstructionem parientibus, fixoque sale poros vasorum obstruentibus, ac sensim nimis dilatantibus, viamque particulis viscidis præbentibus. Victus ergo ratio optima instituitur, quæ ferociam salis mollicie suarum partium demulcere valent. Aer hisce in affectibus sit temperatus, ad calidum vergens & sale volatili multo refertus, vitetur aer multis particulis terrestribus ac crassis aut nimis nitrosis acidis repletus, ut est aer nempe frigidus ac marinus, qui succos ac ipsum chylum in vasīs circulantem, coagulando vel inspissando adeo crassum reddunt, ut postmodum morbi præfati inde oboriantur. Indulgeant ægri cibis facilioris digestionis, quique exhibent nutrimentum subtilius, quod faciliè in forma chyli ad sanguinem delatum leges circulationis sequi potest. Exulent omnia acida & viscida salsa, &c. Potus sic cerevisia optima, cui interponatur Potus Theæ vel Caffæ ad sanguinem & succos attenuandos, sicque ad circulationem faciliorem incitandos, exulent omnia vina atque potulenta acida. Exercitia, somnus ac vigilæ, imò & alvus sint pro consuetudine. Excetiones quoque solite suppressæ aut nimis austæ, quatenus multum ad affectuum horum productionem faciant, ad ordinarium incitentur cursum.

Quantum animi pathemata œconomiam

nomiam nostram turbare queant, vex excoipat, quod ex nimio terrore, gaudium ac mœrore nonnulli vitam cum morte commutaverint, hinc & multum ad affectus nostros producendos contribuere possunt: cum enim anima corpori tam amico fœdere juncta sit, ut nihil ipsi eveniat, quin pro illius constitutione aut similitudine afficiatur aut tristetur, aut id, quod corpori molestum est amovere cœnetur, si fortè corpori inopinatè gratum aut perniciosum quid obveniat, illi statim in auxilium adesse omni ratione conabitur, quando spiritus magna copia ad omnes corporis partes determinabit, qui tanta celeritate, fulminis instar, ad singula corporis puncta penetrabunt, ut inde sanguis & reliqui succi non duntaxat in certo particularum suarum ordine concutiantur, quo postmodum paucos spiritus promere queant, sed magna isto impetu fœpius ex latibulo quodam expellitur fermentum peregrinum, quod humoribus admixtum œconomiam animalem turbat.

Galenicum  
cura  
in Ganglio.

§. 14. *Galenicè in Ganglio calcem vivam cum adipe asinero & terebenthina prodesse dicunt; medicamentum ex Achate lapide parant & imponunt, vel sequens:*

- 1) 3℥. *Cerussæ,*
- 2) 1℔. *resinæ pinur,*
- 3) 1℔. *olei veteris,*
- 4) 1℔. *ammoniaci Thymiamatir,*
- 5) 1℔. *galban. aa. 3j.*
- 6) 1℔. *Gera tridentem.*

M.

Laminam plumbeam crassiore, veluti sunt verricula, Ganglio majori imponunt ac deligant. Gravitate enim dissolvi ajunt per longum tempus.

Commendant etiam oxerum & masticherum Emplastrum. Sunt qui benè fricant Ganglion cum sale & fol. sambuci simul mixtis, dein applicant emplastrum de cicuta. Veteres in curatione *Ganglii à Chirurgia abstinent, ac folis medicamentis utuntur, præsertim verò*

*Gummi ammoniacum super ignem emollitum & ad Emplastri formam redactum cum lamina plumbea superponunt, ne verò hinc & inde moveri possit, artus vinculis constringunt; si transactis aliquot diebus Ganglium emollitum fuerit, nulla rei mentione ad ægrum facta, statim (dum adhuc calet locus, ) vincula tollere, pollicem dextræ manus Ganglio immittere, ac reliquos quatuor digitos parti affectæ injectos comprimere jubent, inde Ganglium citò dissolvi & evanescere sperant.*

*Athero-*

*In Atheromate, Meliceride & Steatomate Chirurgiam, uti in Strumate, Meliceride & Steatomate, adhibent, quæ consistit in Sectione, excoriatione & suturis, &c.*

reliquaque curatione: eam verò operationem ità instituunt, ne & pelliculam facient, eò quod contentus humor effusus impediat Chirurgiam, & ne partem ipsius relinquant, quæ regenerationis plerumque causa sit, circa manuum juncturas, & malleolos, & partes, quæ secundum articulum moventur; quemadmodum etiam struma, si aut tota aut pars ipsius relinquantur. Quòd si tale quid relictum fuerit, melius esse dicunt non fuere, sed erodentibus medicamentis relictis consumere.

In *Emphysemate* curationis scopum esse ajunt, corporum rarefactionem & crassi spiritus attenuationem per calida ac tenuium partium medicamenta perficere. Præmissa evacuatione per hydragoga, quæ pituitam seu serum crui materiam (ex qua status generantur, ) evacuant, progrediuntur ad sacculos ex carminativis, discutientibus ac calefacientibus, eosque calidè parti affectæ imponunt. Si verò musculi ob contusionem inflati fuerint, partes valdè calida & acris agrè ferre dicunt, quare ab initio in mitigantibus perseverare oportet, declinatione verò contingente in discutientibus. Utuntur itaque sapa cum modico oleo, lanis succidis excepto, aut etiam cerato

*Emphyse-*  
*mata.*

ex æsypo admixto, & curam adhibent, quo caliditas permaneat, nam frigiditatem non conducere ajunt. Postquam vetò mitigatio facta est, acetum admiscunt & nitrum aut aphronitrum, & postea etiam lixivium: postremum autem emplastra discussoria adhibent usque ad perfectum mali discussionem, strigmenta fervefacta primum, ut pura fiant, excolant ac rursus in ollam injiciunt, & tritam calcem vivam instar farinæ insperam inferciunt, donec luti spissitudo fiat, quo tum utuntur.

*Paracelsi* §. 15. *Paracelsus* in Tumoribus Cysticis, Ganglio nempe, *Atheromate*, *Meliceride*, *Steatomate* curandis eodem modo incedit ac in Tophis & Sclerosi, commendat ergo in eum finem sequens unguentum.

*℞. Ol. myrtillor.* ℥ii.

*N. Moscat.* ℥ss.

*Axung. iumentorum* ℥ii.

*petrolei* ad pondus omnium

*M. f. Mixtura.*

*In Emphysemate.* In *Emphysemate* curatione ritè instituenda *Paracelsus* ab apertione & rebus siccis cavere præcipit, & resolutioni materię potissimum studere, varia ergò ex siccis, oleo, ex bacc. Juniper. farin. fabarum parare jubet cataplasmata. Ad ventum in Tumoribus abigendum sequens vel simile laudat Cataplasma:

*℞. Ol. ex bacc. Juniper.*

*amygd. dulc.* aa. ℥i.

*farin. fabar.* ℥ss.

*sim. columbin.*

*caprar.* aa. ℥ii.

*Aceti* q. s.

*M. f. l. a.* cataplasma, quod superponatur mane, sub meridiem & vesperti. Vel seq. Empl.

*℞. Terebinth.* ℥ss.

*Cumini* ℥iv.

*sem. lactuc.* ℥vi.

*cera* q. s.

*M. f. Empl.*

*Helmontii* §. 16. *Helmontius* in affectibus Cysticis, ut Ganglio, Atheromate, Meliceride & Steatomate omnia, quæ in aliis Tumoribus reperta

habet & hic prodesse ait. Interne propinat oculos cancr., aliaque Diaphoretica, quæ insigni cum utilitate intus exhiberi posse sperat. Topicè verò emollientia adhibet, potissimum in tumore duro oleum illud commendat, quod in strumis depellendis sæpius probatum reperit, & oleum strumarum ab ipso vocatur.

*Helmontius Emphysema* seu Tumorem statulentum per semina status discutientia auferri posse contendit, anisi, dauci, carvi, anethi, cymini, imprimis cum propter contusionis injuriam pars quedam lacerata in furorem concitetur, qui per remedia ista insigniter mitigetur.

§. 17. *Villissus Ganglion* curare studet, illud insensibiliter resolvendo laminæ plumbeæ, ope, quam parti firmiter applicat, vel solam, vel Mercurio vivo illitam, vel oleo Juniperi destillato inunctam. Folia sempervivi majoris itidem adhibet, inferiorem eorum cuticulam prius detrahendo, novaque manè & vesperti imponendo. Gummi Animoniacum in emplastri forma parti etiam applicat. Sed si *Ganglia* hscæ omnibus resistent, ad emplastrum de Ranis Vigonis cum Mercurio confugit, vel etiam parti successivè imponit plumbi laminam spiritui vini & aceto destillato infusam, cui euphorbium inspergit.

*Atheroma*, *Meliceridem*, & *Steatoma* simili tractat methodo. Statim enim sollicitè materiam aggestam tum internis tum externis medicamentis insensibiliter discutit. Sed quum illud infrequentius contingat, imò & in recentioribus tantum tumoribus cysticis hoc expectare liceat, materia parumper maturata tumorem aperit, humorem evacuat, & loculum penitus excidit, ulcusque deinde curat balsamo vel sulphuris vel Peruviano; nulla autem superest resolutionis spes, si tumor aliquamdiu duraverit, & ad Chirurgi manum, tanquam ad sacrum

anchoram tunc recurrere necesse est. Cistis enim, ut jam dictum radicibus tollenda venit, nec minima quidem ex fibrillis illam constituentibus est relinquenda, ne novus deinceps Tumor exurgat, qui deinceps in diuturnum fœtidumque ulcus, aut fistulam abit. Ad hunc autem finem assequendum utitur vel instrumento Chirurgico, vel unguentis exedentibus. A principio enim hos Tumores maturat emplastro ex gummi ammon. pyrethr. & ol. succin. destill. parato. Post apertionem autem unguentum Ægyptiacum in sinum immittit vel purum, vel cum terra vitrioli, & paucis viridi æris auctum.

*Emphysematis.* In *Emphysematis curatione* abstinere à phlebotomia, uti & à catharticis atque Diaphoreticis, & Diuretica, qualia sunt sequentia, solummodo commendat:

*℞. Milleped. vivor. mund. ℥iſſ. Nuc. Mosch. incif. No. i.*

*Simul confusus affund. aquæ diuturnæ infra scriptæ ℔i. f. express. dos. ℥iii. ad ℥iv. bis in die.*

*℞. Baccar. Juniper. virid. sambuc. aa. ℔iij.*

*Conor. abiet. ℔i.*

*Jugland. virid. ℔i.*

*Cort. VVniver ℥ii.*

*citr. ℥iij.*

*Aurant. ℥ii.*

*Limon.*

*sum. ammeos.*

*eruca.*

*nasur. aa. ℥vi.*

*aneth. ℥i.*

*affund. ser. lact. d. vin. alb. parat. ℔iv. destill. organ. commun. totus liquor misceatur.*

Tumori autem sequentia topica applicat:

*℞. Flor. sal armon. ℥i.*

*crystal min. ℥ii.*

*Spir. vin. tenuioris multo phlegmate imbut. ℔ii.*

Misc. & dissolve in vitro, huic liquori pannum lincum bis in die intingit, & tumori statulento applicat.

Vel:

*℞. Empl. Diasapon. h. e. de minio cum sapone Veneto f. q.*

extendatur tenuiter super alutam tennuem, quod parti impositum in illa per aliquot dies sinit, ipsumque tum renovat.

§. 18. *Sylviur* in Ganglio reliquisque Tumoribus Cysticis curandis ad glutinosam pituitam peccantem corrigendam, incidendam & attenuandam, sicque tumores resolvendos, salia commendat volatilia frequentius in vino vel liquoribus aliis indita sumenda, si ve sint ex animalibus deprompta, si ve in vegetabilibus contineantur. Externè olea & unguenta illinit emollientia & dissolventia ex oleo laurino, Philosophorum, unguento martiato, vel cataplasmata ex plantis aromaticis parata, imprimis verò Emplastrum suum carminans commendat. Ad evacuandos humores viscidos pilulæ suas laudar magistrales.

In *Emphysemate* ad pituitam viscidam resolvendam & bilis actionem juvandam carminativa laudat, ut spiritum nitri dulcificatum, & potissimum spiritum suum carminativum, aliaque status discutientia ac sudorifera volatilia & fixiora quæcunque.

Inter Externa magnificat *Sylviur* cataplasmata ex floribus chamomillæ, baccis lauri, semine cumini, olea rutæ, nardinum, anethi, vel unguentum martiatum & similia partibus flatibus distentis adhibita.

§. 19. *Cartesiani* talem subministrant Ganglion curandi rationem, qua tumor ille spissus ex liquore nerveo coagulato productus resolvatur, dissipetur, & à nervorum ramis & tendinibus amoveatur, ut rami illi & tendinum extremitates à distortionem & convolutionem liberari, & in situm convenientem reponi queant, quæ de causa emollientia & interdum suppurationem promoventia tumori imponunt qualia sunt empla-

*Sylviana cura in Ganglio & tumoribus cysticis.*

*In Emphysemate.*

*Cartesiani norum modus curandi Ganglion.*

emplastrum ex galbano, vel Gummi Ammoniaco in vino dissolutis, diachylon cum gummis, de ranis cum Mercurio, vel tumorem illi-  
nunt balsamo nervino, spiritu gummi Ammoniaco & salis armoniaci inuicem mixtis. Adhibent etiam ad coagulati illius succi dissolutionem impetrandam laminam plumbeam Mercurio illitam, vel aurcam, quam super Ganglion firmiter alligant, vel digitis comprimunt, aut duobus prioribus digitis manus sinistrae illudprehendunt, & dextera percutiunt, ut ita dissipetur, quo facto emplastrum defensionum *vigoris* superimponunt. Sectione quoque secundum longitudinem instituta illud nonnunquam student auferre.

*Atheroma, Atheromatidis, Meliceridis & Steatomatis* curationem peragunt emollientibus, ut sectione postmodum facilius materia intus contenta una cum folliculo suo siue cystide eximatur. Sequens itaque emplastrum singulariter celebrant.

*℞. Gummi. Ammoniac. ʒii.*

*Sulphuris ʒß*

*Campbor. ʒii.*

*Euphorb. ʒi.*

*Ol. petr. q. f.*

*M. f. Emplastrum.*

Sectionem crucis forma super tumore instituunt, ad ipsam usque materiam, tum cutem eleuant, & materiam, spatula à reliquis partibus separant, hinc unà cum tunica illa eximunt, & suscitatum fortè hæmorrhagiam ob diruptas venulas aut arteriolas convenientibus remediis sistunt, cavitatem unguento Ægyptiaco, vel melle chelidonii mundant, reliquias aqua sublimata, Mercurio librato vel alumine penitus absumunt, & curam uti in aliis ulceribus debite absolvunt.

*Emphysema.* *Emphysematis* conferre credunt interna remedia effruescentiam sedantia & discutientia, quæ parantur ex crystallis Tartari, ebore Philosoph. pp. floribus armoniaci, oculis cancr. nec non aliis sudoriferis

& diureticis lympham resolutam extra corpus eliminantibus. Inter externa tumori adhibenda sequens approbant linimentum.

*℞. Unguent. martiat. ʒiiß*

*Agripp. ʒiß.*

*Sperm. cet. ʒß*

*ol. destillat. anath. gutt. vj.*

*cumin. gutt. iiii.*

*Petr. alb. ʒi.*

*F. Linimentum.*

Fotus etiam & cataplasmata deprædicant ex herbis betonice, menthe, chamædrios, salvia, phellandrio, foliis rorismarini, floribus sambuci, chamomillæ, farina fabarum, Tartaro & sale Ammoniaco parata, uti & emplastrum de baccis lauri, oleo Philosophorum malaxatum & calidè impositum.

§. 20. In cura *Ganglii nostri* iudicio eò incumbendum est, ut obstructions tollantur, ac succi viscosi ante omnia attenuentur, hinc præter interna volatilia & incidentia folis externis peragitur remediis, ut sunt spir. lumbricor. matricalis, vini camphor. item fotus & cataplasmata ex blandè resolventibus parata. Hisce verò nil iuvantibus, eò deveniendum est, ut exstirpatio hujus instituitur manu Chirurgi exercitati, quæ per Sectionem fit, hinc Ganglion circa articulos vel alibi emergens tollitur vel concussionem aut digiti compressionem firmiore, seu manu fricetur vel validè comprimatur, usquedum incaleseat, mollescat, & evanescat, & sic vi compressionis succi tumorem constituentes iterum quaquaversum protrudantur & quidem per tubulos; & ne recidivam patiantur ægri, ad succos porro attenuandos obstructionsque reliquias tollendas, ipsi tumori superimponatur lamina plumbea aut alia simplex Mercurio inerstata, & super hanc Emplastrum tenaciter hærens (vulgò *Hessi*, *Pflaster*) cum splenia compactiore & deligatione arctiore, consue quo cystis rupta, & materia intus contenta disensa fuerit, quod

*Nostromæ  
thodis cu-  
randi Gan-  
glion.*

sæpe intra mensem & etius contingit: vel loco lamina imponatur Emplastrum de ranis cum duplo mercurii cum stricta ligatura, quæ impedit ne succi viscosi in consueta cavitate iterum ut antè cumulentur. In quem finem & Emplastrum nostrum de Thea egregium erit, item de Labdano, Divinum *Barbeter*, Diaphoret. *Mysf.* Alii aliquid de emplastris his dictis, aut gummi saltem armoniac. dissolutum sub forma Emplastri laminæ plumbeæ supponunt, & facta decente deligatione eundem expectant effectum. Sequens linimentum Ganglii illicitum à pluribus magni æstimatur.

*℞. Ol. Limac.*

*lumbis. terr. aa. ℥ii.*

*lil. alb.*

*chamæmill. aa. ℥iſs.*

*verbas.*

*Tabac.*

*sambuc. aa. ℥i.*

*castor. ℥ss.*

Quo linimento manè & vesperi artus Gangliis infecti & deturpati calidè illinantur, vel loco hujus totus instituat ex herbis Absynth. Arthemif. Origan. Salv. gran. Juniper. in lixivio decoct. Item suffumigiis utendum est ex gummolis aliisque discutientibus volatilibus. Sed breviori manu negotium hoc succedere videtur, si nempe pugni ictu duplici fortiore, membro super tabulam commodè situate rumpatur capsula, quod vulgus imitari solet, tumorem versus tabulæ apicem aliudve corpus solidius premendo, sicque pariter cystim ejus lacerando. Sed ubi Tumor altas jam egerit radices, & per annos duraverit aliquot, tunc ad præscriptum Celeberrimi Domini *Meyr* ferula lignea haud differens ab illa, qua Præceptores in castigandis pueris utuntur, nisi quod plumbi portio in illius medio infusa jacet, juvat, & talis ferulæ uno ictu, ægroti facie à manu affecta in dorsum averfa, tumor rumpi solet. Quo remedii genere prælaudatus vir Ganglium

per quadriennium patientem vexans evanescente vidit, cuius modela brevi per Emplastrum & strictam ligaturam absoluta fuit. Qui à duro hoc cuncto abhorrent, ii uti possunt sequenti vel simili linimento.

*℞. Ol. de Laterib. ℥i.*

*terebinth. ℥iſs.*

*cora ℥il.*

*camphor. gutt. v.*

*visell. ov. No. j.*

*M. f. linimentum.*

Quidam ex Chirurgis sunt, qui aperiunt Ganglia, eaque per suppurantia sanare tentant. Alii Emplastrum Arsenicale extollunt, ac dein ictu pugni. Rarum est, quod *Gl. Mysf.* refert in *Podalirio* suo ex *Blankardo*, materiam Ganglii ex cadavere exemptam instar crystalli pellucidam apparuisse & satis duram, eamque literas subjectas exhibuisse, multò majores, quam erant revera, sic ut illud Ganglion tum temporis pro microscopio inserviret, quod tamen phenomenon non tam ejus pellucidati, quam figuræ attribuendum existimo, quod facile experiri est, dum pupilla ex vitulo alioque animali exempta imponatur chartæ, literas videbis multo majores, quam erant revera.

In Ganglio ETMULLERUS folia semper vivi majoris, ubi detracta sit inferior cuticula commendat, quæ imponatur quotidie, manè & vesperi removendo, meliore jure applicatur lamina saturi spir. vini, camph. irrorata & adspersa euphorbio, quod Ganglia successivè dissipare ajunt, ut penitus tandem evanescant.

Quod Therapejam Affectuum reliquorum Tunicatorum *Atheroma*, *Meliceridum* & *Stomatitis* attinet, cura ferè eadem est, eorum enim sublatio fit per interna volatilia & fluiditatem succorum conestiantia remedia, ut sunt potus Ther. vel Castæ more jam recenti calidè absorbendus, aliaque incidentia & Diaphoretica sæpius recensita. Cura verò insensibiliter

*Atheroma, Meliceridum & Stomatitis.*



peragitur per attenuantia & res-  
olventia fortiora medicamenta, im-  
primis si tumores hi adhuc mate-  
riam fluidam contineant. Sensibili-  
ter verò magis cura perficitur per  
Maturantia, Septica atque Sectio-  
nem.

Inter resolventia medicamenta  
primas tenent calx. viv. ejusque  
decoctum, spir. vin. camph. spir.  
mattical. cum aliis oleis aromaticis  
& gummosis mixta vel in Empla-  
stra redacta, quæ sæpè post pugni  
ictum imponi possunt ad materiam  
melius resolvendam. Ex. gr.

℞. Gum. Galban.

armoniaci,

Styrac. calam. aa. ℥iii.

Resin. pini ℥ß.

Ol. Guaiac. ℥i.

cera ℥i.

Philosoph. ℥iß.

pulv. rad. bryon. ℥i.

M. f. l. a. Empl.

Emplastrum nostrum de Thea,  
item de Labdano, de cicuta, de  
Tabaco, item Divinum de Ranis  
cum merc. de Galbano Mynf. &  
Magneticum imprimis si quid Cam-  
phoræ addatur, egregia sunt in re-  
solvendis quibuscumque Tumori-  
bus, præsertim in his Tuni-  
catis. Vel in forma linimen-  
ti sequens vel simile præscriba-  
tur:

℞. Vng. Dialth.

Martias.

ol. Laurin. aa. ℥ß.

Philos. ℥ii.

cera ℥i.

Tinct. Galbani ℥i.

Spir. sal. armoniaci volat. ℥iiii.

Camphora ℥iii.

M. & illinatur, dein superius  
præscriptum applicetur Empla-  
strum.

Balsamus Peruv. item vapor à py-  
rite ignita exceptus, & oleum  
rubetorum à Barbette laudan-  
tur.

Quoad maturantia medicamen-  
ta asterisco notandum est, quòd  
hisce cautè incedendum sit, ne,  
quemadmodum à potentioribus ex-  
siccantibus durities redditur scir-

rhosa, maturantium fortioribus  
malignitatem canerosam induca-  
mus. Melius ergò mitioribus re-  
solventibus ut Empl. ex gum. ar-  
moniac. ol. succini & pulv. rad.  
pyrethri mixto tumores hi discu-  
tiuntur, mediante enim hoc re-  
medio Tumorem Tunicatum in  
maxilla ruptum fuisse testatur *Sen-  
nertus*.

Cautica verò seu corrosiva me-  
dicamenta externa Tumores hos Tu-  
nicatos erodentis aliquando in  
usum vocantur, quæ eum cum  
folliculo eorum abrodunt, sique  
Tumores excavant, æt propter ea  
in Meliceride, Atheromate &  
Steatomate maximè conveniunt.  
Ex quorum erodentium seu cau-  
sticorum classe cuti erodendæ ap-  
plicandorum sunt lapis infernalis  
sive causticus officinarum, oleum  
vel butyrum antimonii, item Vi-  
trium luteum, vel quæ Eschara,  
quam illa induxerunt, remota,  
ipsum folliculum penitus erodunt,  
inter quæ sunt viride æris, col-  
chotar dulciss. Alum. ust. mercur.  
libratus & libratus, ungu. fuscum  
*Vitrii*, quibus tamen medicamen-  
tis eo allaborandum est, ut cum  
materia contenta omnis folliculi  
substantia auferatur, & ossa quo-  
que, si his adherescant tales hu-  
mores, studiosè abradantur, aliis  
Tumores hi in ulcera abeunt fistu-  
losa, facileque repullulant.

Chirurgica ac manualis curatio  
horum Tumorum Tunicatorum  
consistit in pugni ictu, prout su-  
perius in curatione Ganglii dixi-  
mus, postea curari potest ut aliud  
ulcus. Caustico prius adoriendi,  
& cultro reliquæ excindi possunt.  
Operatio ergò sequenti modo per-  
agenda est: Incidatur cutis super-  
posita ad formam crucis, & manu  
labris à Tumore separatis cystis exi-  
mi debet cum tota intus contenta  
materia, quæ interdum pinguedi-  
nis, mellis, pulsus, interdum la-  
pidis, vel calcis, vel etiam cere,  
vel glandule costæ similitudinem  
habet, & si aliquid membranæ re-  
manferit, ad istam destruendam

penicilum spir. sal. commun. imbui, & sic applicari potest; vel.

Rx. Empl. dia sulph. ℥iii.

ol. succini,

tartar. aa. ℥ii.

M. & applica Tumoribus Tunicatis, Lupiæ, aliisque.

Dum hæc scribo, in mentem venit sequens casus: Condiscipulus meus *Solein* dictus, Francothalensis, sub mento maximum sensim ac sensim nactus est Tumorem Cysticum, quem tandem curandum suscepit Empiricus quidam Gallus nomine *Atavan* notissimus, qui materiam in Cystide contentam Sectione instituta me præsentem exemit promissimè, quæ materia erat glandulæ coctæ similis, sed post aliquot dies obveniebant Symptomata graviora, ut die à Sectione octavo, inter parentum lachrymas optimæ hic spei Juvenis animam efflaverit.

*Emphysema.* Curatio *Emphysematis* consistit potissimum in removendis tubulorum obstructionibus, per interna Diaphoretica volatilia ac carminativa specifica, ut sunt spir. nitri dulc. Essent. carminat. chamomill. Rom. cort. aurant. menth. Zedoar. arcan. dupl. sem. carminativa quæcunque, & ex his parata spiritus & olea. Omnia enim aromatica hic egregia sunt, ut Tinctura cinnamomi, macis & sexcenta alia cum aq. fœnicul. carmin. aliisque propinanda. In Juniorum gratiam esto sequens formula:

Rx. aq. fœnicul. ℥ii.

carminat. ℥i.

fl. chamom. ℥i.

Essent. cort. aurant. ℥iii.

Spir. nitri dulc. ℥ss.

Syr. fl. chamom. ℥vi.

M. d. cochlearium.

Vel detur per vices arcanum duplicatum à ℥ss. ad ℥j. excellens in flatibus remedium, interponantur spiritus anis. angel. matricar. catarrhal. Elix. vit. Essent. bacc. lauri, Juniper. spir. sal. armoniaci anisat. Ut & omnia reliqua salsia volatilia oleosa conducunt. Solis

enim sudoriferis internis curatur *Emphysema*.

Externè in *Emphysemate* conducunt sacculi ex fl. chamomill. sambuc. sem. anis. &c. in vino cocti & tepidè parti statulentæ impositi, vel parentur ex herb. ruthæ, scord. Malv. fl. chamomill. sem. cumin. carvi, bacc. lauri, Juniper. sal. armoniaci, tartari, &c. Ex quibus pro re nata parentur foci vel Epithemata vino Gallico vel lixivio incoquenda & calidè applicanda. Vel sequens:

Rx. Aq. fl. sambuc.

calc. viv. aa. ℥ii.

librat. vin. camph.

matricar.

Angel. aa. ℥i.

M. cum quadruplicatis linteis applicandum Epithemia.

Ceratum de Cumino, Empl. de bacc. lauri, de Thea, de Labdano, carminat. Syl. &c. optimo sæpè cum successu applicantur.

Tumores hi statuosi haud incidi aut ferro aperiri debent, Gangrana enim ac Sphacelus facilè subsequi solent, sed potius medicamentis idoneis cataplasmatibus, aliisque oleis chamomill. Philosphor. succin. carvi, cumini, anis. &c. resolvendi ac discutendi sunt. Conducunt etiam fuscumigia ex catminativis ac gummosis resinosisque parata.

## CAPUT XII.

### De Aneurismate & Varico.

#### §. I.

**A**neurismus quivis & eorum casus internæ non alibi querendæ sunt, aut reperiri possunt, quàm in succis & canalibus, ex quibus partes solidæ & universum corpus constatum est, nam quæ sanitas, vires & vigor actionum à partium solidarum motu pendunt, hæc verò à succorum agitatione, adeoque necessè est,

est, ut succi per canales fluant refluantque qua decet via, & modo ordinque, ut sanitas in propatulo sit; unde elucescit, actiones nunquam lædi posse, nisi læsis succis vel canalibus, aut ambobus: Itaque explicatis, quæ hic occurrere possunt vitiis, referatæ erunt sores, ut clarè lesarum actionum, adeoque morborum phenomenon causas clarissimè perspicendo ob oculos ponamus. Nunc verò occurrunt & canalium sanguiferorum vitia, inter quæ imprimis perspicua sunt *Aneurisma* & *Varix*.

*Aneurisma* dicitur etiam Latinis *Arterie dilatatio*, & describitur vulgo, quod sit tumor extraordinarius continuè pulsans, digitis facilè cedens, at propediem iterum sese extendens, ab arteriarum interioris tunicæ ruptura, & exterioris dilatatione. Brevissimè describi potest, quod sit ruptura interioris Tunicæ arteriæ à causa quacunque violenta producta.

*Varix*, Grecis *varis* vocatur, Germanicè generaliter dicuntur *Varices* *die Krampff adern* specialius *verò die Kinds Blattern*, quoniam gravidis plerumque accidunt. Varices ergò nihil aliud sunt, quàm venarum nodosa, livida & molles intumescenz, tractum atque colorem illarum observantes, quæ compressæ quidem digito imposito cedunt, mox tamen recurrunt, à sanguine crasso & ad stagnationem apto circa valvulas alicujus venæ, cujus membranæ à majori sanguinis copia ibidem cumulatæ ita distenduntur, ut sacculos quasi sanguine repletos efforment. *Varix* vulgò describitur, quod sit *venæ dilatatio extraordinaria vel cum vel sine ulcere* existens, contingensque modò in temporibus, modo circa umbilicum, frequentissimè verò in cruribus, ut plurimum à nimia dilatatione venarum oborta. Me iudice describi potest, quod sit venarum extensio ni-

mia, à causa violenta tum interna tum externa oborta.

§. 2. *Aneurismatis Pars affecta* *Pars affe-*  
*cta*.  
sunt Arteriæ, vasa ex fibrillis albis conflata, sanguinem ex globulis ovalibus constantem vehentia, quas arterias vasa esse continuata sanguifera solidè probat *D. Antonius van Leeuwenhoek*. Socii Collegii Anglicani, in *Tractatu Belgico, Den vvaaragtigen Omloop des Bloeds*. Cor quidem contractione sua sanguinem ex ventriculis suis in auriculas immittit, sed quoniam arteriæ sensim decrescunt, sanguis in eas injici nequit magno cum impetu, quin eas tumefaciat. Cum arteriæ hoc modo tumant, ad pristinum redeunt statum, fibrarum suarum elatere, & ea ratione partem sanguinis, quem acceperunt, cordis venis impendunt. Et cum cor iteratis vicibus sanguinem in arterias protrudat, ita etiam illæ extolli debent & subsidere, iteratis vicibus. Motus iste Arteriarum Pulsus vocatur, circa quem annotandum est, arteriarum dilatationem cordis contractionem concomitari, & arteriarum contractionem ejus dilatationi adjunctam esse. Ii, quibus satisfacit perspicuus rerum conceptus, cordi tantummodò tribuent munus sanguinem in arterias compellendi, ipsumque principium circulationis instrumentum existimabunt. Ii, qui autumant cor esse sanguificationis organum, permittendum est, in certiori inniti conjectura. In omnibus verò corporis partibus, ubi existunt Arteriæ, *Aneurisma* contingere potest. Sic in Naso Virgo post variolas *Aneurisma* passa est, prout testantur *Bartholini Acta Hassnienfis*, & quidem *Obs. 81. vol. 1.* quod *Aneurisma* nullis remediis cedens febris superveniens curabat. In brachio, pedibus, collo aliisque locis observavimus *Aneurismata*, quæ etiam internè nobis non observantibus contingere possunt.

*Varicum* pars affecta dicuntur

venæ cum suis valvulis, itidem vasa sanguifera, & quidem vulgo revehencia dicta, sanguis enim copiosus, crassus ac acidus à venis majoribus ad minores fluens ob crassitiem & suam viscositatem ad valvulas vasorum subsistens & incrementum capiens, venæ tunicam facili ter arte distendere, & talem sacculum varicosum producere ac efformare potest, imò & internæ venæ à tali affectu non immunes sunt, uti Varices in venis pulmonum annotavit Hippocrates. Ut plurimum verò Varices in gravidarum cruribus ac Abdomine observantur, qui tamen in omnibus corporis nostri partibus contingere possunt.

**Diagnos. Aneurismatis.** §. 3. Nunc ad Diagnosin horum vasorum sanguiferorum affectuum nos accingamus. Aneurismata externis in partibus in sensus nostros facili incurrunt. Tumor enim est arteriarum mollis & laxus, ut digitorum compressioni aliquo modo cedat, mox tamen redeat, quumvis cum tempore & in Aneurismate inveterato tumor satis durus ac magnus evadat, prout Aneurisma pugni magnitudinem excedens & §. circiter unciarum pondere vidit Celeberrimus Dn. Schrakius. In Aneurismate pulsus deprehenditur pulsui Arteriarum respondens. Circa Aneurisma fugillatio vel livor ut plurimum observatur, cutis adest densitas, sanguis enim extra illius cavitatem erumpens in loca vicina fertur, & apertio ejusmodi laserum vasorum arteriosorum causa est, quam infelix Venæsectio sæpe suppeditat.

**Diagnos. Varicum.** Varices quoque externi in conspectum veniunt & facili cognoscuntur ex ipsorum livore & tumore molli, in cruribus enim & prope malleolos aliquoties hi Tumores varicosi, lividi & subcærulei observantur ad mortem vel usque magnitudinem, quales nodos in virgine rustica Celeberrimus observavit Georgius Francus in Decur. Ephem. Ann. 3. Obs. 12. qui varices etiam sponte quinquies rumpeban-

tur, & inde effluebat ultra libram sanguinis. In gravidis ut plurimum observantur imprimis circa femur, abdomen & crura. Interni Varices vix à Medico oculatissimo cognosci possunt., Dn. Joannar. Muesliet, Chirurgus noster Audicus nuper vidit Aneurisma in Brachio circa cubitum Viri Jovenis alicujus, ovi struthionis magnitudinem excedens, quod per annorum aliquot spatium absque ullo incommodo gestabat, sed strepitum continuum produxit tumor, non aliter, ac ventus sibilare solet, sanguis enim sic cum impetu iruebat. Paracelsus ait, si crurum venæ tument, qualescumque sint, nodosæque fiant globulorum instar, cum nativi coloris in cœterum, nigrum aut sub viridem transmutatione, velut inflata cutis præter carnis detrimentum, Varices fore judicabis.

§. 4. Galenicis Aneurisma dicitur dilatatio arteriæ, seu tumor arteriæ, qui est ad tactum mollior & digitis cedens, quem ex sanguine causa. & spiritu generari dicunt. Fieri & Aneurismatis. Aneurisma ajunt arteria faucibus, ubi quidem incombens ipsi cutis ad cicatricem deveniret, manserit autem vulnus arteriæ neque conglutinata, neque cicatrice obducta, neque carne obturata. Cognoscunt affectum hunc ex pulsu arteriarum, imò ubi comprimuntur arteriæ, tumor omnis disparet. Quæ ex osculi arteriæ apertione fiunt, oblongiores apparent, & in profundo consistunt, & ad digitorum impressionem, velut strepitus quidam auditur, quum in affectionibus ex ruptione nullus sonus percipitur, & sint quoque hæ magis rotundæ, & in summo occurrant.

Varix Galenicis dicitur vena Variet. dilatatio, quæ occurrit aliquando in temporibus, quandoque juxta lini ventris partem sub umbilico, maxime verò circa crura. Generationem hujus affectus juxta ipsos ex materia atrabiliosiore ortum habere contendunt.

*Causa ad mentem Paracelsi Aneurismatis.*

§. 5. *Paracelsus* Aneurisma ex sanguinis arteriosi sale caustico oboriri contendit, & *Varices* juxta ipsum oriuntur ex sale plumoso, quod cum substantia resolutum est: illis evenire ait, qui cavernosum ulcus expectant: ac mulieribus gravidis: ideo quod ulcus hoc in matrice debeant expectare per generationem in easdem venas expulsum. Notat enim asterisco, cum sal aliquod ex operatione propria seipsum aperit, ejus est sanitas: ubi non, transit ad radices hujusmodi venarum, & ulcus cavernosum intrinsecum generat.

*Helmontii de causa Aneurismatis & Varicis opinio.*

*Helmontius* Aneurismata ac *Varices* ab Arteriarum ac Venarum partium à sanguine multo cruore referto distentione originem sumere, & natales suos habere sibi imaginatur, ac de eo non amplius dubitat.

*Juxta Villisium causa Aneurismatis.*

§. 7. Aneurisma secundum *Villisii* opinionem oritur à causa vel externa vel interna: causa externa est arteriz sectio vel punctio, ab aliquo instrumento talem effectum producere valente inducta: interna vero est sanguis salibus acerbis & erodentibus luxuriis: quorum particulae quadam Tunicarum arteriarum poros subingressa, fibras Tunicae interioris discindunt ac dissecant, illamque ab exteriori robustiore existente separant. Sanguis vero eodem semper impetu circulum suum agens, hiatus illum in cursu suo obviu subingreditur, & spatium istud inter exteriorem & interiore arteriz tunicam subsistens subiens, ipsas à se invicem latius se jungunt, & aggestione sua validius illas distendens atque extollens, Tumorem Aneurisma dictum generat.

*Varicis.*

*Varix*, sentiente Authore nostro, inducitur à sanguine crassiore & feculentio in venis remorante, illarumque Tunicas dilatante. Cruor enim ex arteriarum osculis elapsus, & venas subingressus, tardiori multo quam antea motu agitatur, tum ob spiritus pariori copia illum tunc inhabitantes, tum res ob tunica-

rum venarum tenuitatem, earumque laxitatem: quo fit ut sanguis, qui arterias torrens instar percurret, testudineo quasi gressu in venis circuletur. Si verò cruoris massae spiritibus sit jam depauperata, aut liber ipsi non suppetat commectus per venam aliquam vel compressam vel obstructam, in vasis alveo detentus sanguis tunicae fibras & pondere suo & aggestione à se invicem dimovebit, illasque extendet ac elongabit, & venae parietes dilatas, illius cavitatem ampliabit, eamque in tumorem elevari.

§. 8. *Sylvius* de causa Aneurismatis ac *Varicis* differens statuit Arteriae Tunica laesa Aneurisma, Vena autem tunica itidem laesa & laxata Varicem excitari, quia juxta ipsum aquae in Arteriis ac Venis requiritur conveniens firmitas & soliditas, quo sanguis per ipsas debite moveri & propelli queat.

*Sylvii opinio de causa Aneurismatis & Varicis.*

§. 9. *Cartesii* adscribunt originem Aneurismatis nimis exterioris arteriz tunicae extensioni, quae à sanguine per interioris tunicae fibras resolutas, suppuratas aut confusas, ad exterioris fibras fortius allabente, & motu suo pulsorio in eas agente frequentius dependeat, abs quo etiam pulsus & continuo sanguinis lapsus ipsa ista tunica exterior nonnunquam dirumpatur, & sanguis effusus circa eandem stagnando coaguletur. Externa quidam infortunia, qualia sunt lapsus, contusiones, aliaeque offensiones, malo huic interdum ansam praeberent, dum arteria sanguine turbida vehementius percutiatur aut confringatur, qua violentia fibrae interne valde laedantur, & nonnunquam penitus disfringantur.

*Cartesii notum rationem de causa Aneurismatis.*

Haud absimili ratione etiam *Varices* progenerari credunt, dum scilicet à vi quadam compressa venae sanguini ab arteriis fortius propulso transitum permittere nequeunt, qui circa valvulas subsistens, & copia auctus ibidem loci venam distendit & tumorem producit, interdum ob segregatas par-

*Varicis.*

ies chylofas accedentes in suppurationem prodeunt. Compressionem verò istam venarum sæpius contingere dicunt, dum homines grave aliquod onus in altum elevant, aut etiam humeris vel capite gestant, ita enim muscoli ad laborem istum exantelandum liquore nerveo admodum referti & intumescentes, vicinas premunt venas & easdem coarctant, ut sanguis liberè satis per eas transfluere nequeat. Foetum quoque in gravidis eandem compressionem aliquando instituire, cum aliis fatentur.

*Notum  
sententia  
de causa  
Aneuris-  
matis.*

*S. 10.* In quo autem *Aneurisma* indoles consistat, nostram nunc inter tot Authorum discrepantias deponamus sententiam: rupturam enim interioris arteriæ tunice ex triplici substantia glandulosa, musculari & membranosa ad mentem *Willisi*, constantis, exterioris autem netvæ extensionem; seu pluribus visum est, admitti vix posse alii assèrunt. Nonnulli sagaciores addunt vix possibile esse internam & crassam satis tunicam rumpi posse, externa tenuissima salva manente, nisi fortè internam duriusculam à sanguinis stagnantis acrimonia sensim atque sensim erodi, externa interdum crassiora reddita, & sanguini irruenti extensione sua utpote molliori, amplius spatium concedente, imò utramque tunicam imbibendo serosi humoris plures, quàm ordinariò aliàs solent, particulas extendi, sicque *Aneurisma* quasi aliquod produci posse plures assèrunt. Sanguis in *Aneurismate* remoram ducens vel stagnans in arteria summam sæpè acquirit acrimoniam, quæ erodit internam arteriam tunicam, & hinc excitat tumorem cum pulsu fortiori, quod in arteriis carotidibus in collo ut plurimum accidere solet, & nonnunquam quoque in aliis minoribus. In his enim ratio ejusmodi distensionem vix ac ne vix admittit, cum tunicarum illarum fortis resistentia istam impediatur, nec valvulæ adsint, motus quoque celerior sanguinis, quàm in venis exstet,

quæ omnia impediunt, ne tam citò excitetur *Aneurisma*. Frequentissima *Aneurismatis* causa est sæpè pertusio arteriæ loco venæ. In variis corporis arteriis *Aneurisma* excitari posse testantur Monumenta Medicorum; *Aneurisma* in Aorta observavimus; *Valzusex* disrupta arteria *Aneurisma* observavit, quod quartam Thoracis occupaverat partem.

*Varices*, me judice, ut plurimum *Varicum*; à massæ sanguinæ particulis multis, acidis, terrestrioribus & viscidis stagnantibus, ac vasa venosa ipsorumque valvulas nimis distendentibus oriuntur, ab acidi enim & viscosi nimia quantitate assumpta, sanguis crassus ac ad stagnandum aptus redditur, quare & portio illius ad venam deferri, & moram præsertim circa valvulas aliquis venæ necesse potest, unde membrana venarum vel valvularum à majori sanguinis copia ibidem cumulatà ita distenduntur, ut succi ex arteriis inter membranas illius venæ dispersis egredi, & per membranarum tubulos fluentes liberè transire nequeant, sed stagnare cogantur, sese inter interstitia fibrillarum figant & quidem tanta copia, ut hæc non tantum dilatentur & amplientur, sed ut præterea etiam aditus spiritibus animalibus intercludatur, ex nervulis in tubulos illos prolabantibus, ac venam aliquatenus constringentibus, inque illo motum quandam peristalticum producentibus, ad sanguinis circulationem in vena promovendam, atque sanguis in vena illa stagnans, membranas illius admodum distendens, *Varicis* causa esse potest.

Cur *Varices* frequentissimè in cruribus accidunt, ratio est, quia valvulæ in ramo crurali fortissimæ, imò duplices existunt, quæ sanguini affluenti validè resistunt. Quod verò *Varices* potius in Tibia & inferioribus corporis partibus prodeant, causa & ratio est, quod sanguis venosus ibidem ascendere debet per viam horizonti perpendicularem,



larem, & aliquando hæc via aliquatenus occluditur à ligaculis illis quibus crura contringere soleamus ad retinendas caligas. Sanguis ergo majori, quàm par est, copia cumulatus in venis, quasdam ipsarum venarum membranas distendit magis, quàm alias crassiores, & sic recessus, seu sinus, seu sacculos sibi formant, ac præsertim circa valvulas, in quibus sanguis indole sua jam acidiusculus, majorem adhuc acorem contrahit, quia ibi diutius absque circuitu commoratur.

Dolor si quis oboritur, ratio est, quòd sanguinis particule plures acidiores in carnem vicinam transcant per sinus, & sic fibrillis ibi irritatis & postea planè discissis, dolor in mente oboritur, & si plures fibrillæ discinduntur à particulis istis acidioribus, aliquando ulcera dolorifica & profunda excitantur, hinc etiam sordida redduntur, & quidem ab acri acido humore ac tenui, cui admixtæ sunt particule quasdam viscosiores ac magis ramosæ, quæ ramulis suis sibi mutuo implexæ ac hærentes in superficie ulcerum illa sordida reddunt. Reliqua phænomena ex his principiis faciliè deduci & explicari possunt.

§. 12. *Aneurismata* minora, inque minoribus arteriis & iis non adeò profundè delitescentibus contingentia, imprimis si à dilatatione tantum arteriarum, faciliùs curantur, quàm quæ in majoribus arteriis, & à ruptura orta fuerint, quæ maximo cum periculo conjuncta sunt, ita ut hoc respectu *Bartholinus Cent. 3. Epist. Med. 34.* meritò scripserit: *Daum solo precari, ut huiusmodi casus vel avertat, vel mea cura subtrahat.* Si aperiantur Aneurismata, sanguinis fluxus difficulter sistitur, & partes adjacentes faciliè in Gangrænam abeunt: sic & *Celeberrimus Bartholinus* lethale vidit Aneurisma in Juvene Nobili ex læso fœmore, quia arteria magna crura-

lis rupta fuit, hinc sectio non tanta erat aut possibilis, propter materiz copiam, & inter musculos delitescentis ingentem rupturam, nec ligatura sufficiens erat, quale quid *Hannoviz* in fabro lignario sibi arteriam cruralem ladente observavi, cui quæcunque generosa remedia adhibebantur, ast sinistra-neo effectu, mense enim uno vel altero post istum magna effusa sanguinis copia, *Hydrope* defunctus est. Ex his omnibus apparet, quòd Aneurismata majora sicut difficilioris curationis sunt, ita minora interdum adhuc curam admittant. Antiqua verò, ac quæ ab arteria profundius latente exoriuntur, nec non quæ ex nimis adstringentibus callosa facta sunt, vix sanantur, & membri exstirpationem sæpe expostulant. Externa verò Aneurismata aliquando sunt absque periculo, & ægri diu superstites esse possunt, quoniam tamen periculum est, ut sanguis tandem corruptionem vel gangrænam concipiat, subinde necessum est, ut curentur.

Si Tumor Aneurismatis non adeò magnus, nihil periculi fovet, sed cum eodem vita satis diu protrahi potest, refertque *Senertus L. 5. p. 186.* Mulierem quandam Aneurisma nucis juglandis magnitudine in cubiti flexura ultra triginta annos gestasse.

Si incautè Aneurisma aperiat, non nisi mors expectanda est; unde si Tumor minor exstiterit, melius est incommodum levius tolerare, quàm periculosa curationi se submittere, nihilominus si major, materiaque latens putrescat, gangræna & mors expectanda, quæ pariter metuenda, si sponte sua rumpantur Aneurismata.

In Cive A. VV. Limburgensi rupturam Aneurismatis post febrem salutarem reperimus, sed hoc inter rara numerandum est contingentia.

Utut *Varicus* generati in cruribus

Prognosis  
Aneurismatis  
minorum.

Prognosis  
Varicis.

bus femoribusque nihil periculi inferant, metuendum tamen, ne rumpantur, cum ex earum spontanea apertione plura pejora symptomata, imò mortis periculum oboriri queant, quale subiit illa gravida, cui sinistri pedis varix rumpebatur, quæ confestim exstillante sanguine, maritum vocat, fluxum ut inhiberet, quod cum non posset, subito extincta est, ceu testatur *Observatio 204. Decur. 1. Ann. 3. Eph. German.* quod etiam facili matte contigisset illi, cujus *Observ. 54. Eiusdem Anni* mentionem injicit, ni manus Chirurgi auxilium attulisset. In gravidis Varices quandoque turgescunt à sætu excluso iterum sponte subsidere, & disparent, ceu in conjugē nostrā Charissimā Susanna, nata Syvert, aliquoties observavimus. Varices etiam in ulcera diuturnatranscunt, imò & dolore & inflammatione obesse possunt.

Melancholicis, quibus sanguis est crassus ac acidus, sunt Varices familiares, quibus etiam salutates esse & ab infania eos liberate ait *Hippocrates* S. 6. aph. 21. In seroto varix existens hernia varicosa dicitur, cujus prognosis proprio petatur capite. Gravidis in femore, & cruribus Varices valde molestæ sunt, & quidem ultimis mensibus, post partum verò ritè fluentibus lochiis spontè obliterantur. In non gravidis & sanguineis Varices cum euphoria sæpè rumpuntur. In ulcus verò, ceu dictum, sæpius transcunt diuturnum.

Sectio periculosa est, quin & ruptio quandoque lethalis, quod illa scæmina 7. menses gravida experta est, cujus in *Ephem. German. Ann. 3. p. 380.* mentio fit. Hæmorrhagiam enim lethalem causantur Varices apertæ, quam sæpè excipit ipsa Mors, linea ultima retum: *Paracelsus* enim inquit, cutis in turpissimum scænitissimumque foramen aperitur, quod si cum laterum punctioibus accedat, mortì iudicato morborum

obnoxium esse.

§. 12. In Affectibus canalium sanguiferorum etiam *Dieta* accurata observanda est, & eò dirigenda, ut massa sanguinea ab acidis ac viscidis particulis, quæ causæ antecedentis nomine gaudet, liberetur. In Aere ergo *Ægri* versentur moderatè calido. Cibus sit tenuis, mollis ac facilis, vitentur angue pejus alimenta incrassantia acidaque, quæ multum contribunt ad hos affectus canaliculorum inducendos. Potus sit eodem modo comparatus, conducit præ omnibus calidus potus Theræ vel Caffæ, vel cerevisia tenuis, in assuetis vinum generosum vel Gallicum cum sal. C. C. volatili more solito in mensa assumtum, quo acidum vini corrigi potest. Exercitia mediocria non verò nimia conducunt, à quibus abstinendum. Somnus ac Vigilia pro consuetudine instituantur. Hilaritati dent patientes operam; Alvus & imprimis menses in sexu sequiore respondeant ordinario cursui. Animi pathemata, ut moror, ira, terror, aliaque vehementiora vitentur summopetè, ne sanguinis coagulationi ac stagnationi in vasis sanguiferis ansam demus.

§. 13. *Perlustrato* fonte *Dietetico* nunc ad Pharmaceuticum ac Chirurgicum Nos conferamus, & primò *Galenicorum* de hisce intimis perspiciamus opinionem, qui in curando Aneurismate tutò incedunt, quæ enim Aneurismata in alis & inguinibus ac collo fiunt, itemque in aliis locis, si magnitudine excedunt, ea Chirurgia non tentant, ob magnitudinem vasorum, quæ verò in extremis partibus & artubus, aut in capite consistunt, ea sic aggrediuntur. Si ex apertione arteriæ tumor factus est, sectionem rectam in longitudinem cuti infligit, deinde disparatis per hamulos labiis, velut in vasorum exsectione solent, excoriantes & per apta ad hoc instrumenta à membranis repurgant

*Dieta*

*Galenicum modus curandi Aneurisma.*

tes; arteriam nudant, & acus sub ea transmissione, & per duo fila deligatione usi, ubi prius intermediam arteriæ partem scalpello pungunt, & quod continetur in ea evacuant, superante curatione utuntur, donec deligata filorum vincula excident. Si verò ex arteriæ ruptione dilatatio facta est, totum ipsum quantum ejus fieri potest, una cum cute digitisprehendunt, deinde acum infra apprehensam trajiciunt, quæ duplex filum trahat: & post trajectionem, ipsam duplicis fili ansam dissecant, & sic per duo fila tumorem hac illac deligant, quòd siumor seu metus sit, ne fila delabantur, etiam aliam acum transmittunt, quæ priorem per totum premat, similiterque duplex filum trahat, & ansa dissecta, sic per quatuor fila tumorem deligant. Aut aperto juxta medium tumore, post excretionem ejus, quod in ipsa continetur, cutem amputant, eo quod deligatum est relicto, & splenio vino ac oleo imbuto imposito, curationem per lineamenta perficiunt.

*Varices* Galenici *Varices* curant adipe gallinaceo cum capa trita imposito vel perducto assidue. Ad *Varices* fugandos commendant *Hederæ* radicem quom fuerit Luna in Aquario, alii *hederæ* baccas tres, quæ per parietem repit, pedi in quo sunt *Varices*, alligant vel radicem ejus circumdant. Ad *Varices* qui suffunduntur & claudi non possunt, lanuginem de papyro apponunt, & sic eos claudi dicunt.

*Varices* ne nascantur lacertæ sanguine crura ægri jejuni illinunt: ad *Varices* siccandos sequi utuntur.

*g. Sedi bircini* ʒi.

*Saponis* ʒvi.

*M. & linctolo* illitum medicamen apponunt.

Quibus *Varicibus* etiam mederi balnea aluminosa haud dubitant. His verò aliisque frustra tentatis ad Sectionem *Varicum* accedunt, quam

operationem sequenti modo describunt: Lotum enim hominem, vinculo in superna femoris parte circumdato, ambulare jubent, repletam autem venam atramento scriptorio aut collyrio, secundum situm ipsius, ad trium aut paulò amplius digitorum longitudinem notant, & reclinato extensis cruribus homine, alterum vinculum supra genu circumdant, & elevata in fastigium vena, scalpello in loco, quem notant, secant, non altius quam per cutem, ut ne venam dividant: & labiis sectionis per hamulos distentis & membranis per incurva scalpella ad hereniam aquosam parata excoriatis, nudataque vena, & undiquaque expressa, tumoris vincula solvunt, & elevato per cœcum hamulum vase, acum duplex filum trahentem subjiciunt, sinumque fili dissecant, & divisa in medio vena per venæ sectionis scalpellum, sanguinis quantum opus est evacuant, deinde uno filo superiorem vasis partem constringunt, & crure in directum extento, manuum expressione sanguinem, qui in orure est, evacuant: & postea rursus infernè vas constringunt, aut partem venæ inter vincula interpositam, præfectam auferunt, aut etiam manere permittunt, donec sua sponte una cum vinculis excidat: & linamentis sicis inditis, & splenio vino ac oleo imbuto imposito deligant, ac ductu suppuratorio medicamentorum, quæ linamentis excipiuntur, curant. Plures inter Veteres vinculis non usi sunt, sed statim nudatum vas excindunt, quidam ex profundo extentum ipsum cum violentia extrahunt ac abrumunt.

*ʒ. 14. Paracelsum* in curandis *Aneurismatibus* & *Varicibus* à corrosivis aquis, balneis, purgationibus cavendum esse præcipit, item ab omnibus unctionibus morbillo- rum, à Merc. & Sulphure.

Ad *Varices* tollendos & *Paracelsus* ad sectionem sequenti modo confugit: Aperiantur vena cum

*Paracel-  
si curatio  
Anguris-  
maris &  
Varicum.*

tempore digesto, postmodum liquoribus gingivarum leporum unguendum erit per tres aut quatuor septimanas: unam tantum esse apericiendam venam per vicem monet, & postmodum alteram, non verò ambas simul. Digestum tempus esse ait, ac postea redeunt. In Anno semel si venerint, & venæ semel aperiantur, si bis, & bis juxta ipsum aperiendæ sunt ordine, deinde leporum gingivas, aut pinguedinem humanam superponit.

*Helmontius de Aneurismatibus & Varicibus cura sententia.*  
§. 15. *Helmontius* in curatione *Aneurismatum* ac *Varicum* cum *Racello* ut in pluribus aliis convenit, eandemque approbat.

§. 16. *Villifus* si arteria puncta aut secta fuerit, statim partem læsam strictè ligat, vel plumbi laminam illi imponit. Si hoc non suffecerit, valida applicat parti adstringentia, qualia sunt terra sigillata, terra vitrioli dulcis, bol. armen. sperniol. Croll. &c. cum laudano opiato mixta, iisque Emplastris superimponit laminam plumbeam, & tandem si istis medicamentis curatum non fuerit *Aneurisma*, cum aliis Auctoribus arteriam aperit, illique vitriolacea blandè corrodentia applicat, & deinceps foramen consolidat.

*Varicibus Villifus* medetur punctura acus sanguinem crassiorē evacuo, si tumor grandior fuerit, & postea laminam plumbeam illis applicat. Laudat etiam unguentum *Hartmanni* ex Butyri Majalis par. j. & succi cancr. fluvial. part. ii. simul coctis paratum, quod illinatur interius laminæ *Varicibus* applicandæ. Sequens quoque à *Fernelio* propositum commendat.

*Varices.*  
§. Alum. roch. q. v.  
Coq. cum aceto acerrimo, & spongia eo imbuta parti applicetur mane ac vespere, illique strictissimè alligetur, quod per mensis curriculum continuetur.

*Sylvio.*  
§. 17. *Sylvius* in curandis *Aneurismatibus* ac *Varicibus* varia constringentia approbat medicamenta

unà cum venæ sectione instituta, nec non vincula ac ligamenta varia tum *Aneurismatibus* tum *Varicibus* circumponenda æstimat.

§. 18. *Cartesiani* ad curationem *Aneurismatis* ritè perficiendam, opus esse censent, ut sanguis arteriæ tunice dilatans & in distentionis loco firmiter hærens inde ad aliam arteriæ depellatur regionem, ut fibræ postmodum tunicæ exterioris distentæ quantum par est in situm pristinum reducantur, & sanguis ubique liberum per arteriam reperiat transcursum. Hunc ut attingant scopum, tumorem digitis comprimunt, & emplastrum imponunt exsicicans, & constringens, cui laminam superdant plumbeam ad fortioiorem impetrandam compressionem. Convenire verò ex emplastris hoc in casu dicunt *Diapompholygos*, desiccativum rubrum, ad rupturas, vel quod sequenti modo componitur.

℞. *Scor. ferri* ℥v.  
mum.  
tragacanth.  
Gumm. Arab. aa. ℥iii.  
thur.  
acac. aa. ℥i.  
glutin. vulg. ℥iii.  
gyps. ℥i.  
Resin. Bisi.

Cum succ. consolid. mai. & cera miniat. q. s. F. Cera-  
tum.

Diutius autem hæc emplastra continuanda esse monent, ut opatum præstent effectum, qui si obtineri non possit tandem perspiciatur, sectionem seu deligationem arteriæ instituendam concedunt, modò à perito Chirurgo, & cautè peragatur. Denudari enim ipsam volunt arteriam, ut *Aneurisma* integrè veniat in conspectum, tum arteriam supra & infra tumorem filo quadruplicato sericeo cera abundè obducto artè vinciunt, & *Aneurisma* in medio ligaturarum excindunt, quo facto vulnus balsamo implent *Capayvæ*, & donec

*neurisma-  
tis & Va-  
ricibus.*

*Cartesia-  
norum  
methodus  
curandi  
Aneuris-  
ma.*

donec carne impleatur fortiter deligant. Vulnere ita sanato, vinculum super illo per anni spatium continuo gestari voluit, & post tempus hoc sensim relaxari, donec penitus auferatur.

*Varices* leviores, & recentiores blandius tractant, adhibendo scilicet externa linimenta, emollientia, & resolventia, ex sevo hircino, butyro majali, verbaschino, oleo hyperici, unguento martiato, & similibus, nec non forus & balnea convenientia ex radicibus altheæ, serophulariæ, bryoniæ, herbis agrimoniz, malvæ, foliis, & floribus sambuci, & similibus parata: quibus sanguis spissior ad fluxum restituatur. In gravidis enim fortiori non admittunt, cum partu feliciter peracto, & onere hoc comprimente remoto sanguis liberiori faciliè requiratur per venas transfusus, in aliis verò nec remedia interna sanguinis motum circulare promoventia, nec externa comprimentia, & ligaturas continent, ut ita sanguis è loco pellatur, & dilatata venæ tunica constringatur, quapropter sequens etiam, vel simile quoddam emplastrum haud ineptum fore confidunt.

*R. Tur. 3ß.*

*aloe 3ij.*

*album ovi q. s.*

*M.F. Emplastrum.*

Quando verò sanguis induratus, & in thrombos coagulatus nec dispergi, nec in fluorem ulterius redigi potest, atque in cruribus existens magnum in ipso ingressu excitat dolorem, ipsam etiam aliquando tentant Varicum apertionem, ut sanguis iste crassior compressione sursum, deorsumque facta evacuetur. Sectionis verò huius modum longo jam usu receptum non improbant, peragiturque, dum egro resupino, & cruribus modicè inflexis in scamno collocato crus ad venæ intumescuntiam supra, & infra tumorem fascia ligatur, venaque in conspectu sita atramento notatur, & cure c-

levata sutsumque digitis obducta, sicque juxta lineam annotatam in longum dissecta, denudatur, & à corporibus circumjacentibus explicatur, hinc acus obtusa, ne partes violet, & duplex filum trahens, ipsi subjicitur, ac suprâ transmittitur, quo tanquam habena elevatur. Solutis posthæc cruris ligaturis, vena parte superna artius ligatur, ac infra ligaturam non aliter, ac si phlebotomia sit celebranda, per medium scalpello dividitur, ut sanguinis parte inferna quantitas sufficiens detrahatur, & tum eadem vena parte etiam inferna ligatur, & vinculo constringitur, intermedia verò portio inter ligaturas abscinditur, extremitatibus utrimque in carnem se subducentibus, venæ ligaturæ ad spontaneam usque decedentiam permittuntur, & post triduum vulnus consolidantibus & sarcoticis, promore in aliis vulneribus consueto, ex arte tractatur.

§. 19. Aneurismatis curatio, *meo Nosse ap- paratus ad curandum Aneurisma.* judicio, in eo vertitur, ut fibræ ruptæ, vel dilatata arteriæ cuiusdam læsæ iterum uniantur; si ergo Aneurisma est à pertusione arteriæ loco venæ, mox forti ligatura pars læsa ligetur, vel lamina plumbea, vel placentula *Dn. Myr* imponatur, & fortiter ligata pars læsa firmetur. Sunt etiam quidam, qui in opposito latere ad sanguinem imminuendum *V. S.* inflant.

Sola verò admoctione spleniorum, & fasciarum in cura recentium Aneurismatum felix fuit *Murellus* testante *Zodiaci Med. Gall. Ann. 3. Obs. 1.* Sed, me iudice, cautè ligaturis hisce mercandum est, ne necrosis partis subsequatur, cum strictionibus ligaturis commeatus sanguinis, ac succorum interceptiatur. Adstringentibus tamen, & arcta ligatura malo huic obviandum esse, omnes ferè asserunt tum Medici, tum Chirurgi. Hinc parti affectæ applicare solemus varia ex farina volatili, gypso, bolo armeno, sanguine Draconis, Thure, aloë, succo plantaginis,

ginis, burs. pastor. hypocistid. a. eac. sperniol. Croll. parata remedia, modò in forma pulveris, modò cataplasmatibus imponenda. Emplastra Diachalit. contra rupturam, de arietin. pell. applicata cum firmiore deligatione, modò membri talis sit constitutio, cui ligaturam commodam applicare licet, v. gr. in Collo, ubi digito, vel manu saltem comprimendus tumor, quo ipsius augmentum inhibetur, imò aliquando planè evanescat: aliàs deligationi subijci potest lamina metallica firmiter reprimens, imò si loci conditio fasciarum applicationem haud ferat, ver. gr. prope arteriam asperam, plurimè ejusmodi laminae sibi invicem superimpositæ, plumaceolis instructæ, & vinculis firmate sufficere debent. Si verò Aneurisma à causa externa, ex. gr. à punctura oriatur, & hæmorrhagia sequatur, sanguinis effluxus ante omnia impediendus est, & puncturæ loco applicetur lintecolum duplicatum, cum liquore stiptico nostro imbutum, vel Tinctura sulphuris vitrioli, vel imponatur Colophonium pulverisatum per se, vel cum albumine ovi permixtum, egregium sanè stipticum. Manu adstantis locus fortiter comprimendus est, & in opposito latere pro re nata V. S. instituatur, sed ne quid nimis; interimpulveres adstringentes ac Emplastrata applicentur, superior verò membri pars linteis aqua spermatis ranarum madidis involvatur, ac fasciæ duorum capitum muniatur sæpius circa partem affectum circumvolvenda, atque sic membrum læsum per spatium aliquot dierum relinquatur in situ congruo.

Nec interna cura utroque in casu negligenda est: si enim Aneurisma ab acrimonia interna canaliculos sanguiferos corrodeute ortum habeat, præscribenda sunt omnia absorbentia, ut sunt oculi cancer. corall. Ebut, C. C. s. ign. pp. terr. sigill. crystall. mont. & sexcenta alia, nec negligenda sunt spirituosa

oleosa, ut spir. matricialis oleos. sal. volat. oleos. &c. Si verò jam hæmorrhagia præsens sit, conveniunt Tinctura sulphuris vitrioli, liquor stipticus, Diachord. Tinctura Hamatit. terræ catechu, traumatica, aliæque plura capite de Hæmorrhagia petenda.

Alii volunt ut arteria super Aneurisma digito, aut conveniente ligatura comprimatur, & Lancetola aperiatur, atque sanguis collectus educatur: Vulneri verò & rupturæ arteriæ admoveatur globulus, seu frustulum Vitrioli Cyprii gossypio tenui involutum, & hujus superinspergatur pulvis colophonii, vel sarcocollæ, ac demum applicentur splenia albumine ovi imbuta, vel apponatur lintecum duplicatum liquore stiptico imbutum, hoc modo constringitur, simulque cauterisatur arteria læsa, ita ut sanguinis appulsus eam minimè resolvere valeat, adaptata simul ligatura conveniente. Alii suadent cauterium actuale. Verum enim verò nostro judicio cautè incedendum est cum sectione Arteriæ, imprimis majoris; nuper enim hic in Nobili quodam triste vidi exemplum, cui in Aneurismate à punctura gladii in carpo manus producto nulla remedia, nec etiam generosa à Chirurgis notis applicata, nec Sectio juvamen attulerunt, sanguis enim continuò effluebat, instabatque Gangrena, quare Chirurgi manus amputationem suaserunt, sed carnis curacionem absque amputatione manus more solito promittebat nimis audacter: sed, fodes, quæ audacia est, audere viribus imparia? ausim dicere stultitia: tertio enim die non tantum manus, sed & totius brachii sideratio accessit, quam excepit ipsa mors truculenta. Ego iussu *Serenissimi, ac Potentissimi Principis, Domini, mei Clementissimi*, cadaver unà, cum ac manu brachio siderato aperui, quod verò nihil præter corruptionem, totalem brachii obstructionem, putrefactionemque exhibebat, internis



preter sanguinem sanis apparentibus.

Hinc sectionem nisi cum maxima cautela instituendam esse author sum; Locus quoque aptus esse debet, ut ritè pars ligari, ac comprimì possit.

Arcta ligatùra miraculì instar subinde patentem, hiantemq; constringit arteriam, sed operatio eventum in minoribus tantum præstat; non verò in maioribus, quia tunica crassa, nec facillè fumpuntur, nisi à vehementi causa, nec ruptæ propter perpetuum spirituosum sanguinis affluxum facillè sanantur, & hinc quotidie cretæ scit Aneurisma, facilius quoque in arteriæ tunica dilata, quam rupta prorsus sperata consolidatio succedat.

Curationis *Varicum* nostro modo institutæ cardo in eo vertitur, ut acidum in sanguine delitescens temperetur, & coagulatio sanguinis impediatur, dein vena dilatata, vel rupta tunica constringatur, consolideturque. Ad acidum ergo corrigendum; temperandumque quotidie eger per vices assumat pulveris sequentis, vel similis dosim.

*R. Ocul. cancr. pp.*

*coval. alb. pp.*

*crystall. mont. aa. ʒss.*

*Terr. cathed. gr. v.*

*M. f. pulv. dentur 9. doses.*

qui pulvis in aqu. chevesol. vel alia traumatica exhibeatur. Dein accedendum est ad sudoriferam temperatam, sicut Antimon. Diaphoret. C. C. unicornis, Herbar. terr. catechu; unicornis fossil. &c. Potus quoque calidus Theæ, vel Caffæ eximius existit per longum tempus continuatus, quo solo potu plures vidimus à varicibus liberatos.

Quod externa Topica attinet in *Varicibus*, hic præ aliis conducunt Empli. ex gumin. Ammon. & Galban. divin. de The. de Labdan. &c. *Hartmannus* in Praxi sua unguentum è butyro majali, vel oleo rosaceo cum succo cancerorum maxime laudat, quod profuit cuidam matro-

na à septimo mense cum ejusmodi malo consistenti; Unguentum Dialib. martiat. &c. item placentula à *Ch. D. Muyr* celebrata egregium sæpè præstant effectum. Alii laudibus extollunt adstringentia, quæ tamen sint moderatæ. Balnea ac thermæ hic optimè conducunt.

Quod Sectionem *Varicum* concernit, hanc itidem esse cum cautione instituendam volumus, imprimis in gravidis, & minoribus *Varicibus*, in quibus post partum sponte abeunt, in quem finem ergo dubia instituatùr cura, in maioribus verò sectio institui potest. *Cl. D. Muyr* Varicem cum ulcere conjunctum singulis annis semel & feliciter aperuit, ex eoque libram unam sanguinis eduxit, atque sic effecit, ut ulcera concomitantia postea nunquam iterum disrupta sint.

Inter Chirurgica præsidia, etiam *Dilatationes* veniunt, quæ ulteriorem venarum distentionem, ac dilatationem inhibent; commodum huic scopo erit medicamen ab *A. quapendente* de *Varicum* excisione commendatum, & ad candellæ figuram formatum, quod tractui varicis imponitur, & super hoc arundinis cortex, qui sua cavitate medicamenti convexitati respondeat, hocque comprimat fascia idonea firmandus. Quò si verò *Varices* majores sint, præter Sectionem, aut distentionem nihil auxilii resistat videtur.

## C A P U T XII.

De Venis, Cornibus, & Fungis.

S. I.

Cum succi in Machina nostra hydraulica continuò moveantur, agenturque, & sic ad destinatos impellantur fines per peculiaritatem, & tenuitatem, & crassitiem succorum respondentia vasa etiam minutissimi,

ma, & sepe vitium fugientia, quorum succi acres erodunt vasa, & perforamina profluente varias excitant prominentias, & hypersarcoses, quæ excreſcentiæ carnosæ Medicis ac Chirurgis dicuntur *Verrucæ*, quarum species vulgò quatuor sunt pro ratione radicis, vel sunt nunc *plane*, seu *sessiles*, nunc *penſiles*, vel ex angustio collo capite amplore prominentes. *Penſiles* vocantur *Myrmecia*, posteriores verò *Acrochordones*. Sic quoque & alia species dicitur *Porrus*, quæ exterius quasdam radículas habet instar porrorum, alia vocatur *Thymus*, colorem floris Thymi referens, in summo est latior, quam *Acrochordon*, ad magnitudinem fabæ excreſcens. Sed non video ad quam utilitatem, & necessitatem ejusmodi distinctiones, & imposita nomina inserviant. *Germanis* dicuntur *die Wurzten*.

*Verrucæ* describi possunt, quod sint excreſcentiæ carnosæ ex profluente succo nutritio productæ.

Ad has quoque Excreſcentias carnosas referuntur alie, *Cornua* dicta, in hominibus sæpius observata, prout præter nostram experientiam testantur *Hildan. Cent. 1. Obs. 25. Ephem. German. Ann. 1. Obs. 30. & Clar. Dn. Franci Exerc. de Cornutis, Boneti Med. Septentr. l. 1. Sect. 3. c. 3. &c.* Cornua hæc pro duritiei conditione possunt dividi in *mollia*, & *dura*, qualia cornua duxerunt *Filius*, & *Filia*. Illustris ejusdæm Baronis, in pedum, ac manuum digitorum apicibus, singulis mensibus erumpentia, & dein sponte iterum decidentia, magnitudinemque avellane in quolibet digito non excedentia.

Cornua describi possunt, quod sint prominentie fere osseæ à sale fixiore, ac acido succum nutritium fortius coagulante productæ. *Germanis*, *Hörner*.

Ad classẽ hanc excreſcentiarum pertinent quoque tuberosæ eminentiæ, *Fungi* dicti, quorum meminit *Hipp. l. 2. de Morb. 48. 10. & Hildan. Cent. 1. Obs. 15. &c.* pluresque alii. *Germanicè* dicitur, *ein Schvamm*,

*Gervæhr*. Fungus describitur quod sit excreſcentia mollis, sensim, ac sensim incrementum capiens ex dilatatione, aut laceratione membranatum, & circa has collectis, & evalutis succis, imprimis nutritio, & ut plurimum circa articulos oborta. Hinc *Germ.* dicitur etiam *ein Glied Schvamm*.

§. 2. Subjectum adequatum *Verrucarum* constituimus totum corpus, & potissimum sanguinem, quicquid una cum succo nutritio continuo suo fluxu, ac refluxu minimos machinæ hydraulicæ tubulos alluat, pervadat, erodaturque, non potest non labem suam affricare, & hinc ejusmodi propullulant excreſcentiæ carnosæ, data enim porta quadam liquor iste nutritivus partium liberius promanat, & in excreſcentias ejusmodi abit carnosas, non aliter ac videmus in arboribus junioribus effluentem succum, accedente extrinseco aere acido, instar *Verrucæ* coagulari, ut jam pro ut pars quævis corporis vas, ac tubulis succum nutritium vehentibus, pluribus, & amplioribus, vel angustioribus aptior existat, accedente succo acriori, & corrode, eò excreſcentiæ hæ in majore, vel minore exoriantur copia.

*Cornua* eandem agnoscunt partem affectam, quæ tamen magis pro basi habent os, & membranas. Nos novimus foeminam quandam juvenem adhuc supersistentem tria cornua in capite ac cranium usque pertingentia gestantem, pollicis magnitudinem æquantia. Viri quoque sunt plures cornua gestantes, ad fortum medicum æntiquam spectantia.

*Fungi* ut plurimum circa articulos apparent, & membranis radiculis inhzere solent. In genu sæpe apparent ejusmodi tumores fungosi, & dum hæc scribebam, infans 3. annorum, & juvenis 20. annorum iisdem affecti mihi curandi offeriebantur.

§. 3. Quod *Verrucarum* Diagnosi Diagnos spectat, præsentium *Verrucarum* adducere signa non necessum existi-

stimamus, siquidem omnes per se manifestæ sunt, & sensus nostros incurrunt, videri & palpari possunt. Ratione radice quædam sunt planæ, & profundè radicibus inhaerent cuti; aliæ sunt peniles, & ex angusto collo, capite ampliore prominent: & cum Verrucæ lippis tonsoribusque notæ sint, illas fusiùs describere haud operæ pretium duximus.

*Cornuum.*

*Cornua* quoque facillè ex eorum excrescentia ossæ, & duritie cognoscuntur, duritiem equim præ se ferunt, ac videmus in unguibus nostris, quæ cornua in aliis majora, in aliis minora conspiciuntur. Varias quoque corporis partes occupare solent. Sic *Borellus* cornu tale in facie, ac pede observavit. *Fabricius Obs. Chirurg. Gent. 2. Obs. 257.* Cornua in calcaneo enata vidit. *Thomas Bartholinus* mulierem, & virginem in capite cornutas notavit, in *Hist. Anat. rarior. c. 1. hist. 78. c. 5. hist. 27.* Variant iisdem cornua hæc magnitudine; sic vidimus in femina suprà mentionata cornua ad pollicis magnitudinem extensa, in aliis verò æquant tantum nucem avellanam, vel mosechatam, vel juglandem, pro copia materiz chylosæ evolatæ, & in duritiem hanc per quietem redactæ.

*Fungorum.*

Excrescentiæ fungosæ facillè in visum nostrum incurrunt, & exactu haud difficulter ab aliis dignosci possunt, cum substantiam habeant spongiam, mollem, atque albicantem, & impresso digito nulla remanet fovea, nec egri magnum inde percipiunt dolorem, ut plurimum verò augmentum capiunt, & circa articulos observantur, imprimis circa genu & mollani, seu patellam, hinc genu loco suo sæpè adeò dimovetur, ut extensioni, ac ambulationi obstitit, pedemque ad ambulandum faciat ineptum. Cum tamen & aliæ partes carnosiores non sint ab iis immunes, sed membranis quibuscumque inhaerere queant, & à causa violenta, vel relaxatione, vel casu inducantur; sic etiam à vulnere membranz cranii fun-

gum enatum non ità pridem in Milite observavimus. Alium ex oculo luxuriantem, item alium ex auribus propullulantem novimus. Funguli hi Tumores similes sunt strumis glandularum.

§. 14. Diagnosti deducta, nunc videamus horum affectuum causam. secundum *Verrucas*, seu poros *Galenici* ab humore terrestri, & melancholico oboiriri dicunt, pluresque ipsarum species constituunt, & ipsis vocantur *Myrmecia*, *Acrochordones*, *Condylomata*, *Cristæ*, *Thymi*, *Mariscæ*, &c.

*Cornuo* ac *Fungo Galenici* deducunt à crassissimis humoribus, à calore quasi in cornua adustis, & ejusmodi tumoribus efficientibus.

§. 5. *Paracelsus* observat, vulneribus luxuriantibus sæpius carnem incrementum Fungorum, ac spongiarum instar, quam dum imperiti Chirurgi nunc corrodentibus Medicamentis tollere, nunc sectione auferre conati sunt, Lerneæ hydræ capita repulsi harum, ut sine dolore scribere etiam nequeat miseras, quibus egros affligerunt. Causam harum spongiarum paulò altius repetere vult, atque, Verrucarum quoddam genus esse, quod abscessum subinde majus, ac copiosius prorumpit, & quo sæpius vel abscessum, vel arrosum fuerit, eò luxuriat magis: ex quo genere & Fungos, & spongiæ esse reputat. Etenim hujusmodi Verrucarum radice vulnerata, ipsi consentaneum est Fungos, & spongiæ tales à luxuriante Natura protrudi. Accidit & juxta ipsum illud, sed rariùs, ex cicatricibus jam olim ductis similem carnem ensescit: ut sit, Verrucarum ratione id accidere contendit.

Fungus enim Ipsi dicitur, quidam post vulneris sanationem nascuntur Verrucæ quædam, & ex eis deinceps tumor in quantitatem duarum, trium, aut quatuor librarum excrescens, ac adherens, non secus, ac arbori Fungus: scætet ac foratim nibus scatet.

§. 6. *Helmontius* Verrucas sue carnis Fungos esse asserit, & sæpè

*Helmontii* ex custode prodigo nutrimentum opinio de partis alicujus variè dispergente oboriri asserit.

*causa Ver-  
rucarum,  
& Fungo-  
rum.* Fungorum verò originem accen-

set nutrimenti partium abundantiz, & copiz, ex qua Fungi partium supercrefcunt, dum caro à latice uberiùs affluente nimium humectatur, & in fundum quandam ejusmodi excrefcenstis proferendis apprimè habilem disponitur.

*Villisi* §. 7. *Verrucarum* progeniem tribuit *Villifus* copiofiori succo nutritio, quandam sanguinis portionem admixtam habenti, & in laxiori aliqua parte remorantì. Ille

liquidem partis istius fibras subingreffus, easque aggefione sua extollens, & dilatans, à liquore nerveo adveniente in fibrarum substantiam convertitur. Verrucz verò carnis colorem, sanguinisque subsidium mutantur à valis sanguiferis, quibus fibræ illas constituentes stipatæ erant.

*Corinna.* *Corinna*, opinante *Villiso*, excrefcunt ex humore alibili glutinofiore, qui ad papillas cutaneas devesfus illi adhærefcit, atque in ipsis remoratur, easque continua sua aggefione elevat, ac producit; plures verò contiguz papillæ cutaneæ à liquore nutritio oppletæ sibi invicem adunantur, & una coeunt, succique in iis cæspitantis tenuioribus, atque aquofioribus particulis avolantibus, crassiores in papillis subsistentes ampliùs nec dilutæ, nec in motum actæ, in materiam compactam faciscunt, & iis infarsita papilla in corneam substantiam faciscunt.

*Sylvii* de §. 7. *Sylvius Verrucas* à lymphâ glandulosa acido spiritu abundante produci existimat, ut & *Fungos* ac *Corinna*, ab acido enim spiritu humorem glandulosum spissiore reddi posse, ut in poroscuteos deductus eosdem opplens, ab alio succo affluente propellatur, sicque *Verrucas*, *Fungos*, & *Corinna* producat.

*Cartesii* §. 9. *Cartesiani* ex ramulorum nervorum iæione, vel obstructione *Verrucarum* deducunt originem, e-

xistimantes, ramulo quodam nerveo in cute, vel ab externa violentia, scalptione, erosione, punctura, & similibus, vel internis quibusdam particulis acutis in lymphâ evasata contentis, uti in Scabie, dilacerato, succum ejus inter cutem, & cuticulam effundi, ibidem inspissari, & in excrefcenstiam talem converti, quæ à subsequente liquore continuum capiat nutrimentum, instar furculi ex arbore efflorescentis. Pro majori verò nervi læsi concavitate, & pluribus inde fibrulis dispersis, etiam formam, & magnitudinem Verrucarum disferre dicunt, ut quo plures fibræ expandantur & dispergantur, quæ instar radicularum nutrantur, eo etiam excrefcenstias illas copiofioribus constare videantur in superficie, quasi foliis, ramulis, aut squamulis: si verò fibræ arctiùs congluuantur, radicem & petiolum longiorem, & crassiorem conspectui dari. Huic læsioni ramulorum nervorum animum quoque præbere opinantur attactum urticæ urentis, vel lanuginosæ non minùs quàm spinosæ illius materiz, qua cavitas fructuum cynosbati unà cum arillis resecta conspicitur, oujus cuti adherentes spinulæ ab externo calore agitatæ forius infigantur cuticulæ, ut ad extremitates nervulorum cutem perrepantes pertingant, easdem vellacent, & pruritus excitent, cui cum succedat scalptio, nervulos istos jam distentos facilè dirumpi, & succum eorum profundius referunt, & obstructionem ramulorum istorum nervorum à succo crasso Verrucarum productioni idèò crescunt esse idoneam, quòd liquor continuo effluens, & debitum non reperiens transitum, priorem illum crassum ad extremitates magis propellat, fibras cutaneas altius diducat, & novo, assidueque affluxu obstructionem augens, tuberculum producat, & sustentet, Verrucam exhibens magis rotundam, lævem, & interdum non adeò pendulam, sed sessilem, instar monticuli cujusdam microcosmi superficie credit.

*Cor-*

**CORNUM.** Cornum illorum visibilibus, & tangibilibus, utrumque sexum interdum invadentium, & dedecorantium, non modo in digitis manuum, & pedum una cum unguibus, sed aliis etiam in membris, & quandoque ipsa in fronte procreantium, ortum sumere docent à papillarum cutaneorum sub cute & contextu reticulari easdem obvelante longiore diductione, à succo crassiore eas expandente inducta, & interdum ab externa fortiori, & frequentiori compressione excitata. Fieri enim saepe dicunt, ut lymphæ, & succus coagritus in scabie à liquore acido coagulentur, qui inspissati à novis succis versus papillas illas propellantur, hæc verò fortiter cretæ, & invicem copulatæ contextum etiam reticularem elevent, & ad novum suscipiendum succum expansæ promineant, qui eum assiduò subsequatur, & à particulis angularibus, inter papillas commorantibus in motu impediatur, & ad subitanam redigatur quietem, magna cum tempore ibidem colligi eum asserunt copia, & duram proferre eminentiam. Externa offensione, compressione, vel alia quadam cutis agitatione oppositas istas papillas ad expansionem premi asserunt, ut succos nutritius versus easdem propellatur, unde in calce, aliisque plantæ pedum, vel volæ manuum regionibus ex continuo incessu, vel laboribus durioribus, offensione in fronte cornua excrevant, quod ductus non modo quidam dirumpantur succos suos postmodum effundentes, sed papillæ quadam fortius premantur, & ad succum recipiendum evasunt optè satis disponantur. Ungues etiam non abscessi in corneam abire prominentiam dicunt, quoniam papillæ cutaneæ versus eorum principia ita sint dispositæ, ut succum unguis nutritientem, majore excipiant abundantia.

Liquorem tendinosum, & nervosum succo unguis articulos lubricanti majore, quam par est, copia commissum, & cutem distendentem,

excrevantiam spongiosam, sive *Fungum* producere docent, qui succi propterea commiscuntur, quod ab externa violentia canaliculi eorum dirumpantur, & succi ipsi effundantur, uti saepe in genibus contingit, quando vel percutiuntur lapsu, calcitatione equi, aut similibus rebus violentis, vel frequentiori, & diuturniori in genua procubitu fibræ fortius compressæ, vel distendantur, vel dirumpantur.

§. 10. Difficile esse *causam* *Natum* doctrinam, & intricatam illarum *radicum* investigationem nemo fortean negabit, si consideret, Nunc ex tot *de causa* *Verrucarum* *rum*. *thorum* Principiis non tantum eas erucere contri, sed earum etiam supplere defectum, quas ipsi Auctores ob gravitatem afflicti non explicare vix ausi sunt. Existimamus autem *Verrucas* ideò propullulare, extuberareque, quod à particulis nonnullis acutis, acerbis, scindentibus, ac corrodentibus membranæ erodantur, & à succo per tubulos, & poros profluente, emananteque succo nutritio fibræ relaxatæ magis distendantur, & aliquando prorsus rumpantur, ut extra circumjacentem membranam promineant circa quas protuberantias assiduè manans succus nutritius colligitur, & hyperfarcosin quandam producit. Vasa enim capillaria vel à quacunque causa magis dilatata, vel attrita, corrosaque succum nutritivum chylolum emittunt, data enim porta quadam liquor ille nutritius partium liberius profuit, qui accedente tunc acido vel interno, vel externo coagulante in excrecentias ejusmodi abie extrinsecas. Eodem modo videmus in arboribus junioribus laesæ succum quandam exillare, qui ab accedente acido aeris coagulatus similes excrecentias Verrucosas exhibeat.

Causas remotas ansam Verrucis generandis dare posse, extra omnem dubitationis a'eam ponimus, ad quas res non-naturales vulgo ita dictas referant. Inter quas primas tenet Aer, qui frigidior admissus succos nostros iusto nimis incalescat,

& insensibilem excrementorum transpirationem impedit, sic novi rusticum mille Verrucis per totum corpus dispersis infectum, qui à sola aque frigidiore immersione has se acquisivisse mihi fassus est. Fecunda dein segetis instar est mala victus ratio, omnia enim quæ chylum crassum acidum, ac viscidum, mox talem sanguinem, ac succum nutritium suppeditant, Verrucas producere apta nata sunt, imprimis si accedat acria saluta, ac maria condita, quæ omnia faciliè tubulos erodere valent. De quibus & reliquis omnibus in *Diata* acturi sumus.

Cornu

*Cornua* verò, me iudice, à succo nutritio evasato oriuntur, eujus fluidis particulis sensim exhalantibus, reliquæ ceu mort. ossis, seu cornudutitium, & formam assumunt. A quiete hunc succum ita indurari posse quis negabit? Rarum est, quod scribit *Alex. Renard. L. 1. Hist. part. Corp. hum. c. 14.* vidimus, ait, in *Geta* vulnerato genu sagitta cornu nigrum rupicapre capitis similitudinem (è vulnere) prodidisse, materiamque, quæ in ossis substantiam converti debuisset, in carneam indolem aeris afflatu conversam, rami modo indurescentem.

*Fungi* utplurimum circa articulos oborti ex violenta distensione, dilatatione, ac laceratione membranarum, vel ex laxatione violenta fibrarum tendinosarum producuntur, hincque effluit succus nutritius, & quidem in maxima copia, ex quo caro molliis, laxa, & luxurians squamosa generatur, quæ dicitur fungus, quæ utplurimum post vulnera membranarum emergere solent, quod si accedat accrescentia, & corrosio, fungi exoriuntur Cancerosi. Qui plura desiderat de Fungis his microcosmicis, conferat *Ephem. German. Ann. 9. & 10. obs. 63.*

*Prognosis*  
*Verrucæ*  
*in 79.*

§. 12. *Prognosis* horum affectuum quod concernit, *Verrucæ* pueris solennes sunt, nihilque mali portendunt, in adultioribus nonnun-

quam suspicionem injiciunt Luis Veneræ, imprimis circa partes genitales occurrentes. *Verrucæ* vulgares sanitati non obsunt, sed cuti defædationem, & molestiam inferunt. Sæpè inopinatò protuberant, & inanimadvertenter rursus evanescent, præsertim Acrochordones & Thymi. Myrmecia verò quatenus profundius hærent, & fibris sæpè nerveis implicantur, tendinosisque fibrillis profundius insident, difficilius curantur, quia periculum est, ne tendinibus læsis inflammatio, vel Gangræna inferatur. Acrochordones verò excisi non faciliè relinquunt radículas, ideoque rarissimè repullulant. Thymo autem exciso in carne radícula remanet, ex qua renascitur sæpè *Verruca*. *Verrucæ* quæ conjunctam habent Luem Veneræam, aliumq; morbum Chronicum difficiles sunt curatu, quàm quæ sunt simplices. Sic etiam illæ, quæ apparent in extrema cutis superficie, facilius sanantur, quàm quæ in internis hærent corporis partibus.

Cornuum.

*Cornua*, seu excrescentiæ ossæ omnes difficillimè sunt curatu, imprimis durissimæ, quæ nullum præter sectionem admittunt remedium, quæ sectio itidem plùribus involvitur difficultatibus; molliores excrescentiæ si ad maturitatem pervenerunt, decidunt quidem, sed post mensem iterum repullulant, cetero observavimus in cornibus digitorum.

Fungotinus

*Fungi* sæpè etiam per plures annos afficiunt homines, sed præter incommodum & dolorem, nisi si contingant in articulis, motum, ac sensum premendo, nervos aliquomodo tollunt. Ob stagnationem verò diuturnam succus acrior redditur, qui faciliè tumorem Cancerosum producere potest. Corpus quoque ad tabem disponunt omni succo nutritio in fungo perditio. Aliquando malum hoc lethale est.

§. 13. Quod *Diata* refert, ista *Diata* eò dirigenda, ut succi rite constituti absque ruptione tubulorum circumferantur, in quem finem aer eligatur.

ca.



calidus ac temp ratur . Frigidus  
verò admodum nocet , quoniam  
incrassat succos nostros , transpi-  
rationemque impedit . Alimenta  
sunt facili digestionis , exulenti a-  
cida , acrida , salina , mustiacea , cor-  
roliva , exinde enim succus nutri-  
tius pessimè partibus affertur , &  
sic ruptio tubulorum & evasatio suc-  
ci nutritii facile produci potest . Po-  
tus sit calidus , imprimis potus  
Theæ , vel Caffæ , vel Succolad , vel  
vin . Galic . Hispan . aliudque non  
acidum , vinum enim Rhenanum ,  
Franconicum , imò ipsum sape Mo-  
sellanum , quatenus acido & Tar-  
taro abundant , coagulando suc-  
cos maximè nocent , eligatur po-  
tius cerevisia tenuis ritè defæcata  
& herdis volatilibus ac aromaticis  
maritata .

Vigilia & somnus , item motus  
& quies sint moderata , & modum  
solènnem haud excedant , motus  
enim nimius si mox à pastu sit ,  
chyum crudum & cum impurita-  
tibus per alvum expellendis , per-  
mistum in sanguinem pellit , quies  
verò immodica , ut est vita seden-  
taria , quam experiuntur Sartores ,  
nocet , quibus propterea Scabiez &  
Verruæ , fungosque tumores si-  
miliares sunt . Animus sit hilaris  
nullis passionibus obnoxius . Ani-  
mi enim passionès vehementiores  
ad affectus hos excitandos an-  
sam dare possunt , quæ fulminum in-  
star sanguinem percutiunt , & in-  
ter ea potissimum quæ spiritus fi-  
gunt , debitant eorum ex cerebro  
in partes subjectas emanationem  
sanguinis ac succorum circula-  
tionem impediunt , & per consequens  
sucis crassis ac acidis imprimis  
nutritio plus justo corrigendis an-  
sam præbent , cuiusmodi sunt tri-  
stia , mœror , curæ immodicæ ,  
odium , terror , &c .

§. 14. Jam ad Curam Pharma-  
ceuticam ac Chirurgicam horum  
affectionum accedamus , & primò  
Galenicorum perspiciamus , qui  
Verrucas quasque tollunt per  
elaterium cum sale imposi-  
tum . Imò ad has extuberan-

tias delendas plura excogitavit ve-  
tustas remedia , qualia sunt Thus  
cum aceto , grossi siue cum ace-  
to , farina ac nitro , fici liquor il-  
litus , itemque Tithymali , Smaridis  
caput salsum ustum , arugo cum  
sulphure vivo usta , ocymi folia cum  
atramento sutoriorum idem id . , quod  
destillat à Sarmenis vitis viridibus  
adhuc dum uruntur , ovillum ster-  
cus cum aceto , hirci fel illitum , he-  
liotropii magni semen cum vino im-  
positum , ruta cum nitro & pipere ,  
nitrum cum urina pueri impubis ,  
stercus bovis gregarii cum aceto .  
Galenus , ejus & sequaces , Verrucam  
Formicariam daræ pennæ fistula ,  
quales sunt veterum gallorum & an-  
serum ac aquilarum , circumscari-  
ficandam esse censent , ità , ut ob-  
torqueatur per vim in profundum ,  
& ex fundo Verruca formicaria tol-  
latur : alii verò ex ipsis anea aut  
ferrea fistula idem præstant . Aliis  
placuit eam circum scarificare , &  
& vossilla prehensam , scalpello  
velut clavos excindere . Quod  
Acrochordonem basim angulatum  
habentem & pendetè visam aninet ,  
extentam hanc eminentiam exci-  
dunt , sin minus filo saltem au-  
pilo ipsam deligant , omnes quo-  
que has eminentias plerasque fri-  
gido cautere consumi conten-  
dunt .

Cornua verò ac Tumores Fungo-  
for Galenici per resiccantia Medica-  
menta tollere saragunt , & com-  
mendant diaphryges inspersum , &  
aridis squamam & testacea omnia  
usta , & erinaceos ustos cum toto  
corpore . Hise non juvenibus ad-  
fortiora transeunt , ut sunt Petra-  
Aliz flos , fori , & chrysocolia , &  
chalcitis , & misy : ( usta verò mi-  
nus mordere dicunt , ) aris flos ,  
arugo . Sal ustus fungosas flavi-  
dasque carnes juxta ipsos consumit ,  
& linimenta evulsa ex linteo fistu-  
luta acriore macerata ac resicca-  
ta , indita & applicata duros ac fun-  
gosos tumores consumijunt . Æru-  
ginem autem cum spuma aris ex  
his vehementer operari dicunt . In-  
ter composita laudant Rhodium  
siccum .

fuccum, & Psaron & flavum appellatum, æstimantur ab ipsis pastilli Faustiani triti ac inspersi, & siccum Sole ustum dictum, quod verò recipit calcis vivæ, squamæ æris & mannæ æquales portiones, & ad excrescentias facit, & fungis similia repurgat cum melle, & replet cum aceto.

*Paracelsi  
curatio  
Verrucarum.*

§. 14. *Paracelsus* in Verrucis delendis & abigendis remedio singulari uti solet, nempe Ipsi Polygonaton dicto. Adhæc Tubercula, Verrucas seq. maxime extollit; accipit enim oleum ardens, quo locum affectum singulis diebus quater inungit, hoc auster diei omnia, quæque similia nascuntur in vulneribus.

*Fungi.*

Ad Fungum absumendum accipit solum arsenicale, quo fungum excrescentem ex vulnere abscondit, postmodum sistit sanguinem, & oleo ardente perungit. Consumuntur ait hoc oleo Verrucæ, fungique omnes ac rami vel radices, è quibus nascuntur. Et post consumptionem curat sanare poros emplastro de Mumia. Verum ubi sanguis nimium abunde proflueret, lavat venam retrò. Fungum & refrigerat. Duros tumores, ut sunt Cornua, eodem ferè modo curat.

*Helmontii  
curatio  
Verrucarum.*

§. 15. *Helmontius* inter arcana refert pomum transscissum, cujus pulpa interna sit affricta Verrucis, donec inpeverit, & religatis medicamentis per solum, donec pomum putruerit; tunc enim vidit Verrucas attackas disparuisse. Simul atque enim vita pomii ultima perit, cui Verrucarum impressio fuit conglutinata, perit Verrucarum vita ultima, retrocedendo per mediam.

*Villifii  
cura in  
Verrucis.*

§. 16. *Villifius* Verrucarum curam exorditur decocti ejusdam sudoriferi usu, iisque deinceps inspergendo pulverem ex tutia, lapide medicament. & paulo ære ustis. Commendat etiam ligatum.

*Cornibus.*

Cornua tollere sitagit internis Medicamentis sanguine fluiditatem

conciliando, saliaque acida succum nutriticum coagulancia corrigendo, & eaque foras eliminando; quibus conferre ait Martialia, Coralia præparata, oculos Cancrorum, rasuram eboris, aliaque hujusce farina. Diaphoretica etiam atque Diuretica summæ esse efficaciz hoc in casu asserit: ad juvandam siquidem diaphoresin hoc exhibet Medicamentum.

*Antimon. diaphoret. Zii.*

*eboris ust. Diiti.*

*Sal. volat. C. C. Di.*

*M. f. Pulv. dos. 3 ss. ter aut saepius in die.* Diuresin verò excitat sequentibus Medicamentis.

*Tinctur. Salsartari Zi. ad Zi ss. aq. raphan. compos. 3 i ss.*

*M. decur in haustu liquoris postetici cum rad. & sem. bardan. incoctis.*

Vel:

*Milleped. præp. Zii.*

*Flor. sal. armoniaci*

*Nuc. Mych. pulv. aa. 3 ss.*

*Terebinth. Venet. q. s.*

*F. Pilul. sumat æger bis in die iv.*

Quod ad externa Medicamenta in Cornubus & Fungis tollendis attinet, emollientibus illa fovet, & sequens, vel simile adhibet:

*Rad. alth. 3 i.*

*Fol. malv.*

*paritar.*

*branc. urs.*

*Violar. aa. M ss.*

*Flor. chamomel.*

*multot. aa. P ss.*

*Sem. sanigræc. 3 ii.*

*F. decoct. in aqua communi, quo foveatur pars affecta.*

Vel herbas has in forma Cataplasmatis applicat. Si istis non satis relaxentur papillæ cutaneæ opietæ, nec materia indurata illas obstruens non emolliatur, Medicamentis cathartecis, jam superius de Verrucis explanatis radices Cornuæ ac Fungor. erodit, illaque hoc pacto destruit.

§. 17. *Sylvius* in curandis Verrucis, Cornubus ac Fungis ad acidum, tanquam omnis mali hinc in

*Sylvianæ  
cura in  
Verrucis,  
Cornubus  
& Fungis.*

affectibus causam præsertim respicit, ut illud dometur, & excreſcentiæ hæc superflua consumantur, quod cauteriis tum actualibus, tum potentialibus ex lixiviosis concinnatis atque Medicamentis Mercurialibus optimè obtineri posse haud dubitat. Verrucas ac reliquas excreſcentias exliccari vult, quo omni succo privati flaccescant ac decidant, imprimis verò constrictione filii & attractu linteoli spiritu tartaris vel alius acidi humectati.

*Cartesiani-  
netum cu-  
ra in Ver-  
rucis.*

§. 18. *Cartesiani* destructioni *Verrucarum* omni opera incumbunt, adhibendo tuberculis hisce ea remedia, quæ radices eorum erodant, vel poros ocludant, ne per eosdem capiant incrementum, sed omni succo destituta flaveſcant & decidant. Approbant itaque succum chelidonii majoris, quo *Verrucæ* frequenter attingendæ sunt, nec non aquam calcis vivæ, vel aquam fortem, præsertim sequentia remedia à D. D. *Vigelfangio* utilissimè adhibita, quibus varii generis *Verrucæ* abactæ fuerunt.

*℞. Decoct. pisor. 3 iiii.*

*Dissolv. in eo*

*Armoniaci 3i β.*

*add.*

*Pulv. santal. rubr. 3i.*

*M. & probæ agentur, abluanturque Verrucæ aliquoties in die tepide. Post ablutionem hanc*

*℞. Aq. Stygiæ commun. 3i.*

*Armoniaci 3ii.*

Stent per horam unam vel alteram in vitro indig stione arenæ calidæ, donec intimè uniantur. Hoc liquore imbuatur stylus ligneus, quo postmodum *Verrucæ* prius fricatæ vel digitis compressæ tangantur. Spiritum quoque nitri, vitrioli, sulphuris interdum adhibent, vel sequens linimentum.

*℞. farin. lupinor. 3i.*

*Stercor. caprin.*

*ciner. fraxin. aa. 3β.*

*Accet. fort. q. s. ut f.*

*Linimentum* *Verrucis* imponendum, locis vicinis emplastro defensivo prius munitis, per cuius foramen quaquæ *Verruca* promineat. Inter-

dum emplastrum aliquod imponunt *Verrucis* emolliens & discutiens, ut nutrimento ita dissipato absumentur, qualia sunt de Ammoniaco & galbanò, imprimis si quidpiam salis armoniaci iisdem sit immixtum. *Acrochordones* & *Thymos*, sive *Verrucas* pensiles filo constringunt, ut sic constrictionis succo nutritio transitus denegetur, & *Verrucæ* alimento suo private exliccentur & decidant. *Myrmecias* sive *Verrucas* sessiles subtilioribus quibusdam illinunt spiritibus facile penetrantibus, poros aperientibus & succo spissiore matentuantibus & resolyentibus, quale sequens exillit.

*℞. Essent. Verrucar. 3ii. β.*

*Sabin. 3i.*

*Sal. armoniaci 3i β.*

*M. & Verrucæ* calidiusculè illinantur. Post illinitionem, & quando essentia hæc debite intra poros *Verrucæ* penetravit, emplastrum superimponunt emolliens, præsertim verò de Ammoniaco, aut diachylon cum gummis. Nihil verò recensitis hætenus remediis juvantibus, ad butyrum accedunt antimoni, & eoque, partibus vicinis prius imposito defensivo. *Verrucas* attingunt, quas funditus tum extirpatum iri promittunt. Corpore quoque variis in locis excreſcentiis hisce referto, interna simul remedia in subsidium vocant, præsertim ea, quæ succos ineraſſatos resolvere, poros aperire, & per eosdem eliminare possunt, quod alias *Verrucis* cedere solet in nutrimentum, quo prædicato è reliquis florere censent sudorifera, sive in decocti, sive in alia hæc exhibebantur forma, in pulveris tamen forma aliis hic prestare credunt bezoardicum martiale, flores armoniaci, tartari, antimoni, & similia in aqua scabiosæ exhibita.

*Cornua* ossæam basin habentia, qualia in capite & fronte quandoque emergunt, difficulter admodum & vix absque periculo vitæ, nedum sine doloribus, auferri possent, cum ferra sint detrun-

can.

canda, & remedia alia, siue interna, siue externa, in his nihil possint prestare iuvenis, duriora enim norunt, quam ut emolliantur aut resolvi queant, & firmius cranio implantata, quam ut absque partis, eui inherent, lésione & majori damno evellantur, proinde huic modo nullum aptare solent cuneum, ne operam & oleum perdant. Minoribus autem & cutancis Medicam interdum adhibent manum, detrahendo iisdem alimentum, nempe succos crassiores, quibus nutritius refectus est, remediis purgantibus hoc in casu convenientibus existimatis, & in forma infusi ad tempus aliquod exhibitis, qualia parantur ex foliis sennæ, turpetho, polypodio, agarico, additis aliis quibusdam simplicibus sanguinis purificationi aliàs destinatis. His subjungunt sudorifera aliquoties repetenda, ut in papillis cutaneis hærens succus in alimoniam Cornuum cessurus attenuetur, ac resolutus per apertos poros evaporetur, & cornua nutrimento suo privata post rarefactas radices decidunt, quo nomine decocta lignorum Guajaci, sassafras, colubrini, Juniperini, fraxini, radicum farsaparille, chinæ, contrayervæ, peucedani, herbarum ceterach, chamædrios, scabiosæ, foliorum rorismarini, sambuci, melissæ, nec non flores mercurii argenteos, bezoardicum solare, & Tincturam ex floribus reguli antimonii valde deprædicant. Externæ thermas commendant sulphureas & aluminosas, quibus non modo duriores eminentiæ circa radices emolliantur, sed pori etiam cum papillis cutaneis constriunguntur & succi superflui absorbuntur, ut excrescentiæ hæc alimonia defraudata decidunt. Ablatis verò Cornubus si papillæ istæ prolongatæ & tumentes medullæ istar extra cutem prospiciant, iis pulverem inspergunt ex alumineusto, testis ostrearum vel concharum calcinatis, calce viva cum saccharo mixta, corticibus granatorum, aristolochia, vel unguentum Ægyptiacum super

igne inspissatum imponunt, & circumligato vinculo per tempus aliquod relinquunt, donec pori ita sint transmutati ut liquorem tanta non admittant copia. Molliora proximè radices filo duplicato forti & cera obdusta firmiter constringunt, usque dum obdenegatum alimentum similiter exsiccatæ & arida delabantur. Minoribus & non ita prominentibus butyrum illinunt antimonii, quo erosa non minus ut Verrucæ perire aut decidere affiantur.

*Fungoso tumori circa articulos* In Fungis, & imprimis genu existenti, atque ex lapsu aut contusione originem ducenti foris conveniunt iudicant discutientes ex salvia, betonica, agrimonia, rorismarino, floribus hyperici, chamomillæ, baccai lauri, semine cumini, nec non epithemata calida ex aqua calcisvivæ, spiritu Juniperi, lumbicorum, essentia rorismarini, spiritu salis armoniaci, & similibus, quibus præmissis emplastrum imponunt deranis cum cuprio, nervinum, vel de gummi ammoniaco. Interna sudorifera non contemnendam hic operam asserere possunt existimant, præprimis ex salibus constantia volatilibus. Aliis autem fungosis excrescentiis in vulneribus nonnunquam conspicuis inspergunt pulveres exsiccentes & absorbentes extradice iros Florent. aristol. rotund. corticibus granatorum, alumineusto, colchotare vitrioli, cuprio præcipitato, vel aqua abluunt mercuriali. In fungis huiusmodi capitis & cerebri vulneribus supervenientibus cautos esse volunt Chirurgos, ne fortioribus corrosivis majora mala, aut ipsametiam mortem accerant.

§. 19. Nostra Verrucarum curatio in eo consistit, ut succi nutritii effluxus ac subsequens coagulatio impediatur, quod verò obtineri potest, si particulæ acres ac corrosivæ in succo nutritio hospitantes obtundantur ac eliminantur, in quem finem omnia conducunt sanguinem purificantia di-

Nostra  
methodum  
curandi  
Verrucas.

Ita Medicamenta, præprimis sequens vinum medicatum commendamus:

*℞. Rad. enul. ℥iij.  
caryophyll. ℥ii.  
pentaphyll.  
petasit. aa. ℥ij.  
Herb. fumar.  
Herb. scabior.  
capill. Vener.  
agrimon.  
heder. terr.  
salv. aa. M℥.  
℞. lign. Iuniper. ℥ij.  
columbrin. ℥ii.  
℞. sambus. Pi.  
anthos. P℥.  
Sem. anis. ℥ii.  
Sal. Tart. ℥ij.*

F. Species pro mensura vini.

Varia etiam absorbentia acidum infringentia & sudorifera partes has per tubulos eliminantia interponi possunt, quæ sunt Animon. diaphoret. Bezoart. minerale Martiale, Joviale; item cinnabar. nativ. Animonij, Decoct. lignor. potus Theæ vel Caffæ, Essent. fumar. Tinct. Animonij tarrârisæ, quæ hic egregia est, Essent. Viperarum & sexcenta alia, quorum mentio capite de Scabia facta est. Hic etiam Mercurialis maxime sæpe necessaria sunt. Cum verò cura Verrucarum solis externis peragi soleat, eapropter interitis recensendis diutius inharere non placet, sed ad Externa transeamus, totius enim eutæ cardo in eo vertitur, ut Verrucæ demto succo nutritio exsiccantur & exstirpentur, seu absumantur, quod obtemus per acidum absorbentia & spirituosâ, ut spir. vin. Camph. Spir. Sal. Armoniac. cum Calc. viv. paratus, Aq. Calc. viv. vel ipsa Calc. viv. Verrucis applicetur, & superimponatur sones accensus, vel solvatur Sal. Arm. in Aqu. pluviatili, qua mixtura imbuantur lintea duplicata & sic apponatur Verrucis. Alcalia omnia & Tartar. condueunt, hinc Ol. Tart. per deliquium paratum non inconueniens erit remedium externè illud, item seq.

*℞. Vngu. alb. Camphor. ℥i.*

*ol. tart. ℥iij.  
cal. viv. ℥i.*

M.

Spiritus lumbriç. Matricar. spir. olivani, Elixir vitæ non contemnendi usus sunt in extirpandis Verrucis. Nec negligenda sunt specifica, ut sunt succus chelidon. maj. succus Esulæ, Limaces rubri, quibus fricentur Verrucæ, & hoc remedium in vulgus abiit, nostra verò experientia sæpe fallit. Inter specifica etiam referunt sanguinem columbinum externè applicatum, itera disparete dicuntur Verrucæ, si latentur liquore illo falso, qui in doliolis butyri saliti reperitur. Alii Verrucas cum frustulo lardi fricant, nonnulli cum Pisis, plures cum pomo Borsdorfiano in medium discisso, ad mentem Helmontii, quidam cum floribus Calendulæ, Celeberrimus Wedelius cas manu mortua tangi vult.

Emplastra etiam sæpe his in monticulis satisfaciunt, ut sunt de galban. *Adys.* oppodeltoch, de Thea, vel Empl. ex cera cum tantillo mercurij vel Vigonis cum quadroplo mercurij. Sequens magnificat *D. d. Guldenklees.*

*℞. Gum. Galban. ℥i.  
sal. armoniaci ℥i.  
picis naval. ℥ij.*

*Empl. diachyl. magn. ℥iij.*

Mf. Empl.

Alii emplastrum ex resina, cera, de Tacamahac. auripigment. paratum commendant. Ungu. saturni Camphor. maxime confert. Sæpe etiam exerescentiæ istæ Verrucosæ abiguntur instituta fortiori frictione cum stramine madido. Sic etiam radice chelidonij fricentur hæc tubercula usque sanguis stillat, hinc aliquando arefescunt deciduntque. Sed sæpe his non satisfaciuntibus ad fortiora accedendum est remedia, cui intentioni satisfaciunt ruptoria ex alcalibus parata, in quem finem impohendi sunt cineres olavellati, imprimis fraxini; item omnia ex sapone concinnata ruptoria laudant plures. Imò necessitate efflagitante ad corro-

siva transcendum est, ut sunt ergo, alumen, precipitatum rubrum, Antimonium crudum, spirit. vitrioli, sulphur. sal. nitr. acer. Ad ipsam Aqu. fort. nonnulli audaciter nimis accedunt, item oleo Antimonii vel Butyro Antimonii prominentias has tangunt, & sic eas profligant, caute tamen hisce incedendum esse suadeo, ne fibrillis nervis ac tendinosis applicentur, alias præter dolorem immanem, inflammationem & gangrenam parti affectæ accersere possunt, magis mihi aridet linimentum *Timei à Guldenkle* sequens.

R. Mell. ros. ʒi.

Spir. vitrioli ʒʒ.

M.

Vel:

R. Rad. Dracunc.

ari

cyclam.

irid. aa. ʒiii.

Fol. sabin. ʒʒ.

sem. heliotrop. ʒ ii.

Sal. armon. ʒi.

oxymel. squill. q. s.

M. F. Unguentum, quo illinantur tumores hi Verruposi, ol. Juniperi, de laterib. Sabine, spic. illinantur sæpius, dein abluantur aqu. sinigmati. Sunt, qui protuberantiis his ausu nimis temerario insigunt aculeum, dein caput aculei ad flammam candele admovent, ut subeandeat, quo modo Verrucas urunt, quæ dein decidunt, remanente solum parva excoiatione. Sunt etiam, qui crudeliter ferrum arripiunt, easque excindunt.

Nostro judicio Verrucæ citò, tutò ac jucundè curantur per Antibrochismum, dum filo sericeo vel pilo equino sensim ac sensim constringuntur ut ardeant ac decidunt, locus verò atramento vel alio Vitriolico inungatur aliquoties, quo modo omnes ferè tollimus Verrucas.

Alii curam nescio quam Sympatheticam præstant, & solo contactu istas excrescentias abigi scribunt. Ex. gr. ( prout testatur *Timeus à Guldenkle*, ) si internodia straminis

secalini vel alterius frumenti singulis Verrucis fortiter imprimantur, postmodum defodiantur in terram sub testi alicujus stillicidio, putrescentibus internodiis, sensim contabescunt Verrucæ, quæ tandem emoriuntur ac disparent. Imò quot Authores, tot remedia Empirica, quæ verò vix satisfaciunt: in Juniorum saltem gratiam unum & alterum apponamus.

*Panarolus* Myrmecias tangi vult sudore illo, qui emanat ex lignis quibuslibet, dum uruntur, semel vel bis de die tangendo.

*Franciscus Peccettus* serpentis exuvium tritum cum carne caricarum, rejectis granis, in formam Emplastri redactum vult, quod Verrucis imponatur.

*Sebizius* commendat pedes gallinæ, si sub prunis ponantur, donec excoientur, corio ab ossibus separato fricentur calidè ter aut quater de die Verrucæ.

*Sennartus* inquit, tolluntur Verrucæ, si cum nigella & urina fricentur sæpius, item si laventur cum liquore ex floribus Verbasce collecto, & cum floribus Verrucis apposito. Item decoctum ex Sinapi, sulphure & sale paratum commendat. Item si folia sabinæ in vino macerata imponantur Verrucosis eminentiis. Laudat etiam aqu. ex famentis vitium dum uruntur exudantem. Alii scyllam viridem, vel succum scyllæ impositum laudibus efferrunt. Alii sanguinem teporis, item succum portulacæ commendant, sed quis omnia sæpè anilia recensere?

Quod Curam Cornuum attinet, hæc eò dirigenda est, ut materia ista condensata, & in duriciem adacta tophacea vel emollitur, vel incidatur, vel planè auferatur, quem finem aquè perinternæ, quàm per externæ obtinere debemus, varia ergo incidentia & sanguinis purificantia, & decocta sudorifica conducent, aliaque diaphoretica, quandoque etiam diuretica, cornua enim debent curari ut Vires Venereæ, quia sunt inflat tophorum Venerearum, hinc cornubus

CURATIO  
CORNUM.

evet-



# CAP. XIII. DE VERRUCIS, CORNIBVS, &c. 239

euerrucandis commoda asserimus mercurialia aliaque, quæ primas eluunt vias. In ejusmodi tuberculis cornutis manuum & digitorum sequens præscripsit Celeberrimus D. Schleitermaeher, Archiater Darmstadinus.

℞. Rad. enul.  
cicher.  
cort. tamarisc. aa. ʒiβ.  
herb. beton.  
eter acb.  
fumar.

veronic. aa. Pi.  
folsenn. el. & mund. ʒiii.  
rhabarb. opt. ʒi.  
agoric. alb. ʒii.  
sem. cartham. ʒii.  
cinamom.

ʒxib. aa. gr. xv.

Incis. D. pro mulla vel vino.

℞. Tinct. antimonii tartarif. ʒii.

Spir. C. C. essentif. ʒi.

M. S. Mixtur.

℞. Conserv. borrag.

rad. enul. aa. ʒβ.

pulv. viperar. ʒβ.

Corellar. rubr. ppt.

Matr. perl. pp. aa. ʒβ.

Syr. condit. cort. citr. q. s.

M. f. Eleſt.

℞. Empl. decicut. ʒi.

Gumm. sagapen. ʒii.

Mercur. dulc. ʒβ.

ol. rute q. s.

M. F. Empl.

℞. Ol. rute coct. ʒβ.

pro inungendis cornibus. Certum est, purgantia mercurialia & sudorifera Antimoniatâ egregiam sæpe præstare operam. Sequens præderit.

℞. Confalt. Hamech. ʒiii.

Mercur. dulc. gr. xv.

M. pro una vice.

Dein exhibantur sudorifera & simul specifica, ut sunt Essent. lignor. spir. matric. cum gumm. Guajac. Tinct. antimoni. Tinct. viperar. pulv. viperar. &c. Sunt formulæ.

℞. Aqu. fumar.

signor. aa. ʒβ.

R. antimon. tart. ʒi.

essent. viper. ʒf.

spir. matric. ʒi.

Sal. Guaiac. ʒβ.

Syr. scord. f. ʒβ.

M. detur bis vel ter in septimana.

Vel:

℞. Pulv. Anglic. nostr. ʒi.

D.

Vels:

℞. Pulv. viperar. ʒii.

Mercur. dul. ʒi.

ocul. cancr. ppt. ʒi.

Sal. Sassafras ʒiβ.

c. roob. sambuc. q. s.

F. Condit.

Diuretica etiam hic maximi usus sunt, ut succi acres scindentes & tubulos effringentes per urinam eliminantur, in quem finem commendamus præ aliis Tincturam nostram Diureticam, aliaque alibi ad nauseam dicta.

Quibus internis simul jungenda sunt Topica Medicamenta, ut Cornua hæc emolliantur, & dein post emolitionem poros mutantia & paululum constringentia applicanda sunt remedia, ut succus nutritius exstillare amplius nequeat. Inter emollientia commendamus varia Cataplasmata, Epithemata, Emplastrâ, balnea & id. genus alia ex chamomill. melior. herb. & radic. emoll. sem. sænigræ. lini, cumin. &c. parata Empl. de Labdano, de Thea; &c. Dein poros immutantia & incidentia fortiterque resolventia applicanda sunt, inter quæ laudamus Empl. Vigon. cum quadruplo mercurii, vel sequens:

℞. Gumm. Galban. & spir. vin. in so-

lut. & thron in spissat ʒi. lb.

Sal. gemina ʒi.

gumm. arbor. ʒβ.

cera.

resin. aa. q. s.

M. F. Emplastrum.

Emplastrum nostrum Mercuriale, quod paratur cum Sale Mercurii, egregium est per temporis spatium impositum. Tanquam specificum in Cornubus commendamus succum ex hedera arborea trunco reciso exstillantem, & tuberculis cornutis illitum. Sunt, qui cines ramorum vitis laudant applicatos, alii ex stercore ovino vel

caprillo, cum lacte & caricis parant Cataplasma tepide Cornubus imponendum. Alii aciculis pun-  
gunt Cornua, & sic ea disparere pu-  
tant. Sequens proficuum erit sapius  
applicatum.

*R. Mercur. dulc. 3 ii.*

*Virid. aris 3 i β.*

*mel. rosar. 3 β.*

*M. f. linimentum, quo ter  
vel quater calidè Cornua illinan-  
tur, dein abluantur sequenti vel  
simili spiritu.*

*R. Spir. Vin. Camph. 3 i.*

*Sal. armon. cal. viv. par. 3 i.*

*M.*

Cum spir. matricali, Elixir vite,  
spir. lumbricor. balsamo Nervino  
sapissimè fricanda sunt Cornua.  
Sunt qui sectionem fadunt, sed  
quàm ut plurimum hæc Cornua ossi-  
bus infideant, & per consequens  
periosio aliisque membranis ac ten-  
dinibus adhareant, maxima cau-  
tione utendum est, & perito Ope-  
ratori committatur hæc operatio.  
Nonnulli fortissimis corrosivis Cor-  
nua aggrediuntur, eaque tangunt  
oleo antimonii, & sæpè usque ad  
os perveniunt, dein iterum more  
consueto vulnus sanant, sed etiam  
hæc periculum involvunt, ne fi-  
brillis omnibus corrosis, vel sen-  
sus, vel motus membri pereat, vel  
gangræna sequatur partis.

*Fungi curatio difficilis est, eò  
enim strenuè incutendum est, ut  
obstructiones referentur, & evasio  
succei nutritii ante omnia impe-  
diatur, quod obtinere possumus, si  
particulæ acres scindentes ac corro-  
dentes è succo nutritio eliminan-  
tur, in quem finem conducunt in-  
terna sudorifera, & pro renata in-  
terna laxantia Mercurialia, aliaque,  
quæ supra in Cornubus recensui-  
mus, chylus enim purificetur. se-  
quenti vel simili nodulo:*

*R. Rad. scabior.*

*enul. aa. 3 β.*

*sarsaparill. 3 iiii.*

*Herb. scordii.*

*fumar.*

*nummular.*

*veronic.*

*scolopendr.*

*ceterach. aa. M β.*

*Flor. sambuc. Pii.*

*hyperic. Pi.*

*Raf. santal. citr. 3 vi.*

*fassafras. 3 β.*

*guaiac. 3 ii.*

*cort. aiisd. 3 iiii.*

*Vitriol. mart. 3 ii.*

*Sal. Tartar. 3 i β.*

*sem. dauci 3 β.*

*M. pro mensura 15 vini.*

Dein exhibeantur Tinct. Antimo-  
nii Tartari, essent. viperar. essent.  
lignor. aliaque superius jam dicta.  
Chalybeata hic egregia sunt nodo-  
lo includenda, & potui ordinario  
indenda.

Cura Fungorum præsertim exter-  
nis Topicis peragitur. Therma hic  
præ aliis conducunt, in quem finem  
facilè Thermae artificiales pa-  
rari possunt. Sæpè etiam ad Fer-  
rum accedendum, & exciendendum  
est Fungus in casu, ubi inclinatur  
ad Cancrum, & cum hoc sit peri-  
culosum, pro partis affectæ ratio-  
ne pulveribus acidum temperanti-  
bus incrementum ejus, quantum  
possibile, impediendum, in quem  
scopum conducunt omnes pulveres  
ex Sale Saturni, Camphora, Calce  
viva, Tutia, Lapide Calaminari,  
Myrrha, succino, Thure C. C. ust.  
parati: spongiosis his tumoribus  
item inspergi possunt Vitriolum,  
O ustum, vel pulv. ex aristoloch.  
rot. calam. arom. caryoph. concin-  
natus: Applicentur etiam spiritus  
Matricalis, olivani, cum calce vi-  
va, imò instituuntur varia suffu-  
migia ex succino, herb. sabin. oli-  
ban. mastiche, &c. vel ex herbis  
sale volatili gaudentibus parentur  
fotns, Cataplasmata & calidè fun-  
gosis imponantur tumoribus. Nec  
negligenda sunt Emplastra optimè  
resolventia, ut sunt Emplast. de  
Thea, divin. de Labdano, de ran-  
cum Mercur. & Virriol. alb. parat.  
vel Cataplasma egregium ex mucu-  
mere asinino, Limac. rubr. coct. in  
vin. Gall. add. pulv. rad. Jalapp.  
& Bryon. f. q. Empl. de cicuta &  
de Cumino itidem conducunt.

Fre-

Frequenter tumores his non deligandi, nec quod Chirurgis notandum, aperienda sunt, hinc etiam à cauteriis abstinendum est, quare ab ejusmodi tumore improvidè aperto mors secuta est, uti patet *Obs. 63. Eph. Germ. An. 9. & 10.* in quibus etiam legere est, quod sæpe exco-riati cultro vel digito, vel ungue auferantur hi tumores & fungi Microscopici.

dictæ, quæ omnia Cutis politum ebur deturpant, temporum gravitatem deiciunt, & fastum, qui pulchre hinc parti inest, exuunt. Cuiusmodi ergo maculatam in pristinum nitorem præsentibus his paginis restituendam libido est.

*Nigredo cutis* est affectus quo Cutis alba & florida, in subnigrum seu fuscum commutatur colorem, ex Cute hispida omnimodaque asperitate donata, obortus.

*Furfures*, seu *Furfuratio*, vel *Porrigio*, est Scabies sicca seu Furfuracea Cutis, ejus imprimis, quæ capitis est, pueris familiaris, & salinis & asperis succis producta. Nomen habent à furturibus tritici, *Kleyen*.

*Lentigo*, Græcis *οκλή*, aliis *Lenticula*, est affectus cutaneus, imprimis faciei, vel sunt Cutis maculæ modò ex flavo rubescentes, modò coloris fuscæ Lentibus colore & magnitudine similes, quibus in utroque sexu, in sequiore verò magis conspicuis facies, manus, brachia & pectus, ceu aeri & solis radiis expositæ partes conspurguntur, sine dolore & molestia productæ à particulis acido fuliginosis in tubulis subtilissimis cutaneis obcoagulationem subsistentibus. Hinc à Solis radiis maculas has cognominant solares, Germanis *Sonnenflecken*.

Cum affectu prædicto sæpe ad mentem quorundam coincidiit *Ephelis*, quas maculas *Blankardus* nominat *Sommersflecken*. Sed *Ephelis* derivatur à Græco verbo *εφελειν*, h. e. asperdo & nigruis in facie. hinc alii gravidis familiares esse has maculas existimant, quæ majores sunt & post partum spontè evanescent, quæ etiam sæpe virgines infestant circa os & labia, sed cessante mensium fluxu iterum evanescent. Sunt etiam maculæ à Sole provocatæ, quos Græci *κνιδες* vocant ex *Critone*.

*Pannus* notans maculam vel naevum in Cute sive ex lue Gallica, sive ex alio morbo maligno dependentem, est macula grandior

## CAPUT XIV.

De Cutis Nigredine, *Furfuribus*, *Lentiginibus*, *Ephelidibus*, *Pannulo*, *Nævi materni*, *Maculis infantum Volaticis*, & *Maculis Hepaticis*.

## §. I.

**P**ulchritudinis amans homo est, imprimis sexus sequior, qui potius mori amat, quàm deformis vivere. Est enim elogio *Isidori Pelusiota*, quod flos nunc splendidus, cras in nihilum redigitur, & quod hodie ignis est, cras in cinerem commutabitur, attamen natus decôr, qui partium proportionem, & colore homini præ reliquis obigit, sui conservatione gaudet, quis enim non se ipsum abhorreat, non dicam scabiosus, leprosus, Elephantiacus, sed vel minima deformitatis macula deturpatus. Quis Nævis defædatam faciem publico exponere sine pudore sustinet, ubi *sanctæ* faciei *sanctæ* in nigrum plumbeum colorem mutatum, vel pluribus maculis interspersis contaminatum est. Tegere licet partes alias, speculum verò corporis, faciem existimo, apertum esse debet. Nec sæpe tegere licet manus, brachium, colulum, &c. quæ sæpe morborum & succorum in corpore peccantium indices & vitia, ut Cutis *Nigredo*, *Furfuratio*, *Lentigines*, *Ephelides*, *Nævi Materni* & *Macula variae* tum *Volaticæ* tum *Hepaticæ*

*Nigredo*,*Furfures*,  
*Furfuratio*,  
*Porrigio*.*Lentigo*,*Ephelis*,*Pannus*,

palmarum interdum magnitudinis, coloris subflavi, vel rubicundi, vel fusci, vel subnigri in facie sæpius proveniens; & sexum sequiorem deformans. *Germani dicuntur die Honigflecken, Sonnenbrand.*

*Navi materni.* Affines sunt his maculis etiam *Navi materni* connati, aliis Maculae originales, vel Notæ infantum à Matre gravis tempore gestationis per imaginationem vel terrorem fortiores impressæ & communicatae. Germanicè dicuntur *die Muttermahler*. Maculae in Infantibus duplices observantur, sunt enim vel protruberantes, vel planæ, figura varia & colore diverso pro causæ varietate.

*Macula Infantum Volatica.* Germanis dicuntur *der Pflug*. Maculae hæc sunt efflorescentiæ cutaneæ, seu exanthemata infantibus familiaria ex fermentatione succorum, & dein coagulatione in cutis tubulis obortiva. Affectus hic tum in causa, tum in cura cum Erysipellate planè convenit, vocatur etiam aliis *Zona*, Græci *orephs*.

*Macula Hepatica.* *Macula Hepatica*, Germanis *die Leberflecken*, sunt efflorescentiæ cutaneæ, quandoque largæ, quæ sanguinis ac succorum acrimoniam, & inde evasationem cum aliqua coagulatione in tubulis cutis præsupponunt.

*Pars affecta.* §. 2. *Pars affecta* horum affectuum est Cutis, rete illud sanctè mirabile, tot plurimis filamentis vasorum sanguiferorum, nervorum, fibrarumque variè inter se complicatis contexta, quibus glandulæ numerosæ & lymphæ ductus densissimè interponuntur. Tota enim Cutis cum tugis suis instar agri ab aratro sulcati, & dein cum ordinibus versis, seu potius obliquis occati, apparet enim ita ut plano sugare supra sulcos utriusque generis eminentes figure ut plurimum Rhomboidis existant, & juxta quod sulci isti cum rugis, sive areis, breviores ac minores, aut etiam profundiores ac majores fuerint, textura cutis delicata sive tenui vel crassa, sive levidensis videtur. Hu-

jus constitutio licet plurimum nativitati ac primogeniæ staminum ac humorum concretioni ac coagulationi debeat, ea tamen ob diversimoda vitæ insequentis accidentia multifariam alterari solet, quò pertinet victus crassior, labores duri, aer Boetianus, vide de his *Blankardi Anat. Reformat.* Et cum Cutis variorum tubulorum & lymphaticorum, glandularum, articularum, venarum, nervorum textura sit, nulli mirum videri debet, hanc etiam variis maculis conspurcari posse.

§. 3. Quod signa spectat *Diagnosis.* Maculas has in apicem sistencia, ipsis non diutius inhæreamus, quia in oculos nostros incurunt.

*Cutis nigredo* ipsis patet oculis, nec signis aliis opus est, si enim cutis florida, & alba abeat in fuscam, statim deturpatur Cutis.

*Purpura* quoque ex furfuribus seu squamis ut plurimum in capite infantum productis cognoscuntur, cum & decedentes in oculos incurrant.

*Lentiginis* sunt maculae lentes colore ac magnitudine referentes, ex flavo rubescentes & fusca, emergunt ut plurimum in facie, manibus atque nonnunquam in pectore, partes enim quæ Solis radiis exponuntur facilius maculis his infestantur, à calore enim Solis quasi coagulantur, & per totum sæpè perennant æstivum tempus, & magis tum temporis in conspectum veniunt, tempore verò hyberno aliquid tumidum dissipant, faciliè tamen repullulant, suntque his familiares, quibus russi sunt pili, quibus etiam est cutis polior.

*Ephelides* verò majores sunt & prægnantibus, & quibus menses obstructi sunt faciliè obveniunt, & post partum, & post mensium fluxum evanescent, circa os & labia aliasque corporis partes apparent.

*Maculae originales* sive *Navi Materni* faciliè cognoscuntur, cum à nativitate nostris apparent oculis, qui

qui navi pro imaginationis, vel cupidinis, vel terroris matris varietate variant, referunt enim modò cerasum rubrum, modò mora, modò murem pilosum, vel testudinem, vel sexcenta alia, quæ hic recensere nimium foret. Navi vel plani conspiciuntur, nonnunquam verò elevari. Color etiam Navorum maximè variat, modò cæruleus, modò flavus, modò niger, modò rutilus existit. Virgo hic degit, cujus faciem ferè totam rutilus occupat color, à matre gravida incendium subito advertente, atque ex terrore faciem suam contrectante ei impressus.

*Macula Volatica* Infantibus familiaris sunt, quæ modò apparent, modò disparent, sunt parva stigmata in Cute nostra, quæ ferè cum Erysipelate conveniunt, discrimen in eo tantum consistere videtur, quòd Erysipelas in uno loco plerumque persistit: in volatica autem rubor priorem locum deserit, ulterius tamen progreditur locaque vicina invadit.

*Macula Hepatica* sunt majores in ambitu, & hinc inde per totum corpus in brachio, in pectore, in collo, &c. dispersæ apparent, & aliquando pruritus excitant Cutem asperam reddentes, ubi vis enim vagantur.

§. 4. Nunc causas, & primò ex veterum Galenicorum mente, harum macularum videamus, qui Nigredinem Cutis ab humore atrabilario summam cutem inficiente oboriri censent.

*Furfuræ.* Furfures ex crassis lentisque corruptis humoribus gigni, aut in toto corpore, aut in solo capite, pro, exuberantium humorum loco, contendunt. Alii à pituita falsa, aut humore bilioso, aut atrabilario sanguine Furfures fieri autumant.

*Lentiginæ ac Ephelides à Sole* provocari ajunt, à cujus calore humores in Cute subsistentes quasi aduruntur.

*Navi.* Pannum seu Maculam fuscam vocant. Veteres ad Nævum referunt ma-

ternum, eosque deducunt ab imaginatione matris, licet veram ejus ortus rationem sufficienter nequeant explicare.

*Macularum Infantum Volaticarum ac Hepaticarum* causam frequentiora statuunt sanguinem biliosum adustum Cuticulam occupantem, & ibidem in humorem melanolicum degenerantem: Hepaticarum verò ab Hepate produci ajunt, sanguinem reddente calidiorem.

§. 5. *Paracelsus Cutis Nigredinem* à sale, & Furfures ex cruoribus resolutis, quibus accessit alumen minerale scissum, provenire ait.

*Lentiginis* ex cholera vel ex caliditate nasci negat Author, verum liquoris Mercurii esse dicit, ubi liquor Mercurii fuerit, qui vergat in sui regenerationem, tum enim oriri Lentiginis contendit.

*Nævus* verò ab imaginatione matris provenire ait, à qua astra interiora citissimè commoveantur, ut foetus hæc vel illa macula imprimatur, pro varietate rei externæ obvenientis, & imaginationem turbantis: per matris imaginationem, conceptum, vel ad aliquam rem appetitum habentis, aut præ timore vel incussio metu, quæ macularum ejusmodi causa sunt.

*Pannum* Paracelsus ex colore emortuo produci statuit, quicquid enim ex coloribus moritur, in corpore juxta ipsum fixum manet. Cum enim infans ex utero matris suæ maculam aliquam luteam, cæruleam aut nigram attulerit, Pannum esse judicat.

*Maculas Infantum Volaticas & Hepaticas* à fluore menstrui oboriri contendit.

§. 6. *Helmontii* secundum Principia causa Cutis Nigredinis, Furfurum, Lentiginum, Ephelidum, Pannorum, Navorum Maternorum, Macularum Infantum Volaticarum, atque Macularum Hepaticarum ab impuritatibus sextæ digestionis relictis, & transvolationi ineptis deduci potest, sæpe etiam ab imaginatione matris perturbata alimentum foetus, ei ut ramulus arbori

*Macula-  
rum In-  
fantum  
Volatica-  
rum &  
Hepati-  
carum.*

*Paracelsi  
iudicium  
de causa  
Cutis Ni-  
gredinis  
ac Furfu-  
rum.*

*Navorum.*

*Panni.*

*Macula-  
rum.*

*Helmontii  
de causis  
horum af-  
fectuum.*

inserti, insufficiente.

*Villisi  
variociniā  
de causa.  
Nigredi-  
pis.*

6. 7. *Nigredinis Cutis* causam esse opinatur *Villisi* bilem atram & adustam in sanguine luxuriantem, vel ob impeditam ejus in Hepate secretionem, vel ob abundantiorrem ejus ac velociorem in cruoris massa generationem; quæ per arteriolas ad superficiem advecta sub cute ob visciditatem suam retinetur. Bilis enim nigrum istum consequitur colorem, quando scilicet aquosioribus ejus particulis tenuioribusque sulphureis à magna ebullitione dissipatis, siliæ summæ rerum potiuntur, crassioraque sulphura residua coagulant. Quum autem sulphurei illi grumuli nullum inter se ordinem servant, & ita sint dispositi, ut ampla adsint inter ipsos interstitia, radii incidentes ab istis cavernulis demerguntur, nec denuò reflectuntur.

*Furfur.* *Furfures* excitari putat à seroso humore à glandulis cutaneis è sanguine secreto, & per poros evaporari solito, salibus paulò acrioribus crassioribusque imprægnato, liquor enim iste serosus ad cuticulæ poros perveniens, eosque angustiores, quàm ut particulis ipsius scabris majoremque molem obtinentibus exitum præbeant, reprensus, salinarum particularum, quas possidet spiculis Cutem ac Cuticulam discindit, & in laminulas *Furfurum* instar dissecat.

*Ephelid.* *Ephelides* deducit à tenuiori humoris bilioli portione, vi Solis illam attenuantis, quæ evaporari incipiens in cutis superficie aut Cuticulæ, quam pertransire nequit, concavo desiguitur.

*Lentigin.* Quum etiam *Lentigin* secundum Authorem nostrum parum aut nihil ab *Ephelidibus* differant, illas ab eadem causa produci statuit.

*Navorum  
Maternorum.*

*Navor Maternos* in foetibus imprimi dicit, quando scilicet gravida mulier objectum quoddam fortuito percipit, ipsiusque possidendi vehementissimo repente ardet desiderio: tum temporis autem hoc objecto in retinæ fundo depicto,

illius imago statim ad sensorium commune per spiritus animales nervos opticos incoherentes convehitur; ab istis verò commoti spiritus in corporibus striatis hospites ad appendicem nervosum confluunt, & per eum in partes deferuntur, ac per fibras nerveas vas sanguiferis implantatas cruoris massam subeunt, & cum ipsa ad uterum pergunt; ipsi itaque cum materno sanguine commixti, & per vasa umbilicalia ad foetum usque penetrantes, atque ad illius cerebrum tandem pervenientes, spiritibus in eo fabricatis characterem in cerebro materno susceptum communicant. Hi autem majore motu perciti sanguinem foetus vehementius exagitant ac rarefaciunt, & in laxiorem quandam cum copiosis, quàm par est, propellunt. Liquor verò nervosus objecti à matre percepti, à spiritibus animalibus imaginem mutatus, sanguinem majori abundantia, quàm ad partem nutriendam requiratur, offendens, illum commutat in substantiam ejusdem penè figuræ, cujus erat objectum matris cerebro representatum.

*Villisi* censet *Maculas Infantum Volaticas* progigni à quibusdam sanguinis grumulis à sale acido coagulatis, & in arterioribus Vasculorum orificiis hærentibus. Infantum enim Ventriculi fermentum quandoque vel à phlegmatis in ejus cavitate residuis obvolutum, aut satis robustum non existens, laesi vel pulti ritè concoquendis non sufficit. Salinæ ergo illorum particulæ rectè non explicatæ, & nullatenus volatilifacæ, ac cum chylo in sanguineam massam delatæ coagulationes in ipsa efficiunt, quæ cum ejus massa per totum corpus circulant, & ad superficiem pervenientes, in tenuioribus ejus vasculis, quæ ob molem transcurrere nequeunt, cæspitant, eaque obcurant, & rubras aut purpureas Maculas excitant, pristinum suum colorem servantes.

*Maculas Hepaticas* provenire arbi-

*Macula-  
rum In-  
fantum  
volaticarum  
THO.*



Macula-  
rum He-  
patica-  
rum,

arbitratur à quibusdam biliosis particulis in hepate à sanguine non separatis : quæ cruoris massæ iterum admixtæ ad glandulas miliares per arteriolas deportantur , à quibus cum sero à sanguine segregantur . Quum verò evaporationi penitus inhabiles sint tales fœculentiz , serò foras per cutis foramina prorumpent , illæ sub cuticula remanent , cutemque , cui insperguntur , defœdant , & confutrant .

Sylvii opi-  
nio de cau-  
sa horum  
affectionum.

§. 8. *Sylvius* Cutis *Nigredinis* causam dicit esse , quando sc. humores quidam crassi sanguini admixti , & ad corporis superficiem propulsi , ut excernantur , sub cuticula hærent , ipsamque colore subnigro inficiant .

Alia  
causa  
horum  
affectionum  
est.

*Furfures* verò ,  *Lentigines* , & *Ephelides* oboriri ab acido humore in Cute coagulante , & quasi mortificante , sic quoque ab aerimonia salina lixiva in Cute sæpe mortificationem fieri statuit , quemadmodum in gangræna & Maculis gangrænosis . Maculas ab acido productas ad ruborem inclinare ait , atras verò ab aerimonia dependere salina lixiva haud dubitat .

Nævos verò Maternos foetui imprimi ait ab imaginatione matris , quia mater & fœtus sibi arctè sint uniti , & foetus à matre faciliè aliquid patiat , sicque nota rei imaginationem graviter occupantis imprimatur .

Macularum Infantum Volaticarum ac Hepaticarum causam corruptioni humorum attribuit , qui corrupti è massâ sanguinea ad Cutem depulsi varias produciunt Maculas .

Cartesii  
notum  
sententia  
de causa  
Nigredinis.

§. 9. *Cartesius* pororum Cutis certâ dispositioni *Nigredinis* adferibunt causam , videlicet eorundem dilatationi & fibrarum cutaneorum relaxationi , unde fiat , ut radii luminates in talem incidentes Cutem non reflectantur aut refrangantur , sed profundius recepti suffocentur , & motus eorum intercepti ac sistatur , prout pila , quavis fortissimè è manu projiciatur , in parietem tamen mollior-

em , uti est ille , qui linteo , reti , vel panno obducitur , incidit , nullatenus resilire solet , sed omni sua vi privata à motu cesset , corpori illi molli eo omni communicato . Hanc verò pororum dilatationem Cuti obtingere volunt ab æstu externo Solis succos cutaneos ad externam superficiem allicientis , qui dum frequentius evaporantur , & particule , quadam asperiores iisdem sunt immixtæ , pori , per quos frequentior iste contingit transitus , distenduntur , ampliuntur , & fibræ nonnullæ eroduntur , quarum extremitates in superficie variè reflectæ , extensæ , distortæ , connexæ , vel dilatatæ majorem iis conciliant profunditatem , & numerum eorum augent . Sordities etiam Cuti diutius adherentes particulis suis asperioribus acutis fibras cutaneas erodere & diffingere posse ajunt , ut hac ratione poris magis ampliuntur , ut iis obvéniant , qui fortioribus & ejusmodi laboribus assiduò occupentur , inter quos magnus excitetur pulvis , qui Cutem externam ambiens , & cum sudore se miscens , eadem modo jam dicto afficiat , vel qui ex incuria raris se lavare consueverint . In Africa cum Solis calor homines nudos continuò affatè soleat , & liquores ex ductibus suis ad superficiem externam proliferare , homines ibi etiam existere norunt nigerrimos *Æthiopum* nomine cognitos .

*Furfures* cutis excitari putant à particulis quibusdam acido-salsis è lymphâ ad Cutem rejectis , eandemque erodemibus , ut succi extillent , qui incrassati aut coagulati in squamulas condensantur , post scalptionem faciliè è Cute decedentes . In capite *Furfures* istos copiosiores quandoque colligi credunt , quoniam ob impedimentum aliquoties transpirationem attenuati succi circa pilorum radices subsistere coacti inspissentur , & per coagulationem incrassati floccorum instar dissoluti depluant .

*Lentigines* à succis oriri censent *Lentiginibus* per tubulos cutaneos exstillantibus ,

tibus, & sub cuticula coagulatis, quam distendentes in altum elevent, & diuturniore sua stagnatione, & quam ductibus inferunt, obstruktionem moleculam coloratam referant, tam citò non dissipabilem, quòd similibus particulis à tergo sequentibus assiduò sustentetur. Fulcum illum, quo præditæ sunt, colorem à majori etiam deducunt pororum cutancorum prolongatione, ob quam radii luminæ aliqualem patiantur suffocationem, & quum spissiores sint succi hi, quàm ut tam citò resolvi possint, propterea obstruktionem hanc non referari, sed maculas hæc diu conspicuas manere asserunt.

*Ephelides* autem à succis quidem istiusmodi à Solis vel atheris subtilioris fortiori in fibras cutaneas agitatione ad superficiem prolektis, & ibidem coagulatis produci existimant, sed quidam succi isti non adeò sint incrassati & spissi, hinc si cesset externa illa Solis vel atheris actio, eosdem facillè resolvi & per ductus convenientes in lympham & massam liquorum omnium communem refruere docent, quapropter & tempore autumnali, aut dum homines diutius sub umbra degunt, maculæ hæc dispareant, Cutis pristinum suum recuperante colorem.

*Panni*, aliorumque *Navorum* maternorum causam imaginationi ascribunt fortiori gravidæ, objecto cuidam desiderato cogitatione sua diutius, & per extasim quandam inhzrentis, vel ex terrore quodam vehementius commotæ, quare spiritus ejusdem validius excitati impetu quodam totam non modò propriam petere machinam, sed ad ipsum etiam ei implantatum pertingant fœtum, & in ejusdem simili membro, quod in proprio corpore attigit mater, fibras ita deducat, ut tubuli dilatati sanguinem aliosque succos majori admittant in copia, qui per coagulationem ibidem stagnantes pro diversa configuratione, quam spiritus secun-

dum corpoream illam ideam, quàm mater ex conspecto externo objecto concepit, determinarunt, varias exhibeant maculas & picturas, quin etiam prominentes, & imagines certas quasdam animalium aut fructuum species distinctè satis referentes.

Ex particulis quibusdam angularibus acidis lymphæ, in extremis tubulis hærentibus, & obstruktionem quandam inflammatoriam inducentibus, *Maculæ* dicunt insantem oriri *Volaticas*, quæ particulæ cum non adeò existant rigide, sed à novis alluentibus succis superari, flecti & moveri possint, aut per dilatatos poros cutaneos eas dissipari & exhalari credunt, aut cum lymphæ resluente per consuetos poros aliò deferri, unde in prioribus partibus dispareant, & quando similes particulæ in aliam corporis regionem cum lymphæ ferantur, in iisdem maculæ tales denuò conspiciantur.

Fieri etiam interdum dicunt, ut plures tubuli & glandulæ in cutè à succo crassiore obstruantur, & lymphæ multis particulis acutangulis, sive acidis repleta magna copia inter Cutem & cuticulam effundatur, quæ per poros transitum non reperiens, sed ibidem stagnans *Maculæ* præbeat *Hepaticas* dictas, quòd Veteres ab hepate humores biliosos in partes transfundi crediderint, unde maculæ istæ oboriantur: quam tamen opinionem veritati nullatenus congruere asserunt, sed liquori acido in lymphæ existenti potius earundem originem ascribendam esse, easque post febres sæpe conspici, quòd absumentis particulis subtilioribus, crassiores & accidiore lymphæ remaneant, quæ cessante motu sanguinis vehementiore magis, quàm antè, coagulentur.

§. to. *Nigredinis* Cutis causam Nor in Cutè frè hispida omnimodæque asperitate donata, ponimus, pro diversitate enim partium commixtarum, poros Cutis

*Maculæ Volaticæ*

*Maculæ Hepaticæ*

*Nostri indicium de causa Nigredinis.*

vel superficiem asperiores reddentium & distortquentium, & radios suffocantium, Assensum præbere jubet pannus sericeus niger, (*Sammiet*) cujus exigua filamenta sericea, è quibus constat, ferè hispida sunt, ideoque inter omnia maximè niger apparet. Corpora enim cuncta nigerrima sunt, quæ extinguunt luminis motum, ejusque radios suffocant. Ut album nigro opponitur, ita opposita albedinis & nigredinis est ratio, etenim majorem porositatem in corporibus nigredo requirit, ut ita microscopia indefinios in nigris corporibus poros detegunt, quorum in una serie carbo unius digiti millenarium interdum excedit. Quæ etiam ratio videtur esse, cur nigra cæteris paribus leviora albis sunt. Nigra ergò non reflectunt foras, sed suffocant potius radios, hinc certum est, corpora alba visum lassare, nigra autem lassitudinem solvere. Nunquam enim album in oculos incurrit, quin simul admittatur impressio multorum radiorum; à quibus visus fatigatur, cum nigrum videatur, ubi nulli recipiuntur radii, quod fatigationem tollit. Quoad ergò poros majores, in quibus plerisque radices pilorum consistunt, & per interstitia ex utroque latere cujusque rugæ cutaneæ ordine parallelo disponuntur, vel minores, quarum innumeri spatia cuncta pluribus interjecta quasi punctis creberrimis adimplent. Ut ergò Cutis magis polita alba & nitida evadat, plurimum interest poros ejus omnes succo benigno dulci ac oleoso impleri, ita namque dum meatus omnes pleni ac tensi sunt, totius Cutis planities levissima apparet: attamen si humor vitiosus poris istis suppediat, aut qui influit benignus, nimis exhauritur, Cutis proinde aspera, rugosa ac nigra fiet. Sic vitius crassior, labores duri, aeris inclementia, ac imprimis caloris ac frigoris excessus, Cutem asperiores nigrioremque etiam, è contrà educatio mollis & delicata, tonorem ac texturam ma-

gis subtilem leviorè, ac politam reddunt.

*Furfuratio* eodem modo, ac suprà de Scabie dictum est, oritur glandulis sc. & tubulis lymphaticis & subcutaneis obstructis & erosivæ variz generantur Macula & Pustula, quæ prout diversa est sanguinis ac succorum intemperies, ipsius Cutis diversa textura, laxior vel constictior etiam pro eorum minimis diversitatibus ratione, siccitatis, humiditatis acridinitusque majoris, figuræ magnitudinis, vel quatenus cum aliis morbis conjunguntur. Certum enim est, *Furfurationis* causam esse plurimas particulas salinas accedente acido in Cutem delatas, & in squamas & furfures per coagulationem degenerantes.

Absquæ erosionè Cutis deturpatur sæpe artus plurimis Maculis, utpote *Lentiginibus*, quæ potissimum astate accidunt, cutè rariori textura à nativitate donata existente, dum subtili æthere plures aliquando particule à crassioribus avelluntur, & cum exhalationibus reliquis ad superficiem machinæ corporeæ delatæ, non ita ritè poros permeant, sed linibi hærentes & per æstatem novis semper insequentibus sustentatæ, tales maculas producunt.

Lentiginum ergò origo, & aliarum macularum sanguinis aliorumque succorum corruptioni & stagnationi debetur, omnes enim macule, sive sint flavæ, sive rubræ, sive fuscæ, nil aliud sunt, quam in tubulis Cutis coagulati & flagnantes succi. Solis quoque calor multum ad humorum in tubulis existentium concretionem conferre potest, quatenus volatiles, mites ac oleosi avolant, & reliqui magis exsiccati ac inepti retinentur, hinc *Lentigines* foramina quoque pilosa, quæ & sudatoria dicuntur, ob transpirationis beneficium (tempore æstivo præsertim) effluvia copiosiora continuo emittunt, quare majora semper illa ac potentiora videntur; sin verò à frigidu-

*Furfuratio.*

*Lentiginum.*

gadiusculo aere externo hæc subito occludi contigerit, vapores intus coerciti Cutim circa eruptionum loca undique inflant ac in moleculas seu maculas attollunt. Cerrum enim est, quod succi vitiosi quidam in subtili cuticula coagulantur, & per cuticulam transparent, & sic formam macularum talium representant.

Tempore autumnali cum Sol non admodum ardeat, hinc coagulatæ & inspissatæ sensim ac sensim influente mitiore æthere attenuantur & educuntur, hinc Cutis pristinam recuperat formam. Maculas ferè omnes ab obstructis ac erosis vasis capillaribus enascuntur, quando sc. sanguis ac reliqui succi evasantur, particule volatiles volant, reliqtis crassioribus, quæ ob lentorem non tam ritè progredi possunt, sed in ambitu corporis (ceu littore Microcosmico, quod alluit sanguinis unda) extravasatæ & fixæ herent, prout nunc sanguis magis magisque ab indole sua degener factus, ejusque crasis vehementius vel mitius destructa fuerit, sic quoque diversæ macularum apparitiones variabunt. Rubræ si apparent, signum est sanguinem non usque adeo corruptum esse, unde rubore adhuc dum suffusæ sunt. Sin lividæ appareant, majorem sanguinis ac succorum corruptelam innuunt, pessimæ verò omnium notæ existunt nigræ, quæ summum sanguinis statum putrilaginosum, & ad nigredinem vergentem indicant, & maculæ hæc sunt superficiei Cutis mortificationes Sphacelo haud absimiles.

*Ephelides* itidem exoriuntur ex coagulatione sub Cute stagnantium succorum, imprimis ab obstructione mensium obortæ, hæc enim maculæ sub vel in Cute generantur, exinde, quia sanguis sit crassior & minus mobilis, adeoque faciliè in superficie corporis hærent, sunt & sæpè fermenta quedam velacida minutissima, quæ in hisce cutaneis porulis latentes humores præcipitant coagulantque, ita ut

amplius suum circulum continuare nequeant. Et quod *Ephelides* in gravidis stagnantibus mensibus aliisque oboriuntur, & dein fluentibus lochiis mensibusque iterum evanescent, hinc faciliè causa *Ephelidum* erui potest.

*Nævorum causa primaria* est coagulatio varia succorum, in Cutis tubulis facta à forti imaginatione vel terrore matris uteri materni claustris adhuc incluso fœtui impressa, à qua per versa imaginatione, & improvise terrore ejusmodi stigmata tenellulis embryonibus imprimi solent. Experientia enim constat, quod si gravidæ vehementer aliqua animi passione aliquid appetant, ejus signum fœtui in uteri claustris adhuc contento imprimi; ita si quæ gravis tempore quodam, summo & insatiabili desiderio appetiverit fructus, vel cerasa, vel mora, vel pyra, & si sui compos fieri nequeat, tunc horum fructuum imaginem imprimet isti parti fœtus, quam mater in suo proprio corpore attigerit inanimadvertenter, cum magno percelleretur horrore. Sic si de improvise pyrum vel prunum decidat in gravidæ caput, & fuerit inde perterrefacta, & caput tetigerit, infans post natiuitatem talem fructus iconem exhibebit. Difficillimi hujus problematis causam reddere hoc opus hic labor est: si verò cogitemus, quod corpus nostrum sit ubivis permeabile, & quidem ad momentum fulminis instar, ita ut spiritus animales undequaque admittat, quia fibrillæ capillares & minutissimæ adsunt & inserviunt pro ipsorum canaliculis, si igitur jam gravis magno teneatur desiderio alius fructus vel etiam summo terrore percutiatur, faciliè nobis persuademus, animam hisce unicè esse intentam, & hæc fructuum imagines ita conjungere cum spiritibus animalibus per totum corpus diffusis, adeoque ipsum uterum permeantibus, ut illæ imagines nullo negotio imprimi possint tenello corpusculo fœtus intra contenti, obser-

*Ephelidum.*

obſervamus enim hæſce figurarum ſignaturas non niſi geſtationis menſibus foetui communicati a matre. Ratio autem, cur in corpore matris non ſequatur idem effectus, hæc eſt, quia illud eſt nimis ſolidum, & durum, adeoque inſtar terræ mortuæ ſigillum reſpicit, cujus tamen impreſſionem facile recipit, molle foetus corpusculum, quod inſtar cere mollioris ſecti poteſt: cur autem iſta imago præciſe imprimatur illi foetui parti, quam mater in proprio corpore tegit, ratio hæc eſt, quod anima eo tempore nullius ampliùs motus eſt conſcia, quàm tantum illius, quo mater certam ſui corporis partem contrectavit, unde etiam huic unicè inhzrens, ei junxit iſtam imaginem hujus vel illius fructus ardentè deſiderati, vel animalis cujuſdam, ſed cum hæc ſpirituum determinatio ad hanc partem matris radiavit ad ipſum uterum, factum eſt, ut etiam tenderet ad ſimile membrum foetus, eique ſuam imaginem inuſprimeret, ut egregiè diſſerit *Celeberr. D. Craan, Amicus meus dum viveret, ſingularis*. Facile etiam hic effectus oboriri poteſt, ſi gravidæ obviuſ factus eſt de improviſo vel mus vel aranea, vel rana, vel buſo, &c. & ubi mulieres prægnantes ſe tangunt, ibi ſtigma apparet. Quomodo verò impreſſio hæc fiat, non dubitandum, ab ipſis ſpiritibus animalibus id contingere, ſi enim gravidæ ob cauſam aliquam terrore afficiuntur, hinc ſolent in loco, quem manu tangunt, fibrillæ infantum etiam ſimul commoveri, ut majorem ſanguinis quantitatem admittant, quàm aliàs ſolenne eſt, hinc illæ extenduntur, majores redduntur, & per conſequens rubicundiores, quod ſi diu durat, manet macula rubra, hinc rubor modò in facie, modò in oculo, modò in dimidia facie, modò aliis in partibus apparet.

acrior in extremis Cutis, tubulis ſtagnans, humores enim aciores ac mordaciores vaſa miniſſima capillaria ſubcutanea facile corrodere poſſunt, evaſati humores quoque ad particulas volatiles ac ſubtiliores abeunt in auras, reſiſtis in Cutis tubulis craſſioribus ſtagnantibus, maculaſque tales in infantum tenellorum Cute excitantibus.

Ubi contigerit, ut vel propter abundantiam particularum craſſarum ſalinarum, vel acidarum magis vel minùs corroſivarum in toto ſanguine, vel humoribus exiſtentibus, vel propter præcipitationem fortuitam, alio quodam à fermento inductam fiat obſtruſtio, ab ea diverſi generis oriuntur maculæ, & ſic etiam *Macula Hepatica* dicitur; & hic non ad hepar inſons reſpiciendum eſt, ſed obſervanda venit tam intemperies ſanguinis, prout enim illa variat, ita & ipſæ maculæ colore variare poſſunt; quàm læſio tubulorum, prout plures vel pauciores, majores vel minores affecti ſunt, macula erit major, ſi occupat tubulos laxioris texturæ, hinc dilatationem facile admittunt, & cum humor etiam fuerit viſcoſior, i. e. pluribus particulis ramoſis & chyloſis conſperſus, major ſit congeſtio & ſtagnatio.

§. 11. Quod *Prognosis Macularum* Cutis concernit, *Cutis Nigredo* à nativitate vix emendabilis erit, juxta ſacrum Codicem, *Ieremie c. 13. v. 23.* Nunquid mutabitur æthiops pellem ſuam, & *Pardus* maculas ſuas? Aſt cum à morbo vel ſordine ſuccorum ad Cutem depoſita oriatur *Nigredo*, iſta aliquomodo corrigi poteſt.

Reliquarum macularum, ut *Lentiginum*, *Ephelidum*, &c. curatio licet ex ſe non ſit neceſſaria, à pluriſque tamen magis, quàm vel alius graviſſimi morbi, expeti ſolet. Maculæ enim hæc ſunt Curatu difficillimæ, & ſæpè, me judice, incurabiles.

Quod *Nayorum* *Prognosis* atti-

*Macula- rum Hepaticarum.*

*Prognosis Nigredinis & reliquarum Cutis Macularum.*

*Macula- rum Volaticarum* Volaticarum cauſa ſerè eadem eſt ac *Eryſipelatis*, lymphaticarum, pha enim in volatica eſt ſubtilior



attinet, Veteres. Physiognomici, imprimis Cardanus alique recentiores *Nævos* ejusmodi Verrucarios levia faciei parte insaufitosplenis pronunciaverunt buccis, violentosque exitus portendere crediderunt, quod licet vanissimum, Romanis tamen quoque Veteribus ad superstitionem promptissimis receptum fuisse, ex ipso Cicerone patet, qui Pisoni morum fœditatem obiiiciens, non *Pilosa*, ajebat, genæ deceperunt me, nec *vultus totus*. *Nævorum* igitur curatio quamvis non sit necessaria, à pluribus tamen ob turpitudinem desideratur. Difficillimè in Infantibus & rariùs, vel nunquam in adultis curantur, nisi corrosivis & fortioribus remediis, quæ etiam non semper satisfaciunt.

In *Maculis Infantum Volaticis* refert *Sennertus*, si macula illæ orificium, aliquod, os putà, nares, oculos, aures, nares attigerint, & ed usque penetrarint malum, lethale esse, quod tamen nos nondum observare potuimus, sed licet tumor igne suo totam faciem, labia, nares, oculos & aures occupaverit, morbi tamen lætum eventum subsequutum vidimus.

*Macula Hepaticæ* sæpe spontè abeunt, sæpè etiam difficulter curantur, facileque recurrunt, nihil præter Cutis descædationem inferentes.

*Diatæ in maculis.* §. 12. In externis minimis affectibus etiam *Dietæ* ratio habenda est. Aeris enim constitutio diversa diversos in Cute colores producere posse testantur variz nationes: hinc Galli nigriores sunt, quàm Angli, aut Dani, aut Germani, ubi enim Aer magis temperatus est, quàm nimis calidus vel frigidus existit, colore etiam incolæ præditi gratiore & splendidiore. Solis enim æstus exposita Cutis alba facillè in nigriorem abit, prout videmus in rusticis qui ruri habitant, à quo etiam mulieres formosæ se optime munire norunt larvis Masque dictis. Huc etiam pertinet victus, qui sit tenuis, blandus, boni succi, vitetur cras-

sior, acidior ac salsior, qualis enim chylus, talis Cutis, educatio enim mollis, & delicata reddit Cutim subtilem, leviorem ac politam, imprimis verò potus calidus conducet, ceterùm herbis ac radicibus sanguinem purificantibus maritetur, ut sunt rad. gram. bellid. caryophyll. lign. fantali, citr. chin. &c. præ aliis commendamus puellis & virginibus, ut & fœminis pulchritudini studentibus potum Caffæ & Theæ, qui juxta versus Germanicos sequentes omnis generis maculas abstergit mundificatque.

*Flecken, Finnen, Eyerbeulen, Kupffer, Nasen und Gesicht Da der Wein mit Macht ausbricht.*

*VVilstu auß dem Grunde heilen, Recipe.*

*Edlen Thee, Den wvird vom Gesicht, und Nasen,*

*Solchen Pußat bald wvegblasen.*

Delicatulæ etiam hauri nimis vigiliis, item motibus nimis incumbant, & imprimis eo annitantur, ut excernenda consuetò exeant tempore, æque summo perè animi pathemata vehementiora fugiant, & iram, merorem, sollicitudines omni studio vitent, & quod æterisco notandum, abstineant à Mercerialibus cosmeticis.

§. 13. Hiscæ deductis ad *Curam Galenicam ac Pharmaceuticam* nos conferamus, & priùs Veteres *Galenicor* de Cura harum Macularum audiamus, qui ad nigredinem Cutis commendant farinam fabarum, cum succo interioriæ peponis mixtam, & in trochiscos octo reductam, & tres ex his imponunt aquæ & illinunt Cutem. Herbam quoque Rhodiam ex aceto tritam illinunt & siccescere permittunt, atque ita eluunt. Vel recipiant Iridis contritæ, farinæ prisanæ, farinæ fabacæ ejusque sextarium unum & dimidium, salis ammoniaci, C. C. ust. ammoniaci, thymiamatis, cujusque sextantem in aqua dissolvunt & pastillos efformant, quos in umbrâ exsiccatos adservant, atque usus.

tem.



tempore in aqua resolutos illinunt: vel, farina ptisanæ, thuris, iridis; farina fabarum, farina ervi, spumæ nitri, costi, cujusque chēnicis partem quartam, amygdalas amaras N. xx. informant cum candido ovorum & lacte asinino, exsiccant in umbra ac utuntur. Aliud multo usu exploratum dicunt, Thuris sesquiunciam, cerussæ probè lotæ, spumæ argenti in decocto cicero alborum ad Solem frequenter ablutæ; amyli recentis, scobis marmoris aluissimi, mastiches puræ, spumæ nitri albensis, testar. sepię sing. unc. j. saponis Gallici ℥xii. candid. ovor. n. x. M. Sequens fuisse Cleopatram dicunt Regine odoratum & pretiosum: R. Costi, myrrhæ troglodicticæ, iridis, spicę nardi, amomi, folii malabathri, cassiæ, floris junci odorati aa. ℥i. Myrobalarum ℥iv. spumæ nitri ℥i. Contund. eribr. & utere. Cutis nigredinem emendant per ea, quę modicè detergent, qualia ptisana, aphronitrum, amygdalę amarę, &c.

**Furfures.** Furfurum curationem sic peragunt; evacuant totum corpus imprimis melanago. Dein. cimoliam aquę premadefactam ad betæ succum admiscunt, illinunt & donec resiccetur, sinunt: deinde abluunt, & thus cum vino ac oleo terunt ac illinunt: postmodum verò staphidem silvestrem cum oleo illinunt: sequentem etiam commendant formulam:

R. Nitri

facis vini usla

myrobal. aa. ℥i.

staphidis silv. ℥ss.

vino dissoluta parti affectæ affricant.

Verum ad humidiores porriginis muris aut lupinorum decocto ad abluendum utuntur.

**Lentigines.** Lentigines ac Ephelides iisdem curant remediis, externis, optimè nempe extergentibus ac discutientibus, cujusmodi est assum aphronitrum & farina ervi. Ad maculas solares & lentigines seq. commendant.

R. Terra Cimolia torrefacta he-

minæ dimidium,

aphronitri tosti ℥i.

farina ervi ℥ss.

ramentor. fellis taurini ℥i.

Trita affricant.

Vel:

R. Facis vini

farina ervi aa. ℥x.

saba frescæ ℥ix.

veratri albi ℥v.

aphronitri ℥x.

alcyonii ℥ix.

M. & confricant.

Vitis alba item nigra radices cum oleo decoquunt, donec succolentæ reddantur; laudant quoque oleum amygdalarum cum cera, & radicem lilii cum melle. Maximè autem omnium lentigines delere dicunt gummi & nitrum aequali pondere, melle permixta. Item Brassicæ semen aqua contritum illinunt. Columbæ quoque sterus cum acri aceto terunt ac utuntur. Ad diuturnas Lentigines seq. magni æstiment.

R. Radicis Cucum silvestris sextant.

Cimolia ℥i.

in pulverem redigunt ac reponunt.

Vel:

R. Bulborum depurator.

Thuris aa. ℥i.

conterunt, adjecto cochlearum terrestrium magnarum cruore, oportet autem ipsas adhuc vivas stylo pungere, atque id quod effluit mucosum pharmaco injicere, melle quoque exceptum inungunt. Eundem effectum præstat ari radix sicca cum melle, & umbilici veneris radix cerato liquido excepta atque illita. Brassicam contritam & illitam ad maculas à Sole productas, & lentigines, atque omnia illa, quę mediocri extersione ac repurgatione indigent, utilem dicunt. Similiter & sepię testę usitæ, aut testę purpurarum ac buccinorum cum melle illitę conducunt. Vel seq.

R. Cera Tyrrhenica ℥xv.

olei rosacei ℥viij.

ping. anserin. ℥i.

spuma argent. lota

& dealbat.

ceruss. aa. ℥i.

gumm.

gummi. ʒʒ. ʒii.

mellis Attici ʒi.

Dissoluta illinunt, & post spatium horarum sex spongia detergunt ac lavant cum sapone.

Alii lupinos in lixivio per triduum maceratos conterunt, & cum iis vel Lentigines vel Ephelides illinunt donec avelli possint. Saponem Gallicum aqua tritum modicè adjecto melle inungunt, & per horas tres inherere sinunt. Laudant quoque myrobalanos, bulbum erudum per se vel cum ovi luteo, aceto aut melle, radices narcissi in aceto decoctos, imò quilibet Veterum experimentum singulare jactat, & integer tractatus non sufficeret ad omnia hæc comprehendenda.

**Pannum  
& Navis**

**Pannum** seu maculam istam fuscam non aliter Veteres curandam volunt quàm ipsam *Navum maternum*, qui juxta ipsos curatur sequenti ratione.

ʒ. calc. viv. ʒvi.

ʒ. ʒi. ʒi. ʒi.

nitri ʒii.

Hæc terunt & lixivio de cinere caprifici facto, vel de farmentis immiscunt, adjiciuntque rubricæ aliquid aut atramenti, quo possit colorari, quæ simul mixta in patella fictili coquunt ad mellis spissitudinem, & recenter parato utuntur.

Adhibent etiam sinapi cum aqua calida in formam pulsæ redactum, vitellum ovi assatum tritum & Navis impositum, item costum cum aqua & nielle applicatum commendant, nec non Alysson, fell. galin. Saponem album, sanguinem menstruum vel secundinæ calide Navis adhibita magni æstimant, quas aliasque inunctiones vespere ante ingressum lecti instituunt mandant, & matutinis horis decocto sem. lupinor. iterum abluere, quæ omnia aliasque Topica vix voto respondent, hinc plura ex eorum scripnis addere non libet.

**Maculas  
Volaticas  
& Hepa-  
ticas.**

Ad *Maculas Infantum Volaticas* & *Hepaticas* exterasdas utuntur variis internis, & in hepaticis semper ad Hepar respiciunt, V. S. & purga-

iones instituunt, dein aquas Epaticas, Endiv. scichor. aliasque refrigerantes exhibent, & serum lactis propinant, varisque ad Hepar confortandum exhibent. Inter Topica Gallas immaturas, melantheriam, itemque malicorium contrusa, ut succum emittant, imponunt, & ampelopratorum succum viridem adhibent, donec teneri cerati crassitudinem habeat. Maculas nitro perfricandas & abstergendas esse scribunt: quæ macule etiam juxta ipsosexteruntur betæ decocto, aut nitro tosto, aut smegmate, quod ex ervo conficitur, si verò nigror ex hoc appareat, florem aris admiscunt, aut per se inspergunt. Dein tollunt maculas ac cicatrices hunc in modum: Maculas illinunt resina per dies quinque, sexto die solvunt, acubus maculas densis puncturis pungunt, ut locum æquè vellicent, sanguinemque fluentem abstergunt, quæque horæ dimidium ita permiserint, spongia locum mundant, ac Medicamentum in quæcunque maculam induunt, tertio die iterum solvunt, & de ligaturis expediunt.

Vel:

ʒ. Cera

nitri

aphronitri

calcis vivæ

lixorii

thuris aa. ʒii.

M. &amp; cum Melle excipiunt.

§. 14. *Paracelsus* curationem *Cutis Nigredinis* & *Furfurum* ita instituit, ut primò Cutis Medicamento corrosivo evellatur, quo postmodum nova, pura & immaculata produceatur, in quem finem sequens commendat.

*Paracelsus  
cura in  
Nigredine  
& Fur-  
furibus.*

ʒ. Album. ovor.

test. ovor. calc.

destill. in aquam, &amp; add.

marchasit. arg.

chimolæ, f. digestio ad men-

strum &amp; destillatio.

Sic quoque in *Furfuribus* maximè prodesse dicit sequens:

ʒ. alcali de albuminibus

salis

*salis fusi aa. q. v.*

*Fiat Mixtura pro Furfuribus.*

*In Panno.*

*Curam Panni Paracelsus peragit Tinctura sequenti*

*℞. de floribus fabarum ℥℥.*

*calcis ovorum ℥ii.*

*salis peregrinorum ℔i.*

*aqua consolidæ,*

*alcohol vini aa. ℥xv.*

*Destilla per alembicum & hac medicina Pannum inungit, & fiet albior quam Cutis altera.*

*Sequentem etiam commendat Tincturam.*

*℞. aluminis plumosi*

*scissi aa. ℔i.*

*Destilla in aquam cum ista additione:*

*℞. Caphura ℥℥.*

*sigilli Salomonis ℥ii.*

*Rursum destilla, postea linteolo hac aqua madefacto Pannum inungit lavatque.*

*CURA NERVORUM  
PARACELSI  
VARI.*

*Nervos Maternus Paracelsus tantum sanari credit si res, quæ imaginationem matris agitavit, & qua mater perterrita est, adhibeatur, vel infans vel re-appetita fruatur; vel terrore aut timore afficiatur, ut res illa exstirpetur, & tum ut extrinsecus ad Cutem deveniat, Cutis aqua aliqua forti, ut Regis eluatur, & dein iterum exsicceetur. Commendat quoque omnia ea, quæ detergunt & cutem transformant, ut sunt Caphura, flores fabar. albam. ovorum, calces ac teste ovorum, sol. argent. stann. plumb. Venus, Marchasit. argent. aurea, chimolea, aqua consolidæ, sigilli Salomonis, alumen plumosum, scissum, sal armoniac. viride gris, & plura alia, ex quibus varias concinnat formulas; imprimis verò hanc præ aliis commendat curam, & sequentibus verbis exprimit: Demuste vermis imaginem visibilem, coloreque similem in macula forma quovis corporis loco habere: Perquirendum est à Matre primum, cuius magnitudinis, coloris & formæ cum tempore, die videlicet, hora, minutoque, quibus accidit, ac adim-*

*pleta fuit imaginatio talis: perquirenda est istius occasio: rursusque. Si tamen exactè singula per matrem addisci nequeant, quod raro cuncta recolant, ab Astronomia & magia petendum erit; istæ siquidem artes perfectissimam instructionem dabunt. His à te cognitis, est quod ejusdem generis vermem accipias unum, omni proportionem correspondentem, & si vivus ille fuit, de quo mater imaginationem concepisset, vivum etiam sumere delect, si verò mortuus, & mortuum accipito, quem eodem etiam tempore, quo matris accidit imaginatio, super maculam servata concordantia quavis ligato, & vivum in mortem usque relinquito, mortuum autem usque ad putrefactionem immotum. Et si forte matri ex appetitu contigisset, infans eo satiandus fuit & contentandus: si tamen ex timore terroreque, simile quid infanti fuerit incutendum interea temporis, quo superligatur vermis. Ad hunc modum eradicari dicit à fundamento Vermem extra carnem, non tamen extra Cutem intrinsecus. Ad hoc autem assumendam esse ait aquam fortem vel Regis vehementissimam, tum prius aqua recenti lotam Cutem, illam perlinsendam. Ejusmodi Cutis in octo vel quatuordecim diebus ad summum auferetur, & recens ac munda nascetur alia. Hac via, inquit, poteris nedum animalium quascunque maculas ejus detegere generis, verum & fructuum & creaturarum omnium, per ei simile quod matrem ad imaginationem traxerit. Hanc curam occultissimam neminem ante ipsum revelasse scribit.*

*Macularum Infantum Volaticarum & Hepaticarum curam consistere ait in abstersione & correctione salium, hicque omnia ea prodesse scribit, quæ superius in Panno communicavi-*

*Macula- rum Vola- ticarum & Hepaticarum.*

*§ 15. Helmontius Maculas has nigras, item Lentiginas, Ephelides, propositum Pannum, & ipsos etiam Nervos demaculis spon-*

hiscu-  
tandis.

sponse evanescere promittit, si maculis jam characteritatis manus cadaveris longa tabe extincti, omnique vitæ proprietate exuti, admoveatur & applicetur, donec frigus partem maculatam penetraverit.

*VVillisi* 9.16. *VVillisi*, cum affectum istum Cutis sc. *Nigredinem*, à bile in sanguine redundante deducat, illam toras ejicere statim anxie curat, quare hoc Medicamentum ante omnia administrat:

*R. Sulphur. antimonii gr. vii.*

*scammon. sulph. gr. viii.*

*cremor. Tart. ℥i.*

*M. f. Pulv. detur è cochlearij panatelle.*

Sequentem bolum deinceps exhibet.

*R. Elestuar. à succore sar. ʒi.*

*rhabarbar. ʒi.*

*sal. absynth.*

*crem. tartar. aa. ʒi.*

*Syr. de rhabar. q. s.*

*M. f. bolus.*

Blisir propr. cum vehiculo idoneo propinatum commendat ad gutt. xx. manè & hora quinta pomeridiana. Martialibus magnam etiam efficaciam tribuit hisce in affectibus. Topico tandem sequenti alienum istum colorem Cutem defecandem tollit:

*R. Rad. apri.*

*bryon.*

*Agill. Salom. rec. aa. ʒi.*

*sem. fenigr. ac. pulv. ʒi.*

*camphor. ʒi.*

*simul contus. affund.*

*ol. tart. per deliq. ʒiii.*

Fiat expressi applicetur cum petra bis in die.

*Surfuri-  
bus.*

In *Surfuribus* *VVillisi* statim pororum apertioni studet, materiaeque serosae stagnantis per eos excretioni, blandè disphoreticis. Solum acrimoniam verò compescit sero lactis, ac balneis aquæ dulcis tepidæ, & partem *Surfuribus* afflicta hac linimento inungit.

*R. ol. tartari per deliq.*

*nucum aa. p. æq.*

*M. f. linim. locis affectis bis in die illinendum.*

*Lentiginæ, Ephelides, & Maculas Hepaticas* nulla medendi methodo indigere ait, sed tantum cosmetica Medicamenta requirere asserit. Primò enim partem affectam sequenti cosmetico illinit.

*R. Sulph. viv. pulv. ʒi.*

*sapou. nigr. ʒii.*

ligata in petia suspende in aceto ℞j. per dies ix. dein in usum adhibeatur, loca affecta bis in die ablundo & confricando.

Postea in usum adhibet lac istud Virginis:

*R. Solutionem linbargyr. in aceto destillato faciam, scilicet precipitatio ol. tartari per deliq. à quo liquor infusar lactis albianus devenit eoque facies & manus bis in die lavantur, ac blandè confricantur.*

Vel:

*R. Minium in acet. solut. q. v.*

aut ejus loco cerus.

*F. eorum præparatio cum aqua aluminis aut sal. gemmæ.*

*Nævos. Maternos* curare tentat Author. Cosmeticis, quibus utitur ad reliquas Cutis defecationes abigendas.

*Maculas Volaticas* infantum sanant illorum pulti admiscendo grana aliquot sal. absynth. & ocul. cancr. ppt. vel antimonii diaphor. & corall. rubr. adeo ut stomachi phlegmata dissolvantur, ejusque fermentum validius reddatur, & sanguini requisita fluiditas tribuatur, ejusque coagulationes dissipentur. Quod ad externa verò Medicamenta, hoc solummodò utitur:

*Maculis  
infantium  
volaticis.*

*R. Camphor. in oil. ʒii.*

teratur in mortario vitr.

sensim affundendo succ. unius limonit, dein adde vin. alb. ℞i.

*F. colatura, & Camphora residua in petia ligata suspendatur in vitro.*

*S. 17. Sylvius Cutis Nigredinem, Syl. vii cu. Purfures, Lentiginæ, Ephelides, & ta in cu. Pannum aliasque Maculas non prius curari asserit, quam propulso hæc se*

*Ribui abi-* more obstruente foras, superataque  
*gendii,* in totum causa, quod verò sudoriferis obneri posse contendit, commendat in eum finem varia decocta lignorum, antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, & salia volatilia ex animalibus parata, quæ omnia causam, nempe acidum, tollunt, & simul materiam in Cute hærentem foras propellunt. Forinsecus autem cum commodo usurpari posse promittit fons ex vino vel aceto, cum Theriaca & Camphora, myrrha & similibus misto, & calidè sæpius applicato, ut & inferius dicendis.

Sic quoque ad *Nævor, Maculas Infantum Volaticas & Hepaticas*, pro diversitate causæ varia commendat remedia; ad rubras, & flavas abigendas Maculas utitur lixiviosis, ut farina orobi, sale Armoniaco, Melle, succo ceparum, & felle animalis cujusdam in linimentum redactis, vel oleo tartari, ad nigras, verò maculas tollendas laudat subacida, ut succum limonium, fimum columbinum cum aceto subactum, lac Virginis, quibus illini posse omnivarias maculas contendit.

*Cartesiani* §. 18. *Cartesiani* ætiopem quidem lavare, ut albescat, aut innatam *Nigredinem* penitus auferre non aggrediuntur, eam verò, quæ delicatis antè candida satis Cute præditis post diuturniorem in Sole commorationem contigit, quod succi corporis è ductibus consuevis ab externo calore adurentem versus superficiem proleat, & frequentius per poros cutaneos evaporati eodem dilataverint, & acutiores ejus partes fibrulas quasdam eraserint, atque moleculæ quasdam eorum obscuriores circa easdem hæserint, remendare interdum student remediis quibusdam internis diaphoreticis impuritates istas cutaneas remouentibus, potissimum verò externis sorditiem quamvis absorbentibus, abstergentibus, fibras aliquantum contringentibus aut relaxantibus, & poros dilatatos particulis quibusdam oleosis replenti-

bus, ut radii luminare non amplius suffocentur, quapropter delicatis hujusmodi pulchritudini corporis studentibus suadent, ut Solis se subtrahant radiis, aut obtestis facie & manibus, si ambulandum sit, iisdem occurrant, frequentissime verò umbraticum agant vitam, & membra decolorata sequentibus emundent remediis:

*R. Unguent. rosar. 3.iii.*

*magistr. marcast. 3i.*

*ol. diss. lign. Rhod. gt. vi.*

*express. nuc. Persic. 3ij.*

*F. linimentum*, quo partes nigredine descædat ante introitum læti probè illinantur.

*R. Mal. Medic. Nii.*

*scindatur in frusta orbicularia, quæ ad horæ unius spatium macerentur in Bii. vini, super igne cinerum, postea fiat colatura cum levi expressione.*

*liquori transcolato adde*

*aq. rosar. Bß.*

*album. ov. N. ii.*

*Agitentur omnia Virga betulina, ut ritè commisceantur & spumescent, post subidentiam liquor decantatur servetur ad usum,*

quo partes unguento prius illinitæ manè denuò abluantur. Parant etiam linimentum ex magisterio illo marcastite cum aqua spermatis ranarum, quo vesperi locos denigratos obducunt, & manè illud abluunt eadem aqua spermatis ranarum, vel sequenti destillato cosmetico egregio:

*R. Mal. Cistri N. iiii.*

*Limon. N. ii.*

*Intalrolas scissis superfund.*

*lact. vaccin. Bii.*

*Stent per noctem in digestionem, postea destillantur per alembicum, cuius rostro imponatur nodulus aliquid camphoræ, benzoini & storacis, cum granis aliquot ambre continent.*

Liquor extillans servetur pro ablutione. Laudant etiam essentiam benzoini, tanquam remedium

dium inter cosmetica minimè ultimum existimandum.

*Furfures.* Ut Cutis à *Furfuribus* mundetur præter interna sudorem excitando particulas acutas per poros eliminantia, hosque apertos servantia, ut evaporatio recrementorum promoveatur, externa abstergeria, posthæc fibras cuticulares lubricantia admovent, ne tam facile obrigescant, & à particulis acutangulis lædantur. *Furfures* igitur *furfuribus* abigere norunt, abstergendo Cutem *furfuribus* trictis in sartagine tantillum frictis, & adhuc calidis, quibus postmodum decidentibus, simul *furfures* cutanei delabuntur. Similem instituunt absterfionem decocto herbarum parietariæ, saponariæ, agrimonie, feminis lupinorum, radicis cucumeris asinini, aliorumque, postquam absterfionem partem unguento Medicamento *Mysichti* inungunt, vel urina calida, in qua flores sulphuris sunt dissoluti, ejusmodi peragunt ablutiones. Præmissis hæc fibras rigidiores relaxant & emolliunt oleosis, unguento pomato, pulpa ex amygdalis dulcibus, amaris, femine melonum, papaveris albi contusis, addito spermate ceti, & oleo ligni Rhodii, cujus pulpa portio in aquis rosarum & hyperici dissolvitur, eaque pars furfurosa inungitur. Oleum etiam laudant amygdalarum amararum, nucum, balanium, sesaminum, & alia. Cutem emollicientia.

*Lentiginibus* auferendis ea adhibent remedia, quæ cuticulam penetrantes succos in poris cutaneis coagulatos resolvere, & poros ita disponere possunt, ut alia succorum recrementa tam facile non admittant, suadentque propterea, ut maculis hæc tincti longo tempore spiritum melissæ tum intus ususpent, tum foris adhibeant, lentigines eo tangendo & abluendo, vel balsamum storacei anthos illinane, aut aqua ari, vel saryrii maculosi, cum aquæ

calcis vivæ tertia parte, mista, additaque portione camphoræ, aut sequenti aqua Galicana Epiphani Empirici studiosè abluant.

*℞. Tartari ad albedinem cremati ℥i*

*massicb.*

*tragacanth. aa. ʒß.*

*camphor. ʒvi*

*album. ovor. Niiii.*

*Trita & mixta in aqua rosacea destillantur.*

Commendat quoque liquorem si-ve aquam destillatam limacum, præsertim quæ cum sale gemmæ paratur, succum bryoniæ, in quo aliquid armoniaci sit dissolutum, vel sequentem aquam.

*℞. Borrac. ʒi.*

*camphor. ʒß.*

*alum. commun. ʒiiii.*

*gum. Arab.*

*tragacanth. aa. ʒß.*

*sarcocoll.*

*ass. dulc. aa. ʒii.*

*cetruss. ʒiiii.*

*Omnia bene trita misceantur & infundantur in*

*aq. serpentar.*

*flor. lilior. aa. ʒß.*

*genist.*

*solan.*

*nymphæa. ʒiiii.*

*M. destillentur in alembico vitro.*

Quamvis autem optima adhibeantur hujusmodi remedia cosmetica, norunt tamen Lentigines eadem sæpe illudere, quapropter si earum ablatio seriò urgeatur, & adeò non existant numerosæ, per caustica cuticulam erodunt, & succum coagulatum maculam efficiientem destrunt, tangendo nempe lentigines stilo ligneo acuto spiritu sulphuris aut vitrioli madido bis vel ter in diè, donec ulcuscula sint effossa, quæ nihil nisi carnem subrubicundam exhibeant, quod signum est, nihil ulterius de succis istis corruptis superesse, hoc facto ulcuscula ista aq. rosacea & plantaginis abluunt, & adhibito unguento de lapide calaminari, vel tutia carnis promove-  
vent



vent generationem, ut fovez denud adimpleantur, quæ cura ad summum trium septimanarum spatium absolvetur.

*Ephelides.* Ad *Ephelides* abigendas utuntur aqua bryoniz, cum succo limonium & felle gallinarum, liquore myrrhæ, lacte virginis, & remediis camphoratis, quibus remediis si non cedant, ad vitrioli phlegma, aut mercurialia accedunt, dissolventes sublimati purtiunculam in aqua rosarum, qua tum maculas attingunt.

*Pannum.* *Pannum* illinunt oleo tartari, vel albumine ovi, in quo tartarus calcinatus sit dissolutus, vel pulverem seminis crucæ, & lupinorum cum succo limonium, & oleo baccharum lauri in linimenti formam redigunt, quo maculam hanc inungunt vesperi, & mane aqua rosæmarini, vel sigilli Salomonis abluunt.

*Nævi.* *Nævi* maternos in foetu statim post partum adversos lacte matris recente & calente, vel secundina etiamnum calente jubent abluere aut detergere, in adুক্তioribus vero præter recensita in prioribus maculis ad fortiora accedunt quandoque erodentia, nævis videlicet existentibus minoribus, quo spiritu sulphuris aut vitrioli attingunt, & eodem modo procedunt, ut in Lentiginibus jam docuerunt, vel illinunt unguento aurco. Approbant etiam sequens remedium, quo Nævi sæpius tanguntur.

*R. Alcohol. lap. can. ʒii.*

*S. alis subtilis. trit. ʒi.*

Supersund. acet. ad supereminentiam duorum digitorum, stent per octiduum & sæpius agitentur, & linteo eodem liquore imbuto nævi illinantur. Oleum myrrhæ per deliquium paratum, & tincturam benzoini etiam commendant.

*Maculas Volaticæ.* *Maculas Infantum Volaticæ* interna sudorifera convenire dicunt ex aquilegia, fumaria, scabiosa, cinnabari antimonii, tinctura tartari antimoniata, maculas vero ipsas abluunt aqua omnium florum, li-

liorum, centaurii minoris, rosarum, in quibus orocus & camphora fuerunt dissoluta.

*Maculis Hepaticis* abigendis eadem prodesse censent sudorifera interna antimoniata cum C.C. Philosphicæ pp. & sale cardui benedicti in aqua fumariz exhibita, posthæc externa abstergentia, ut cuticula demta succi vitiosi stagnantes dissolvi, absorberi, & planè auferri possint, quas vires sequens habere dicunt remedium, paucis quidem constans ingredientibus, sed utiliter semper adhibitum.

*R. Ag. flor. sambuc.*

*hyperic. aa. ʒi.*

*lact. sulphur. ʒi.*

*sacch. saturni ʒß.*

*camphor. ʒß.*

*M.*

*Maculæ linteo* prius aliquantum fricentur, tum mixtura hac bene agitata tepide illinantur.

§. 19. Præmissis aliorum de *Maculis hisce* opinionibus, nunc & *Nostram* apponamus. In *Cutis Nigredinis Curatione* ed incumbendum est, ut *Cutis* tersa, candida ac polita seu æqualis evadat, quod obtinemus, si *Cutis* pori humore benigno, miti, ac velut oleoso impleantur, ita namque, dum meatus omnes pleni ac tensi sunt, totius *Cutis* planities lævissima ac candida apparet. Ad sanguinis crasin imprimis reflectendum est, hinc varia interna sanguinem depurantia commendamus, inter alia verò pulverem nostrum renovativum ob egregias vires ita à nobis nominatum; Imprimis verò externa conducunt cosmetica, inter quæ ex Talco parata extolluntur, omnia verò asperiora & salina, quæ succum benignum ex *Cute* exhauriunt, vitanda sunt. Quare si cujuscumque *Cute* molissima ac planissima seu candida præditi manus aq. saponata, lixiviali, calcaria, aut etiam sanguine calenti aliquamdiu madefient, propterea mox humore salino per sales alios è poris extracto, sulci & rugæ illico majores & profundiores evadent: quare scemina delicatio-

*Maculis Hepaticis.*

*Nostra methodus curandi Nigredinem.*

res lavacra saponata & quævis alia Cutim sulcantia acriora religiosè evitent; Blandiora potiùs balsamica Sulphurea aliaque cosmetica ex Talco parata in usum vocari possunt, hinc Aqu. Talei, ex Talco sæpè calcinato, comborace, & Aqu. lil alb. vel sigill. Salôm habetur pro præstantissimo cosmetico. Liquor quoque Talei magni æstimatur, de oleo hujus Talei plures præstant descriptiones, verum adhuc cum industria quarunt Chymici.

In Cutis *Nigredine* à primo ortu sequens commendatur aqua, ex fursur. ritic. cum duodecim ovis recentibus cum vino misc. & destillantur. Sic etiam sola aqu. ex albumine ovorum ad duritiem coctorum parata, & Cuti illita à pluribus magni æstimatur. Sequens à Foresto magni penditur.

*R. Borracis  
Tartaris  
ceruss. aa. ʒi.  
camph. in aq. ros. sol. ʒii.  
pulv. iros  
fabar. aa. ʒii. ʒ.  
Aq. Ros. fabar.  
rosar.  
fumiterra aa. ʒii.*

*F. Mixtura pro lotione.*

Sunt quædam divites formositati studentes adeo, ut margaritas aliaque pretiosa, solvant, & cuti illinant, Tartarea verò præstantiora sunt, præ omnibus aliis Cosmetici nostri commendamus, experientia sæpè comprobatum, ob Empiricos verò non communicandum. Munditiei cutis studentes abstineant à V. S. sæpius instituta, multis purgationibus, hiru- dinibus, scarificationibus, laboribus vehementioribus, alias incassum tentabunt & optima cosmetica: sed nunc ad alias pergamus Cutis Maculas curandas.

*Fursuratio* curatur eodem modo ac Scabies, internis sc. depurativis, sudoriferis ac temperantibus, ut sunt Antimonium diaphoreticum, Bexoardicum minerale, cinnabaris Antimonii, viperina, Tinctura An-

rimonii Tartarifata, Essent. fumar. lignor. &c. Aliæ quoque calces seu absorbentia omnium optima sunt in cutis affectibus hisce calces enim hæ licet acido saturata, nihilominus tamen magnetes acidi esse non desinunt, temperant enim acida corporibus nostris & præcipuè in externa Cute nocua, quod indubitatis hætenus probatum est exemplis, sunt quippe temperantia potentissima, & continuato usu ut plurimum huic malo medentur.

Externè verò in Fursuribus conducit inter alia liquor ex Sale Tartari & myrrha in cella hæsesctis, quo pars fursuribus affecta illinatur, & dein cum decocto lupiorum cum urina parato ablatur. Prodest quoque decoctum centaur. minor. ex pisorum brodio paratum, quo lavetur pars fursuracea, inde enim decident fursures. Quidam solo lixivio cum herb. centaur. min. decoct. uti solent, alii illinunt succum scyllæ, & tanquam præstantissimum depradicant remedium: spir. murricali, vel aqua vitæ, vel aqua. Reginz Hungariæ laventur partes, & sic laterem non lavabis. Muliercula nostrates in malo perstinacissimo Empl. Piccum efficerentur, quod vocant eine *Pech Haube*, quo Cutem itape cum fursuratione tollunt.

Quod *Lentiginum*, curationem attinet, quamvis illa non tam sanitati, quam Cutis nitore adversæ sint, attamen formositati studentes virgines earum ablationem avidè desiderant, curatu difficillima sunt, sed tentari possunt varia extrahentia seu resolventia, & aliquando Cutis poros constringentia, ne sedem figere commodè queant, in quem finem *Agricola* sequens ceu expertum laudat.

*R. Sem. sinapi alb. ʒii.*

*contund. cum pauco acet. ut fiat infusar pulvir, tunc adde*

*Sal. commun. ʒi.*

*album. ov. N. i.*

*M. quo illinantur maculæ in hypocausto calido, & relinque aliquamdiu, dein rursus ablu-*

abluitur aqua figill. Salom.

Convenit etiam in Lentiginibus ol. Tart. per deliq. vel lixiv. Sal. Tart. cum aqua flor. fabar. fact. item spir. vin. camph. spir. matric. al. Sequens à Cl. D. Invenit magni aestimatur.

R. Merc. dulc. ʒi.  
sacch. saturni ʒi.  
camphor. gr. xii.  
borrac. ʒß.  
magist. marcasit. ʒii.  
aq. sperm. ranar.  
ʒi. fabar.  
figill. Salom.

ros. aa. q. l. ut fiat instar pulvis, cum hoc postu cubitum ituri inungatur facies, manè verò abluitur aqua figill. Salom. continetur hoc per 8. dies. Alii commendant pulverem excoctatum amygd. cum paucis oleo Tart. madefactum, quo illinantur maculæ: sequens verò in aula nostra pro usu receptum est ad sordes quas-cunque eluendas.

R. Antimon. crud. ʒi.  
pom. citri N. 13.  
ovar. N. 8.

coq. in aq. pluvialit. & benè agitent. quæ mixtura laventur sepiusimè Lentiginos.

Vel:

R. Ol. amygd. dulc. ʒß.  
Tart. per deliq. ʒii.  
M.

Alii Lac Virginis laudant, nonnulli phlegma Vitrioli, quidam lac suillum, sequens pluribus profuit.

R. Aqu. è socleis  
limacib. aa. ʒi.  
nymph. ʒi.  
camph. ʒi.  
liq. Tart. ʒii.  
Tinct. benzoes ʒß.

M.

Sunt, qui extollunt in Lentiginibus defendis facinam lupinorum cum aceto vel oxymelle subactum & appositum.

Vel:

R. Ag. ʒi. satyr.  
fabar. aa. ʒii.  
ol. Tart. per deliq. ʒii.  
M.

Vel:

R. Ag. leucosii,  
figill. Salom. aa. ʒiii.  
esmet. ʒii.  
camphor. ʒß.  
ol. Tart. ʒv.

M.

His nihil juvantibus ad fortiora accedendum est. Virgo 15. annorum à lentiginibus curata est sequentibus.

R. mell. opt. ʒii.  
alum. scissil. ʒii.

M. & applica vesperi.

R. phlogm. vitrioli ʒvii.

quo facies & artus Lentiginibus conspurcati manè & vesperi abluendi sunt.

Nec his juvantibus ad corrosiva accedendum est, & proin Mercur. sublimat. ad ʒi. cum aq. rosar. ʒii. ʒi. misceri potest, & lentigines ea abluantur, hac tamen admonitione ut eautè his incedamus corrosivis, ne aliæ partes laedantur.

Lentigines sæpe omnia respuunt remedia, imprimis si sint sphacelata, cultro quidem vel corrosivo extirpari queunt, sed cicatrices, quæ relinquuntur, sunt sæpe deteriores, quam ipsæ maculæ.

Quod verò concernit curam Ephelides  
ephelidum, hæc curantur ut aliæ maculæ, internis absorbentibus & temperantibus antimoniatis aliisque superius dictis, & inferius adhuc dicendis remediis sanguinem purificantibus. Externè verò cura Ephelidum variis alcaheis Tartareis & myrrhatibus cum calc. viv. mixtis peragitur. Pro specifico commendant Authores baccarum lauri pulverem, cum melle in linimentum formam redactum, vel alii cum aqua fungorum in formam Epithematis redigunt & illinunt Ephelidibus. Liqueur Tart. & myrrhæ præ aliis nostra experientia confert. Alii Sulphur calcinatum in aqua solum commendant, nos Essentiam Benzoes cum moniente Camphoræ laudamus, spir. matric. Camph. c. aq. figill. Salom. & aq. sperm. ranar. calc. viv. rosar. &c. optimum erit cutis depurativum.

Si rugæ cutis hisce maculis fuerint conjunctæ conducet albumen ovi cum alum. in linimentum terendo redactum, & per aliquot dies mane & vespri applicandum.

*Nævus.* Nævus quod atinet, hi curationem etiam postulant: Fœminæ enim quæ laetissima utuntur fortuna, imprimis in aulis constitutæ, turpitudinem hanc magnis sæpè redimunt sumptibus, ex sequiore enim sexu plures nobis notæ sunt fœminæ pulchritudini maximè studentes, quæ pro qualibet macula delenda ducatum obtulerunt. In his maculis ad externa confugiendum est, pro Specifico commendantur in Maculis his originalibus secundinæ recenter illitæ, sed toties hoc remedium probavimus, nunquam tamen effectum præstitit promissum, quare legi meretur *Observ. 197. Eph. German. Ann. 3.* ubi invenies, quod secundinæ sic illitæ magis noceant, quàm profint, inde enim tumor & inflammatio fuerunt productæ. Nos pro secreto commendamus albumen ovi, quod detineatur super igne, donec vesiculæ instar perlarum apparent, quo liquore Nævi sæpius de die illinantur, vel seq.

*℞. aqu. calc. viv. ʒi.  
ol. T art. per deliq. ʒi.  
Tinfl. myrrh. ʒiij.  
ciner. clavell. ʒi.*

*M.*

Vel:

*℞. aqu. Caryophyllat. ʒii.  
calc. viv. ʒi.  
Spir. sal. armon. ʒi.*

*M.*

Quæ Medicamenta cum penicillo Nævo illinantur. Sequens non contemnendum. *Cl. Muys. commendat.*

*℞. aqua plantag.  
calc. viv. aa. ʒi.  
ciner. clavell. ʒi.*

*M. & utatur eodem modo.*

*Cl. D. Iunken*, Medicus Mosbacensis, amicus noster vetus laudat succum ex viridibus nucum juglandum corticibus expressum, à quo nigrescet Cutis, quæ separanda,

unde Nævi minores, ut ille ait, faciliè auferuntur, quod si stigma profundiores egerit radices, cum juseumque etiam sint formæ, nunquam tangantur manu Chirurgica, ne exulceratione inducta major inducatur deformitas, vel in præsentius periculum homo præcipitetur. Idem ad Nævus empyreumaticos admodum extollit hincum matris repetitum. Nævi etiam saliva propria illini possunt quotidie; alii scarificat prius partem affectam eamque postea tangunt penicillo butyro antimoniî imbuto. Cum Nævi originales à foetu se manifestantes vix absque excoriatione tolli possint, applicetur ergo sæpius spir. sal. armoniaci cum calc. viv. paratus, quo inuncto sit excoriatio Cutis quæ dein curatur oleo è vitellis ovorum parato. Adulteriores facti turpitudine Nævorum commoti aqua regia uti solent loco affecto subtilissimè inuncto, sed aliquando cicatrix redditur turpior, quàm ipse Nævus. Anglis Cosmeticum sequens in Nævus aliisque Cutis Maculis ac tuberculis solenne est, nostra quoque experientia comprobatur, Junioribus idem Medicis communicandum.

*℞. aqua fontan. ℞ v.*

*sem. pap. alb. recent. contus. ℞ li.  
f. Emuls. tunc in vitro magno pone  
antimon. librati sæpius loti ʒi.*

*album unius ovi bene conquassatum,  
simul agitentur per boram,  
tunc add.*

*Emuls. papav. cochli. i.*

*agita. per boram, tunc  
add.*

*cochlear. ii. emulsionis, & sic deinceps, donec aciculam non omnino tinges per diem & noctem intus dependentem, tunc add.*

*sacch. canth. alb.*

*Kerrac. albiss. subtiliss. pulv.  
ver. aa. ʒi.*

*Agita per duas horas, donec nivium candorem conciliavi, nihil enim damni adfert, Nævus maculisque aliis & tuberculis illitum.*

*Cura Macularum, Volaticarum infantum,*

Ut in omnibus maculis, sic & in his volaticis Infantum ad sanguinis & fœcorum purificationem respiciendum est, & quia infantes acido abundant, ad id corrigendum & absorbendum pulverem maximè conducunt, ex Antimonio diaphoret. cinnabar. ocul. cancr. ebore. unicorn. C. C. aliisque bezoarticis concinnati, præ aliis conveniunt, inter composita, pulverem Anglicum viperinum commendamus ad grana aliquot exhibendum in aqua fumar. vel alio vehiculo convenientiore. Tinctura quoque Antimonii, Essent. fumar. lignor. iidem per vices exhiberi possunt. Externè præter jam dicta in maculis his Volaticis convenit illinitio cum aq. rosar. plantag. in quibus crocus maceratus fuerit, & duplicatis linteaminis applicandus liquor. Vel spir. Matricalis cum Camphora apponatur.

*Cura Macularum Hepaticarum*

Cura Macularum Hepaticarum in eo vertitur, ut sanguis ac succi depurentur & corrigantur, ut eo melius stagnatio succorum impediatur, præprimis internè sequentem commendamus pulverem renovativum.

*R. Antimonii diaphoret. ʒi. alcohol. spinar. viperar. ʒß. cinabar. Antimonii ʒß. crysall. mont. ʒi.*

*M. f. pulv. dosis a ʒß ad ʒi.*

Imprimis hic conveniunt sudorifera blandiora, ex. gr.

*R. Clyss. min. ʒß. Diaphoret. ex clyss. ʒi. C. C. phil. pp. ʒß. Roob. sambuci ʒß. Aq. cent. min. hyperic. aa. ʒii.*

*M. assumatur cochleatim.*

Sunt qui ad purgantia mercurialibus admixta accedunt. Alii sangui-

nis corruptionem sequenti Electuario depurativo corrigere satagunt.

*R. Conseru. rosar.*

*cichor. aa. ʒß.*

*rad. cichor. cond. ʒiii.*

*Tart. Vitriolat. ʒß.*

*pulv. santal. rubr.*

*citrin. aa. ʒi.*

*Vitr. mart. ʒi.*

*M. f. la. Conditum, dosis ʒi. ad ʒii.*

*Vir in die exhibendum.*

Externè convenit sequens:

*R. Liq. Sæ. Tart. cum Sulph.*

*myrrh. cellasus. ʒß.*

*succ. plantag. ʒii.*

*aq. chalybeat. ʒi.*

*M.*

*Vel:*

*R. Aqu. Calc. vit. ʒi.*

*ʒ. Sulph. ʒvi.*

*Sal. Saturni ʒi ʒß.*

*M.*

In Maculis his flavis existentibus summopere juvat sequens.

*R. lact. Sulph. ʒi.*

*camphor. ʒß.*

*aq. hyperic. ʒi ʒß.*

*fol. quercus ʒß.*

M. qua mixtura illinatur maculæ hepaticæ. Maculæ & foveæ à variolis relictæ optimè etiam iisdem curantur cosmeticis, quale cosmeticum sibi servat Celeb. Dn. VVillichius, Sereniss. ac Potentissimi Electoris Brandenburgensis Consiliarius ac Archiater dignissimus, Fautor ac Amicus noster colendus, qui dum hæc scribimus Bielefeldæ Sereniss. Marchionem Brandenburgensem, Albertum Friedericum, variolis laborantem non tantum felicissimè curavit, sed etiam à maculis & foveis quàmplurimis, prædicto cosmetico, liberavit. Laudamus etiam in maculis aliis quibuscumque Cosmeticum Anglicum superius descriptum.

## FINIS LIBRI QVINTI.



I O H . D O L Æ I  
E N C Y C L O P Æ D I Æ  
C H I R U R G I C Æ  
R A T I O N A L I S  
L I B E R VI.

De Morbis Artuum , seu variarum Corporis partium ,  
tum magnitudinem vitiose imminuentibus ,  
tum continuitatem dissolventibus .

C A P U T I.

De Aridura .

§. I.



Nil sanè in ortu sui  
perfici, sed spei ru-  
dimentum ante per-  
fectionem cernas  
quotidie, sic ex em-  
bryone fit infans,  
puer, adultus, tan-

dem senex, horum individuus comes  
est corporis quoad trinam di-  
mensionem ext nsio, aliàs *Nutri-*  
*tionis* nomine veniens, hac verò  
cum non gaudeat corpus vel ejus-  
dem Pars, *Atrophia* dicitur, quæ  
Poetis mors, item tabida lues, ta-  
bidumque malum audit. Quum ita-  
que hanc moriendi sortem omni-  
tati quàm frequentissimè continge-  
re, variisque insuper modis totin-  
dividua tabido hocce corrumpi ma-  
lo videamus, prout Febbris hectica,  
Pneumonia ex pulmonum vicio, A-

trophia ex Scorbuto, Rachitis An-  
glorum, Macies puerorum, Tabes  
dorsalis, Marasmus senilis, atque  
*Aridura partium* hic tractanda, te-  
stimonium ferunt sufficientissimum,  
ideò ultimam hanc speciem, *Ari-*  
*duram* nempe partium, hic tantum  
tractare Nobiscum constituimus,  
quatenus pertinet ad corporis par-  
tes externas, & per consequens ad  
*Chirurgiam*.

*Aridura* aliis vocatur *Macilen-*  
*tia*, nonnullis *Marcor*, ac *Macies*  
partium dicitur, pluribus autem  
*Atrophia Particularis*, vel mem-  
brorum omnimoda consumptio vel  
consideratio cognominatur, Germa-  
nis dicitur, *das Schwinden der*  
*Glieder, die Darre*.

Describitur vulgò, quod sit ex-  
tenuatio extraordinaria partium ex-  
ternarum, imprimis artuum obsu-  
stratam nutritionem à pluribus cau-  
sis ob orta.

§. 2. Ut autem in genere qui-  
dem Tabi obnoxium sit totum cor-  
pus, omnesque illius partes tam so-  
lidæ,

*Aridura  
partium.*

*Macilen-  
tia Mar-  
cor, Ma-  
cies, Atro-  
phia par-  
ticularis.*

*Atrophia.*

*Partes so-  
lidæ.*



lida, quam fluida, quia ex alimento ac inde facto chylo incrementa capiunt omnes, manifestius tamen & ad sensum confumuntur partes molliores carne & pinguedine inest, v. gr. Musculi artuum, minus vero partes solidiores, ut sunt membranae, Tendines atque ossa, quae potius exsiccantur. Artus ut plurimum contabescunt, observamus enim in praxi lepidissime extenuari solum brachium vel crura, salva reliquorum substantia & mole. Sic non ita pridem observavimus aridum in pene, item in digito uno & altero feliciter tamen curatum. Absumpto quippe aliquibus in partibus rorido nestare chyloso, nisi cito causa tollatur, malum augeri solet, ita ut adiposae & defectu oleosarum ac pinguium particularum, dein tendinosae, ligamentosae & membranosaes partes chylo & oleo destituta imminuantur.

*Diagnosis*  
*primaria.*

5. 3. *Diagnosis morborum* quorumvis & externorum rectæ curationis clavis est, & quilibet Medicus tantum valet in curando, quantum in cognoscendo: ideoque paucis eam nunc tradere necessitas jubet. Præfens quidem *Aridura partium* oculos non fugit, ac ex partium coincidentia quilibet haud falso *Atrophiam* partis concludit. Particularem enim Tabem seu Ariduram facili Marte cognoscimus, quando partem aliquam juxta flaccidiorē & minorem, imò aliquando nigriorem, quam aliās in statu sano esse solet, deprehendimus, pars enim una atque altera marcescit, reliquis adhuc salvis existentibus, sæpe motus simul perit, & stupor aliqualis deprehenditur. Pars enim tabida filo circumhigari, & idem filum vel charta alteri sanæ parti applicari potest, unde ex ejus longitudine partis emaciatio & tenuitas explorari potest. Post Paralyfin partis alicujus, item post fracturam artus, nec non ex fortiori ligatura ejusmodi Atrophiz particulares oboriri queunt, prout toto die in praxi nostra quotidiana observamus.

9. 4. Pergendum nunc ad id, quod vel palmarium, vel inter palmaria est, in hoc affectu, nempe ad *causam*, ex cujus accurata cognitione Cura procul dubio dependet. *Veteres* verò, quibus ratione temporis prioritas debetur, Marcorum membra ab humore putrescente irridente in membrum aliquod deducunt. Sape quoque culpant Hepatis intemperiem, unde sanguis non rite paratur & ad membra distribuitur, si vel fuerit inflammatum, vel corruptum, unde musculi à defectu hujus sanguinis ac nutrimenti extenuantur macie. Sic quoque existimant extenuari artus, quando ab articulo luxato premanantur arteria ac vena, ut nulla alimenti portio ad membrum commeari possit. Pluresque alias causas externas ac remotiores allecant.

5. 5. *Paracelsus*, cui *Aridura* membri nihil aliud est, quàm transpositio membrorum, & curæ successus pravus, e. m. oriri dicit, quando per mumiam naturæ membra non bene cocant, convenient ac conjungantur, quodlibet enim membrum siquidem cum alio convenire debet, idque solum industria Naturæ, non sapientia Chirurgi, quæ propter ille Naturam vocat Medicam, ac non Chirurgum ipsum dicit Medicum fore vulnere. Ex glareali aqua vulnere idem deducit causam Ariduræ, inquit enim, cum viscosus liquor ad albumen ovi profusus à vulneribus, indicat accidens periculosissimum, ut membrum totius & medullarum exsiccatur, cui nemo poterit obviare, nisi liquor ille iusto pondere fuerit membro prorsum aliqua medendæ ratione restitutus, alias exsiccatur ut signum ab arbore sua truncatum, quod accidens Ipsi *Paracelsus* *Aridura* vocatur.

g. 6. *Hilmonitius* in *Aridura* mem- *Hilmonitius*  
bri existimat aliquando liquorem  
nutriurum aliò furtim subduci,  
imò atrophiam hanc oboriri pu-  
tat ex deturpato alimento alicu-  
jus membri: equidem retenta ju-  
sta ipsum, sive sint transmutata,

sive verò transmissa, semper tamen intrinseca insigniuntur idea, ente inquam morbofo, unde sæpe degenerationis hostilitatem suscipiunt, quare & radix primarii morbi plerumque ipsis adhæret, eandemque ideò æmulantur ac repræsentant, quatenus ipsius sunt producta. Macies ergò omnis nascitur ex alimento substracto, & ut plurimum Ariditas partium, juxta ipsum, fit à vicio distributivo.

*Willisi.*

6. 7. *Willisi* docet, Ariditatem induci à sanguine acido facta, vel in eo supra modum exaltatis particulis salinoacidis aut sulphureis summè acerbis, hac enim de causa succus alibilis ex intestinis in cruoris massam appellens, ab ipsa jam depravata ritè assimilari nequit, nec idoneus reddi partium nutrimentum. Liquore ergò nutritio sanguinis labem contrahente, & partibus solidis sese non solum nequaquam applicante, verum etiam particulas illarum delibante: ipsum tum genio suo defraudatur, tum ab ac. i illo humore propriis particulis spoliatur emarcescunt, & exarescunt. Liquor etiam nervosus à tali scaturigine fluens, à natura sua degenerat, existit, crassiorque ac viscidior existens, difficilius per fibras nerveas delabatur, pauciorque copia ad partes appellit, illorumque nutritionem parum promovet. Talem etiam affectum excitant ea omnia, quæ liquoris nutritii magnum inferunt dispendium, vel ejus proveniunt, uti & spirituum animalium influxum in partem impediunt.

*Sylvii.*

8. *Sylvius* particularem Atrophiam contingere asserit in determinatis tantum partibus, Artubus præsertim, à vicio ut plurimum sanguinis, aliquando etiam partis affectu. Sanguinis culpa Atrophiam evenire ait, si is deficit in parte aliqua, aut ineptus est partibus contabescentibus reparandis. Sanguinem ergò deficere dicit in parte aliqua propter impeditum ejus ad vel in ipsam fluxum, articularumque adeo ad ipsam tendentium dissectio-

nem, aut compressionem qualemcumque, ob luxationem ossium, tumores duros, vincula, &c. corpori continenti, ejusdemque Partibus pluribus paucioribusque nutriendis ac reparandis ineptum esse sanguinem ait, propter qualitatem vitiosam, humoresque vitiosos, falsos, viscosos, purulentos, &c. ipsi admittos.

Partium quoque nutriendarum vitio Atrophiam accidere arguit, quoties ipsæ à quacumque demum causa & imprimis externa fortuitaque aliquam sunt passæ noxam, ex casu nempe, contusione, vulnere, grandi, &c. unde non tantum vasa per ipsas delata rupta sunt aut dissecta, verum carnes ipsæ, ac membranae, &c. labefactæ & vitiatæ; quocirca non tantum deficit, verum corrumpitur quoque accedens ipsis alimentum, sanguis. Ab obstructione, compressione, constipatione ac coalescentia Atrophiam hanc fieri contendit.

Spirituum animalium transitum & influxum impeditum in partes emaciatas, itidem nervorum vel dissectorum, (cujus exemplum etiam habet *Charleton* in sua æconomia animali, exercitat. x. §. 3.) vel compressorum vitio ait contingere.

9. *Cartesiani* partem aliquam *Cartesii* corporis humani Ariditatem prehendi & tabescere affirmant, quoniam debitum ipsi subtrahatur alimentum. Fieri autem hanc nutrimenti partis subtractionem dicunt, non modò quòd illud diversimodè consumatur per diuturniores hæmorrhagias, salivationes, diarrhœas, sudores colliquativos, aliasque succorum extra corpus effusiones, quibuscum materia succo nutriendi destinata simul elabatur; sed quòd illud etiam propter canalium occlusionem, compressionem vel destructionem ad partes pertingere nequeat, aut à reliquiis quibusdam succu affectu vitiosis tubulis poris nutriendæ adhærentibus corrumpatur, aut antequam ad.

ad ipsas istas partes alendas perveniat, jam sit corruptum, & ad nutritionem ineptum. Particulas quasdam viscidiores arterioſas obſtrueri poſſe credunt, ut aliis aptioribus tranſitus, & ad fibras alendas acceſſus prohibeatur, vincula externa ſtrictiora canales ocludere, lympham ſpiffiorem in ductibus ſuis herentem vicinos tubulos comprimere, lapſum, contuſionem, fracturam, & laxationem diſtorquere, compingere, vulnere & ulcera deſtruire, divellere, diſcindere, & erodere, ut ſcjunctorum canalium extremitates fibroſæ in cincinnos abeant, & meatus eorum obturentur, quibus de cauſis omnibus liquori nutrienti tranſitus inpediatur. Hiſce convuſiones adjungunt, & paralyſes, ob quas frequentiores canales diſtorquantur, aut comprimantur. Acutas quasdam lancéolatas, aut ab utroque latere ſcindentes particulas, vel nimium angulares, liquorem nutritionis corrumpere exiſtunt, quod mucronibus, & angulis ſuis partes teretes, anguillares, & ramosas chyli divellant, & fibrulis firmius adhærentes poſteriorum acceſſum, & agglutinationem inpediant, ſicuti utplurimum in vulneribus contingat, dum diverſi generis ductibus diſaceratis & diſruptis ſucci eorum, lymphaticus nempe, nervoſus, tendinoſus, ſanguis tum venoſus, tum arterioſus confundantur, qui in ſe invicem mediantes æthere agentes ſeſe ipſos deſtruant, & dominiũ tandem capiente, lymphæ acidioræ, plures ab eo corrodantur canales, ut ſucci in ebria aliquando effundantur, etiam chyloſas nutrientes ſecum auferendo. Succum nutrientem corruptum ad partem deferri referunt, ſi loco particularum chyloſarum blandiorum, ramoſarum, & teretium diverſæ magnitudinis, multæ angulares, cuſpidatæ, acicularum inſtar, ſive acidæ, & ſalfæ ex ſanguinea maſſa per arterioſarum extremitates ad partem emittantur, quod in ſcorbuticis frequentius obveniat.

ſ. 10. Noſtro judicio omnem Tabem tam univerſalem, quam particularem immediatè conſtituit *frustrata Nutritio*. Quantum enim ad Nutritionem ſpectat, ſcire oportet; primò chylum noſtrum conſtare uniformibus particulis, ſed ratione magnitudinis, & figure valdè diverſis, utpote ex diverſis eduliorum generibus intra ſtomachum preparatum: dein ſciendum eſt, hæſce particulas, ubi per venas lacteas, ac ductum thoracicum ad cordis ventriculos pervenerunt, in illis porro fermentari, attenuari, ac incidi. 3. Perpendendum eſt, maximam in arteriis dari occaſionem illis particulis egrediendi, dum enim ſanguis ex ventriculis cordis magno cum impetu erumpens ex ſpatio anguſto, & latiori ſemper debet tranſire in ſpatium anguſtum, & minus latum, neceſſariò urgebit, & expandet arteriarum tonicas, adeoque & poros earum ſummopere, & amplabit, dilatabitque, per quos facilè negotio particule chyli oleoſæ, & dulces ſanguini innantes, & non dum intimè cum ipſo mixtæ, ea propter ingredi poterunt in ſingulas partes, per quas ſanguis tranſit. Cum autem illæ particule chyloſæ inventunt poros in corporis noſtri partibus, ſuis figuris, & ſuperficièculis accommodatos, illæ herent, & agglutinabuntur iſtis pororum lateribus ſola quiete: hoc igitur modo facilè percipimus, quæ particule chyli nutrientes cum nutriendis coherere queant, quare nonnullæ ex his particulis alimentorum potiùs degenerent in os, aliæ in carnem, aliæ in membranas, aliæ in glandulas, aliæ in pinguedinem, hoc verò non fieri à facultate quadam aſſimilatrice, notum jam eſt lippis, tonſoribusque, quod vobis eabulum nihil ſignificat, quàm ehymeram; neque huic ſatisfacienti, qui ſtatunt, in chylo latitare ſimilem particularum varietatem, quia & nos plerumque, & oſſa, & cartilagineſ & carnes aſſumimus, adeoque hæſ particulas coherere poſſe cum.

*Noſtra ſentia de cauſa Aſtrophia.*

cum sui similibus: huic enim responsioni reponi potest experimento de vacca, vel cervo, qui solo vefcentes gramine, prædictam partium varietatem nihilominus exhibent. Nec isti rem, meo iudicio, acu tetigere, qui statuunt in singulis corporis partibus latitare fermentum quoddam peculiare, quod aptum natum sit alluentes chyli particulas in substantiam convertere similem, ut in poris cartilaginum latitet aliud, quam in poris ossium, in his iterum aliud, quam in poris membranarum, & sic porro. Sed quibus constat Machinam nostram ex meris canaliculis constare esse, maioribus, maximis, minoribus, & minimis, facili negotio hæc explicabit. Nos enim persuasi sumus, opus hoc consistere in eo, prout canaliculi chylum recipientes sunt diversæ magnitudinis vel amplitudinis, liquor crassior recipitur, cum enim chylosæ particulae crassiores inveniunt canaliculas ampliores, hinc nutritur *Cerebrum*, si verò canaliculos constrictiores, & minores transeant chyli particulae subtiliores, tunc membranae & cartilago augmentantur: quando verò transeant chyli particulae subtilissimæ, tunc ossa nutriuntur, hoc modo unus chylus plures potest nutrire partes; quo enim vasa majora, vel minora sunt, chylus recipitur vel crassior, vel subtilior. Duplex ergo statui potest Nutritio, una scilicet, & quidem præcipua, partium fluidarum, altera verò partium stabilium, sive solidarum. Inter partium fluidarum, præprimis spirituum animalium restitutio necessaria est, cum enim valde subtiles, & ad motum faciles, adeoque sphaeram suam debitam, intra quam moveri possunt, semper querunt, hinc indefinenter per sudatoria cutanea, quibus fequet Cutis, innumera, ipsorum quamplurimi auras petunt, & ita præsentia sua illud defraudant, languidumque reddunt, quod post diuturniorem aliquando famem animadvertunt homines, qui exinde animo languuntur; subtiliores enim

sanguinis particulae, quæ eundem debite motu, & mixtura conservare fideliter solebant, jam dudum avolarunt, contra verò cum partes stabiles, & solidæ iuxta se invicem quiescant, per solam enim quietem sunt stabiles.

Quatenus itaque spirituum illorum in corpore nutritio nihil aliud est, nisi continua particularum valde subtilium suppeditatio, cuiuscumque demum fuerint indolis particulae istæ subtiles. Requiritur itaque ad debitam partium solidarum nutritionem particulae tales, quæ leni sua ramositatē, & flexibilitate poris partium variè possunt accommodari, & superficiebus ipsarum applicari, quales sunt blandæ oleosæ, h. e. quæ blandè saltem iuxta se invicem repunt: *Oleosa* dico, nam humide cum nimis sint glabræ, & anguillarum instar lubricæ, eadem, qua poros irrunt, facilitate rursus etiam elabuntur, quod sanè non requiritur, si aliquid partibus apponere debeat, quietem enim aliquam huic concurrere necessarium est. Acidæ verò particulae aqueæ, salinæ, ac amarae magis nutritionem, quatenus talem, impediunt, quam juvant, ut aqueæ quidem, & salinæ, modò non nimis sint acutæ, in tantum etiam aliquid ad nutritionis opus contribuunt, quatenus aliis ramosioribus partim inserviunt pro vehiculo, partim ipsis viam præparant ad partium nutrimentarum poros ingrediendum, seseque superficieculis ipsarum applicadum.

Premissis his, *Anorexia* particularis causam facile eruere possumus, quæ equè ab internâ, quam externa observatur causa. Ut plurimum præcedentem quandam occasionem externam Tabes hæc sequi solet, ob nutrimenti vitium, & ejus defectus, sanguineque tam sanguis propriè dictus, quam chylus non ritè affluit in partem nutriendam. Ob aliquod impedimentum propter arteriæ nempe ad eam tendentis læsionem, & à causa externa compressionem, vel ex luxatione, vel

fractura, tumore duro, &c.

Fit ergo *Aridura* vitio tubulorum, vel canalium, si nempe fuerint obstructi, vel plane rupti, ac abscissi, ut per eos liquor chylosus vel nervus emanare, ac stagnare nequeat, alias comprimendo, & obstruendo parti Ariduram inferre potest. Sic in puella nuper hic observavi, quæ in genu defluxionem, ut vocant, sustinuit, Chirurgus verò imperitus accersitis statim tumorem aperit, ex quo humor stillavit flavus, & paucus remanente tumore, qui Chirurgus nimis audacter eum adhuc seniel ferit, efficitque 6. foramina, sed frustra, tandem resolvablentibus aliis puellam quidem intra aliquot mensium spatium curavit, remanente Aridura totius Tibiæ, adhuc durante. Affectus hic sæpe oritur à liquore chyloso acore imbuto, tenacique, & ad circulationem inepto, canaliculos partis alicujus obstruente, & comprimente vicinos tubulos, hinc succi per eos transire nequeunt. Certum enim est, succum nerveum, seu spiritus animales ex cerebro fluentes, omnesque ramulos nervos toto in corpore replentes, non modo partium nutrimentum dispensare, ut pars nutriendarum suo fungi queat munere, cui libet siquidem notum est, spiritus animales esse distributores chyli: Partis enim nutriendæ est succendiculis illis, per pulsionem & motum oblatis, fibras suas legitime dilatare, quale & quantum ad sui nutritionem sufficit, dispensare per suos canaliculos. Læduntur verò dictæ Nutritionis operationes in *Aridura* artuum, aut ex culpa spirituum, aut eorundem canalium; spiritus enim peccant vel quantitate, vel qualitate: quantitate peccant, ubi insufficiens eorum est copia, & adfertur portio: quod ipsum fit, vel ob senectutem nimiam, vel ob cibos acidum, vel austerum ac crassum præbentes chylum, vel ab inedia, aliisque morbis defunctis, imprimis Paralyti, vel evacuationibus nimis. Item

quando spiritus animales, etiam si in corpore presentes sint, ad alias sepius vocantur actiones, ver. gr. meditationes profundas, curas, moerores, amores, &c. adeo ut in his nimis occupati, & distracti Nutritionis negotio, debita adminicula subtrahant, partesque hac ratione segniss, & insufficienter nutriti faciant.

*Qualitate* peccant etiam spiritus animales, ubi particulæ ipsis admixtæ sunt salinæ, acidæ, ac viscidæ, quæ eorundem motum, & vigorem impediunt, & ipsos reddunt torpidiores, imò aliquando ipsos canaliculos nervos lædunt, quales sunt acres scorbucicæ, narcoticæ spirituum velut extinctoriæ, venenatæ ex fumo arsenici, auripigmenti, ut ita non pridem ex tali fumo instituto Atrophiam hanc particularem in quodam Pharmaceutices studio observavimus. Id quod etiam Metallurgi probant, qui sub quotidiano labore illiusmodi fumos noxios copiosissime attrahunt, hinc artuum debilitates, tremores, contracturæ, & imprimis *Aridura* ipsis obveniunt. Canaliculi omnes, & præcipue ex iis Nervi, eorumque fibrillæ inculcantur merito, quando iidem læsi spiritibus animalibus liberum cursum, vel motum denegant, atque hinc eorundem operationes sensum, & motum, & per consequens ipsam impediunt Nutritionem, & Ariduram partibus inferunt. Notandum porrò hic est, non qualemunque nervorum læsionem statim inducere maciem, & absumtionem, nisi ubi pars prius omni spirituum animalium influxu prorsus destituta sit. Hinc contingit, membrum Paralyticum motu interdum destitui, superstitæ adhuc sensu, & nutritione, quæ nutritio tamen plerumque pravitate quandam habet iundam. Læduntur autem Nervi (1.) quando obstruuntur, vel à particulis acidis, austeris, crassis, stipicis eosdem obsidentibus, & obstruentibus; vel per vertebrarum, aliorumque articulorum luxationem, tumorem, ci-

catricem, aut ulcus vicinum eas prementibus, & sic spiritus animales transcentes suffocantibus: vel quando continuitate solvuntur nervi, ut in vulneribus, fracturis, contusionibus, nec non luxationibus, aliisque stagnationibus succorum acrium accidit; sepe etiam ob defectum nutrimenti exsiccantur vasa quod nutrimentum nunc subtrahitur per nimiam sanguinis, & feri evacuationem, v. gr. immodicum synoviz, & sanguinis effluxum in fauciatis, aut ulceribus, per coitum justo frequentiore, sudores copiosos; nunc ob canaliculos quocunque modo obstructos oritur *Aridura*. Pertinet huc denique defluxus, seu potius stagnatio catarrhalis, quando sc. sine ulla causa manifesta, solum ob feri evasati decubitu, & pressionem in quandam partem, ejusque articulationem, & inde fibrarum ad tendinem, paralyticam flacciditatem, cum sensu doloris obtuso. Fit quoque Aridura membri à dislocatione articuli comprimendis ligamenta, ac nervos, seu observavit *Hildanus* à dislocatione in coxa Tibiæ Atrophiam. A gibbo Atrophiam particularem observavimus. Nervorum ergo & fibrarum læsiones causam Tabis particularis aliquando esse quis negat? Si enim nutrimentum optimum, & sufficiens, ejusdem copia per vias destinatas continuò omnibus æquè offertur partibus, & nihilominus pars una, atque altera marcescit, reliquis adhuc salvis. Ex his dictis constat, quòd Atrophia particularis oritur vel ex defectu succorum, vel eorum lentore, aut ex eorum acrimonia. A defectu, quando sc. vasa, seu canaliculi rupti, vel corrosi, vel ab alia causa violenta distorti, vel compressi fuerint, hinc crispantur, & absque succis in fibras exsiccantur. A lentore, seu pigritie succorum oritur Atrophia hæc particularis, quoniam succi circulantes crassifunt, & in plures parvulos canaliculos intrare nequeunt, ut inde eodem modo collabantur. Ab acrimonia succorum, quoniam ab acri-

bus succis canaliculi hinc inde corroduntur, qui succi effluunt, siquæ stagnant, & si aperta via est, penitus ex corpore emanant, & tunc hæc vel illa pars iis fraudatur. Sic quoque hic affectus oboritur vitio canaliculorum, quando nempe sunt coaliti, vel nimis angusti, vel plane indurati, hinc succis nullus ad partes conceditur transitus, vel si fuerint compressi à variis incumbentibus, hinc ægri ob has causas, & per sequentes, sc. per nimios labores, vigilas, jejunia, sitim, mororem, sudores, nimiam balneationem, violentas purgationes, suctiones infantum, apostemata, ulcerationes, fonticulos, V. S. Hemophysin, & emarcescunt, & patiuntur modò Atrophiam generalem, modò hanc Particularem. Nuper etiam Ariduram brachii observavimus in Lavatrice ex perfrigeratione aquæ frigidissimæ, ubi facta est impedita sanguinis, ac succorum reliquorum circulatio. Remotè plures causæ contribuere possunt ad hunc affectum producendum, quas omnes ob nimiam prolixitatem hac vice recensere superselemus, & ad *Prognosis* nos conferimus.

§. 11. Quod itaque Ariduræ Particularis Prognosis concernit, sequentia observanda veniunt. Ariduræ Particulares ex nervorum, & fibrarum læsione subortæ, plerumque suum reliquo corpori haud impertiunt vitium, nec lethales sunt, sed in principio convenientibus resisti possunt remediis: imò eidem soli parti ad mortem usque fixæ inhaerent, reliquis corporis partibus semper salvis, quo major enim causa, & quo plures simul conjunctæ sunt causæ, eo contumacius, & periculosius malum hocce dicendum erit. Affectus hic est Chronicus, & vel paralytin, vel fracturam sequitur, novimus enim plures, qui membrum aliquod per plures annos emarcidum habuerunt, sepe etiam partes aridæ motum, ac sensum perdunt, hinc etiam hoc laborantes affectu facili in apoplexiam labuntur, vel cadunt in motus convulsivos, ob

*Prognosis.*



ob defectum & inde acres factores, spirituum animalium, & reliquorum succorum. Generosis enim remediis nil proficientibus, metus est, ne tandem gangrana, vel totalis corruptio, Sphacelus nempe insequatur, ubi in tempore cadaverizata pars auferenda, ne vicinis partibus labem communicet.

Si a luxatione & vulneribus Aridura fuerit, curatu est difficilima, & fere sæpe optima eludit remedia, sic etiam cum reliquis comparatum est. In Junioribus faciliores sunt curatu Atrophie hæ Particulares, quam in adultis, & senibus.

§. 12. Perpenſa Prognosi deducimur nunc ad *Pontem Dieteticum*, auxiliis ditissimum, utpote cujus solius beneficio sæpe gravissimi tolluntur morbi, & quo sine etiam ut plurimum frustra laborare solent Medici, ac Chirurgi. Consistit autem *Dietæ*, ceu sæpius dictum est, in legitima assumendorum, gerendorum, & excernendorum concinna administratione, quoniam si illa non ritè observantur, causæ morborum existunt. *Aer* ergo inter ea primas tenet, quo homo in lucem prodiens statim tanquam pabulo viæ utitur, sine quo nec homo, nec animal vivere potest, ceu hoc probari videmus per antliam nostram Pneumaticam, in qua posita animalia exantlato aëre illico moriuntur, imò, quod mirandum, ipsis vegetabilibus, viæ sine aëre perit. *Aer* ergo in Aridura debet esse temperatus; si enim nimis frigidus existit, sanguinem nostrum, reliquosque succos circulates inspissat, coagulat, & ad motum ineptos reddit; quia aer frigidus in se continet multum acidi. Si nimis calidus est, antiam dat ad nimis vehementiores transpirationem, qua subtilissimæ, & volatilissimæ particule sanguinis, & succorum avolant, & restans pari modo crassum, spissum, ac lutosum redditur; præterea omnis calor reddit sanguinem acriorem, efficeatque reliquos corporis nostri succos: nec hic cum

aliis Medicis aerem commendamus humidum, aer enim humidus secum fert penetrans frigus, quod catarrhos, vel potius obstructions vasorum lymphaticorum producit, augetque lympham in corpore, per quam sanguis aquosior fit, ut in circulatione sua potius impediatur, & sic motu suo frustretur. In Atrophia hac potissimum nocet Aer noxiò corrosivusque reſertus acido, vel ab arsenicalibus, sulphureis, narcoticis aliisque venenatis particulis, vaporibus aut nebulis productus, quia corrosivum acidum sanguinem circulantem pro gradu acrimoniæ magis vel minus coagulat, & hinc ad Ariduram disponit, vel eandem incurabilem reddit, hinc eligatur rure aer temperatus, si non haberi potest, arte corrigatur salibus volatilibus, vel suffumigiis aromaticis ac resinosis, ut ex succino, baccæ Juniper gum animæ, mastiche, olivano, &c.

*Cibi* sint facilioris digestionis, optimi lacteique succi, ut corpori languido & membris emacidis robur & nutrimentum inde accedat, per cibos enim & potum succi nostris, qui per urinam, alvum, sudorem ac insensibilem transpirationem quotidie & momentanè consumuntur, refarciendi debent, ita ut ex 8. libris alimenti assumpti quinque per vasa sudorifera avolent, hinc continua reitutio valde est necessaria, si enim particulas per poros corporis continuè egredientes videre poteris, semper hominem nebula circumdatum aspicias. Cibi quoque eligendi sunt, qui ab infantia consueti & saporis nostri grati sunt, gustu enim decipimur, cum ab infantia à matribus cum lacte assumto sæpe depravetur, ut inde multis præjudiciis occæcati simus. Esto ergo nobis generalis hæc regula, quòd omne id, quod circulantem sanguinem ac succos in motu suo impedit, crassum, pingrum, lutosum ac viscidum acremque reddit, simulque coagulat, summè noxium existat, hinc tria hæc

hæc vitanda sunt, *Acidum* nempe, *falsum*, ac *dulce*. Hæc enim viscosa, utut falsedinem massæ sanguineæ optimè inviscare valent, vitentur, quia exilia vasa infarciunt, glutinant, chyli aliorumque succorum transitum denegant, ut inde partes corporis, ubi obstructio facta, tabescent; facile ergo quilibet eligere potest ea, quæ multum satis volatilibus in se continent, uti sunt omnes carnes, imprimis leporinæ, ac cervinæ janiore, vitulinæ, ac bovinæ, &c. quæ multum præbeant salis volatilis; sic Pharmacopœus quidam ex integro cervo 100. lb. pendente, libras sex salis volatilis more chymico elicuit, & collegit. Assumantur ergo carnes quævis recentes non salisæ, vel muria confectæ, vel fumo indurata, quæ nullum præbent nutrimentum, sed potiùs sanguinem, ac succos inspissant. Eligantur lac, & ova recentia, quæ in Atrophiciis maximi sunt usus. Vitentur omnes fructus acidi, inter fructus verò concedi possunt nuces juglandes, avellane, amygdalæ dulces, pistaciæ, pineæ, &c. sed de his jam satis alibi egimus.

*Potus* quoque emaciatos reficit, succosque nostros fluidos reddit, ad quod præprimis commendamus potum Theæ cum lacte, vel calidum Capheæ, vel etiam Chokoladæ: in consuetis concedi possunt cerevisiæ, pingues, ac temperatæ volatilibus alcalibus imprægnatæ herbis præstant; alii laudant decoctum hordei cum passulis, & lign. santal. citrin. vinum Gallicum minus acidum non austerum modicè potum conducit, quia spiritus animales incitat ad fores clausas aperiendas, ubi spiritus languent, vinum Hispanicum concedi potest. Vitanda verò sunt omnia vina acida, ut sunt omnia Rhœnana, Bæcharacensia, Mosellana, generosa tamen, quæ dulcedinem præ se ferunt, admitti possunt, & quidem in consuetis, quia vina hæc in se continent acidum intensum, quod omnes succos nostros, qui sunt lacti, vel cremori hordei similes, in corpore nostro, uti lacti

affusa coagulant, & sic obstructiones tubulorum pariunt, totamque œconomiam nostram pervertunt, melius ergo vina conducunt alcalica, quale in districtu Hanovienfi Sancti VVilhelmi dicti crescit, quod vinum maximè sanitati conducit, cum acidum non in tanta copia, ac alia vina in se continent; vitandæ verò sunt omnes potationes, & ingurgitationes ejuscunque potus, hæc enim ratione ventriculi tonus, & fermentatio destruitur, massa sanguinea nimia crudicatum accumulatione vitatur, spiritus debilitantur, quid igitur mirum, si corpora bibonum emarcescant?

Quoad *somnum*, ac *vigilias*; somno ager indulgeat longiori, & corpus quiescat, nec motionibus, curis, mœrore, terrore, metu, ira, meditationibus, amore, nimiove Veneris usu enerventur artus. In tubulorum quorumvis nutrimentum vehementium, nec non nervorum obstructionibus tabificis referendis, multum conducit *Motus*, moderatus tamen, non enim sit laboriosus.

*Alvus* nec sit nimis adstricta, nec laxa nimis, oblita verò officii sui, quod tabidis solenne est, per blanda solutiva tantum, vel melius spirituosius ascalicis, & absorbentibus admoveatur.

Uno ut comprehendamus verbo, quæcunque ad nutritionem ritè promovendam, sanitatemque tuendam alias requiruntur, summa opera tabidis observanda sunt, contraria vitanda. Nutritio enim est vitæ conservandæ medium cum quovis subiecto, illa desinente, ipsa etiam vitæ desinit; rare enim, & ut plurimum fictitiæ sunt illæ abstinentiæ diuturnæ exempla, inidè rarissima est historia illa, quam recenset D. Boissot Abbas S. Vincentii de Jacobina Nicolet, quæ intra 34. septimanas nihil comedit, & potavit, qualis inedia qui plura exempla desiderat, addeat Paul. Lentulum de Iædia prodigiosa Apollonia Schreiera. Consecrantur etiam Licetus de Ferris altitricis animæ, & Pechlinus de se-

ris, & alimenti defectu.

*Atrophia curat. ratio Jacobi Galenicus.* §. 13. Data sic Dieta, restat ut Therapeiam quoque subjungamus, & quidem priusquam nostram aperiamus sententiam, aliorum affectui huic medendi rationem praeferemus, inter quos ob vetustatem *Galenici* primus conceditur confessus, ac locus, vota sua profecendi.

In *Aridura* ergo membri alicujus eò insudant, ut hepatis intemperies corrigatur variis hepaticis in eum finem internè propinatis, si verò *Atrophia* fuerit ab obstructione pituitosa, materiam hanc preparant, & dein variis exhibitis phlegmagogis eam evacuant, dein accedunt ad roborantia; quandoque & ex naturæ, deastræ ipsorum, partis vicio, & adstrictioribus linteis id accidit; ut quasi sideratum & marcidum membrum affectum gracilescat. Quandoque etiam ex *Atrophia* partis. Omnia igitur hæc in melius commutanda esse ajunt, cum toti corpore prospiciatur optimis alimentis. In affecto membro instaurandam esse vitam jubent, laxandam esse deligationem strictiorem, & attrahendum, vel alio modo eò adigendum esse sanguinem. Laudant ergo in eum finem dropaces, sinapismos, moderatamque temperatæ perfusionem, idoneas frictiones, præterea commodam deligationem, sed contrà quàm in Fracturis. Marcescente enim tibia, femur superius alligant ab inguine ad genu deducta fasciæ, atque initio quidem arctiorem paulatim relaxant; ut à communibus venis; quasi rivis adeo usque sanguis exprimatur. Femore dextro contabescente, vel toto crure, sinistro femori fasciæ injiciunt, à genu ductis orbibus, adstrictius quidem, qui cum desinant in inguine, hic etiam ita constringunt, ut pars aliqua sanguinis in gracile merbrum derivetur. Ea autem ratione temperant deligationem, ut neque dolorem creet, neque universum alimentum à parte incolumi reprimat. Eandem rationem servant in

superioribus membris. *Guil. Fabr. Hildan.* brachii *Atrophiam* insucatione decocti Caput, & intestinorum vervecum, vel vituli; & sudione per cucurbitulam corneam arteriis, & venis majoribus appositam curavit. Hinc *Hildani* curam sua experientia *Tulpius Observ. lib. 3. c. 49.* confirmat.

§. 14. *Paracelsus* in *Aridura* membrorum commendat varias *Vulnerarias* potiones, ex.gr.

*R. Flor. spica Mj.  
hypericonis Miv.  
taxi Mij.  
betonica,  
centaurea,  
prunell. aa. Mß.*

*prepara secundum usum de spica dictum.*

Commendat externè medullam osseam, & pinguedines animalium, item medullam humanam, ac pinguedinem, item unguenta ex resinis odoratis, & balsama varia, ex.gr.

*R. Galban. Bß.  
terebinth. Biiij.  
olei laurini,  
olivarum aa. ßiiij.*

*F. oleum, quo mane vespereque utitur.*

*Vel:  
R. adipis vulpis,  
taxi aa. Bß.  
mumia de medullis ßiiij.*

*F. Unguentum.*

§. 15. *Helmontius* in *Curatione Aridurae membri* eò tendit, ut vis distributiva non aberrat, in quem finem laudat internè elementum perlarum lacteum, externè adipem, & mumiam humanam cadaverum violenter mortuorum. Sunt ex sequentibus ejus, qui ad membra consumpta, & contabescencia brevi tempore rescindienda balneum instituunt ex foliis salicis, illudque singularibus condecorant encomiis.

§. 16. *Villisi* in *Aridurae membro* *Vidissimum* subvenit salso-acidam sanguinis dyscrasiam corrigendo, sulphurumque acrimoniam temperando, decoctum lignorum statim prescribit, & si *Aridura* à febre hectica oritur, passu-

passulas lignis adjungi jubet, quippe quæ summæ sunt efficaciz in hætica, Perlas, & oculos canc. hoc in casu inter alia commendat, pluribusque etiam extollit lãstucam, nymphæam, endiviam, cichorium, &c. Lactis usum in Aridura magnificat, æquæ ac omnia lãsticina. Topica verò Medicamenta internis affociat, adeo ut earum ope fibrarum nervearum obstructions reserari possint, quales sunt spiritus lumbricorum terrestr. Lavendul. Juniper. Sal. armon. cum calce viva parat. &c. mirz est quoque virtutis arcanum aluminis cum linimentis, & pinguedinibus appropriatis applicatum.

*Sylvium.*

§. 17. *Sylvius* particularem Atrophiam fieri asserit in determinatis tantum partibus, Artubus præsertim, eamque ex arteriarum, vel nervorum soluta continuitate oriundam incurabilem pronunciat: Sin ex arteriarum obstructione causam ducat, ea sublata, eam tolli asserit, in quem finem omnia ea Medicamenta commendat, quæ non tantum humores glutinosos incidunt, sed & educunt, humorum glutinositatem juxta ipsum corrigunt, & emendant, omnia aromatica & sale volatili abundantia, qualia sunt inter radic. calam. arom. levisitic. galang. & aperieat. pyrethr. raphan. gentian. zarzaparill. Cortic. Tamarisci, cinam. macis: fol. card. bened. calaminth. meliss. rorismarin. origan. absynth. scord. petrosel.aturej. majoran. pimpinell. serpill. sem. anis. scenicul. carv. cardam. cubeb. gran. paradif. nasturt. eruc. salia volatilia, C. C. urine, sal. armoniaci sangu. hum. olea varia, & quæ sunt talia plura. Ex quibus variz formulæ pro Medici intentione, & ægri palato formari possunt, ex.gr.

*R. aqu. meliss.*

*card. bened. 22. 3 i ss.*

*Oil. Matthiol. 3 ss.*

*Spir. sal. armoniaci gr. xv.*

*ol. macis still. gr. iii.*

*Syr. & rad. 3 i.*

*M.*

Capiat eger subinde hujus mixturæ

cochleare unum, vel alterum. Humorem glutinosum quodammodo correctum si abundet, evacuat colocynth. hermodactyl. Merc. dulc. gum. var. ex.gr.

*R. Gummi. sagapen. cum acet. mund.*

*& in pissinat. 3 ss.*

*trochisc. albandal. 3 ss.*

*Mercur. dulc. gr. xv.*

*M. F. Pil. N. xv.*

Exhibeantur ægro manè.

Atrophia quæ arteriarum compressioni, ex tumoribus, luxationibus, & cæteris talibus vitiis adscribitur, iis curatis nutrimentum partibus denudò concedit.

Si ex nervorum compressione ab humore pituitoso, circa medullam spinalem, vel alibi hærente, præter jam dicta, incidentia, & attenuantia interna, etiam externa usurpat Cataplasmata, unguenta linimenta, Emplastra, & alia plura, ex.gr.

*R. Ung. martiat.*

*dialthaa. 3 j.*

*ol. Philof. 3 iij.*

*succin. 3 j.*

*M.*

Emplastra nervinz & ex gummi parata magnificat.

§. 18. *Cartesium* restitutionem alimentis maximam partem curationis *Ariduræ*, sive *Atrophie* particularis existere docent, quam pro causarum varietate diversimodè impetrare student. Defectum enim chyli nutrientis supplere aggrediuntur remediis digestionem in ventriculo, & distributionem ejusdem succi per venas lacteas promoventibus, ut magna satis copia, in massam influat sanguineam, atque ex eadem omnibus partibus equè communicentur, qualia existere putant, quæ particulis abundant spirituosos, salinis, volatilibus, & oleosis, mentham videlicet, & ex ea paratam essentiam, nec non essentiam rorismarini, zedoariæ, spiritum salis armoniaci cinamomifatum, tartarum solubilem, aliaque stomachica, præsertim famosum illud specificum stomachicum *Poterii*. Ne verò frustra urgeatur distributio, etiam prospiciunt, ut alimentis facilis digestio-

*Cartesium  
norum cu-  
ratio Ari-  
dura.*

nis & multum nutrientibus debita chyli suppeditetur copia, quapropter iuscula carnum juniorum animalium, & ex lacte parata approbant. Sed quamvis in reliquis corporis artibus nulla sentiat penuria, in certa tamen parte illa nutrimenti contingit defraudatio, eo quod canales & tubuli illius non satis sint dispositi ad transicum particulis nutrientibus concedendum, operam locant, ut in specie ductus hi particulares referentur, & proinde omnia removeantur obstacula, quæ succorum influxum possunt inhibere. Crassiores itaque & viscidiores illas partes sanguini immistas, & arteriolarum extremitates obstruentes attenuant & resolvunt tum internis spirituosus & volatilibus, sudorem excitantibus, & omnes succos fluidiores reddentibus, tum externis poros facile penetrantibus, fibras agitantibus, & contentos in canalibus liquores ad motum suscitantibus. Vincula etiam membra nimis stringentia relaxant, fracturas uniunt, sanant, & partes luxatas in situm debitum restitunt, easdemque ferulis coercent, ne denudò excidentes vicina vasa & tubulos comprimant. Ut autem liquorum motus promoveatur, & canales debite ab iisdem expandantur, sequens vinum medicatum magno exsistitum esse dicunt auxilio.

*R. Rad. Levistic. Ziii.*

*Angelic. Zii.*

*caryophyllat.*

*Imperator. aa. Ziiiß.*

*Herb. menth.*

*salv.*

*origan.*

*sol. rosmarin. aa. M.ß.*

*rasur. lign. colubr. 3ß.*

*flor. cheiri P.iß.*

*bacc. lunip. Ziii.*

*cardamom. min. Zi.*

*cinamom. acut. Zii.*

*armoniaci depurat. 3ß.*

*F. Species pro Nodulo uni mensuræ vini impendendo.*

In Convulsionibus & paralyti huic morbo præcedaneis prioribus speciebus adiungunt majoranam,

*Tomus II.*

rutam, betonicam, flores lavendulæ, baccas lauri, & sal volatile cornu cervi frequentius exhibent. Promovent etiam sanguinis & liquoris nutritis in partem influxum remediis externis, ut à debita succorum copia canales compressi sufficienter dilatentur & amplientur, vel distorti in convenientem disponantur situm, eaque propter haud contemnendas esse affirmant frictiones panno lanco calido, vel foliis & semine urticæ, quibus præmissis partem illiunt oleis penetrantibus ex castoreo, Philosoporum, etucæ, teræ, terebinthine, saponis, vel spirituosus, quale sequens infusum existit, magnum hoc in affectu exhibens commodum.

*R. Herb. abrotan.*

*ruta,*

*origan.*

*salv.*

*sabin.*

*menth. saracen.*

*sol. rosmarin. aa. M.ß.*

*flor. chamomilli Roman.*

*lavanda vel spic.*

*cheiri aa. P.i.*

*Rad. ari Ziii.*

*pyrethr. Zii.*

*levistic. 3ß.*

*bacc. laur.*

*lunip. aa. Ziii.*

*pip. Ziß.*

*zingib. Ziß.*

*lumbicor. adbuç vivor. Zi.*

*formicar. viv. 3ß.*

*castor. Zi.*

*euphorb. 3ß.*

*Sem. eruc. Zii.*

Debite apparatus affund. Spir. vini. f. q. in vitro ad eminentiam 6. digitorum, stent in loco calido per aliquot dies & noctes, postmodum membrum aridum aliquoties in die calide liquore hoc illinatur. In defectu hujus infusi aliquando Simpliciores spiritus in usum ducunt, quales sunt spir. lumbicorui, formicarum, Juniperi, angelicæ, essentia castorei, aqua Anhalidina mirabilis, & similes. Nec unguenta contemnunt, præsertim quan-

do post vulnus vel ulcus niagnum & diuturnum plures canales sunt destructi, ut fibris emollitis, ex vicinis tubulis & canalibus liquores majori influant copia, & membrum sufficientibus succis irroretur, qua de causa sequens unguentum in Ariduris hisce auferendis, & nutritione promovenda summo-  
pere depradicant.

*g. Vngu. alib. 3viii.*

*arregon.*

*martiat.*

*agripp. aa. 3ß.*

*Ol. laurin.*

*Iunip. & baccis aa. 3ß.*

*lign. 3ß.*

*lumbrie.*

*castor.*

*Petra R.*

*spica,*

*hyperic. aa. 3ii.*

*axung. taxi,*

*ursi*

*canis*

*porci*

*mur. mont. aa. 3i.*

*homin. 3ß.*

*sev. cervin. 3i.*

*pulv. pip. nigr. 3iii.*

*emphorb.*

*pyrethr.*

*alum. plumos. aa. 3ii.*

*cera citrin. 3iii.*

*M.*

Salibus fixioribus referta massa sanguinea in scorbuticis volatilia interna & externa scorbuto convenientia in usum ducunt ex cochlearia, nasturtio, armoracia, semine erucæ, sinapi, raphani, non omisis antea internis porosioribus & alcalicis, quibus sales acutiores facile adhæreant & ab iis corrigantur, oculis scilicet cancerorum, ebo-  
re Philosphicè præparato, co-  
talliis præparatis, antihectico Poterrii, antimonio diaphoretico, nec non arcano duplicato, singulari in hoc affectu remedio. Foris sequens adhiberi potest mixtura spirituosâ & balsamica.

*g. Spir. Iunip. 3ii.*

*lumbrie. 3i.*

*spir. cochlear. 3ß.*

*armoniaci 3ii.*

*Essent. eruc. 3ß.*

*ol. destil. Camomill. Kom. 3ß.*

*lavandul. gt. viii.*

*rorismar. gt. vi.*

*M.*

Nec debitas suas hic detrahunt laudes balneis & thermis sulphureis & bituminosis, quibus membra arida sæpius immergi & foveri volunt iisdem, easque adhuc judicant præstantiores, quæ ex terra proveniunt, multum aluminis plumosi in se continente, ad quarum indolem accedere videtur fons ille medicatus ante parvum temporis spatium in Hassia nostra in agro prope Schencklensfeldiam prosilire observatus, cujus usu aliquot jam reconvaluerunt. Potest tamen harum suppleri defectus aliis quibusdam artificialibus, incoquendo scilicet aquæ communi vel pluviali herbas nervinas, huicque decocto adjungendo sulphur crudum, bitumen & alumen scissile sive plumosum, quod tum pro totu & balneo salutariter adhibebitur. Sparadrappam nonnunquam imponunt arido membro, ut fibræ non tantum emolliantur, sed aer quoque arceatur noxius, ne per poros ingrediatur, nec liquores resoluti tam citò exhalentur, qualem sequenti consiciunt ratione.

*g. Resin. pini,*

*cera,*

*sebi hircin. aa. 3iiiß.*

*Dissolvantur super prunis, &*

*immisceantur pulv. sem. hy-*

*per. 3ß.*

*Coquantur invicem, & tela li-*

*nea Mixtura huic immerga-*

*tur.*

quæ siccata parti tabescenti post solum & inunctionem commodè imponatur.

§. 9. Perspecta itaque aliorum Cura, operam dabimus, ut illud etiam, quod Particularem Atrophiam produxit, quantum possibile, auferamus, sinemque sic artis, quæ sanitas est, assequamur. Cura ergo, nostro iudicio, diminutionis hujus tabificæ restitutionem, mediante nutritione ac quasi regenera-

*Nostra  
Ariduram  
curandi  
ratio*

tione



tione in carne , pinguedine , &c. præcipit: quod si itaque massa sanguinea orbata , sit succo nutritio sive chylo à morbis exantelatis , ille reparetur cibis , qui in succum ac sanguinem facile converti possunt , & multo alcali & sale volatili sunt referti , ceu jam superius de *Dieta* ad nauseam diximus . Et cum ut plurimum obstructio tubulorum vel à luxationibus , vulneribus , fracturis , contusionibus aliisque compressionibus externis oborta , tolli debeat , quibus enim sublati & curati , & tollitur inde producta Aridura , de horum prædictorum effectuum curationes suo loco agemus . Si ergo ab obstructione nervorum , aliorumque tubulorum à succis crassissimis viscidis ac lutosi oborta , omni studio eò collimandum est , ut hæc auferatur , & , si concurrat visciditas ac aciditas , conveniunt hoc in casu præ aliis absorbentia sudorifera blandiora ac incidentia , quæ sanguinem cum reliquis succis attenuant , spiritus augent , eosque volatiliores reddunt , sicque obstructionem tubulorum tollunt : conducunt ergo sal. C. C. volat. succini , sal. volat. oleos. liq. C. C. succin. spir. sal. armoniaci succin. imprimis verò spiritus noster Catarrhalis , & spiritus C. C. cum sal. tart. paratus , vel spir. matric. fuliginis , Essent. castor. Zedoar. viperar. lign. aloes , spir. Eboris , lumbric. lil. convall. cochl. urin. formicarum , quæ æquè internè ac externè usurpantur possunt , & , si acidum coagulans adfuerit intensum , magnetem acidum commendamus , Cinnabarin scilicet antimonii & nativ. pulv. spasmod. n. d. specif. ceph. D. M. mercur. dulc. in obstructionibus referendis egregium remedium , quod etiam aliis addi potest remediis . In Juniorum gratiam unam & alteram communicabimus formulam .

Rx. Spir. Matricalis ℥iij.

Sal volat. oleos. ℥iij.

M. & assumuntur 30. usque ad 60. guttis .

Incidentia varia interponenda sunt Tartarea , armoniacalia , & ex her-

bis atque radicibus aromaticis vel forma vini medicati propinanda , vel forma Essentie exhibenda .

Dein Cura eò dirigatur , ut promoveatur spirituum animalium influxus , tollendo obstructionem , & hinc simul sanguis ac reliqui succi , ad partem quo reparetur sufficiens nutritio pellantur , in specie habenda est ratio , an cum solutione continui & effluxu nutrimenti inducta fuerit Aridura , an verò sola læsione vel obstructione sine continui solutione , sive hæc à vi externa facta fuerit , sive ab interno lymphæ acidæ decubitu , in quem finem acidum absorbentia interna conducunt , ut oculi cancr. Ebar. , C. C. aliaque corpora terrea , & insipida , quæ salum acutorum acrimoniam obtundunt , ut corallia , crystall. mont. testæ conchæ , in ditioribus margaritæ , unicornu , beyoar , &c. ex mineralibus Sal saturni , Antihæsticum Poteri , antimonium diaphor. Balsamea volatilia oleosa hic apprimè prosunt , quatenus spirituum animalium influxum promovent , tubulos obstructos quoscunque aperiunt , Balsam. noster nervinus , item volatilis noster contra Atrophiam egregius est , quo plures inveteratas sustulimus Ariduras artuum . Conveniunt etiam spir. meliss. fl. tunicar. lil. convall. lavendul. rosar. fl. liliz , salv. anthos , sive ex florib. rosmarini titulo aq. Regin. Hungariz notissimus .

Si particulæ salinæ terrestræ obstructionem tubulorum causantur , & sic Atrophiam inducunt particularem , in eum finem diuretica laudamus , quæ simul visciditates incidunt , ut sunt spir. sal. armoniaci , succ. liq. tart. foliat. spir. Juniper. lumbric. asell. pil. Terebinth. cum salib. &c.

Purgantia verò quæcunque , ut ferè ubivis , sic & hic atro notamus catbone , quæ in Aridura angue pejus fugienda sunt , quia malum potius augent quam demunt , dum succum nutritium , aliosque ad nutritionem necessarios eliminant . Sic quoque hic improbamus venesectionem ,

nem, quoniam hēnoptoici in ariduram incidunt, & videmus eos, qui diarrhœa laborant diuturna, faciliē tabescere.

Nec hic Topica varia negligenda sunt, quibus solis sæpē malum tollimus, quare pro tubulis quoquo modo obstructis rursus aperiendis & ampliandis, atque sic in statum ordinarium revocandis, instituantur frictions cum pannis asperis succino fumigatis, vel singulis septimanis bis vel ter parti affectæ apponantur 7. aut 8. cucurbitulæ cum flamma, absque tamen scarificatione, illæque relinquuntur, donec rubescat cutis, tunc applicentur varii liquores illinendi & infra dicendi. *Tulpius* Ariduræ nil melius esse scribit, quàm ut mediante Cucurbitula cornea, & per hanc instituto suctu, juxta arteriarum cursum, nutrimentum, ut ille loqui amat, rursus attrahatur.

Si cum effluxu nutrimenti aut Synovix post vulnera insigniora accidit Aridura, huic profunt foci externi partis aridæ, cum decoctis emollientibus & nervinis volatilibus ex animalium partibus paratis. Sunt, qui partes emacidas illinunt pinguedine hominis aut vulpis, lupi, canis, taxi vel ardæ, aut castor. vel ranar. lumbricor. Juniperi, apprimē tamen hic conveniunt ol. succini, anthos, spicæ, petræ alb. &c.

Si verò Aridura fuerit ex paralyssi, vel a fortiori contusione aliaque compressionē, post frictions partium deorsum versus institutas linimentum applicari potest sequens vel simile.

*℞. Ol. laurin.*

*ungu. mart. aa. ʒi.*

*ol. Juniper.*

*hyperic. aa. ʒiʒ.*

*alumin. plumos. ʒi.*

*ol. sabin. dest. ʒiʒ.*

*petræ alb. ʒi.*

*M.*

Partes emarcidæ cum pannis asperis & calidis fricentur sæpius, præsertim in casu, ubi Ariduræ membri sensus fornicationis aut stuporis una adsit spir. lumbricorum etiam, im-

primis essentificat. & cum spiritu formicarum & sal. armoniaci volat. vel succin. vel lavendulæ. vel anthos. junctus hoc in casu mira præstat, quæ volatilia spirituosa omnem implent paginam.

In Aridura imprimis in cā, quæ oritur à catarrhali lymphæ effluxu sequens proderit.

*℞. Sem. urt. ʒʒ.*

*rad. aronis*

*angel. aa. ʒv.*

*pip. long. ʒiʒ.*

*assund. his spir. matric. lbi.*

*add.*

*Spir. lumbric.*

*urina aa. ʒi.*

*armoniaci aromat. ʒʒ.*

*ol. caryophyll. ʒʒ.*

*M. qua mixtura illinantur partes emarcidæ:*

*Vel:*

*℞. Infus. arthrit. ʒiʒ.*

*spir. lumbric.*

*formicar. aa. ʒʒ.*

*liq. C. C. succin. ʒi.*

*Aq. calc. viv. ʒiʒ.*

*M.*

*Vel:*

*℞. Liqueur. lumbric. terr. per de-*

*liq. in elibano parat. ʒiʒ.*

*Aq. calc. viv. ʒi.*

*M.*

*Vel:*

*℞. Succ. lumbric. c. aq. Reg. Hun-*

*gar. express. ʒiʒ.*

*ol. de ranis ʒi.*

*M. & agitentur optimè quo illinatur pars arida.*

Ex foci sequenti plures restituti sunt,

*℞. Herb. mairan.*

*trifol. fibr.*

*salv.*

*spic. aa. M. i.*

*fl. chamomill.*

*melilot. aa. M. ʒ.*

*sem. cumin.*

*fenicul. aa. ʒi.*

*Sal. armoniaci ʒi.*

*Tart. ʒvi.*

*Dantur incisa ad chart.*

*Coq. in aq. communi pro foci.*

Dein Emplastro de Labdano artubus emaciatissimis impositis curavimus plures, ob partes enim volatiles.

*gum.*

gummosas maxime resolvit, sicque obstructions pertinaces referat, & sic spiritibus animalibus transitus rursus conceditur, in quem finem alia etiam emplastra ex volatilibus & gummosis parata conducunt, imprimis Nostrium de Thea. Sic quoque Thermae sulphureae & nitrosae conducunt, vel artificiales possunt parari, quae saepe magnam praestant emaciatas opem, in quibus varia animalia ut canes juniores, item pedes agnorum & vervecum, adjectis formicis, lumbricis, aliisque pluribus sale volatili abundantibus. Balnea enim haec & totus ideo juvant, quatenus scilicet particulae quaedam volatiles, & dulces ex herbis coctis redundantes communicantur succis per vasa illa partis Atrophia infectae circulantibus, quo fit, ut obstructions referentur & nutrimentum cum spiritibus iterum affluere possit. Balnea ergo sunt, seu dictum, ex decocto capitis & pedum vervecis, vel cervi, vel ex herb. origan. majoran. malv. alth. betonic. flor. lil. fol. salicis, salv. rorismar. &c. parata; vel fatus ex ejusmodi herbis concinnatus, ex quo prodeuntem vaporem excipiat membrum aridum, quo solo totu plures vidimus curatos, additis nimirum scoriiis Reguli antimonii, vel instituantur suffumigia varia ex succin. alst. foetid. castor. oliban. mastich. & pluribus aliis, quae saepius plus praestant, quam unctiosa & pingua. His jungendae sunt frictions cum fumo succini, vel pannis asperis institute, & calidioribus, vel etiam pelle vulpina foveantur. Alii pro totu utuntur cane, cum scilicet ejus, vel etiam alius animalis adhuc viventis Thoracem aperiunt, eidemque retorridam immittunt partem, idque aliquoties repetunt, donec pristinum parti robur & augmentum redierint. Immittunt alii artum emarcidum in lte coctae, sive reliquis post coctam cerevisiam (Tribena) saepiusque reiterant. Hartmannus commendat spiritum

mellis singulari modo paratum, atque, mirabili etiam potestate valere in restituendis Ariduris aquam fluviatilem, quae inter aquandum ex ore equotum generosorum, postquam biberint, profluere solet, si nempe diligenter colligatur, & potanda manet & vesperi detur, sed de hujus exoptato effectu valde dubitamus. Melius ergo, cum imprimis malum fuerit ab obstructione nervorum aliorumque tubulorum, conveniunt spir. uosa nervina, ut Ballam. Nervin. m. d. spir. salv. aq. Regin. Hungar. vel spir. fl. anth. succinat. astrum nostrum cephalicum; sal. volat. arnioniaci urinosi. aliaque saepius illita. Felix Wurx arcanum suum solanis aliis unguentis aut pinguedinibus mixtum commendat, quo omnem Ariduram particularem promptissime curari asseverat. Emplastra ex gummatibus, imprimis de Labdano, de Thea, & omnia, quae salibus volatilibus praedita sunt, gummata vero non in acet. sed spir. vin. dissolvi debent, nec multum ceræ aut resinæ Emplastris addantur, vel ceratum nostrum de Cumino, vel aliud pro picatione in Atrophia membrorum, ex quacunque causa probatum est. Spiritus quoque sequens ad Ariduram egregies est.

*℞. Fl. lavendul.*

*cheiri*

*fl. hyperic.*

*lil. corvall.*

*chamomill.*

*herb. menth.*

*origan.*

*sarracen.*

*rorismar.*

*Spic. aa. M. ii.*

*Infund. in spir. vin. Gall. stent per mensem in digest. dein colentur cum forti expressione, servetur ad usum, quo spir. membra arida aspersione. Convenit etiam hic ol. animale, quod superius in Oesophagi Paralysi communicavimus. Sic quoque Penemontanus de Secret. l. i. p. 38. modum parandi oleum ex cane russo laudat, quo quendam sanavit, qui*

per 11. annos brachium instar ligni aridum habebat.

*Platerus* sequens magnificat, quod haud contemendi usus est.

*℞. Summit. fabin.*

*Summit. Iuniper.*

*fol. levistic. rec. aa. M. ii.*

*fl. chamomill. P. ii.*

*gran. Iuniper. virid. P. iii.*

*concl. & contus. add.*

*ol. laurin.*

*lil. alb. aa. q. f.*

*axung. porcin. ℥ i.*

*Aq. vitæ ℥ ii.*

*Coq. omnia ad consumptionem humiditatis, coletur exprimatur quæ,*

*add.*

*ol. spica ℥ ii.*

*pulv. sem. sinapi ℥ ℥.*

*rad. pyrethri ℥ iii.*

*piper. long. ℥ ii.*

*Cera q. l.*

*M. f. Unguentum.*

Alii sunt, qui succum urticæ membro arido sepius illitum magnæ stimulant. Rarum est exemplum *Tulpii Obs. Med. 49. l. 3.* quod Atrophia membri suctu sanata sit.

## CAPUT II.

### De ulceribus & Fistulis.

#### §. 1.

**V**T è quinaria Chirurgicorum affectuum classè ferè nullus *Ulcerebus*, ita ex *Ulcerebus* nullum *Fistulis* accuratior considerationem meretur, juxtaque Chirurgum non vulgare, aut barbitonforem, aut balneatorem, sed dextrum & benè exercitatum, imò ipsum Medicum postulat. Adsertum hoc roborat frequens horum Chirurgastrorum utplurimum imperitiæ debitus proventus, nec non difficilis, si planè impossibilis curatio, unde à vulgaribus *Ulcera* & *Fistulas* ad *Divos* relata esse, quod horum ope indigeant *Petr. Forestus l. 7. Obs. Chir. 16.* existimat, memorabiles ad 5.

*Eligitum Guido de Cauliaco*, cum gentilibus remittit, *Chir. magn. tr. 4.* nec non balneatores & Carnifices, qui hanc artem in contemptum Chirurgorum ac Medicorum turpiter sanè exercent. Imò hisce in locis ad fascinum impiè confugiunt, dicuntque, *Cacodamonem*, modò solum, modò ministrantibus ejus mancipiis sagis & veneficis, *Ulcera* seu *Fistulas* efficere, ut non ità pridem Carnifices quidam ob *Fistulam* talem curatam sed infeliceiter, ad hoc contigit excusationis asylum. Sed quàm rectè hæc sint dicta, quilibet videt, & omnia hæc rident, quibus causa & cura *Ulcerebus* ritè perspecta ac cognita sunt. Qui Carnifices, non verò Medici, uti quidam existimant, meritò *Roma* expulsi fuere, & adhuc hodierno tempore non in Republica benè constituta tolerandi essent, qui tantum ad tormentum generis humani artem istam exercent. Eapropter incitat Nos communis hominum salus, uti in *Ulcerebus* & *Fistularum* veras causas, signa, & curationem rationalem paulo penitiùs inquirere constituiremus, ut clarè & distinctè ut plurimum absque veneficiis appareant.

*Ulcus* Græci *ἔλκος* vocant, vide *Vleus*. tutque nomen Latinum à Græco deductum esse, dicitur & *Helcus*, *Hulcus*, *Helcosis*. Germani dicunt *ein Geschwür*, oder *alter Schade*. Statim autem ex jam dictis abundè patet, mihi in præsens rem esse cum *Ulcerebus* continui solutionem ab æribus succis stagnantibus, in quibuscunque corporis partibus & tubulos seu canaliculos discindentibus seu corrodentibus factam, & ejusmodi *Ulcera* diversa producentibus. *Ulcus* enim nihil aliud est, quàm solutio unitatis vasorum & sepe eorum osculorum, per quæ, & ex quibus succis, imprimis verò *chylosus* effluit, qui simili modo ad alias manat partes, easque partis mollis pariter ac duræ perluit, corrodit, absumitque substantiam; in quo consistit essentia *Ulcerebus*.

*Ulcus* differt secundum rapturam & cor-

& corrosiōem vasorum vel majorum vel minorum, item si Ulcus occupat vel membranas, vel alias partes sive canaliculas, hinc etiam varii effluunt succi. Inter doctrinam Ulcerum possunt jure meritoque *Fistula* recenferi, quæ tantum paucis ab Ulceribus differunt; *Fistula* enim dicitur illud ulcus, quod arundinis instar, fistulosum est, partem, quam occupat, penetrans, corrodensque, & fistulas cavitare sua immutans, præsertim musculorum, quæ ut in superiore parte foramen angustum habent, ab inferiore latius, ita hæ ut plurimum os strictum formant, in profunditate in latum extenduntur. *Vlcera* inde Medicis *fistulosa* dicuntur, Spagiricus *Vlcera salis petrae*, & Idiotis divi *Quirini foramina* audiunt, Græci *στυγία* eodem cum Latinis jure, item *Teknia* à callo nominant Germani appellant fistulas *Rohr-oder Hobl Geschwulste Rohrlocher*. *Fistula* ergo describuntur, quod sint *Ulcera* vetusta sinuosa, profunda in orificiis ut plurimum stricta, in profunditate latiora, cum duritie callosa, in partibus quibuscunque à particulis acerbis acidis corrosivis, canaliculos maximos perforantibus, & discindentibus, atque hinc effluentibus succis oborta. Dantur Ulcerum diversæ species. Differentia autem imprimis sumenda est ab excrementis Ulcerum, quodocunque enim ulcus pus album, æquale ac minimè foetidum excernit, dicitur *Vlcus vulgare*, omnium facillimè sanabile. Ubi verò serosus succus affatim emanat, ulcus dicitur *saniosum*, Veteribus rheumaticum, phlegmaticum, vel fistulosum dicitur, Germanis *ein riesender, rinnender schade* Effluxus hujus copiosè lymphæ dicitur ichor, *das Glied Wasser* ulcusque hoc tamdiu insanabile redditur, donec iste effluxus cessat. Ubi autem sordes mixtæ sunt, nempe sanies, aut atrum, lividum, cinereum aut variè coloratum crassum ac foetidum, glucinofum & tenaciter ulceri inhaerens in eo reperitur ex-

crementum cum fetore, & profunditate, tale ulcus dicitur *fordidum*, Veteribus ulcus *melancholicum, malignum & depascens*. Sic quocunque depascentia & in profundum ambitumque rodentia ulcera à quibusdam vocantur *lupus*, Germanicè *ein fressender VVolf*. Alii tamen per *lupum* intelligunt ulcus quoddam specificum ut plurimum in carnosa femoris parte sedem figens, & acerbis cruciatibus affligens, nisi ulceri quotidie frustum carnis recentis imponant. Alii è contrario favam illam faciei & narium exulcerationem, qui aliàs noli me tangere appellatur *lupum* vocant. Sic quoque ejusmodi corrosiva ulcera nuncupantur *Phagedæna* & *Nomodes*, Germ. *ein umblich fressender schade*. Aliis etiam *Chironia*, à Chirurgo *Chirone*, aliis *desepulotica* ac *Tephia* dicuntur, h. e. quæ non duntaxat affectam carnem erodunt, & quasi dentibus devorant excavantque, sed etiam adjacentes & vicinas partes erodendo & exedendo depopulantur. Talem autem inter utrumque esse differentiam volunt, quod nimirum *Phagedæna* sit paulo mitius Nomode, & saltem ambulando (hinc dicitur *Foresto ambulacivum ulcus*), & serpendo cutem erodat, sitque species *Impetiginis* & *Serpiginis*: Nome verò non tantum cutem, sed & carnem excavat. Sed quæso? nonne nomina hæc Tyronem magis confundunt, quàm juvant, nausæamque ipsi pariunt? Hinc & nos in iisdem nolumus prolixiores esse, sed ad Lexicographos eorum amatores remittimus. Cum autem ulcus cum tumore præduro incipit, ac dein in malignissimum & maximè dolorificum ulcus degenerat, tunc Ulcus dicitur *Cancerosum* seu *Cancer exulceratus*, de quo suo loco ex professo agemus. Sic quodlibet etiam Ulcus malignum seu virulentum exedens & omnem sanationem respuens *Cacæthe* vocatur. *Ulcera* particularia etiam sua sortiuntur peculiaria nomina, de quibus omnibus in suis capitibus agemus.

*Vlcus fordidum.*

*Lupus.*

*Noli me tangere.*  
*Vlcus phagedænum.*

*Nome.*

*Vlcus canerosum.*

*Vlcus cacæthe.*  
*Vlcera*

peritas quadam & durities Ulcerati membri, à pertinacissima obstru-  
tione canaliculorum proventientia  
symptomata. Ulcera enim sphace-  
lata nullum exhibent pus.

Ulcus *Phagedænum* à *φάγειν* ex-  
edere dictum, quia partes vicinas  
quali dentibus comminuendo de-  
vorat: signa ex quibus cognoscitur,  
sunt sequentia. Ulcera *Pha-  
gedænica* sunt cum *Telephiis*, &  
*Cheironis* rebellia, magna, nullis  
obedientia Pharmacis, oras habentia  
duras tumidasque, quando  
enim optima applicantur remedia,  
in deterius ruunt hæc Ulcera, &  
magis discindunt sanam carnem  
cum suis vasis, & ægrî adeo vehe-  
mentem patiuntur dolorem, ut  
dies noctesque insomnes traducant;  
Ulcus denudatum plures angulos  
& profunditates exhibet, fibræ, ve-  
næ ac arteriæ sæpe nudæ in conspè-  
ctum veniunt, cum metu gangræ-  
næ. Materia quæ effluit, nihil aliud  
est, quam ichor fœtidus aut flavum  
putridum serum. Sæpe erysipelas vel  
Herpes degenerat in tale ulcus. Ul-  
ceris, cui os corruptum subjacet,  
signa hæc sunt, primò materia,  
quæ effluit, est spissâ instar oleosæ  
pinguedinis, utplurimum graveo-  
lens, aliquando subflavi, interdum  
viridis coloris, utplurimum tenuis  
& fluida ac copiosa effluens, &  
inde probatur, num os sit corrup-  
tum, nempe Chirurgus imponat  
plumaceolum profunditati huius Ul-  
ceris, & altero mane exenti pluma-  
ceoli pars inferior magis fœtet,  
quàm superior, quod certum si-  
gnum est, os subiectum esse corrup-  
tum. Alii Chirurgi Emplastrum  
imponunt, & si hoc altero mane  
nigrum conspiciatur, de ossis car-  
ie non amplius dubitant. Adest  
1. carnis Ulceri incumbens mol-  
lities & flacciditas cum spongiosa  
& fungosa substantia, ejusdem par-  
tis livor est modo instar lardi, modo  
flavi coloris prominet caro. 3.  
Mali diuturnitas, ad cicatricem  
enim perducî nequit, quamdiu  
os corruptum manet, & quam-  
vis sæpe coalescant labia, po-

stea cum majori incommodo iterum  
rumpuntur, eû id quotidie observa-  
tur. 4. Est, quod tutissimum, præsenti-  
a scilicet ipsius ossis, si nudum conspici-  
tur & nigrum excoriatum, inæ-  
quale, de quibus vide inferius, ubi  
de *Cariæ ossium* ex professo tractabimus.

*Ulcus Scorbüticum* cognoscitur ex  
signis, quæ scorbuto sunt utpluri-  
mum solennia, primò ergo dispi-  
ciendum, an parentes hocce malo  
afflicti fuerint, an æger illis in locis,  
ubi scorbutus endemius, si Belgio,  
Anglia aliisque locis maritimis vi-  
tam degerit, an malo hypochondriaco  
vel febre quartana, vel alio diu-  
turno laboraverit morbo, inde enim  
via habetur explanata ad penitorem  
cognitionem, si dolor capitis vel  
in hoc, vel in illo percipitur loco,  
& quidem intensus, si ægrî fue-  
rint somnolenti, vel laborent vertigi-  
nine, delirîi, apoplexia, paraly-  
si, convulsionibus, ptyalismo, si simul  
ad sit sanguinolentia gingivarum cum  
fœtore intenso halitus, præcordio-  
rum angustia atque difficultate spi-  
randi, & pectoris dolore, tussis sic-  
ca, ut putent jam sese suffocari cum  
deltiquis animi, si in ptimis viis circa  
ventriculû percipiunt sæpe do-  
lorem cum nausea, sæpeque vomitu,  
si abdomen est distentum flati-  
bus, aliquando corpiuntur dysen-  
teria, adhuc percipiunt in attu-  
bus dolores vagos arthriticis similes,  
conspiciuntur maculæ rubræ,  
purpureæ, aliæque exanthemata in  
facie, pectore aliisque corporis par-  
tibus, tumor pedum adest cum sub-  
sequente sæpe hydropo. Sed quis  
omnia hæc recensebit: in uno hæc,  
in alio alia apparent phænomena: si  
caries ossium simul conjuncta est,  
caro sœpius in Ulcere luxuriat, ac  
major puris copia adest, quàm Ulce-  
ris angustia requirit. Caro enim val-  
de luxurians & sensibilis, facîle san-  
guinem stillat. Color hisce in scor-  
büticis Ulceribus succeruleus est,  
cum punctis albis instar lardi  
& humor, qui effluit, non est  
instar albi olei, sed est ichoro-  
sus, lutosus & tenax, male olens:  
Ulce-

Signa Ul-  
ceris Scor-  
büticis.

Signo Ul-  
ceris cum  
carne lu-  
xuriante.



*Ulcus  
sordidifi-  
gna.*

Ulcus sordidi seu putridi signa ut attingam, sunt ferè eadem, tumorem enim vel pustulam sequitur: materia intus contenta est, & hæc instar lardi, h.e. tenax, lutosa & maximè loco hærens, in lateribus sc. Ulceris: facile hoc ulcus cacochymicos infestat, h.e. corpus in quo succi non satis attenuantur vel subtilisantur, vel fluidiores fiunt. Succus exulceribus effluentes varia quaque à Veteribus sortiti sunt nomina. 1. Pus dicitur, quod nobis est alba & crassiuscula materia benè olens, & nihil aliud est quam coagulatus chylus cremori lactis similis, quæ à Veteribus concocta in Ulceribus habetur materia. 2. Ichorofus sanguis, qui communiter acidum spirat, & gustu deprehenditur falsus, & videtur esse serum sanguinis, dicitur *sanies*, & cum permisceatur sanguini, dicitur *pus sanguinolentum*. 3. Ichor vocatur tenuis ille humor chyli sulphureus & falsus, qui etiam sæpe ex ulceribus effluere solet. 4. Sordes dicitur illa materia, quæ lardo similis est, lutosa, spissior, quæ non facilè canaliculos carneos perfluere potest, & lardum repræsentat in Ulceribus difficilioris curationis. 5. *Virus* quod appellatur, est acris foetidus, tenuis humor, Ulceribus maximè noxius, qui vulnera aperit rodendo & cutem pustulosam reddendo. 6. *Melagium* est oleosus humor, qui ex corruptis ossibus effluit, & instar ossium comminutorum foetet.

*Signa si-  
mularum.*

*Fistula* differunt, seu superius diximus, tantum profunditate, angustia & diuturnitate ab Ulceribus, habent enim profundum, fistulosum foramen extrinsecus, angustius, latius intrinsecus, cum callosis subinde & duris labiis, intus plures quoque habet canales *Fistula*, qui se ad omnes partes explicant, & usque ad superficiem cutis, & valde profunda est *Fistula*, in qua cavitate, tanquam in spelunca commutatur pus, & sensim, & partim emanat, sæpeque coalescit, tunc iterum aperitur; materia quæ effluit etiam in

*Fistulis* alba & aliquando vel flava, vel viridis, nonnunquam nigra, interdum albidior, sæpe putrida ac cadaverosa, sæpe cum copia materia nonnunquam pauca cum quantitate excernitur. Omnes occupant corporis nostri partes, nec ulla pars datur ubi *Ulcus* vel *Fistula* non produci potest, & pro partis affectu ratione minus vel magis periculosa est *Fistula*, apta enim est quæcunque materia exedente & corrogente vi prædita, in quocunque loco moram nectens, sive sanguis restagnans & corruptus, sive alius succus aut sanies sit à contusione, tumoribus, abscessibus, vulneribus, Ulceribus relicta, ut sinum ad *Fistula* formam excavet. *Fistula* spumosa, aquosa, saniosa materiam, subinde virulentam & aliquando cum sibilu ad compressionem eructant, quandoque tamen ferè siccæ sunt, varique durationis spe Chirurgum ita plerumque læstant, idque juxta male vel benè institutam dietam, dolor vel nullus vel exiguus adest, nisi pars maxime sensibilis subsit, quia plures fibræ discissæ sunt, hinc nullus sensus doloris. An simplex, an in plures diducta sinus sit *Fistula*, ex effluentis materia majore vel minore copia colligere est, plura item orificia liquoris injecti habita effluxus ratione explicare facile est. Brevem aut altius penetrantem, ut & flexuosam aut rectam stylus prode intrusus, qui in flexuosos ex flexili magis materia paratus stylus convenit, aut hujus loco candela cerea substituitur. Veteres ad explorandum, ut dolorem evitarent, variis usi sunt instrumentis. *Galenus* seta uti voluit: *Hippocratis* alique recentiores caule: *Guido* cum sui temporis Chirurgis petroselini aut betæ radice *Fistula* altitudinem exploravit. Sed ad quem usum talis apparatus? Explorationes enim has, tamquam periculosas non admittimus. Si *Fistula* in sola carne hæret, quod stylo tangitur molle est, pus exit album, æquale, copiosum: ad nervum quæ pertingit, in profunditatis exploratione dolorifica est, pus crassum,

sum, oleo haud dissimile exspuit, motumque partis, in quam hic inferitur, ladt, affectis vas sanguiferis, sanguis cum purexit, ex venis quidem crassior, ex arteriis pellucidus magis & aliquali cum saltu & titillatione profilit. Ubi ad os tendit Fistula, durum quid & retinens, & æquale stylo occurrit, dolor, solo periosleo, non omnis abest sub carie asperum & inæquale est, eoque magis, quo caries major, pus nigricat, mali odoris & tenue admodum deprehenditur. Num verò Fistula recens aut vetusta sit, continua aut periodica, tempus & res ipsa loquuntur. Ancallus in orificio solo hæreat, an interior actiam durior investiat, faciliè distinguitur. Ani fistularum & recti intestini specialia signa videantur superius suo capite.

*Vegetum  
opinio de  
causa Vlc  
cerum.*

§. 4. *Causam Vlcera* constituunt Galenici humores acres erodentes, eosque vel pituitosos; vel biliosos, vel serosos, vel atrabilarios. *Causæ Vlcera*, juxta ipsos, sunt plures externæ, aliæ internæ. Antecedentes sunt cacochymia, vel à toto vel à parte proveniens; externæ causæ rerum nonnaturalium sinister usus. Causæ conjunctæ sunt humores acres & erodentes, seu salini, qui ulcus excitant, à mala visceris alicujus diathesi, vel à toto provenientes. Inter *causas externas* & *procatarrhicas* numerant Medicamenta corrosiva, adurentia, corpora item fricantia, & intertiginem causantia, item contagium tum Venereum, tum scabiosum, tum pestilens, lepram, &c. Ab Ulceribus tres præcipue humores profluere ajunt, unum subtilem, qui *sanies* dicitur, alium crassum, qui *sordes*, tertium qui medio modo se habet, & *Pur* vocatur: hinc Ulcera vel *saniosa*, vel *sordida*, vel *purulenta* indigitantur; quos humores hoc modo fieri asserunt; quod si se humores aquosi ad partem confluant, dicitur saniosum Ulcus: si crassi, sordidum; si purulenti, putulentum. Bonum esse dicunt *Pur*, quod est album, læve, æquale, & minimè foetidum.

Sanies autem dicitur ipsis *Ichor*, aliis *virur*. Ulcera partium etiam fieri asserunt ob mandantis partis affluentiam & humorum copiam, aliquando à partis recipientis potentia attractiva.

Ossa corrumpi ajunt vel ab *externis* causis, ut ab aere nimis frigido vel calido; vel à corpore incidente, contundente, rumpente, Medicamentis acribus & corrosivis, vel ab apostemate præcedente: vel ab *interna causa*, ut sunt humores vitiosi corrosivi, virulentis, saniosi, viscosi, &c. ab humorum quantitate & qualitate peccantium affluxu; unde *Dyssepulota*, & *Cacothica* & *Chiroma* dicuntur. Juxta ipsos Fluxiones excitant *causæ externæ*; v. gr. Aer in qualitatibus excedens, cibi & potus mali succi & copiosi, vigilæ nimis, somnus longus, motus nimis, cura, sollicitudines, evacuatione consuetæ impeditæ: *Causæ* aliæ sunt quatuor, utpote pars mandans, pars recipiens, humoris fluentis conditio, & via, per quam fit fluxio. Pars mandans humores à se propellit, vel quia potens & valida, vel quia irritata; huc confert via, & partium meatus. Humores autem generari dicunt, vel à prava victus ratione, vel ab alicujus visceris nobilioris, vel membri vitio. Partem autem recipientem fluxionis esse causam, vel quia debilis, rara, mollis, vel quia in loco inferiori & patente sita est; humorem fluxionem causare arguunt, quia vel copia, vel qualitate manifestæ, vel maligna irritat, vel ob fluxibilitatem & pondus; ut in hydropicis: canales autem & via sunt in causa, eò, quod nimium dilantur, & patent. Et hæ sunt ipsorum causæ fluxus humoralis.

Ulceris *depaſcentis* seu *Nomer*, *Phagedænici* seu *Vlcis ambulativæ* causæ ipsis sunt humores pravi, acres, biliosi, falsi, & affectæ partis intemperies calida & sicca; vel etiam fouentur ab alicujus visceris, aut præcipui membri, simili intemperie, incipiunt sæpius ejusmodi

di Ulcera post herpes, seu exurentes pustulas. Cause sunt illa omnia, quæ calidos, acres, & corrodes humores gignere possunt, uti est aer præfervidus, cibi & potus calidi, ira, Medicamenta acra, vulnera malè sanata, quæque multum degenerarunt, qualia sæpe evadunt Sclopetorum.

*Vlcis Sordidi causam externam* dicunt alimentum prævum, aerem impurum & pestilentem, Medicamenta oleosa; *internam* verò arguunt prævum & crassum humorem, qui per incalescentiam & fervorem putredinalem non parvam nactus est malignitatem; huic adstipulant affecti membri debilitatem.

*Vlcis Sinuosi*, quod angustum orificium, intus verò latum habet ventrem, & interdum cuniculos agit citra duritiem aut callositatem. Causam esse demonstrant à sanie aut pure corrosivo, quod apostema aut abscessus neglectus prægeneravit.

*Fistula.* Sinuosa hæc Vlcera sæpissimè degenerari in *Fistulam* observant, quæ ipsis nihil aliud est, quàm Sinus ulcerosus, angustus, longus & callosus, *Fistula* in modum, per quem humores effluunt.

*Fistulam* ab eadem causa, ac *Ulcis Sinuosi*, deducunt. *Fistula* enim tantum Callo à Sinuoso differt *Ulcere*. Callum autem in *Fistulis* oboriri consent à crassa & viscidæ materiæ influxu, cum autem potius in sinus orificio, quàm in fundo fieri scribunt, cujus ratio ipsis hæc est, quod Natura, ipsorum Dextra, semper ad cutim protrudit excrementa, quæ etiam cutis sua duritie ad calli generationem, non parum contribuit. *Fistulas* enim ex acerbis ac mordacibus humoribus partem mollem exulcerantibus nulli dubitant.

*Paracelsi opinio de causa Vlcis.*

§. 5. *Paracelsus* de Fundamento *Vlcis* differens, *Ulcus* aliquod in corpore præter corrosiva nullo modo posse fieri statuit, atque, nullum etiam corrosivum extra sa-

lium genera reperiri; Inde quorumvis *Ulcis* originem ex salibus deducit, non ea via quidem, ut sal transmutetur, melius aut pejus reddatur, uti de complexionibus fictum arguit. Centuplicatam in corpore salium varietatem existere ait Author, quorum quodque genus peculiare suum *Ulcus* efficit: ex quorum conditionibus juxta salium existentiam *Ulcus* pejus fit, aut melius alio. Inde suam formam, conditionem, essentiam ut externa salia sumunt. Sal quod limaturæ ferri permiscetur, ut ille ait, peculiarem suam ferruginem habet: item sal urinæ suam & alumina propriam, &c. quamquam ferrum unum & idem existit, nihilominus transmutationes, quæ per salia fiunt, haudquaquam similes, quod in salium conditiones transcant. Et prout unum gustu vehementius est alio, quod à differentia percipitur inter Vitriolum, sal commune, sal nitrum, & alumen, quodque peculiarem dolorem infert, uti gustum habet proprium.

Non secus, imò pejus ea efficeret *Ulcera* dicit, quæ proveniunt ex Realgaribus, ut sunt Arsenicalia, auripigmenta, usnea, petrea &c. ut ista pro sui conditione veneni tumesciunt, pungunt, &c. hic etiam ubi producant *Ulcera*, sese palam faciunt. Horum omnium primum fundamentum esse ait, cognoscere totum corpus in hujusmodi salibus constitutum: & quantum externa mineralia comprehendunt, Microcosmum tantundem etiam concludere. Ex prædictis fieri *Ulcera* contendit, non alias, quàm super ferrum ferrugo, quod proprium sal consumit. Sic & cuprum juxta ipsum, suo sale proprio convertitur in aris florem, aut viride aris: non secus in sui consumptionem per salia sua transmutatur corpus. Aliam nonnullorum *Vlcis* originem fieri statuit ad hunc modum. Salia quædam

dam subtilia sunt, & liquorosa, quæ per propriam subtilitatem corumpuntur, eo quod in aliis liquoribus existunt aut separantur postmodum in hunc modum. Vinum integrum & sanum videtur, & in eo sal ejus non percipitur, quia dulce bonumque, nec non in substantia sua potentissimum: suo tempore post ab eo sal proprium separatur, ac tartarum producit ad latera vasis, quod sal acutissimum existit; pariter ratiocinatur Author, in corpore liquorem, qui necessarius est illi, temporis etiam successu talem in separationem transire: pellis ejus est vas, cui juxta ipsum tartarus adheret, ut in dolio, cum sua differentia tamen, & corpus corrodit. Similiter vinum acescere ait, quia substantia sua separatur ab eo. Nam aliis in corpore liquoribus accidit, qui centuplicatè variantur, ubi similem in acetositate incoidunt, statim adescerofivum statuit. Nec est, quod miretur quispiam ob salum in corpore multitudine, cum id ipsum varietas demonstrat Ulcerum corporis, in quo generationes omnes elementorum existunt. Latius notat salia corrosiva juxta separationem tartari, nec non aceti processum à vino similiter Ulcerum originem esse, quum in suam exaltationem ad hunc modum veniunt: & prout unum diutius altero vinum conservatur, & acutius existit, in corpore salia juxta ipsum haud absimilem differentiam habent. Nihil enim præter corrosivum in corpore existere posse arguit, quod ulcus forare possit, aut corrosivum esse posse, quod sal non sit. Omnia Ulcera dicit Author mineralia esse, uti scilicet terra corpus est mineralium, accidere enim ait, ut uno in loco reperiat aluminosa, vitriolata quidem in alio, salia similiter in tertio, quarto verò nihil, &c. Sic etiam contingere in corpore asserit. Ex sale *Noster* omnia deducit Ulceratum interna, tum externa, & non ab humoribus, uti Galenicus ficege. Sal etiam urinæ varia produce-

re Ulcera Author arguit, per urinæ enim viam prout in Cambuca similibusque, sal istud cum urina simul, ut acetum cum vino bibitur, effluere debere testatur. Quum tamen in separationem transit inde mox centrum sequitur, post eruptio manifestatioque foraminis, quod ad mentem ipsius pro conditione sui salis formam habet. Simili processu cognosci posse ait salia hæc omnia, quæ ex salino verò corpore profluunt, quæque plura sunt sub fundamento comprehensa tamen omnia, prout ipse Cambuca continet. De coloribus, qui videntur Ulceribus accidere, solum ex salibus, è quibus oriuntur omnes, procedere pariter & formas vult. Ubique sal non fuerit, ibidem iuxta ipsum & color nullus, & in extractione proprietatum salis colores fiunt manifesti; sic etiam ex forma variatur, idque juxta species: Crystallum in angulos cudit aliud nihil, quam sui salis proprietas; quod citrinus lapis aliam formam habeat, alterius, est sui salis causa; sal aliud in Saphiro, quam in Granato latere dicit; similiter juxta eum aluminis est alia forma, quam Vitrioli. Salis communis formas varias esse arguit, unam quidem aqueam, cotis instar aliam, granulata quandam, &c. Sic etiam Ulcera corporis apparere vult longum unum, latum aliud, angulare hoc, rotundum illud, quod salium suorum, ut cujusque quæque proprietas, efficit.

*Fistularum* originem pariformiter ac Ulcerum exurgere contendit, ut, quum alumina simul una cum nutrimentis aliquo loco resolvuntur, hæc juxta eum suum locum inclusum appetant, h. e. putrefaciant, & non corrodant: estque dulce quoddam alumen earum. In Lacertis eas primum oriri asserit, etiam in juncturis arteriarum inter aut ligamenta. Postquam occultam ejusmodi putrefactionem

*Fistulam*  
tum.

nem fecerint, aut in latum extendunt, spiraculum sibi parare non alia de causa dicit, quam ad respirationem. Ob debilitatem istius aluminis corrodi cutem non posse asseverat. Fistulas etiam ex omnibus Vulneribus & Ulceribus nasci posse haud dubitat.

Hujus generis alia multa foramina fieri in corpore statuit, quæ minora sunt extrinsecus, quam intrinsecus. Istorum esse conditionem ait dolores non inferre, sed prout aluminis dulcis est natura, semper humiditatem emittere, vel in aquam resolvi, sic & Fistularum conditionem esse ait, spumam, aquam & saniem ejicere; ubi tamen glaciæ non fuerit alumen, aut ejus acuitas mortificata, nam per illud dicit Fistulam cavernosum ulcus efficere. Cum Fistula, (pergit Author,) perseverat in exaltatione sua, manet quousque morbus ad eam alius accedat; nam juxta ipsum ex Fistula mors nulla producit. Latius in alumine considerat, id quod plumosum dicitur, sæpius manifestari, de quo mirabiles admodum conditiones oriri asserit, ut sunt Scrophulæ, formicæ, & id genus alia, quæ omnia produci ait ex alumine plumoso, quod quum separatur, tria, quatuor, quinque, vel plura centra facit, usque in centum vel ducenta, hunc in modum: Quoties gutta separatur, toties ea coagulatur, & hæc duritie circum se corrodit in foraminis productionem: & ubi multæ guttæ resolvuntur, juxta Authorem multa pariter foramina fiunt, modi glandesque donec incidunt. Quandoque mitigari scribit per aluminis dulcis accessionem, ut sua foramina dolores non via vehementes inferant ac per se: nonnunquam ab arsenico. malitiam suam adauctam habere notat, quæ per ejus efficitur, quam alias existeret. Hujusmodi plumosi conditio quum incipitoriri, duplici via manifestatur: Priore, nodis ac duris glandibus præmissis, ex quibus juxta Authorem fiunt Scrophulæ, nec non id genus Ulcera multa, quæ sub Scro-

phulis omnia comprehendit; posteriore, pruriticibus & ultionibus primum aggreditur, ex quibus non adeo magna vel profunda fieri Ulcera asserit, sed pejora satis & acutiora juxta mixtionis incidentiam, sese multo minusve manifestare possunt. Notat insuper fetorem, profunditatem, vermes & similia, quæ occurrunt in similibus, occasione carnis fieri, quæ conditionis illius existit, ut istorum facile generationem admittat. In carne vermes quandoque nasci arguit, quando putrefactionem in resolutionem tendit, ut in fetorem transeat. Pariter sicum Gangræna, quod Ulcus apparet causam esse putat, quia bonum atque malum accidentia sua recipiunt.

§. 6. *Helmontius* Ulcerum causam occasionalem & radicem eorum esse ait fermentum quoddam feminale, deleterium atque virus proprium contagiosum susceptum, partisque fundo ac labris seu oris (non cavitati) inpressum & insitum, ejusque Artheo-exoticum, carnis & cruoris boni corruptum. Pariter quoque Ulcera fieri asserit vel à vulnere malè curato, vel à contusione, vel ab apostemate erumpente, vel tandem à veneno intus genito, quod sui malignitatem plantat in externa parte, ibique fermenti sui virulentæ proprietates fixit. Unde quoque juxta ipsum, quicquid cruoris alendæ parti in horas distribuitur, id totum in virus vertitur juxta fermenti sui profapiam. Author valde insurgit contra Galenicos, eosque ridet, & saniem ac pus non ut illi, dicit Ulceris aut partis excrementa, ut neque digestionis naturalis: sed esse ait producta seminum sive radicum Ulceris, statique in Ulcere habitare proprium corruptorem, qui cruorem alimentarium viciat, antequam digerit sit aptus. Degenerari arguit ille & transmutari cruorem in radices partitis, qua corruptor locatur residetque, non autem in ipsa Ulceris cavitare, sive alveo, alioqui namque necesse esset, merum atque innocuum cruo-

*Helmontii  
ratiocini-  
um de  
causa Ul-  
cerum.*

eruorem decidere semper in ipsam Ulceris cavitatem, atque ibidem corrumpendo degenerare, quod oculos & quotidiana ipsius experientia falsum asserunt. Radicem cuiusvis Ulceris esse in fundo & labris, sive margine, nullus dubitat, i.e. paribus cavitati finitimis habitat, quibus nempe sua est coquina, qua cruor alteratur in corrosivam saniem, pus, &c. sanies verò ipsa est illi productum, sive effectus positivus Ulcerum, ipsa autem cavitatis ejus, quæ Vulgo medentum ulceris æstimatur, est productum privativum, atque deficiens. In oris Ulceris enim circumhabitare statuit hostilem corruptorem & hospitem fermentum virulentum, ad quod cernit oras atque fundum diversimodè alterata. Enim verò majora Ulcera pure carere asserit, sanientium duntaxat plorare aut continuam, & subinde decuplo plus, quàm juxta alioqui cruoris distributio requirit, atque in aquas acres, atque depascentes transmutatum ichorem defluere putat. Etenim ut acor, ad mentem ipsius, in stomacho est gratus & ordinarius sapor: sic extra stomachum, omnis aciditas est præter naturam & hostilis, hinc quoque corrosionem in Ulceribus ab acido deducit. Author cum Paracelso tot species Ulcerum statuit, quot salia, quia fundunt synoviam continentiam falsam. In Ulceribus rodentibus ac putrescentibus dolores prodire ex acido primum concepit. Dolet enim, inquit, anima sensitiva primum, quæ tandem assueta, minus excandescit, perinde ut insuetus equus calcaria recusat. Dolorem quandoque in Ulcere ex sola meraque indignatione æstare memorat. Imò Ulcera sanguinem mutare sæpe in aquam pungentem contendit.

*Fistular* quoque Author à latice corrupto ac acrescente partes corrode, ac exedente, produci asserit, & eisdem ac Ulcerum causas accusat, differentiamque solum in diversitate salis consistere dicit, qui in Ulceribus nondum illum mali-

gnitatis gradum obtinet, juxta quem corporis partes à Fistulis profundius eroduntur, sinusque callosus ob cruorem infectum producit.

§.7. Juxta *Villisi* effatum Ulcus generatur ex humore seroso acidofalso & glutinosiori, qui in parte quadam laxioris texturæ moram faciens, acrimonia sua fibras ejus dissecat & dissecindit, vasorumque sanguineorum, è quibus exsillat sanguis, erodens. Cruor in foveam jam excavatam delapsus, in eo stagnat ac remoratur, atque extervefecit, tunc verò volaciliores illius particulæ majorem assecutæ motum ab aliis defciscunt, & exhalantur, salis autem terræque particulæ elevantur, summoque jure potientes, & cum crassioribus sulphuribus superstitibus mixtæ, atque ab aquosis particulis residuis dilutæ, materiam eximia acrimonia præditam constituunt, quæ partis, in qua nidulantur, substantiam perpetuò exedens, ampliorem semper sibi foveam excavat. Generatur etiam ad mentem Authoris à sanguine in parte quadam remorante ac putrescente, & acrimonia, quam in ebullitione assequitur, partis substantiam erodente.

*Villisi* asserit *Fistulam* fieri ab Abscessu vel Ulcere diuturnioribus, in quibus particulæ ob moram singularem assecutæ acridinem, & acutiores atque robustiores factæ, nec à spiritibus, sulphureis subtilioribus particulis jam evaporatis amplius cohibitis, & continuo motu donatis, in partem, in qua continentur, altius sese insinuant, fibrasque sibi circumpositas perpetim erodentes ac dissecantes, profundiores indefinenter agunt cuniculos. Quum verò fibræ quædam firmioris sint texturæ, quàm aliæ, materiæque purulentæ vim declinare valeant, pus recto semper non incedit tramite, sed flexus agere cogitur: paries verò *Fistulam* obducens fit ex eo, quod viscida illa portio puris falsæ & corrodentes particulas comprehendens fibris tum carneis tum nerveis ex-

*Villisi*  
opinio de  
causa *Vl-*  
cerum.

*Fistula-*  
rum.

*Fistula-*  
rum.



fari norunt, ut materiam lardi, aut sebi similem exhibeat. Eam verò succorum congeriem, quæ particulis abundat acutioribus, tam profundè aliquando musculos penetrare recessit, ut in ipsa agat ossa, eaq; perterebrando cariem producat, in Ulceribus quibusdam profundioribus observabile. Adhuc si contingat, ut unus, vel alter pediculus, vel alius quidam vermiculus à capite, vel aliunde, etiam ab alio quodam homine ex improvise Ulcus ingrediatur, & in eo, tanquam nido, ovula ponat, ex quibus alii excludantur vermiculi, ulcus produci dicunt verminosum, vel cum Phthiriasi conjunctum, quo ægri quidam miserè aliquando fuerint excruciat.

*Fistula arii.*

Juxta musculorum longitudinem, latitudinem, aut profunditatem, si à liquoribus istis, particulis gladiolatis acutis discindentibus refertis, altior fiat erosio, & excavatio, & ex destructis canalibus, aut tubulis effluentes succi à liquorum istorum particulis parietes ulceris fortius verberantibus undiq; versus eosdem compingantur, & in quiete diutius detineantur, *Fistulae* emergere docent, quæ modo speluncam referant, si una cavitas effodiatur amplior, modò antra quædam cunicularia, dū plures hinc inde elaborentur. Fieri enim sibi persuadent, ut plurimis tubulis & canalibus ita destructis succi magna in copia effusi nullum repellant effluxum, sed intra cavitatem istā detineantur, quorum activæ particule sese cum aliis dominium gerentibus commisceant, crassiores verò ab iisdem à consortio suo detineantur, quæ circa latera Ulceris hærentes tubulos obtinent, & intercedente quiete in scirrhum occalescant duritiem.

*Causa ex nostra ipsa vā Ulcerū.*

§. 10. Ut æterna veritas est, quod nulla exulceratio sit absq; aliquali tumore, ita quoq; firma est regula, quod nullus tumor absq; obstructione esse possit. *Ulceratio* ergò oritur, nostro iudicio, à tumore, tumor ab obstructione, obstructio fit à hoc, vel illo stagnante, & abacido inspissato succo, quæ spissitudo & visciditas succorum est quoq; varia, & pro quorum varietate varii oboriuntur tumores, & juxta horum varietatem, & diversā produ-

cuntur Ulcera. Sic & Inflammatio est diversa, est enim major, vel minor, hæc vel illam occupans partem, produci-tur vel à causa externa, vel interna, juxta horum diversitatem tot diversa generantur Ulcera. Sic quoq; gangræna ex diversis produciitur causis, & juxta harum diversitatem major, vel minor est gangræna, & per consequens inde producta Ulcera diversa oriuntur. Sic & à vulneribus male curatis, Ulcera generari solent. Etenim differentia tumoris, & Ulceris in eo consistit, quòd tumor id est, quod tantum in tubulis suis conclusum lateat, h. e. tunc dicitur tumor partis, quādo materia adhuc in subtilissimis vasculis conclusa maneat, stagnetq; & cum ea non effluat, nondum dici potest Ulcus, hinc Ulcus præsens dicitur, quādo vasa à contenta materia discissa, ac rupta, seu corrota fuerint, & quod illa pro diversitate materiz, & modo operandi, diversa sunt. Ulcerum causa ergò primaria certè est acrimonia salium quorumvis, & tota sæpe massa sanguinea, & exinde prosilientes reliqui succi, hisce salibus silvestribus, acerbis, corrosivis, arsenicalibus, mercurialibus, & quo nomine illa insignire velis perinde est, testerti sunt, qui perfringendo, corrodendo, discindendo canaliculos viam sibi ad exitum parantes, qua facta via ulcus produciunt. Mantentibus enim vasis, seu canaliculis integris, nullus succus effluit, hinc etiam nullum Ulcus, sed potius tumor produci potest: in catarrhis quidem rumpuntur aliquando tubuli, sed liquor emanans non valde acris stagnat tantum inter musculos, vel cutem, sed materia ulcus excitans acrior & lixi viosior est, eosque instar lapidis infernalis, aliusque cauterii perforat, corroditque omnes, quos alluit, tubulos, unde flavus, vel albus, vel dulcis, vel salus, aut tenuis, vel crassus succus, qui vulgò pus dicitur, provenit. Unde verò color ille oriatur, facillè cōcipere possumus, cum necessariò is succus ex certis canalibus fluere debet, notum enim est totum hominem constare ex meris tubulis, & canaliculis, & quòd alia vasa sint arteriosa, alia venosa, alia lymphatica, alia

adiposa, alia nervosa, & quæ adhuc plura alia sunt. Ex his vasis mirè & variè, ordine tamen, inter se intertextis, componuntur omnes corporis nostri partes. Ex hisce luce meridiana clarius apparet, quod pus in Ulceribus ex certis canaliculis effluat, ex quibus effluere nequit, nisi sint rupti, aut corrosi, aut discissi, sanguis enim effluere non potest ex suis vasis arteriosis, vel venosis, nisi vasa illa fuerint vel discissa, vel corrosa, vel alio modo rupta, & asterisco notandum est, quòd omnia vasa inter se contexta sint, quibus ruptis succis inter se immiscentur, ex quibus diversitas puris producit, quod non semper ex puro sanguine, uti Veteres, nec ex puro semper chylo, uti Recentiorum quidam putant, provenit, sed ex succis diversis, quorum canaliculi discissi sunt, vel rupti, sæpè verò si fuerint rupti soli chylosi ductus, hinc effluens alba, & spissa materia nihil aliud est, quam coagulatus chylus, sanies verò seu aquosus sanguis, qui acidum olet, & falsum saporem habet, est serum sanguinis, quia cum eo commiscetur & sanguineum pus vocatur. Ichor est tenuis succus chylo sulphureus, & falsus. Sordes est materia lardo similis, quæ lutosa, spissa, & non faciliè per canaliculos musculorum fluit. Virus est tenuis, ac fetida materia, quæ carnem & cutem exedit. Melagium dicitur oleosa materia, quæ communiter à carie ossium oritur & valde fetet. Generatur ergò Ulcus quando particula acida, salse, & aliq̃ ejusdem farinae confusæ & inordinatè mixtæ latent, & nullam occasionem nanciscuntur evasandi propter præsentem obstructionem, hinc vasa simili modo, ac si quis id præster cum mille cultellis, discinduntur, & non apud Chirurgum tot varia inveniuntur instrumentorum genera, quæ hic non reperiuntur in materia ista purulenta, quod probari potest, si vel sanguis, vel materia purulenta destilleretur, & rectificetur, quæ delineatur ante nares, vel imponantur guttæ unæ, vel alteræ linguæ, percipiet destillator;

imò unusquisque, quòd cultelli admodum sint acuti, fieri debet. Medicus ille Viennensis tempore pestis bubonem pestilentialem alembico immiserat, exinde destillatum liquorem aliis gustandum porrexit, ex cuius cultellis omnes canaliculi erosi, ac discissi, omnesq; succi coagulati fuerunt, & hinc degustatores mortui sunt. In Ulceribus tria bene consideranda veniunt, multitudo nempe vasorum ruptorum, deinde materia quæ ex his emanat, & postmodum effectus quem effluens & effluxa materia producit. Si enim plura vasa rupta sunt, plus effluit materiæ, & multitudo ruptorum vasorum dependet à maiore circumferentia tumoris, quo enim major est circumferentia, eo plures rumpuntur canaliculi: nihil tamen magis vasa corrodit, quam per fermentationem acrior redditus, evasatusque succus, qui acido albus est, ex chylo nempe producto, modò flavus, & tenuis, modò aeris, ac viridis, modò crassus, flavus, & viridis iste succus non ab hepate, vel fene, aut aliis visceribus, uti Veteres somniarunt, ac hodie plures reperiuntur, qui falsè huic opinioni adimplantur, sed potius oritur à fermentatione ibidem facta inter succos effluentes, flavus ergo humor non à Bile uti Veteres putarunt, sed flavedo hæc oritur ex liberis particulis volatilibus, acidis, & dulcibus inter se mixtis. Fætor verò puris oritur ab eadem causa, accedente enim fermentatione, & diu durante salia volatilia avolant, fæto remq; inducunt.

Cavitas Ulcerum oritur, quando scindentes, & mordentes aciculæ salse, & acidæ ex proximis vasis effusæ adjacentia minutissima vasa simul dilacerant, discinduntque, ac planè sæpè erodunt, & sic sibi cavitatem parant tanquam foveam, unde Ulcus ortum suum habet.

Prout ulcus Phlegmonem, seu inflammationem, ac tumorem sequitur, sic & gangrænam excipere solet, vel ab incongruis remediis gangræne applicatis, vel si gangræna jam radices egerit. Ulcera vero non sem-

semper producuntur eodem modo, ac supra diximus de eo, quod phlegmonem, seu tumorem excipit, nam in hoc pus eicitur, in illo verò, quod gangrænam sequitur, nullum pus reperitur, & in gangræna cum omnia vasa corrupta & rupta sunt, ut plane nullum commercium restet cum aliis vasis, hinc nullus succus nutritivus effluere potest, contrarium verò observatur in tumore.

Quod in illa Ulcera, quæ comitem habent scorbutum, aliamque intemperiem sanguinis, difficiliora sunt curatu, ratio est, quòd succi in M. S. non bene constituti sunt, vel particulæ sunt nimis salsæ, vel acidæ, hinc ulcera fiunt manantia, & ab aere externo adhuc acriores redditæ perforant, rodunque alios canaliculos proximos, & impediunt accretionem carnis. Pro regula enim firma stabilienda est sequens veritas, quòd omnes succi corporis nostri tam diu in vasis suis circulantur, meliusque in statu suo conservantur, quàm illi, qui extra vasa stagnant, quia circulantes succi in vasis suis contenti ab aere impediuntur, aer enim ipsos succos ita non faciliè coagulare potest, dein per circulationem etiam per cor melius miscentur, à quo succi ab irregulari commixtione, & motu feruntur, sicque quoque novo fermento imbuuntur circulando, hinc non facile corrumpi possunt.

Si ergo succi sunt acidi, vel nimis salsi, aut acidi, & pauco sale volatili, & spiritibus, & oleo præditi, faciliè vasa perumpunt, & foras emanant, aliamque nanciscuntur indolem extra circulationem suam constituti. Salia enim volatilia, olea & spiritus corpora nostra quæcunque à corruptione præservare debent, dantur enim variæ acida, & salsæ & maxime inter se differunt.

Nunc paucis rationem reddamus, quomodo sphacelus in hydropicis sæpe Ulcus producit. Hic ergò considerandum est, quòd si adsit obstructio vasorum lymphaticorum, v. gr. in Tybia, &c. per quæ succi aliàs circulare debent, quòd tamen

nequeunt ob obstructionem vasorum à mucò tenaci facta, & minori vi succorum, hæc vasa præter modum à succis istis extenduntur, & extra ordinarium suum situm dinoveantur, hinc in parte illa oritur occasio ad dissectionem, & corrosionem vasorum, & cum plura discinduntur, & à reliqua carne quasi separantur, tunc fit Ulcus, distenta enim sunt vasa, & non amplius à debili influxu spirituum ad pristinum statum deduci possunt, nec separatio succorum fieri potest.

Ulceræ ex Scorbutò sæpissime producuntur à particulis istis salinis acutis sanguini, ac reliqui succi in-existentibus, tubulosque tandem erodentibus.

Si particulæ acidæ pertinaciter poris labiorum Ulcerum inhaerentes, *Ulcera sordida,* succos dulces de novo alluentes convertunt itidem in acidos, qui ob tubulos ab ulceribus ruptos circulationem continuare nequeunt, à succis ergò à tergo continuo insectantibus propelluntur foras in cavitatem Ulcerum, quam ad summum usque fere semper adimplent succo quidem acri, acido, ac tenui, cum quodam viscosiore, ac magis ramosæ particulæ intermiscantur inhaerentes in superficie Ulcerum, illa sordida reddunt.

Ulcus cum carie ossis, & fungo- *Ulcus cum carie ossis.* sa inde nata carne oritur ab aido corrosivo, ossium tubulos corrode-  
nte, & sic ossa cariòsa reddente, vasaque sanguifera magis quam par est aperiente, ex quibus prolongatis effluens succus transit in carnem fungosam.

Ulcus mirandum est, quod notavit Celeberrimus *Muyr Obs. 4. prax. Chirur. rational.*, ex qua una vice prodierunt 30. ova humore simpido plena, deinde per aliquot subsequentes dies plura alia egrediebantur, quæ omnia simul sumpta numerum centenarium superabant, eorumque quædam ovi gallinacæ, quædam columbini, quædam etiam ovi passeris magnitudinem habebant, singulaque eorum propria, ac à cæteris separata, candidaque cingebantur

membrana, quæ chartæ luforige affitum habebat: ovis subventancis hæc ova valde fimilia apparebant, omniaque fimul in communi craffaque membrana inclufa jacebant. Nos & ulcera inveterata vidimus, ex quibus chartæ lufuriz, vitra, araneæ, lacertæ, mufci, pili, ranæ, & ejusmodi res prodibant, vide de his *Commerc. noſtr. lit. Epift. 2.* Num hæc à naturalibus cauſis prodeant, *Cl. Myr* curioſè explicat; vel num diabolus ejusmodi res non animadvertentibus Chirurgis & adſtantibus ſubſtituat, quæ non in ulcere antè fuere. De animatis tandem ratio reddi poteſt, ſed de inanimatis, uti vitris, ubi adhuc inſignia cujuſdam nobilis fuerunt impreſſa, vix credo ejusmodi res naturaliter à ſuccis variè diſpoſitis produci poſſe, ſed à dæmone mille artium fabro fuiſſe potiùs ſubſtituta nemo erit, qui inſciabitur. Sic & fruſtulum fiſtulæ adæquantis longitudinem dimidii digiti, quæ tabaci amatores utuntur, in Abſceſſu vidit prælaudatus *Cl. Myr*, ſed ab ægro fuit in fauces adactum per lapſum, quem ex improvifo ſuſtinuit, de quo Abſceſſu mirando conſer ſæpius nominati *Cl. Myr*. *Obſ. 6. Chir. ration.*

Cauſæ *Fiſtularum* ad quatuor capita reduci poſſunt: 1. à vulneribus, & puncturis oriri poſſunt Fiſtulæ. 2. à tumoribus, vel abſceſſibus. 3. Ab ulceribus inveteratis: & 4. à carie, & corruptione oſſis. A vulneribus enim, ſive puncturis exoritur fiſtula ſequenti modo. Si enim quis profundè læſus fuerit, & æger in peculiari ſitu ita conſtitutus, ut nemo ad profunditatem vulneris pervenire poſſit, certum dein ut materia ſtagnet, & peculiarem ſuccum ſibi efformet, facili Marte proin accidere poteſt, ut ſuperius vulnus conſolidetur, remanente materia, quæ de die in diem acrior redditur, vicina vaſa corrodit, unde effluxus materiæ major fit, ut cutis iterum corrodatur, ſicq; Fiſtula generatur. Si jam materia ex ſua cavitate effluxerit, non tam repente illa replet, hinc

reſtat ſemper mucus viſcidus, avolantibus ſcilicet particulis ſubtilibus hinc craſſus ſuccus hæret in oriſicio Fiſtulæ, impeditque effluxum tenuis de novo afluentis materiæ. Calloſitas Fiſtularum producit utplurimum à preſſione materiæ, prout videmus in callis manuum provenientes à labore. Fiſtula nihil aliud eſt, quam particularis exulceratio, h. e. apertio extraordinaria vaſorum; in Fiſtula enim ſemper remanet fermentum acidum, prout in ſtomacho liquor quidam gſtricus, quod ſuccos effluentes alterat, & hinc pus variè alteratur, modo ſanguineum, modò album, modò ſlavum, aliquando falſum, vel acidum, vel craſſum, &c. Quòd in Fiſtulis nullus doloris ſenſus ſepe percipitur, ratio eſt, quod partes Fiſtulæ ſint compreſſæ, & conſtrictæ, vel planè abſciſſæ, & induratz, & labia interna ferè calloſa, hinc videmus, quòd cal'oſitates manuum, vel pedum abſq; dolore ſcindi poſſint. Cauſa ergo primaria Fiſtularum utplurimum eſt acris, & corroſivus ſuccus in cavitate deliteſcens, plures tubulos & canaliculos diſcendens. Anſam huic præbet ſæpe ſanguis craſſus, & ſtagnationi aptus, ſi multis nimirum acidis, & viſcoſis fuerit reſertus particulis, hinc portio quædam harum particularum deſertur ad partem aliquam noſtri corporis, & ibidem ſubſiſtens, moramq; trahens in carnem vicinam tranſit, fibrillas dirumpit, redditq; ſibi cavitatem ampliorem, ſicque Fiſtulam producit. Si verò craſſiores ramoſæ particule circa Ulceris latera, ſeu labia ſibi impertium rapiunt premuntque fortiter vaſa, hinc calloſam efformant Fiſtulam. Non tamen neceſſum eſt, ſuccos acridinem ſuam, aliasq; vires ubique, & manifeſtè ſemper prodere, ſed qui occultè ſubinde ſale, ut *Helmontius* ait, gaudent, quod ſub ſanguinis tegunt involuero, nec niſi cùm ſecreti fuerint, & per ſe exſtiterint ſcorſim conſpicui ſunt, hominemque lædunt, ſo moleſtia afficiunt, & cujus generis, aut generis ſint maniſeſti ſunt ex *Hippoc.* Res

nos ambientes multum faciunt ad Ulcera & Fistulas producendum ; & quomodo contribuant suumque symbolum addant ex dicta infra dicenda apparebit , aer enim acidus & multo sale repletus , sanguinem faciliè hisce particulis impregnat , hinc & ii , qui per mare vehuntur , ob salas & acres exhalationes , & dictam viscidam ac salinam , sicque incongruam hisce Fistulis & Ulceribus obnoxii sunt : succedunt alimenta & potulenta succo saleque mordaci & acido abundantia , & in fermentationem , corruptionem faciliè tendentia . Vinum acidum quodvis nobis suspectum est , & omnes potus acidi , ut cerevisia acida vinum pomaceum , &c. Ex la- & vitiosi succi infans cum nutrice sua totum corpus multis repletum . Ulceribus circumtulit , teste etiam ipso *Galeno de aliment. facult.* Motus nimius , ut & vigilie , cacochymia non difficiles causa operosa quoque hic sunt ordinariè excernenda , si præter modum retineantur , v. gr. in vitis hæmorrhoidis suppressæ ob stagnationem sanguinis actioris & viscidæ , Fistulosa circa annum Ulcera dederunt , prout apud *Hildan. cent. 2. Obs. 75.* aliosque legere est , quod & ipsa testatur experientia . Item ob menses in foeminis stagnantes & aciores collum cervicis Uteri planè cancriforme exulceratumque notavit prædictus *Hildan. cent. 2. Obs. 61.* Mulierem lochiorum fluxu non satis purgatam post partum , nuper observavi copiosissimis crurum Ulceribus repletam , quæ adhibitis remediis congruis feliciter , Deo benedicente , à me curata fuit . Mæor quoque scorbuticorum Vlcibus fovendis aptissimus est , sic tumores , inflammationes , gangrenæ , hydrops , cacochymia quæcunque , difficiles partus , dilaceratis nempe circa Uterum vasibus , causam Ulceri Fistuloso dare possunt : frequentissimè verò accidit Uulnera in Ulcera , Abscessus & Fistulas degenerare , malè præsertim curata . Sic & catarrhi contusiones sæpè in Ulcera & Fistulas degene-

rant . Excoriatio intestini recti à succis actibus virulentis in lue Venerea & gonorrhœa occasionem Fistulosis Ulceribus dant , & non ita pridem adhuc virum quendam balsamo nostro divino feliciter curavimus , qui per tricennium & ultra hæc affligebatur Fistula , & inde sæpè febrem passus est : post variolas & morbillos malè curatos sæpius vidimus Ulcera & Fistulas , sic & post fracturas cariemque ossium , item abiectu , à bubonibus , ex mala dentis extractione aliisque progressis morbis observantur Fistulæ , seu quotidiana constat experientia .

§. 12. Quod *Prognosis* concernit . *Vlcus* . Ulcerum , si pus dulce est , & bene olet , optimum signum denotat , facili curationis ulcus , non esse malignum , & quod fermentatio non ad summum pervenerit fastigium . Si verò pus sit flavum , vel vitide , maximeque fetet , malum est .

Difficultas curationis Ulcerum in eo consistit , quod simul acré redditum pus , reliquum affluens ad partem affectam eodem induit ebaractere . Illa Ulcera , quæ propter gangrenam ex scorbutico , hydropico & frigore oriuntur , sunt pessimi moris , illa verò , quæ post phlegmonem & tumorem seu abscessum oriuntur , melioris sunt notæ facilioresque curatu . Per calorem enim seu motum succi nostri circulantur , à frigore verò non tantum succi inspissantur , & ad motum inepti redduntur , sed & ipsi canaliculi , per quos circulantur , constringuntur , hinc facilius obstruuntur . Ulcera saniosa sunt curatu difficillima & diuturna , membrane enim non tam citò sanantur , quam caro . Sic & illa , quæ chylum inspissatum instar lardi in se continent , peioris sunt notæ . Fistulæ etiam , quæ occupant juncturas aut partes , ubi majores sunt canaliculi , itidem difficulter curantur , quoniam succi faciliè effluunt , & hanc eandem abeunt amurcam , quo ulcus profundius existit , eo difficilius est curatu . Atrophiam ulcus quandoque exipere solet .

Ulcerum in hydropicis obortaratio

sanantur, & exsiccantur, quia continuo emanant, omnes enim canaliculi obstructi sunt, vel rupti, vel corrosi sunt, hinc nulla alia via restat, quàm extra cutem, ideoque nulla consolidatio fieri potest ob continuum effluxum, aquosæ materiz, seu ichoris, propter acres pungentesque particulas, quibus vasa dissecunduntur, hinc etiam melioris sanationis spes elucet, si materia albidior, & spissior redditur. Non enim copia aquæ hydropicis mortem accersit, sed obstructio, hinc plures novimus, quibus aqua per aliquot septimanas ante mortem effluebat, & abdomen instar sanorum redditum fuit macilentum, at tamen paulo post mortui sunt.

Cum in glandulosis partibus aliquid acidi subelilis secernatur, & lympham constituat, contumaciora sunt Ulcera, magis quoque dolorosa, & corrosiva, quæ facillimè degenerant in Fistulas, imò hæc ulcera canerosam induunt sæpe indolem.

Ulceræ, & vulnera articularum sunt curatu difficiliora, propter facilem lymphæ, aut sanguinis stagnationem, corruptionem, ac accrescentiam, sic quoque Ulceræ facile producant cariem ossis, quoniam acor lymphæ, aut sanguinis ad os subjectum delatus, aut ex alteratione ipsius ossis ab aeris contactu ortus, aut etiam ex aciditate intensa ad os cum chylo delatus, os ipsum corrodit, cariosumque reddit.

Quod *Prognostica* Fistularum Signa attinet, quæ omnes generaliter curatu difficiles sunt, plures tamen difficultatis aliæ, aliæ minus habent, imò nonnullæ planè incurabiles censentur; sic filia Prætoris ejusdam per annum, & ultra in manu ejusdam Empirici versabatur, quæ laborabat Fistula circa os femoris, sed frustra operam navavit Empiricus ob profunditatem, & multa disrupta vasa majora, cariem ossis subjectam, & atrophiam conjunctam. Simpliciter verò recentes intra carnem non adeò pro-

funda sub cute transversim existentes, in corpore juvenili robusto, cætera sano, labiis quodammodo mollibus, & mucosis præditæ, faciliorem ceteris curationem spondent, difficiliorem autem minantur inveteratæ valde profundæ, & rectà ad interiora tendentes, scorbuticæ, lardo similes, tortuosæ, variis sinubus constantes, sensus planè expertes, lumen Venerem, aut gangrenam redolentes in hydropicis, scniibus emaciatiss corporebus, pueris, & junioribus obvia, raroque ita exemplo, quatuor rectum intestinum perforantes *Fistulas* in infantulo unius mensis perfectè sanavit *Petrus de Marchetti de Fistula ani* p. 180. *Fistulosæ* exulcerationes nostro judicio curationem admittunt, si singularis Medici, aut Chirurgi dexteritas, & ægri obedientia accedant. Periculosæ verò sunt quàm maximè illæ, quæ visceribus vicinæ ad musculorum capita, vasa, articulos, dorsum, vertebra, ossa, ventrumque cavitates extensæ quoque gravia post se symptomata relinquunt, ut febrem, cachexiam, tabem, synopen; degenerant quoque non raro in phagedænica Ulceræ in intestinis, sæpe, & claudicationem in femore inferunt. *Fistulam* ventriculi feliciter curatam fuisse ex *Eph. N. C. Ann.* 7. & 10. *Obs.* 131. à Nobis communicata constat, quæ circa juncturas manus, aut pedis nascuntur, cum nec manum Chirurgi, nec Medicamenta decenter admittant, difficillimè sunt curatu. Ut & canerosæ perdifficilis sunt sanationis. Quas etiam plures non semel attingendas esse volunt: curatam tamen talem memorat *Georg. Valschius exoticar. curat.* *Fistulæ* non benè curatæ facillè iterum recluduntur, coacervata materia imprimis ubi subest caries ossium, aeris autem perforat. Sunt, & nonnullæ, quibus ocluduntur *Fistulæ*, hinc conqueruntur de anxietate, & angustia pectoris, respirandi difficultate, &c. ratio est, quod sunt coagulationes in succis nostris. Ex



materia effluente majus, vel minus periculum concludere potest Chirurgus, si enim materia valde foetor, & circa os latet, signum est carici ossis, si circa juncturas prodeat & foeteat, signum est corruptionis tendinum. Fistulam pedis gangrenosam lethalem observavit Celeb. Georg. Francus, P. P. Heid. Decur. Eph. Germ. An. 6. Obs. 81.

*Cura dietica,*

§. 12. Non duntaxat Medicamenta commoda in Ulceribus, ac Fistulis inserviunt, sed & *Dieta* in his non negligenda est, ne Medicus, & Chirurgus semper suppeditata nova causa peccante, inane laudat operam. Aer ergo eligatur purus, nitidus, nullis inquinamentis, & nebulosis, falsis, ac acerbis exhalationibus inquinatus, sed temperatus, nimis enim frigidus sanguinem, & ceteros circulantibus succos incrassat, & nimis calidus acrioribus suis particulis sanguinem, reliquosque succos replet, & sic ansam Ulceribus, ac Fistulis præbet, & quævis aeris in sanandis Fistulis sit, legi meretur Obs. 43. volum. 3. æst. Hassnienf.

Post aerem cibi, potusque ratio habenda est, usurpentur ergo omnes cibi volatili gaudentes sale, & videntur angue pejus omnia acida, falsa, acrida, saccharata, sive dulcia viscida, de quibus alibi ad nauseam diximus. Hoc asterisco etiam notandum est, quod acida valde noceant, sæpius in mensa assumpta, ex ejusmodi enim acidorum abusu, imprimis succi citri singulis cibis in mensa aspersi. Sereniss. Elector Palatinus Carolus Princeps certè seriore Libitina dignus, non tantum placentiam emaciatus est, sed etiam post mortem ipsius in intestinis innumera inventa fuerunt *Flerra*. Fugiatur ante omnia vinum Rhenanum, aque ac Mosellanum, & Baccharagense, si sint sc. acidæ, quæ ob aciditatem maxime nocent Ulceribus, ac Fistulis, concedatur verò vinum Gallicum, aqua pro re nata dilutum, vel Malvaticum, vel Tokayense, potus Thez in omnibus Ulceribus item & Capheæ maxime conducit, &

nunquam in his negligendus est, quoniam ope hujus potus particule acres salinæ viscidæ peccantes, vel per urinam, vel per sudorem eliminantur; sive aqua calida, qua utitur Czar ordinariè in Moscavia cum pauco fermenti panis, & ad stomachum roborandum interponit aliquando vitrum vino Hispanico repletum, & sit longævus. Vel sumatur istius in Gallia usitate aquæ vitæ, nomine l'eau de Siam insignitæ parvum vitrum. Somnus sit largior et si etiam sit meridianus, quem concedimus, quia is nihil aliud est, quàm mortis frater à debiliore influxu spirituum obortus, quo enim quis volatiliorem, & subtiliorem sanguinem, & succos habet, eo minus ad somnum proclivis est, quo verò sanguis & succi crassiores, tenaciores, & viscidiores, eo ad somnum propensiores sunt. Vigiliæ verò, ut & lucubrationes modum ne excedant. Vigiliæ enim portiones spirituosas in M. S. nimis absumunt, sicque sanguinem vappescientem quasi lentumque ac viscidum relinquunt, succos etiam exsiccant, eosque acres, ac corrosivos reddunt.

Morus, & quies ita alternis vicibus instituenda sunt, quo minus spiritus deprimi, aut motus eorum impediri queant, nam per motum sanguis, & succi nostri atenuantur, & ad circulationem promptiores redduntur, quies verò nimia succum nostrum nervosum, seu spiritus animales in musculis nostris, (qui sunt interni motores nostræ machinæ aque rotam molare circumgyrantes) nimis exhaurit, producitque vappescientem, lutosum, ac viscidum sanguinem succosque, sicque ansam dat Ulceribus, Fistulisque nostris. Per motum etiam nimium avolant particule subtiliores remanentibus in M. S. lutosi ac viscidis ramosisque particulis, sanguinem, ac succos incrassantibus.

Excreta ac retenta denique ad ordinarias leges debito modo revocandas esse Auctor ero, præprimis mensum in feminis. Fluxus solitus pro-

moveatur, nec insensibilis transpiratio impediatur, sic & urina, fluxus feminis, lac ac saliva, ut & alvus sit lubrica, ita ut eger ex usu tam Medicamentorum, quam Dietæ optime regimine cum sanitate pristina in gratiam redire possit.

Animi pathemata, ut mæror, ira, &c. Venerisque ludibria nimia maxime hic nocitura recte rationis freno coerceantur, ne breve illud gaudium diuturna Ulcera, & Fistulas excipiat.

*Galenicorū  
cura in Vl-  
ceribus.*

§. 15. Tradita nunc cura Dietetica, Pharmacia, vel Chirurgia manum auxiliatricem alteram porrigit, cum Ulcera neglectis internis remediis non tantum in deterius ruant, sed & plurimum, aliorumque vehementiorum, ac lethaliū morborum Auctores esse possint, quod præter experientiam monumenta Medicorum abunde testantur. Prius ergo de Ulcerum curatione audiamus *Galenicorū*, qui *Indicationes* desumunt ab ipso morbo, à causis ipsius, & à Symptomatibus. Ulcus itaque cum sit solutio unitatis, reuniens expetunt, & cum deperdita sit substantiæ portio, repletionem instituunt; causæ indicant sui remotionem, symptomata verò sui delinitionem. Ut primo satisfaciant scopo siccantibus, & parum adstringentibus, utuntur ad præscriptum *Hipp.* iniquentis, quod siccum est, sanum; quod madet, ad vitium propius accedit. Siccandum esse ajunt ob excrementum tenue, abstergendum verò ob excrementum crassum, quod utrumque in Ulceribus reperitur: eadem tamen & in eodem statu Medicamenta non esse adhibenda docent, nam juxta ipsos Ulcera quatuor habent tempora, principium sc. augmentum, statum, & declinationem. In principio autem, ubi sanies est valde cruda, & in ipsa parte generatur, presente inflammatione, dolore, &c. adhibent maturantia, & dolorem parum sopientia, & tamdiu insuppurantibus persistunt, usque dum pus album, laxe, & æquale appareat: in augmento crassiori sc. excremento perco-

ationem sese accumulante abstergunt: in statu, & declinatione in hac tamen magis, sarcotica admittunt, in fine tandem cicatrificatoria applicant. Si verò aliquid grave Symptoma Ulceri sit complicatum, quod rationem causæ induat, & Ulceris curationem impediatur, isti auferendo prius incumbunt.

Primo itaque omnium *Galenici* in *Ulcerum Curatione* convenienter instituant Dietam, tenuiorem scilicet, & aliquantum siccantem, partis tamen temperiem maxime respicientem: secundo evacuantia, repellentia, aut interceptiva praefidia adhibent, itaque venæ-sectionem, si adfit plethora; & purgationem si cacochymia urgeat, præscribunt, humorum verò qualitatem alterantibus tum alimentis, tum Medicamentis corrigunt, etiam per cucurbitulas, frictions, ligaturas, vincula, &c. contrariis partibus adhibent, revulsiones, & interceptiones instituunt, per Medicamenta frigida humores fluentes interceptiunt, incrassando scilicet humores cogendo, & adstringendo: tertio solliciti sunt de symptomatibus corrigendis: & quarto de omnimoda Ulceris curatione. Ut itaque Ulceri simplici auxilietur, ad maturantia confugiunt, ætati, & temperamento congrua, in corporibus enim mollioribus mitiora sufficiens, ut ver. gr. illud quod fit ex vitello ovi, & ol. rosaceo, in corpore verò non ita molli, illud quod fit ex terebinthina, & vitello ovi, in corpore sicco, ac adulto addunt oleum mastichinum, & farinam hordei, pulv. thuris, succum apii, sem. lini, pingui. anatis, &c. nec toto Ulceris tempore continuant suppurantia, ex metu, ne Ulcus fiat sordidum, sed tantum donec sit optimum fundamentum carnis rubicundæ, & vivaci positum: nam deinde sufficere ajunt psumaceolas, sive linea filamenta; regenerationem solius naturæ esse opus arguunt, modo sanies, & quæ hoc opus impediunt à Chirurgo arceantur. Cum  
duo

duo hic esse excrementa. statuant, crasum & tenue, crasum abstergunt, & tenue exsiccant, v. gr. farina hordei, foenigreci, thure, aloë, ungu. Basilico majore, ac minore: si sicciora sunt corpora, adhibent aristolochiam utramq; farinam orobi, lupinorum, fabarum, ungu. de matrisylva: si verò corpora sint valde sicca, ad magis adhuc siccantia deveniunt: ut sunt Chalcitis, lapis calaminaris, cadmia usta ac lota, tutia, absinth. ung. Apostolor. Ipsorum abstergentia Medicamenta sunt hydromel, de apio, mel rosaceum, pulv. sem. erucæ, &c.

Si cavitas repleta est hisce, & remanet tandem simplex, seu superficiale Ulcus, præferibunt *Cicatrisantia*, seu epulotica, uti sunt emplaf. de lapid. calam. diapalm. myrrh. olibanum, aloë, cinis corii antiqui, pomphol. plumbum usum, ungu. de minio, balauft. bolus Armena, terra sigillata, sem. sumach, unguen. desiccativum rubrum, alumen scissile, pulv. rosar. rubr. santal. rubr.

Si calida Ulceris fuerit intemperies, ad refrigerantia illico confugiunt, ex. gr. ungu. album Rhafis, album Camph. de cerussa, de tutia, populeum, refrig. Galeni Santalin. aqu. plantag. rosar. portulac. succ. semperviv. solani, cicutæ, bursæ pastoris, vinum nigrum stypticum, ex quibus plurima parant remedia, intus quoque ea quæ refrigerant, administrant, ut sunt emulsiones Jutapia, Juscula, &c.

Si intemperies Uleeris fuerit frigida, ad calida topica confugiunt, ut sunt oleum Therebinth. hypericonis, de spica, anethin. camomill. vinum calidum spongias applicatum, unguen. Apostol. ceratum, de betonic. quod si magis calefacere oporteat, aquam vitæ, vel vin. Hyspanicum calidè spongias applicant, in quibus coquant salu. hyssop. absinth. pulegium, rosamarin. folia Lauri, lavendul. &c. Imò adhibent oleum euphorbii, aut de piperibus mistillant.

Si intemperies humida fuerit, sic-

cantibus utuntur, siccam verò intemperiem præ reliquis maximè considerant, & eò respiciunt, an intemperies hæc sit ex alimenti defectu, vel ex impressa sicca intemperie, vel ex utroque. Si ex alimenti defectu, quod pars non ritè attrahat, cibo euechymo, & facilis distributionis utuntur, dein adhibent fomenta, aquam tepidam, cucurbitulas, picationes, fridiones, &c. donec ipsa pars rubedinem contraxerit; si verò intemperies sicca sit impressa, humectantia adhibent, ut sunt aquæ temperatæ fotus, vel seq. unguentum humectans.

*B. Fol. malv. confus. 15ß.*

*butyri recent. 3 viij.*

M. coquantur usq; ad mollitiem, trajiciantur, dein adde

*ol. lil. alb. 3 iß.*

M. F. linimentum.

In *Ulcere Phlegmonoso* vinum tepidum, in quo mala punica fuerint cocta, vel poscam, vel mulsam aquosam applicant: in *Erysipelatoso* Ulcere convenire ajunt cataplasma ex cydoniis, & piris acerbis, cum vino, & aceto factum: si Oedema adsit: Medicamenta paulò magis calefacientia; si feirrhus, simul emollientia: si durities in Ulceris labiis cum decoloratione adsit, eam quamprimum tollunt. Imprimis hoc in casu emollientia commendant, tale parant Cataplasma.

*B. Mucilag. sem. alibæ aq. malv. extr. 15ß.*

*pingued. anatr,*

*anseris,*

*Gallinæææ. 3 iij.*

*farinæ sem. lini 3 iijß.*

*mica panis triticeæ 3 iv.*

c. f. q. lactis coq. ad consistentiam catapl. ita tamen, ut pinguedines ultimò demum injiciant; vel instituant embrocationes ex decocto carnis arietinæ, quæ & insigniter emolliunt, & temperant. Si durities fuerit à repletionem, evacuantia, & resolventia suadent: si humores grumosi duritiem efficiant: eos dissolvunt emollientibus simul incidendi vi pollutibus, & Medicamentis in hunc finem acetum admiscunt.

fcant. Si partis duræ color niger fit, eam novacula a parte fana feperant, vel fcarificant, vel cauterio ad decidendum follicitant, vel cotroſivis fortioribus tollunt. Quod ſi vermes in Ulceribus à putredine, & pituitoso, ut illi dicunt, excremento generati fuerint, eos auferunt vel necando, & putredinalem illam humiditatem tollendo; Vermes auferunt vel ſpecilli cuspide, vel alio quovis instrumento; quod ſi hoc efficere nequeant, applicant amara ex abſynthio, aloë, centauro minore, tanacetio, ſcordio, helleb. nigr. parata remedia, vel etiam ferro candente eos interficiunt. Ulcera cum oſſe corrupto curant purgatione, ac pro re nata venſeſſione inſtitutis, dein os denudant, niſi obſtent nervi, venę, aut arterię majores. Item ſi oſſa capitis, femoris, vertebrarum fuerint corroſa, ab incifione, & uſione abſtinent, & potentialibus tantum utuntur, in aliis autem corruptis partem oſſis incidunt, urunt, & auferunt; ſi caties tantum fuerit ſuperficialis, eam tollunt ſiccantibus remediis, ut ſunt aloë, ariſtolochia, ſem. ſumach, pumex calcinatus, cinis ſiueſneus, calx, ſax uſta, rad. ireos, &c. quæ tamen ita applicant, ne circumjectæ partes tangantur, hinc filamentis has bene muniunt. Prædictos pulveres, vel cum melle, vel cum ungu. ægyptiaco, vel cum terebinthina, pice, cera, &c. miſcent, & applicant, os autem per Chirurgiam, vel abraſione, vel uſione tollunt, quæ omnia videri poſſunt *capite de Carie Oſſium*.

Ulcus virulentum depaſcens, Phagedenicum, ſeu Ulcus ambulativum cutant *Galenici* humorum peccantium evacuatione, virulentæ materię exſiccatione, & intemperiei correptione, Ulceris repletione, conſolidatione, & cicatrifatione. Primę indicationi ſatiſfaciunt corpus bene expurgando, ſanguinem, ſi exuperet, extrahendo; humorem intercipiunt per deſenſiva. Dein ad localia perveniunt, inter quæ frigida, ſicca, & ſtipicia commendant, uti eſt aq. aluminofa, dein ung. diapom-

pholygos, vel ſequens, aut ſimile.

*B. Herb. plantag.*

*prunell.*

*burſ. paſſor. aa. M j.*

*fl. roſar. rubr.*

*balauſtiorum,*

*nucum cupreſſi, aa. ʒ iij.*

Decoq. in aqu. fabrorum, & æcēi partibus æqualibus, quo decocto ulcus corrodens ſæpius abluitur, deſenſivis inter partem mandantem, & recipientem ſemper diligenter applicatis. Quod ſi verò hiſce non juvantibus malum ulceris ſerpat, Guidonis curam, cum lamina plumbea perforata ſuperligata approbant. Dein ſi nec iſta proſint, ad eſchatorica, vel ignem actualem confugiunt, hoc enim melius, & præſtantius nullum reperiri, ajunt, & in Ulcere Phagadenico, venerea plerumque malignitate pertioaci 10. vel 12. instrumenta ferrea candentia Itali exſtingunt. Poſthanc operationem, ne Inflammatio parti ſit inducta, refrigerantibus agunt, ut ungu. albo Camphor. album. ovor. ole. roſar. bene conquaſtatis, vel ſucco ſolani cum ungu. albo Rhais conjuncto. Quod ſi omnis malignitas ablata fuerit, tandem Ulcus more aliorum implet, conſolidant, & cicatrifant.

*Ulcus ſordidi* curam peragunt, (1.) *Dia* ritè inſtituta, (2.) humoris peccantis evacuatione per revulſoria, ac derivatoria, (3.) topiciis, ſeu localibus. Quod ad localia pertinet, corpore bene mundato, orificii dilatationem quamprimum moliantur, ſemper à nervis, venis, & arteriis officioſè cavendo: vel loco ſeſſione, eadem ſacta cautione, cauteria potentialia applicant, dilatationem ſinumque aperiant. Si Patiens eam admittere nolit, injiciunt deterſoria, & exſiccantia talia ſunt muſſum, cui aliquid, ad putredinem magis arcentdam, oxymelitis addunt, ad primam injectionem muriam, lixivium, aqu. aluminofam, &c. adhibent, vel etiam, ſi adeſt maligna putredo, injiciunt Ægyptiacum in ſpiritu vini cum pauca theriaci diſſolutum, quan-

quando Inflammatio abest : hæc enim si addit, cremor, hordei cum melle rosaceo mixto, vel aqu. muls. in qua absinth. symphytum majus, &c. coquant. Facta absterfione vinum calidum rubrum pro corroboracione injiciunt, cui vino incoquant myrrham, thus, aloen, sarcocollam, & similia sarcotica, extra vero spongiam rubrum vino calido madidam ita applicant.

*Galenicum cura in fistulis.*

*Fistularum* Curationem perficiunt instituta, *Dieta*, dein humorum *evacuacione*, internorum membrorum correctio: & topicis Medicamentis, jecur, lienem, stomachum, caput, &c. confortant tum per appropriata, tum per decocta ex lignis, & herbis aliquoties repetita. Optima ergo *Dieta* instituta, expurgato corpore, partibus internis roboratis, fluxione à parte affecta in contrariam retracta, vel saltem prohibita, aut intercepta, cum hic sese plura offerant, utpote sinus, callositas, & orificii angustia, hinc vident à quonam horum incipiendum sit. *Fistulas* enim curari non posse ajunt, nisi callo ablato, & orificio taliter dilatato, ut Medicamenta ad cavitatis fundum pervenire possint. Itaque ab orificii dilatatione curam omnino auspicantur, quod fieri ajunt turundis ex valde compressa, & colligata spongia, vel etiam ex medulla ligni sambucini cum extractorio filo, ut, si in sinum ipsum incidierint, turò possint extrahi. Talia, postquam humores imbibuerunt, sese dilatant, adeoque orificium ampliunt, hinc per duodecim horas esse relinquenda monent, dein extrahunt, & sic turundas majores semper esse introducendas dicunt, donec foramen sat amplum fuerit redditum, imò usque ad sinuosæ cavitatis fundum si fieri possit, pertingant. Hoc facto callum asperunt, quòd si Patiens neque usionem, neque incisionem ferre velit, callusq; non sit admodum crassus, cum *Corrosivis* præmissa prius scarificatione, consueperit, talia sunt ex ipsorum

sereniis, uti ungu. *Ægyptiac.* succus tabaci, resur. rad. aristoloch. rotund. asphodeli, melle illitæ, ad id maxime laudant rad. hellebor. nigr. per triduum in cavitate detentam. Præcipue si is sit ab humore melancholico, conducere ajunt elaterium, terebinthina exceptum & applicatum. Valentiora ipsorum corrosiva sunt Chalcanthum ustum, pulvis Cantharidum, Sapo niger, lac esulæ, lixivium ex cinere & calce viva, &c. Ex his componunt turundas & imponunt, ex. gr.

*℞. Aeruginis ʒi ss.*

*ammoniaci ʒi i.*

*aceti q. s.*

*M. F. Massa.*

Unde formant turundas *Fistulis* indendas.

Alii ex corrosivis illis pulverem conficiunt, quem deinde in foramen per cannulam insufflant, alii eosdem pulvres cum mulla dissolvunt, & siphone injiciunt in *Fistule* foramen, id quod maxime observant, ubi *Fistule* sunt valde profundæ, cuniculosæ & antra-ctuosæ: illuc enim sola liquida penetrare possunt. Dum acria hæc administrant, defensiva semper ad vitandam majorem à dolore concitatam fluxionem, & consequenter inflammationem, applicant; faciliorem verò & breviorum viam esse arguunt, vel per incisionem, vel per usionem, imprimis ubi *Fistule* sunt profundæ, eò enim tendunt, ut ad ipsum fundum perveniant. Si ergo secare velint, primò specillum ligneum immittunt, suprà quod instituunt incisionem cum novacula aut scalpello, atque ita omnes sinus, vitatis vitandis, detegunt & aperiunt, donec eorum finem adinveniant. Sequenti dein die callum vel caustico, vel corrosivo consumunt, adurant & omnimodò tollunt. Deinde post operationem oleo rosaceo cum vitello ovi bene agitato dolore demulcent, quo factò butyro recenti vel alius unctuosus elenatam pati-

latim emolliunt, & ad deciditiam præparant, quo peracto, si pus album, læve & æquale succedat, & Ulceri color laudabilis redeat, boni successus spem esse optimam memorant, si præcipue dolor, tumor & alia symptomata recesserint, & optima caro, loco calli per Sarcotica incipiat regenerari, quod antequam fiat, Ulcus probe esse detergendum monent, ne ullum Fistulæ seminarium remaneat. Quod si, vel ob debilitatem agroti, vel ob loci, in quo est Fistula, periculum talis cura institui non possit, *Palliatiua* sufficere *Curam* ajunt, hinc tenuem imperant Diatam, corpus autem superfluis scatens humoribus optime expurgant, & quantum fieri potest, fluxum ad partem minus nobilem derivant, quin & , juxta ipsos, non læve adest periculum, ne antequam percurrent Fistulam, sine fluxionis derivatione, materia ad partem mandantem regurgitet; hinc Fistulas in pedibus, & manibus ad magis constantem sanitatem sæpe relinquunt, quin & in mutatione ætatum, uti sæpius observarunt, desinunt.

*Paracelsi  
processus  
in cura  
Vulcerum.*

§. 14. *Paracelsus* curam, sanationemque patentium *Vulcerum*, in Balsamo solum consistere censet, quod eo corporis loco simile Balsamum deficiat. Addit sequens exemplum: corpus in se Balsamum continet, quod à putrefactione conservat quicquid in illo continetur, ubi tamen eorum aliquid à corpore separatum fuerit, huic balsamo non subest amplius. Balsamum quo sanari debent Ulcera, consistere ait in exterioribus elementis, & esse id, quod alia genera defendit à putrefactione, nuncupat ergo Mumiam corporis exterioris elementorum, h. e. fructuum eorundem, quamvis enim Mumia sit, cum tamen ab uno in aliud applicatur, Balsamum esse dicit. Nam quod ex uno corpore transfertur in aliud, vel permutatur, est *ipsi* Mumia transmutata, sub nomine Balsami comprehensa. Hujus extractionem Balsami fieri autumat in separatione, sic, ut hoc ipsum, quod su-

stentatur à Balsamo, sumatur. Jam ad hæc animadvertit, Balsamum existere, præter liquorem Mercurialem, unde existimat, in Mercurio sanationem omnem contineri. Similem & potentissimum in Theriacib, & Nofloch, item in aquæ mineralibus, terræque fructibus Mercurium haberi meniorat. Ex eo colligit, Antimonium excellentissimum Ulcerum exhibere Medicamentum, cum hujusmodi liquoris Mercurii plus in se continet, quam aliæ quævis Margaritæ, Kakimix, & cætera similia. Solum ex eo curam, & sanationem suam recipere aurum statuit, quod supremum arcanum, ac remedium habeat. Subtiliorem enim liquorem Mercurialem inter ea, quæ per elementum aquæ producuntur, minime reperiri posse existimat. Similiter eorum, quæ terra profert, nullum excellentius arcanum sanationis existere ait, quam liquorem Mercurialem ex Realgare Cheiri. Liquorem Mercurialem esse scribit pro parte crocum Martis, pro parte florem Veneris, & pro sua parte spiritum Jovis, non tamen eò prorsum adductum: quum separatio vera facta fuerit, juxta sui recepti, vel processus potius tenorem, unumquemque liquorem Mercurialem hujusmodi potentissime curare Ulcera promittit.

Primo, quod ad Balsamum attinet ex auro productum, in Ulceribus adeo proficuum, in hunc modum elici censet, ut aurum hoc absque spiritu salis omni, tum realgare, vel similibus, in pulverem, oleum, aquam, aut hujus generis tale quid adducatur: quod nedum in auro, verum etiam in quovis ei simili corpore per transmutationem fieri debet. Nam absque simili transmutatione mineram nullam suas operationes adimplere posse ait, ut in se continet, ac habet à natura, licet aliquam similitudinem exhibeat, ex fundamento verò non procedit. Ejus extractionis processus est, ut aurum per Theriacibin crudum in succum redu-

catur



atur absque destillatione quavis. Nam per destillationem sal exaltatur, quod juxta cum in hoc auro nullo modo predominari debet, nec alia via quacunque reducendum esse ait in pulverem. Recipe ejus est sequens:

*℞. Auri laminati ℥i.*

*olei de pino ℥ss.*

Pone simul in digestionem septimanis quatuor, postmodum oleum abluet, manebit in fundo pulvis. Hunc una cum Theriabin crudo administrat. Vel alio modo sic procedit.

*℞. folior. auri ℥i.*

*olei massicis ℥vi.*

Digerantur per mensem. Postea separatur ab oleo, sicut prius, & affunditur alcohol vini, digerit per octidies, postmodum abstrahi vult à balneo Maria. Hoc oleo in Ulceribus utitur.

Ex ferro similiter balsamum ad hunc modum parat, scilicet, ut cum aceto destillato reverberetur in crocum, à quo postmodum octies, aut novies elevari jubet sal armoniacum, & inde post in oleum redigit optimè dulcificatum. Usus horum, auri videlicet ac ferri designat, ut illud qualibet septimana ter Ulceribus patentibus imponatur, ferrum verò singulis duodenis horis semel.

Pariter in Cupro similem balsamum existere contendit, quum in Vitriolum rursus convertitur, & hoc in aquam, ejusque postea Colchotar in rubrum oleum, quæ quidem ambo valere ait ad omnia *Vulnervaria Ulcera*, sicut Cancer, Lupus, Fistula, vel similia corrodentia quæque foramina fuerint.

Ex plumbo etiam spiritum istum parari posse, nullus dubitat, si per acetum destillatum ex cineribus ejus extrahatur, quæ dulcedo postquam in oleum venerit, nendum Ulcerum patentium, verum etiam apostematum, & Vulnerum admirandum esse remedium narrat.

Similiter ex Argento Vivo, quum in oleum convertitur, auri balsa-

mo comparandum esse statuit, & ubi congelatum postmodum fuerit à Colchotare, postea cum aqua Parthenionis alkamistiatur, omnia quotquot sunt ex *Ulcisima*, & in crocum versus, aut præparatum in florem, Ulceribus ejusmodi summam curam exhibere dicit.

Præstantissimum etiam ad Ulcera patentia approbat remedium ipsa realgaria, prædictis non immerito comparanda. Arsenicum enim quodcumque patens Ulcus, cujusvis etiam conditionis fuerit, validissimè sanandi, sufficientes vires habere inquit, hoc suo processu tamen, ut sibi venenum, quod habet, auferatur ad hunc modum, fixat per sal urinæ, denum in oleum per se ipsum convertitur, quodvis Ulcus patens persanandi potentissimum. Hac via cum Antimonio incedit, ubi hoc in pulvis aqua Vitrioli decoquit, & postmodum ab eo sal armoniacum elevat, colat, & rubrum obscurum colorem deprimat, & spissum liquorem, eandem, ut antè dictum, virium.

Salium etiam vires ad Ulcera patentia maxime virtutis esse scribit, quum alumina suis privantur corrosivis, absque stiptice suæ conditionis corruptione, sic ut ab alumine liquor sumatur, non tamen à calcinatione; contra capi vult à Vitriolo suum oleum, & liquorem nullum, à sale colorem deducit puniceum, à alio semoto. Ex salibus præparat in hunc finem balnea, quæ mineralia, ut ipsæ thermæ continent, quandoquidem, juxta ipsum, ex salibus omnia balnea procedunt. Horum etiam virtutibus aquam frigidam calefacere arguit in balnea, quæ patentia quævis Ulcera curare, sanareque posse testatur.

Balsama etiam terræ ad sanationem *Vulnerum* adhibet *Author*. Notat ergò, Mumiam terræ balsamum exhibere, quum ad eundem salis urinæ modum in aleali reducit. Postmodum omne, quod ex

terra nascitur, Mumiam latius præbere ait.

Balsama arborum, qualia Botin & Juniperus exhibet, partim in Ulceribus aliquid posse contendit in uno quàm in alio magis tamen aliquando frondes aliàs fructus excellere dicit alia. Generale tamen magis eligit Balsamum. Inter arbores, aut herbas aliquod Parthenion simile laudat, quum liquoresejus in modum extrahuntur, ut sua virtus Mercurialis maneat, cum administratione sui vera: hac viapotenter evadere ait Chirurgum in Fistulas, Ulcera corrodentia, cancrum, ferruginem, &c. quocumque modo, vel forma fuerint. Et non aliàs ac moscus aromatum odores excellit omnes, Parthenion virtutes omnium vegetabilium, arborum, herbarum, &c. quæ terra producit. His ille Balsamis terræ Mumiz, compositionis ejusdem, & Parthenionis omnium terrenorum balsamorum vires conclusisse vult. Pari modo quod, juxta ipsum, elementum aeris in suo Thereniabin exhibet, liquosa Thereniabin existit, supremi balsami. Sed pro tenore suæ contentione, & elementi proprietate, separari debet à sua humiditate, per additionem Parthenionis non alias & Nostoch, cum tamen ista non sint in usu, reperi tu satis difficilia.

Mortificationem, ac Mundificationem in Ulceribus instituit. Mundificatio ipsius est sequens.

*℞. picis navalis ℥i.*

*visci pini,*

*abietis aa. ℥ss.*

*visci locustarum à larice ℥ss.*

*pic. larigne ℥iii.*

liquefiant omnia simul cum vi omnium cere medietate, ac olei, quantum satis fore videbitur, ut formam acquirat emplastri. His peractis curam aggreditur sequentibus.

*℞. Cera-*

*picis communis aa. ℥ss.*

*avistoloch. rotund: ℥iii.*

*mumia ℥ii.*

*antimonij triti ℥ xv℥.*

*M. f. Emplastrum, & eo mane vesperique ligat, juxta consuetudinem.*

*Vel:*

*℞. Resm. abietis ℥ss.*

*visci consolidæ ℥iij.*

*succi chelidonia q. s.*

*inde fiat Emplastrum.*

Ad Ulcera mundificanda tali utitur remedio.

*℞. Aluminis usi ℥ss.*

*in acet. extincti*

*mellis ℥ss.*

*aloepatici ℥i.*

pulverisanda pulverizentur, & super ignem coquendo modicè commisceantur, & in emplastri non duri formam reducantur, hoc mane vesperique ligari vult Ulcera. Si vetera sint & prava calcinati parum addunt, & sic mundificabuntur ad fundum usque, moxque suadet sequentem consolidationem.

*℞. fodicationem emplastri ℥i.*

*secundum artem Chirurgia compositi, cui croci maris addatur ℥ss.*

*& calcinati ℥ss.*

& inter manus commisceantur, hoc Medicamento liganda vult Ulcera mane vesperique in finem conclusionis.

Pro tertia cura eò respicit, ut quod consolidatum est, hac ratione stabilizetur, ut singulis annis aliquot vicibus venæ magnæ, vel varices aperiantur, & venæ sævientes in furis, aut nodis extrinsecus, aut intrinsecus pro damni respectu.

Curam Ulcerum emortuorum peragi vult per mundificationem, & postea consolidationem, mundificationem perficit calcinatis; curam fodicationum emplastris: & conclusionem croco Martis. Calcinata miscet cum unguento de melle, hoc ligat tandiu, donec bonum fundamentum appareat, absque putrefactione carnis, & scetore, aut similibus; quod quinto ad summum dici fieri dicit. Fodicationum emplastra ex lithargyrio, vel colophonia superponit, & ligat, quinto quoque die renovat emplastrum, ab initio semper con-

continuando. Concludit curam crocò Martis, quem in igne per se combustum, aut reverbatione paratum, non per acetum Ulceribus istis inspergit quoquo die bis. Secundo etiam inspergit, lavatque prius ulcus hac aqua:

*R. communis aquae Mens. part. 5.*

*aluminis 3 i.*

*salis communis 3 lb.*

Et ubi mundè laverit, exsiccet, postmodum inspergit crocum Martis, & concludit. Patienti post dictam, aut ordinem in cibo, & potu praescribit, necnon phlebotomias convenientes supra damni locum. Etiam in Thermais balneare reperit proficuum.

Sic quoque curanda vult Ulcera simul accumulantis, & eorum per se aperientia, admiscet tantum aliis ungu. de vitell. ovor. cum calcinatis, add. oleo Mercurii. Imprius si duri adfuerint nodi. Sequens magni aestimat.

*R. Corticum ovor. calcinat. 3 lb.*

*aluminis usi & extincti 3 i.*

*crocò mart. 3 i lb.*

*thuris*

*massicis*

*myrrh. 22. 3 lb.*

His omnibus tritis utitur ut moris est.

Curam satentium Ulcerum peragit Author itidem mundificatione & consolidatione.

*R. Resinae par. abietis 3 i.*

*cum vitellis fungu. add.*

*calcinata pro libitu.*

consolidationem instituit per sequentia.

*R. cera 1 lb.*

*colophon. 15 lb.*

*resin. quam coxisti 3 iii.*

liquefac omnia simul; postmodum injicit pulverem hunc

*massicis 3 ii.*

*myrrh. 3 vi.*

*carabis flavi 3 i lb.*

*addit postremo.*

*consolida maioris.*

*aristolochiae rotundae 22. 3 lb.*

Redigit simul in emplastri formam, quo mane vespereque ligat.

In Cura Ulcerum, quorum unum

in aliud genus transmutatur, eadem fere remedia approbat, imprimis Mercurium, & lithargyrium: item Ulceris agnati curam, & eorum, quae tracturas, aduersiones, vulnera insequuntur iisdem peragere vult.

Ad Ulcera ex propria constellatione oborta curanda sequens commendat.

*R. Chelidoniae Miii.*

*folior. quercus M ii.*

In fimo putrescant, & postmodum in oleum destillentur, quo lavat haec Ulcera, & dein pulverem ex iisdem ad incarnationem inspergit. Plura, atque infinita ex ipsius Authoris seriniis depromi possent, nos verò hac vice selectis contenti sumus, non enim animus est omnia describere, sed tantum meliora.

Paracelsus noster de *Fistulis* disserens inquit, nunquam hactenus auditum esse, hoc genus Ulcerum sanatum per se fuisse, verum per Medicamenta solim & optimè conditionata, alias verò minime curari testatur. Duplicem Fistularum agnoscit curam, videlicet internam per potiones, & externam per aquas, & emplastra, vel alias limitationes. Cum verò semel consolidata fuerint, nunquam amplius erumpunt, nec indigent conservationibus, & minus dicta, in quem finem portionem talem commendant.

*Paracelsi  
cura in  
Fistulis.*

*R. ciclaminis M ii.*

*saniculae albae M i.*

*herbae Sophiae M lb.*

Coq. in vino prout vulnerarias potiones. Postmodum addit

*caryophyllor. olei per alembicum tracti 3 i lb.*

*M.*

Ter quovis die Patientibus dat in potum, ut in quovis haustu iusta sit olei portio mixta & aequalis. Hac portione sola recentes Fistulas sanat. Ablutionem sequentem commendat.

*Destilla simul 3 iii. olei laterini 3 vi.*

*olei Terebinth. 3 i lb. olei caryophyllorum per alembicum,*

*& post-*

& postmodum cum additione haursum destillat.

*R. mafficis*  
*myrrhe*  
*thuris* aa. ℥ ii.  
*mumia* ℥ iii.

Destillat hoc abluit Fistulam immiffione per Syringam usque ad fundum quovis die bis: vel intermissis vicibus abluit eodem instrumento sapids vino, vel aqua salsa, ut in eis nulla putredo maneat.

Extrinfecus applicat fodicationum emplastrum cum calcinato mixtum, & eo mane vespertique ligat, secundum usum: alia multa quæ Fistulas curant, commendat, ut oleum Saturni, oleum Mercurii, aqua Mercurialis. Hæc certissima esse, & minime fallentia Medicamenta renunciat. Sequens quoque commendat ad Fistulas.

*R. aqu. de cornibus cervi* ℥ i.  
*centaurea*  
*consolida aurea* aa. ℥ iii.  
*parthenionis* ℥ iv ℥.  
*His imponit*  
*rhabarbari*  
*mannæ elect.*  
*spermatiscetia* aa. ℥ i.

Hujus optime commoti singulis vicibus mane vespertique exhibet cochlear unum, & mox inde vini cochlearia tria. His potiunculis mundificari ait internæ Fistulam, per seque sanari, absque Medicamento latius externeque posito. Et si quid superponere velis, sequens suadet Emplastrum.

*R. degummi quatuor* ℥ ii.  
*cera* ℥ i.  
*Coquantur simul & iniice*  
*visci botini* ℥ iii.  
*Fiat Emplastrum.*

Ad ejusmodi Ulcera putrida eavernosa, seu Fistulas croci, hermodactylorum accipit grana vi. olei Nutis grana iv. permiscet, ac inquinque partes dividit, quarum unam singulis noctibus ministrat. Postmodum sequens Emplastrum imponit.

*R. ceræ abietis albi* ℥ i.  
*visci de botin.* ℥ ii.  
*resina communis* ℥ i ℥.

Liquefiant omnia simul, & eis addit nucum olei ℥ iii. Minii.

*Lithargyr.*  
*lap. calaminar.* aa. ℥ ℥.  
*intia* ℥ i.  
*carabis* ℥ iii.

Terenda conterantur, & ex omnibus fiat cerotum, & postquam satis coctum fuerit, addit calcis Corticum ovorum ℥ vii ℥. & in migdaliones agitat.

Ad Fistulas sequens Emplastrum magnipendit.

*R. Empl. de Mumia* ℥ ij.  
*visci de botin.* ℥ i ℥.  
*consolida rubra liquorum* ℥ i.

Fiat Empl. quod superpositum immotum ad sex dies maneat.

Postea innoyat, & æquè diu relinquit.

Vel:

*R. Aqua Galotheni* ℥ iii.  
*olei vitell. ovorum* ℥ i.  
*mumia liquorum* ℥ vi.

Fiat oleum, quo madidi panni superponantur.

Ad pustulosam Fistulam sequens prescribit:

*R. liquorum carabis,*  
*asphaltis,*  
*armoniacia* aa. ℥ ℥.  
*ceroti de Mumia* ℥ iiii.

*M.*

simul in empl. formam & applicat.

§ 15. *Helmontius* in cura *Ulcera* instituit abluentionem fermenti corruptivi remediis, vel internis, ut arcanis, quantum à principio interno dependet, vel externis, quæ sunt vel magnetica, vel ordinaria, suntque venena inversa, & fixa, jamque mitia, & mansueta, quæ ipsum Ulcerum fabrum, & corruptorem enecant, non ut corrodentia, & absterfiva, ita ut Ulcera pro sua malignitate corrosivonis gradus, suisque alimenta optent. Talia autem sunt. 1. Realgaria fixa, unde *Balsamus Fuliginis* *Paracelsi*, i. e. Arsenicum, vel auripigmentum, primò per nitrum fixata, dein ad Sulphur adstringens dulcorata, & mitigata per repetitam spiritus vini cohobationem: quæ ad mentem Authoris Ulcera sanant.

*Helmontii*  
*cura in*  
*Ulcerebus,*  
*&*  
*Fistulis.*

sanant, non quòd rodunt & exedunt, sed quòd jam venenum nite inanitatumque nactum per sui dulcorationem, quo ipsum Ulcerum Venenum & Fabrum, sanguinisque corruptorem domant & enecant foras applicata.

Colchotar Vitrioli omnem Ulcerum corruptionem necare asserit, idque pro Ulcerum differentia diversimodè applicatum, scilicet vel integrè maceratum in vino, quod tum sola lotione sufficit.

Laudat quoque terram ejus saltem elatam & edulcoratam exactè inspersam, ac nonnunquam in oleo lini coctam usque ad nigredinem, quæ pro basi est unguenti vulnerum Felicis VVürzii.

Restitutionem cavitatis per succretionem carnis & cicatrizationem pellis, quæ natura quidem per se præstat, quo semel enecato corruptore caro deinceps sponte è fundo succrescit.

Perficariam sive piper aquaticum, Consolidam, Sophiam, serpentinam brassellam, &c. istud habere peculiare scribit, ut si frigida demergantur in aquam, & super Ulcus aliquantisper intepefiant, mox defodiuntur cænofo loco: ubi putrere incipiunt etiam attrahere satagunt ex agro, quicquid nocuum est. Ulcera tantum odoribus per inuncta applicatis mitescere vel exasperari inquit. Ubi interim Ulcera externa longè peiora perpharmaca oretenus sumpta sanantur: tamen ab ore longius distent quam interna: eò quòd viscera atque membranæ internæ juxta Authorem alantur sanguine plus quam eruore. Ulcera mitigata irritari ait abstergentibus. In curatione enim semper eò incumbendum esse inculcat, ut hostilis fabricator partique insidens corruptor delcatur, quippe qui nil exsiccando abstergendoque remittit mitescitque. Seminalis videlicet deleteriæ qualitas, venenosaque impressis Archeopartis exotica, bonum cruorem sibi dispensatum pervertens, sui

duntaxat ablationem naturaliter indicat. Est ergo virus, fermentum quoddam atque contagium fundo insitum, cruoris atque carnis corruptivum. Sunt enim totidem Ulcerum fermenta, quot Ulcerum diversæ corruptiones, corruptorumque distantia. Est ergò juxta eum plena atque exata Ulcerum sanatio, fermenti sui ablatio, non autem hepatis refrigeratio, non bilis somniata vel saniei absterfio. Non enim realgar fixum per salem petra, atque in adstringens sulphur dulcoratum sive mitigatum, sexaginta forte Ulcerum diversitates exstinguit: quia rodit, exeditque ( etenim sic non sui dulcorationem cum repetito spiritu vini exposceret: ) sed quia venenum mite jam habet, quod ipsum Ulceris fabrum, cruorisque corruptorem, est enecando, quò videlicet semel in toto demortuo, non cessat deinceps caro sponte è fundo succrescere. Itaque juxta illum cavitas Ulceris, carnis succretionem pellisque cicatrizationem indicat, ut ablata scilicet fiat restitutio. Author hic maximè capit *Paracelsum*, quod causas Ulcerum in microcosmi fodinas minerales atque salinas transtulerit. Voluit nempe cuncta salia, lapides, mineralia, herbas, &c. in homine velut seminariis suis deliterere; non attendens, quod absonum sit, cum Microcosmus non minùs Astris & plantis constare velit, quàm mineralibus, quod potius in salia quàm in plantas, & quadrupedia sese resolveret.

Postremò totum esse *Paracelsum* ridiculum scribit, docentem, ulcus & Vinus ali herbis, balsamo, unguentis. *Helmontius* noster Colchotar dicit enecare omnem Vulnerum ac Ulcerum corruptorem. Sal Tartari per spiritum vini rectificati, donec astringentem nanciscatur gustum, magni æstinat, estque balsamus *Samech* *Paracelsi*, prout ex Arsenico pro Vlceribus est ejus balsamus fuliginis: eò quòd apud peritos Realgar habeatur

tumus Metallorum. Sexaginta enim Ulcera sanat Arsenicum fixum, quia Ulcerum venena necat, quod etiam praestat auripigmentum.

*Villisi* §. 16. *Villisi* *Vlcus* sub cura habens primò istud acido-salium mitigare & extinguere, ac deinceps è corpore ejicere conatur, priorem autem finem attendit interius Medicamentis ex ocul. can. corall. rubr. ebor. ust. Martial. &c. paratis: secundum verò diaphoreticis, & diureticis. Externis etiam nititur ad materiam Ulcus foventis acrimoniam contemperandam, qualia sunt absinthium, mentha, agrimonia, nicotiana, myrrha, aloë, spir. vin. mort. vitrioli, Saturnina, &c. quæ in Cura principio atque in Ulceribus minus malignis conveniunt. Si verò Ulcus putridum ac mali moris fuerit, fortiora adhibet Medicamenta acutius fortiusque detergentia, cujus generis sunt ea, quæ cum Mercurialibus, vel oleis volatilibus commisceantur, mandant enim Ulcere ad glutinantia devenire jubet, qualia sunt balsama, vel digestiva Vulneraria passim ubique descripta.

*Fistulae.*

Chirurgicis tantum auxiliis munitus Author *Fistulae* curam suscipit, callosamque ipsius circumferentiam præcipitato rubro, vel albo digestivo admixto, vel cauterio potentiali liquefacto, cui intinguntur turundæ in fistulam immittendæ, destruit, & si hæc debiliorum virium fuerit, trochiscis ex sublimato corrosivo, opio, & gummi tragacanth. paratis ad hunc finem utitur. Si verò *Fistula* profundius altiusque serpsit, & in corporis superficie posita sit, cultro aut forficibus eam ad ipsius usque finem aperiendo, istiusque callosam tunicam supradictis Medicamentis exedendo: deinceps remediis appropriatis eam generationi, Ulcusque consolidationi studet.

*Sylviana*  
cura in  
*Ulcerebus.*

§. 17. *Sylvius* in *Curatione Vlcus* eò refertur, ut obtundatur acrimonia illa in causa notata, dein mundentur ipsa à puris sordi-

bus, postea consolidentur eadem ac cicatrificentur. Ad acrimoniam acido-acrem corrigendam laudat internè decocta vulneraria, aliasque mixturas ex oculis can. antimonio diaphorer. paratas, quibus acidum-acre satis domatur & absorbetur. Mundationem verò ac consolidationem Ulcerum consistere ait in correctione puris acidi rodentisque, ulcerata parti adherentis, atque sanguinem ipsi nutriendæ dicatum ex parte saltem corruptentis ac. in novum pus vertentis. Corrigit verò illud pus parti affectæ adhaerens à Sulphuris Balsamo laudato, imprimis ratione olei Aromatici, adeoque sale volatili oleoso abundantis; à quo spiritus acidus in pure luxurians, quin sanguinem in pus indies corruptens, non tantum obtundatur, sed insuper mitigetur, emendeturque ita, ut affluens sanguis partes prius consumptas brevi reparet, consolidationemque ultimam expediat. Quamvis autem existimet convenire quoque Ulceribus spiritus acidus externè applicandos, & quantitate parva syrupis & mellitis junctos, præ aliis tamen laudat Salia tum volatilia, tum alia blanda per oleosa amplius obtusa, temperataque, qualia sunt Balsama sulphuris pleraque, & imprimis gratiose ut anisatum, succinatum, Juniperinum, Terebinthinatum, &c. quæ vel per se, vel cum syrupis mellitisque juncta extollit, in quibus quoque inesse ait vin mundantem.

In Ulceribus Venereis approbat decocta sudorifera guajacæ, herbarumque aromaticarum, item salivationem, cæterasque evacuationes Mercuriales laudat. Quæ Ulcera venerea etiam abluit ac mundari jubet decocto guajacæ, & cæterorum aromaticorum potentium, quin tangi possent, sale volatili liquido & cupri tinctura imbuto. Unguentis etiam pro re nata admiscet Mercurium tum præcipitatum, tum sublimatum ac præferat dulcem.

Fi-



In Fistu-  
lis.

*Fistularum* curam peragit Syl-  
uius sequenti modò : callum adi-  
mendum esse jubet cauterio appro-  
priato, siue sit ferrum ignitum, si-  
ue aliud Medicamentum consumens,  
ex sale potissimum lixiuioſo para-  
tum, quo facilius stylo profundi-  
tas ejus explorari possit, dein cu-  
niculos discindendos esse mo-  
net, ac acidum acre peccans  
temperat internis sudoriferis, ex o-  
culis cancr. antimonio diaphor. be-  
zoart. miner. decoct. lign. juniperi,  
guajaci, sassafras, herbarum fuma-  
riæ, scabiosæ aliarumque salibus  
volatilibus oleo's pollentium. Ex-  
ternè in Fistulis magnificat Au-  
thor Balsamum de Capaiba, oleum  
terebinthinæ, ejusque balsamum,  
vel balsamum sulphuris terebinthi-  
natum, quo & ipsas has Fistulas  
omnium optimè mundari ac con-  
solidari posse non dubitat.

Catheteri-  
smum  
curatio  
Vlcerum.

§. 18. *Cartesianis* ad veram *Vlce-  
rum* curationem impetrandam pro-  
positum est emundationem eorum  
omnium primò peragere, qua ob-  
tenta cavitatem carne student ex-  
plere, & cute illam investire, ut  
parti læsæ debita sua sit restitatur  
integritas. Consistit autem illis  
emundatio ista Ulceris in separa-  
tione fibrarum destructarum, &  
succorum ex tubulis & canalibus  
suis diffractis & erosis effusorum  
& corruptiorum separatione à par-  
tibus sanis, harumque præserva-  
tione, ne à prioribus similiter corrup-  
pantur, & succi vicini inficiantur,  
ubi prudenter simul advertunt. si  
ulterior corruptio inhiberi debet,  
ut particula illæ gladiolata acutæ  
& scindentes, quibus succi reser-  
ti sunt, hebetentur, attenuen-  
tur, frangantur, mitigentur, &  
auferantur, ne ulterius ab iis sit  
timendum periculum, sed ex arte-  
riolarum extremitatibus parti læsæ  
succus communicentur destruenti-  
bus istis particulis. valenter obsis-  
tentes, & impetum eorum fran-  
gentes, ineptique ad partis nutri-  
mentum, & corroboracionem li-  
quores eliminantur. Depuratio-  
nem itaque totius massæ illius, ex

quà diversi ad diversos diversarum  
partium usus distribuuntur succi,  
remediis instituunt internis tum  
per secessum, tum diuresin aut  
diaphoresin recrementa quæcunque  
è sanguine abolerentibus, præsertim  
ex lignis, antimonio, & mercurio  
compositis, quibus subjungunt  
porosa alia reliquias mucronatas  
recipientia, & impetum eorum si-  
stentia, quorum è numero illis exi-  
stunt Balsamus antimonii, mercuri-  
us solaris, magisterium saturni,  
nec non oculi cancr. myrrha, al-  
bum Græcum, decoctaque magni  
habent in pretio, quorum sequens  
esse potest formula :

*Rad. Vincetoxic. ʒʒ.*  
*aristol. rotund. ʒiiii.*  
*peucedan. ʒiʒ.*  
*caryophylat. ʒiʒ.*  
*Herb. scabios.*  
*scord.*  
*agrimon.*  
*veron.*  
*card. bened. aa. Mʒ*  
*summitat. cent. min. Pj.*  
*flor. sambuc. Pʒ.*  
*rasur. lign. sassafras ʒiiii.*  
*sem. fraxin ʒiii.*  
*F. Decoctio in ʒ. q. aq. simpl.*  
*Colatur. ℔. ii. add.*  
*ʒss. Gumiat. ʒiʒ.*  
*Tinctur. antimonii ʒiʒ.*  
*Syr. Scabios. ʒiii.*  
*M. Propinentur agro singulis*  
*diebus manè ʒii.*

Ulcus ipsum abluunt spiritu vini  
crocato vel myrrhato, aut si magna  
adsit impuritas, decocto scordii,  
calc. viv. vel aqua mercuriali, un-  
guentaque illi sunt, vel stupam aut  
turundam iis obductam imponunt,  
quæ ex terebinthina parantur, vi-  
tellis ovi, gummi elemi, & melle  
rosarum, & quæ fortiora sunt, ex  
resina pini, pice, fuligine, ærugi-  
ne, alumine, sapône, præcipitato;  
ex compositis adhibent unguentum  
Apostolorum, aureum, basilicum,  
fuscum F. VVurtzii, emplastrum  
diachylon cum gummi, de gra-  
tia Dei, simulque inflammationi  
ulcus ambiens occurrunt unguen-  
to albo camphorato eidem illito,

vel emplastro diapalmæ, cui colchotar vetrioli immistum est, aut cataplasma apponunt, quale sequens exhibet formula :

*R. Herb. apii.*

*absynth.*

*scord.*

*rut.*

*Phellandria. aa. Mi.*

*flor. sambuc.*

*melilot. aa. Piß.*

*Fiat decoctio ex vino, & adde*

*farin. orobi ʒii.*

*M. ut F. Cataplasma.*

Chylo ita in Ulceribus corrupto & inspissato, ut materiam pinguem lardo similem præsentet, etiam ab ea Ulcera emundant resolutentibus & destruentibus materiam illam inspissatam, præsertim sequenti lavamento :

*R. Herb. scord.*

*absynth.*

*centaur. min.*

*sabin.*

*flor. rosar. aa. Mi.*

*Coq. ex vino ad ʒxx.*

*Colatur. add.*

*aloës*

*myrrh. aa. ʒi.*

*Unguent. Ægyptiac.*

*ʒi.*

*M. F. Injectio.*

Vermiculos in Ulceribus nidulantes atque pediculos enecant amaris & mercurialibus, aloë, myrrhæ, colocynthide, radice gentianæ, hellebori, diptamno, felle tauri, melle chelidoniz, ex quibus tum decocta pro injectione, tum limimenta componunt. Facta hac ratione Ulceris commoda emundatione, cavitatem carne implere student, removendo aut demendo reliquias chylum corruptentes, instillantque idpropter balsamum sulphuris, Peruvianum, de Capayva; vel remedia adhibent ex radicibus consolidæ majoris, aristolochiæ, ireos, herbis alchimilla, pyrola, veronica, nummularia solidagine Saracenica, mastiche, myrrhæ, gummi animæ, styrace liquida, vel ex compositis, emplastro diapalmæ, de gratia Dei, æstetico martiali *Ang. Sale*, de mi-

nio camphorato, quibus adjuvantibus si cavitas satis carne conspiciatur repleta, operam locant ut cutis eandem debite investiat, coercendo subtiliores chyli particulas, ne tam facile exhalentur, sed cum oleosis aliisque fixioribus mixtæ in superficie quiescant, & in substantiam cutaneam indurescant, qua de causa remedia deprædicant ex lapide calaminari, bolo, calce lota, minio, antimonio, tutia, litargyrio auri & argenti, plumbo usto, cerussa, pompholyge, mastiche, thure, terra vetrioli dulci, ex quibus etiam composita existant unguentum diapompholygôs, nutritum, emplastrum de lapide calaminari, dialaturæ *Alyscichi*, griseum, de Stercore canis *Vigonis*, oppodeltoch *Fel. Martiæ*, & præsertim sequens magni æstimant, quo plura Ulcera, etiam, satis antiqua norune feliciter fuisse curata.

*R. Lap. calamin. ʒiß.*

*min.*

*ceruss. aa. ʒvi.*

*oliban. nigr.*

*alb. aa. ʒii.*

*mastich. ʒß.*

*camphor. ʒvi.*

*vetrioli alb. ʒiii.*

*cere,*

*colophon.*

*resin. aa. ʒiii.*

*Gumm. Galban.*

*terebinth.*

*ol. ovor. aa. ʒii.*

*iunip. ʒvi.*

*M. F. Emplastrum.*

Non tantum emplastro hoc ulcus bene mundatur, carne repletur, cute obducitur, & sic in totum consolidatur, sed hyperfarcosis prohibetur, & caro superflua absorbitur, quam ob causam aliàs adhibenda sunt alumen ustum, præcipitatus, coleothar aut oleum vetrioli, xruo, cortices granatorum, lapis alchymiz, aqua mercurialis, unguentum fuscum, Ægyptiacum, quibus omnibus caro illa laxior & spongiolior absorbitur, & melioris durabili orisque paratur proventus.

*Fistula.*

In *Fistulosa* Ulcere fortiore humorem vitioforum exsiccationem necessariam esse præcipiunt, & calli absumtionem, ut impedimentis hisce ablatis cavitatis carne expleri possit, & cura uti in aliis Ulceribus peragatur. Remedia, quibus scopum hunc obtinere sperant, parare solent ex radice chelidonii majoris, gentianæ, ari, hellebori albi, herbis apii, centaurii min. foliis fabinæ, nicotianæ, semine sinapi, raphani, nasturtii, succo, ari, chelidoniæ, apii, thymalli, lixivio, ærugine, auripigmento, vitriolo, calce, alumine, mercurio sublimato, præcipitato rubro, aqua mercuriali, viridi *Hartmanni* unguento fusco aut Ægyptiaco, qualia dum adhibentur, partem simul corroborant cataplasmati ex ruta, scordio, absinthio, Phellandrio, salvia in vino coctis, vel emplastro de cumino, aut cerato fantalino. Ex unguento fusco vel Ægyptiaco inspissato turundam parant, eamque Fistulæ insinuant, vel instillant liquorem mellis abantimonio abstractum *Ang. Sal.* balsamum ex scoris Reguli antimonii, liquorem mercurii vivi, mercurii librati, oleum seu liquorem arsenici, quibus si callositas absumta sit, ulcus non aliter quàm uti superius jam dictum est, tractare pergunt, donec omnimodò consolidetur, nec parvi ad felicem hujusmodi obtinendam curationem sequens ducunt unguentum *D. Borrihy*, quo plures Fistulas norunt sanatas,

*B. Plumb. Autor. Philos. calcin.*

3 ii

mercurii viv. cum vitell.

ovi agit. 3vi.

vetrioli ter rubificat. & ter

loti ab omni acrimonia

3ix.

Lap. magnet. pp. 3i.

Ung. rosat.

Infrig. Galen. aa. 3iii.

*M. F. f. a. Unguentum.*

Ad cauterium sive ipsum ferrum candens confugiunt, si prædictis remediis callositas absumi nequeat,

*Tomus II.*

& plures cuniculos discindunt, ut una existat cavitas, cui remedia commodius queant applicari, tum Ulcus benè mundatum & abstersum perfectè sanant, & sequens propterea laudant emplastrum.

*B. Ol. rosar. 3ß.*

myrsillor. 3ii.

ceruss.

liuhargyr.

Lap. calaminar. aa. 3iii.

Tut. pp. 3i.

Bol. Armen. 3iß.

Campbor. 3i.

cera 3ii.

*M.*

§. 19. Perspectà nunc Cura Aliorum *Pharmaceutica*, ordine incedamus, & cuilibet Ulcerum speciei peculiarem, & quidem ad mentem nostram assignabimus Curam, quam etiam postulat. Ante omnia duo in Curatione Ulcerum accuratè attendenda sunt, nimirum restitutio, sive redintegratio vasorum ruptorum, & materiæ stagnantis & intus contentæ acrimoniæ emendatio, quæ corrigenda & edulcoranda est, & hoc aliter fieri nequit, nisi materia temperetur, h. e. in pristinum suum, quantum possibile, restituitur statum.

In Ulcerum ergo Curatione primario ad acrimoniam salum respiciendum est. Toti itaque massæ sanguineæ prius per universalia prospiciendum, deinde tutius ad externa detergentia, acidum temperantia & obstrictos labiorum poros referantia deveniendum, inter quæ laudem merentur spirituosæ, & pulveres absorbentes, volatilia oleosa internè reliquis palmam præcipientia, imprimis oleum balsam. Peruv. cum cineribus clauellatis rectificatum, spir. matric. cum Elix. vitæ, &c. Imprimis enim eò annitendum est, ut succi peccantes corrigantur acresque temperentur, quod ad curationem multum facit, hinc præprimis decoctum commendamus sequens vel simile:

*B. Rad. liquirit. 3ß.*

china.

V 2

Ra-

*Nostra  
metho-  
dus cu-  
randi  
Ulceræ.*

*Rad. salsaparill. aa. ℥ii.*

*Herb. scord.*

*agrimon. aa. Mi.*

*limat. chalyb. ℥ ss. vel.*

*pulv. antimonii crud. ℥ ss.*

Coq. in aqua communi & vino. De quo decocto ager b's vel ter de die ℥iv. bibat & quidem tepidè.

Ubi simul Scorbutus conjunctus est, antiscorbutica non negligenda sunt, ut spir. tritol. fibr. beccabung. cochlear. &c. In omnibus speciebus Ulcerum aequè conducunt diaphoretica, quæ omnem absolvunt paginam, sive sint antimoniatata live volatilia alcalica oleosa, &c. sunt formulae:

*R. aq. scabios.*

*℥. sambuc. aa. ℥ ss.*

*R. antimonii tartaris. ℥i.*

*ess. lignor. ℥ii.*

*Syr. fumar. ℥vi.*

M. F. Mixture d. cochlearim, assumendo

*℥. sal. vol. oleos. n. d. ℥ii.*

*ol. bals. Peru'vian. ℥i.*

*M. d. gur. xv.*

Laudamus inter diutetica sequens sudoriferum catholicum.

*R. nit. p. r. r. 3.*

*Antimonii p. i.* fundantur per horam, sic primò flamma exhalat, quod nihil aliud est, quàm spir. nitri; ut verò hic acquiratur, detonatio per Scort. tubulatam fiat, ita in recipiente acquiritur spir. nitri. Diaphoreticus abluat. aq. fontan. qui destruit acidum & sudorem movet; constat spir. exalcali & nitro. Quibus Chirurgus Hanovienfis VVedling. plura inveterata aliis incurabilia Ulcera brevi feliciter curavit. Sic & Brema est Empiricus quidam, qui quæcunque Ulcera feliciter sanat, ceu Nobis retulit D. *Gehema*. Extollunt plures viperina, quibus solis sapius Ulcera auscultant. Antimon. diaphor. bezoard. miner. optima sunt remedia, quæ constant ex alcali & nitr. omnia quoque salia volatilia C. C. succini, &c. in usum vocanda sunt, quæ attenuant sanguinem & succos, eosque simul temperant. Mercurialia tum inter-

nè tum externè maximè conducunt, quod sint in Ulceribus sæpius altera Chirurgi manus, male verò usurpata Ulcera & Gangrænam excitare solent, ceu nuper in Nobili observavi, cui Empiricus artus illinivit unguento mercuriali, à qua illinitione. Sphacelus totam faciem cum faucibus devoravit, ut miserè vitam cum morte commutaret. Confer *Ephem. Germ. Decur. Ann. 4.* Quare prius succi temperentur, aliàs à metèur. omnes acidi ac acres interne in unam partem coagulantur. Merc. dulcis Nobis in Ulceribus magnum præsstat commodum cum theriac. vel diascord. vel confer. ros. singulis diebus à ℥ss. ad ℥i. exhibitus, donec salivatio sequitur. Sal. merc. nostrum egregium existit remedium tum internè, tum externè tutò usurpandum, quod citò, tutò ac jucundè curat ulcera. Merc. curc. dulcem & Indi magna quantitate suis agris cum commodo præstebere solent. Sunt, qui ordinant præcipit. rubt. ad gr. iij. c. conserv. rosar. & theriac. in Ulceribus, post usum enim mercurialium Ulcera & Fistulæ multum exsiccantur: sed multi ab his abhorrent, & fateor, constatque nostra experientia, quod sæpe mercurialibus tantum peragatur cura palliativa, & agri faciliè recidivam patiuntur, & majorem fidem adhibeo spir. matrikali cum gum. guajac. vel sassafras, vel ol. bals. indic. &c.

Diuretica egregia in Ulceribus inveteratis remedia sunt, hinc acidulæ, potus Theæ & Capheæ, cum decocto lignorum, vel veronica sæpe maximum afferunt commodum, & hisce partibus, observata simul diata exacta plures vidimus curatos & liberatos ab Ulceribus diuturnis & quidem mali moris. Hinc in Ulceribus inveteratis magnam vim habent aselli, sicut præter *Rivierum* mirabilia recenset *Celeb. Boyle*, item spir. essentif. canceror. vel viperar. vel tart. Bals. sulph. cum ol. lign. sassafr. spir. canceror. sal. vol. succin. essent. charesfol. decoct. consol. med. adjunct. rad. chinæ. R. tart. R. antimon-

monii tartarifar. liq. terr. fol. tartari, R' assellor. spirit. fragor. cynosbat, &c. Calidiora ac volatilia remedia in Vlceribus quibuscunque optima sunt, quia succos acidos & quasi frigidos stagnatione ita factos, calefaciant, ad motum incitant ac volatilant, sicque resolunt: frigidiora omnia nocent summopere, quia magis inspissant succos eosque acriores reddunt.

Purgantia angue pejus in quibuscunque Vlceribus me iudice fugienda sunt, quæ tantum agros debilitant succosque acriores reddunt, quia fucci acidi non expurgari possunt, & cum cænes purgaveris, nullum tamen Ulcus sanabis, quod experientia quotidiana constat abunde.

Eodem carbone noramus V. S. & quamvis juxta veteres & aliquot recentiores bilis in causa sit, impossibile tamen est eam V. S. eliminare, totum enim sanguinem emittas necesse est, bilis enim omni sanguini permixta manet, vel quis statuere debet bilem tantum solum per V. S. evacuari posse, quod certè absurdum est statuere. Sic & fonticuli non multum utilitatis afferunt in Vlceribus sanandis, cum dulcem chylum tantum emittant, & non corruptum, corruptiturenim chylus in ipso Ulcere ab acri corrupto ichore. Fonticulum pedi Ulcere laborantis adaptatum, parum verò proficientem observavit mecum Celeb. Francus P. P. Heid. Decur. An. 6. Obs. 81. Usus tabaci plures commendant, exinde enim plures Vlceribus diuturnis laborantes restitutos fuisse legi meretur Obs. Cl. Frommanni Decur. Ann. 3. Obs. 167. Sudorifera verò egregia sunt absorbentibus mixta in quem finem in juniorum Medicorum gratiam aliquot communicamus formulas.

R. Antimonii mort. cachect. ʒʒ.  
cinnab. nat. aurat. ppt.  
pulv. vip. vel Angelic. aa. ʒi.  
elæosach. cinam. ʒʒ.

M. F. pulv. in 3. dos. divid.  
Vel: R. diaphoret. Helm.

Sol. vitæ Burrhia ʒʒ.  
solph. antimonii fixat. Sylv.  
gr. vi.

elæosach. citr. ʒʒ.

M. F. pulv. divid. in 3. part. aq.  
Vel pro pauperibus.

R. Flor. sulph. ʒʒ.  
pulv. enul. ʒiii.  
vipera. ʒi.  
myrrh. ʒi.

sach. albiss. ʒʒ.

M. F. Pulvis.

R. Extract. cent. min.

diaphoret. Helmont.

bergard. solaris aa. ʒi.

ol. still. sal. safr. gut. ii.

M. f. pil. 60. & dentur pro dosi  
20. cum aq. card. bened. omnia etiam  
antimoniata, & volatilia conveniunt.

In Cura externa ad succum seu materiam effluentem intus latentem respiciendum est, num quoque materia crassa, alba & absque fetore sit, quod Ulcus facile curatur, & non opus est multo apparatu, sed solo unguento basilico calide infuso, & emplastro ex eodem confecto imposito, si sanies verò circa lœra Ulceris reperitur, flava vel viridis fluidaque, ad fortiora transeundum est, quo enim Ulcera sordidiora sunt, eo fortiora requirunt remedia. Sequentia ergo conducent, quibus sæpissime feliciter inveterata curavimus Ulcera, & aliquando cum Gangræna conjuncta.

Cura externa.

R. aq. cal. vitæ ʒi.  
vitæ ʒiv.

M. quæ mixtura eluantur Ulcera.

Dein R. Spir. vin. C. ʒiv.

oliban. pulv. ʒi.

sal. saturni ʒi.

alum. vss. ʒvi.

M.

Ipsi Ulceri imponenda.

R. Ol. hyper. ʒii.

R' galban. ʒʒ.

aq. calc. vitæ. q. s. f. l. a. per  
agitat. instar nueriti. R' sol. à Celeberrimo Dn. Crugio, Conf. & Archiatri. Brandenburgico, Amico meo Veteri communicata egregias in Vlncribus, & Vlceribus na-

vat vires. Omnia verò Medicamenta, quod asterisco notandum, calidè applicanda sunt, quia calor maximè attenuat succos, hinc & sacculi reliquis emplastris arena calida repleti imponi solent. Si Ulcus nimis cavum sit, injectiones variz fiant, ex decocto scilicet herbar. absynt. scord. hyperic. veronic. agrimon. ruthæ, cui add. Elix. vitæ, aqua Regin. Hungar. calc. viv. Camphor. ex.gr.

*Bz. Herb. chelidon. major.*

*absynth.*

*ruta,*

*scordii,*

*mentha aa. Mj.*

*Rad. aristol. O.*

*caryophyllat. c. toto aa. ʒj.*

*Coq. in ag. commun. colat. ʒij. add.*

*spir. vin. ʒij.*

*sacch. saturni ʒij.*

*camphor. ʒj.*

M. f. Mixt. pro injectione Ulcerum, & pro re nata addi possunt mercur. præcipitat. & sublimat. Imponi possunt spir. matric. cum Elixir. vitæ, sacch. saturni & Camph. vel sequens cum plumaccolis impositum, raro fallens, & ex succ. hyperic. plantag. fanicul. aloë, myrrh. calc. viv. spir. paratum. Emplast. nostrum aromaticum sequens egregii est usus.

*Bz. gummi galban. ʒij.*

*sagapen.*

*opopanax. aa. ʒij.*

*ammoniac. ʒiv.*

*sol. v. in ol. tereb. colent. add.*

*gumm. Elem. ʒij.*

*ol. s. ut. per deliq. ʒj.*

*camphor. ʒij.*

*myrrhæ ʒv.*

*caryophyll. ʒij.*

*piciis ʒij.*

*colophon. ʒj.*

*serebinth. ʒxij.*

*sal. volat. C. C. ʒij.*

*cera q. s. M.*

si hisce non cedat, sequente utere.

*Bz. Ungu. basil. ʒj.*

*pulv. castor.*

*ase fatid. myrrh. aa. ʒj.*

*Elixir. vitæ ʒij.*

*camphor. ʒj. M.*

utere calidè in Ulcere.

Hæc enim omnia crassum ac viscidum succum in Ulceribus attenuant, & simul acidum fermentum ibidem latens corrigunt, emendantque, Medicamenta enim hæc ex volatilibus constant salibus, & gummosis pergratis oleosis particulis tubulos consolidantibus, quibus certè acida & salsa optimè ligantur, sic & Elix. vitæ, aliaque spirituosæ, impediunt ulteriorem corruptionem succorum, qui alias de nouo affluentes à fermento acido latente corrumperebantur. Curatio Ulcerum nihil aliud est, quàm consolidatio seu oclusio apertorum & ruptorum vasorum, non enim semper vasa in totum sunt destructa, sed tantum in uno vel alio loco rupta.

Notandum hic, quod turundæ nec Ulceribus, nec Fistulis, quicquid etiam obgarriant Chirurgi, sunt imponendæ, sed potius plumaceolæ unguento aureo vel basilico inunctæ, vel spirituosis balsamicis oleosis madefactæ imponantur, dehis totum membrum Ulcere infectum linteis circumvolvatur, per cam enim ligationem pori inuertuntur, ne succi corrupti ita ad partem affectam tendant. Sic in Ulcere Tibiæ debet totus pes ligari, quia succi influentes, quasi sibi certos poros formant, quo mediante tali ligamento immutantur, quod & confirmat experientia edoctus Celeberrimus Muye Obs. de usu fonticulorum. Sic quoque in exulcerationibus cum Gangræna, in obstructionibus glandularum, maximo cum fructu utimur cataplasmatibus ex herbis roborantibus, scordionempe, absynth. marrubio, rutha, fl. sambuc. rorismar. &c. addi potest farin. fabar. sem. anis. carvi, &c. in sero lactis vel in lixiv. vel eum decocto herbarum in cataplasma. redactum, quod antequam imponatur, aspergatur spirit. vini Camph. & Theriacæ.

Sic quoque istud Ulcus, quod insequitur Gangrenam, non multum differt à curatione prædicti, quod sequitur phlegmonem, huic unguentum basilicum prædictum

*Curatio  
Vleeris,  
quod in-  
quieur  
Gangra-  
nam.*



cum gummi elemi, oleo Guajaci, Elix. vitæ & camphor. paratum optimum erit cum plumacenlis calidè Ulceri gangrenoso impositum, & simul ordinarium emplastrum applicatum vel stypticum, vel de labdano, &c. Si verò Ulcus ad meliorem reducitur statum, commisceri possunt prædicto unguento & absorbentia vitæ. mart. vel ocul. cancr. vel antimon. diaphor. vel antihæc. Poter. Cinnab. antimonii, Ebur. pp. & mandib. lucii piscis, &c. Et, si Ulcus profundum & maxima adest cortuptio succorum, quod ex fœtore materiz effluentis apparet, tunc conveniunt infusiones ex rad. Angel. Imperator. Gentian. herb. absynth. ruthe, scordii, card. bened. & adject. Elix. vitæ, aloë, myrrh. camphor. R aff. fœtid. Aerante omnia ab ejusmodi Ulceribus arcendus est, incredibile enim dictu, quàm propediem materia in his Ulceribus gangranosis corrumpi solet. Si à frigore fuerit gangranosum Ulcus, tunc magis calidiora, ut ol. Philosoph. R castor. bals. Peruv. vel bals. Chili Anglorum, aliis prædictis unguentis & mixturis addi, calidiusque applicari debent, ut & varia cataplasmata ex prædictis concinnata & calidissimè applicata. Si Ulcera fuerint mundata, ad mitiora accedendum est, & solus sapius sufficit bals. Peruv. vel de Capiva, vasa verò distrupta facilè consolidati vel couniri possunt, modò consideremus, quòd canaliculi per succi nutritii appositionem elongentur, usque offendant alium, quo se simul uniant.

Sic & Ulcera, quæ Anthracem excipiunt, eodem modo curantur ac prædicta, præ aliis sequens conducet in hoc Ulcere.

R. Elixir. propr. f. acido,  
vitæ aa. ʒʒ.  
spir. ammoniac. ʒj.  
ol. guajac. ʒʒ. vel ʒj.  
camphor. ʒi.

Cura Vi- In Ulceribus Phagedanis dictis  
caris pha- conveniunt præter interna sudorife-  
godani di- fortiora superius dicta, quæ san-  
git. guinem & succos simul temperant,  
decoct. liquor. vel oc. cancr. antimon.

diaph. Antihæc. Poter. quia temperata alcalia & non acria sunt diaphoretica, quæ hic præ aliis conducunt, & ægri in hisce affectibus semper ad sudorem disponendi sunt, in quem finem seq. vel simile cochlearium propinari potest.

R. aq. fumar.  
funicul. aa. ʒij.  
ocul. cancr. ʒj.  
sal. card. bened. ʒʒ.  
Elix. vitæ Matthiol. ʒʒ.  
laud. opiat. gr. j.  
syr. scord. ʒj.  
M. D.

Vel: R. Aq. card. bened.  
fumar. aa. ʒj.  
Essent. enul. ʒi.  
spir. C. C. volat. ʒʒ  
syr. scord. ʒʒ.  
M.

Ad corruptionem impediendam, & obstructionem referendam, acidumque temperandum seq. focus applicatus apprimè conducet.

R. Rad. angel.  
bryon.  
gentian. aa. ʒʒ.  
Herb. cochlear.  
trisfol. fibr.  
scordii  
menth. aa. M. j.  
myrrh.  
aloer aa. ʒʒ.

Coq. inf. q. vini in vase bene clauso,  
colas. add.  
elix. vitæ ʒʒ.  
spir. sal. armoniaci ʒʒ.  
M.

Varia quoque Emplastra imponantur ejusmodi Ulceribus, imprimis laudatur quod Cartesianis adscriptum ex ceruss. min. camph. lap. calamin. colophon. ol. ovor. &c. parat. quod egregium est, vel pulvis seq. inspergatur.

R. Croci martis ex vitriol. præcip. ʒiii.  
sacch. luna ʒiʒ.  
myrrh.  
aloer.  
macis aa. ʒj.  
car. yopphyl.  
camphor. aa. ʒiʒ.  
M.

Vel: R. Aq. calc. viv. ʒʒ.

*Merc. dulc.* 3ii. β.

*M.*

*Vel: R. Aq. calc. viv.* ʒiβ.

*spir. theriacal. campb.* ʒiv.

*sacchar. saturni* ʒj.

*merc. dulcis* ʒβ.

*M. probē.*

Sic post varias epidemicas phagedænica in tibiis cuidam exorta sunt Ulcera, quæ sat diu illudere Chirurgorum manus, & tandem insperso pulvere stercoris ovilli feliciter à Parentibus fuere sanata, prout videre est ex *Observ. 94. Decur. Eph. A. 6.*

*Cura Ulcerum cum carie ossis.*

Nunc ad curam Ulceris cum carie ossis conjuncti transeamus, sed cum de carie ossis hac inferius ex professo tractabimus, paucis hic tantum nostrum expleamus officium. In his verò Ulceribus semper ad os respiciendum est, nisi enim prius cariem ossis sanaveris, Ulcus nunquam curabis, nam semper caro luxurians excrescit, quæ nullis remediis absumi potest, & si absumatur, statim repullulat, hinc cultro incisório ad os usque penetrandum est, & animo cordato id faciendum. Cumque ab aere talis caries sæpe producat, ad eum prohibendum applicetur Balsam. meus nervinus ex spir. vin. sal. volat. spir. sal. armon. & ol. macis ac caryophyl. paratus, vel divinus, quo præmissis callum absumentibus remediis, nullum præstantius in Ulceribus ac Fistulis invenies remedium: & quidem calidè balsami hi sunt admittendi, in quorum tamen defectu imponatur Ulceri Elixir. vitæ, vel aq. Regin. Hung. vel spir. matrical. & per dies aliquot relinquantur, tantum de novo imposito plumaceolo hoc Elixir. imbuto; cave verò ne sæpius aeri exponas hujus generis Ulcus, quod dilatandum, immit-tendumque carioso ossi Euphorbium vel myrrh. oliban. aloe, & spongiæ combustæ loizque tantillum in forma pulveris, subinde unguentum digestivum immit-tendum, & spir. vini adju-gendus, sal. spir. & Mercur. & os corruptum eximidebet: vel sequens.

*R. Aq. Regin. Hungar.* ʒiii.

*euphorb. pulv.* ʒii.

*calchant.* ʒβ.

*myrrh.* ʒi.

*aristol. O. & long.* aa. ʒi.

*calc. viv.* ʒβ.

Singulis diebus bis de hac mixtura cum plumaceolis madefactis Ossē corrupto & cauo impositum, adjunctis Spongiolis eodem liquore imbutis. Sunt, quisingulis quoque septimanis cauteria actualia per canulam cariei apponunt, ut & calchant. pulverem siccum ipsūque euphorbium: Ulceris verò duris fabiis digestivum applicant, vel ferum candens admovent, sine quo vix cariem ossis curari posse plures sciuntur.

Si corruptio magna adsit, ejusmodi Ulcera clavantur cum aq. Regin. Hung. vel Elix. vitæ, addita camphor. & muria humana, vel succ. absyth. vel:

*R. Spir. anthor* ʒiii.

*Balsam. nervin. m. d.* ʒβ.

*Camphor.* ʒiβ.

*ol. cochlear.* ʒi.

*M.*

*Vel: R. Elixir. vitæ* ʒi.

*aq. Reg. Hung.* ʒβ.

*spir. sal. armoniaci.* ʒβ.

*R. Euphorb.* ʒi.

*R. tartar.* ʒβ.

*M.*

Hiscæ remediis instructus Chirurgus mira præstat, sal volatilia enim infringunt acidum Ulcerum aque ac ossibus inimicum.

Si unquam certè hac in Ulceris specie diaphoretica antiscorbuticis nubta optima & egregia sunt, imprimis decoct. lignor. cum antiscorb. ex gr.

*Cura Ulceris scorbutici.*

*R. lign. sassafr. sancti* aa. ʒiii.

*rad. chine* ʒii.

*pimpinell.*

*trifol. fibr.* aa. ʒiβ.

*Bacc. juniper.* ʒiii.

*Herb. trifol. fibr.*

*scord.*

*nastrurt. aq.*

*cochlear.* aa. M. β.

*sal. tartari,*

*absynth.* aa. ʒβ.

*Infund. & coq. vel in fero lactir ,  
vel aq. f. cola. ꝑxxx. adule. syr.  
trifol. fibr. q. l.*

Interponenda sunt varia acidum ab-  
sorbentia , & digestiva sæpius di-  
cta , ex antim. diaph. Bez. mineral.  
ocul. caner. tart. vetriol. parat. vel  
bis de die æger assumat seq. spirir. in  
vin. Malvat. vel Gallic. à vino enim  
acido abstinendum est .

*℞. Spir. cochlear.*

*Bals. nervin. n. d. aa. ℥ii.*

*Vel :*

*℞. R corallie. spir. Guaiac. parat.  
quæ est specifica .*

*Vel Elixir. vite. vel sal. vol. oleos.*  
Cerevisiæ ordinariæ indatur Antim-  
on. crud. ꝑss. vel limat. Chalybis,  
quod maximè mortificat acidum in  
Scorbuticis , quod acidum & falsum  
maximè prædominatur . Purgantia  
hic & ubivis maximè nocent , aci-  
dum enim expurgari nequit , sed  
volatilia & temperantia dicta adhi-  
beantur , hæc quippe interna reme-  
dia non tantum acidum temperant ,  
sed & attenuant succos eosque flu-  
idiore reddunt , & ita Ulcera à cor-  
rupto nutrimento præservant . Sic  
quoque acidum per externa remedia  
temperatur , cum volatilia alcalia  
acidum destruant , & spirituosa id  
temperant . Spirituosa enim acida  
infringunt , quod videre est inter  
alcalia & acida commista , ubi fit  
effervescencia , & in effervescendo  
alcalia acidum obtundunt , certum  
enim est , quod in succis nostris certa  
& proportionata quantitas acidi &  
alcali seu salis volatilis continetur ,  
& acidum sæpe prævalet , ut solet in  
Scorbuticis ; hinc spirituosa assump-  
pta succis admixta acidum oppu-  
gnant vel impediunt , ne corpori  
majora mala accersat , quem effe-  
ctum etiam præstant ocul. caner.  
sacch. saturni . Sic & nostro judi-  
cio acidum volatile in Scorbuticis  
debet restitui , hinc & pluribus Scor-  
buticis acida blandiora maximè con-  
veniunt , & sine iis vix vivere pos-  
sunt , fermenta enim nostra à pri-  
mordio corpori nostro infusa de-  
bent maximè conservari : atque hic  
sæpe maximo cum commodo utun-

tur externè spir. sal. tart. vitrio-  
lat.

Externè conducunt & hæc topi-  
ca ex rad. bryon. trifol. fibr. herb.  
scord. & trifol. fibr. cochl. sal. tar-  
tari in vin. Gall. coët. & hoc elu-  
antur Ulcera Scorbutica , si lardo  
similis est caro , hinc addi potest  
bals. nervin. spir. cochl. trifol. fibr.  
& Ammoniac. & imponatur Empl.  
superius dictum , vel liniment. seq.  
vel simile .

*℞. Ung. diapomph.*

*Basil aa. ℥i.*

*pulv. myrrh.*

*aloes aa. ℥i.*

*sal. saturni , spir. trifol. fibr.*

*ocul. cancr. aa. ℥ss.*

quod ungu. calidissimè Ulceribus  
Scorbuticis imponi debet , alias la-  
terem lavabis .

Si dolores pertinaces adsunt &  
quidem nocturni , tunc reliquis re-  
mediis camphor. cum suffic. quant.  
admisceatur , ut & pro re nata ipsum  
opium , dolorum domitor. Ulcera  
probè mundata curari debent ordi-  
nariis remediis , ut Empl. divino .  
Si Ulcera verò foris in pede vel  
tibia existant , conducit quoque bal-  
neum , vel fons , ex supra dictis  
herbis & radicibus parata , sed si-  
mul convenienti ligatura institutà .  
Ex. gr.

*℞. lign. sanct.*

*cort. Guaiac. aa. ℥ii.*

*Rad. gentian. ℥i.*

*Herb. veron.*

*absynth.*

*trifol. fibr. aa. M. i.*

*nasurt. aquat. M. ss.*

*Tartari vitriolat. ℥iii.*

*M. Coq. in aq. communi ,*

& cum Ulcera maligna comitem  
habeant ut plurimum Cachexiam  
scorbuticam , ad acres ergo particu-  
las obtundendas collimandum est ,  
ad consolidanda & exsiccanda ejus-  
modi Ulcera , qua de causa se-  
quens linimentum ob vires egre-  
gias nobis sacrum dictum commen-  
damus .

*℞. Terr. sigill. strig.*

*vitrioli Hass.*

*plumb. ust.*

*croc. marz. aa. ʒß.*

*camph.*

*myrrh.*

*maſſich.*

*ceruſſ. lot.*

*mercur. dulc. aa. ʒiv.*

*Balf. Peruvian. ʒi.*

*ol. viſell. ovor. q. ſ.*

*M. F. linimentum.*

*Cura V.  
coris enim  
luxuriante  
carne.*

In *Ulcere hyperſarcotico*, ſeu cum carne luxuriante, eadem interna remedia ac in aliis *Ulcetum* ſpeciebus conducunt, variat enim parum in cura, & quidem externa. Si enim corruptio maxima eſt, poſſunt & aſumentia fortiora applicari, & quidem ſeq. modo.

*R. Aq. Regin. Hungar. ʒi.*

*balf. nervin. ʒii. vel Elix. vine.*

*camphor. ʒß.*

*Mercur. ſublim. gr. iii.*

*M.*

Communitur Chirurgi utuntur in hyperſarcotiſi alum. uſt. ſeu mor. vi- trioli, vel præcipit. alb. vel rubr. nobis verò magis placent aloetici, myrrhata, ut ſpir. matric. vel etiam ung. *Ægyptiac.* inſpiſſat. Si verò hyperſarcotiſis contumax & magna ſit, nil impedit, quo minus cultro excindatur, hoc enim plus efficitur, quàm mille aliis inviſibilib. cultellis, puta corroſiviſ remediis. Si verò æger ferrum abhorreat, ad cauſtica tranſeundum eſt, ad hoc ergò conducet lapis infernalis, vel noſtrum cauſticum aliquoties laudatum ex cineribus fraxini paratum, hinc eſcharæ digeſtiviſ impoſitiſ facile ſemper ſeparari poſſunt. Si dolores maxime urgeant, digeſtiviſ camphora in majore copia addi poſteſt. Si inflammatio urgeat, antiſtammatoria conveniunt, ex. gr.

*R. aq. ʒ. ſambuc. ʒii.*

*card. bened. ʒi.*

*balf. nervin. n. d. ʒii.*

*ſpir. ʒ. ſambuc. ʒii.*

*camphor. ʒß.*

*M. D.*

Si hyperſarcotiſis jam fuerit ablata, facile *Ulcus* convenientibus aroma-

ticiſ remediis ſanabitur, & raro ad ignem accedendum eſt niſi ſumma neceſſitas urgeat, ac prædicta remedia diu fruſtrà adhibita fuerint, ſolu enim baſſamo dyvino noſtro ea curare poteſ. Ubi latdo ſimile quid apparet, calx. viva vel mortua imponatur *Ulceri*, polychreſtum enim eſt externum in *Ulcetibus* aliſque, abſorbet in ſe quæcunque acida corroſiviſa, & *Ulcetibus* antiquiſ inſperſa, abſorbet ſordes & fermentum *Ulcetum* acidum, in ſimul tubuloſ ſaceratos conſolidat, & inter cicatriſ nria optima eſt; ſic quoque aq. calcis vivæ, Chirurgiſ aq. benedicta dicta *Ulcera* ſanat, & nuper ſcæmina quædam *Ulcus* habuit in genu, quæ ſola hac aqua curata fuit feliciffimè. Si aq. hac *Ulcera* abluantur lintheaque imbuantur, verminofa licet ac putrida ſint, tamen curantur. Supernatat huic calci cruſta albicans ſubpinguiſ, ſi illinatur *Ulcetibus* maligniſ cancroſiſ, ſingularè quid obtinet, deſtruit enim fermentum *Ulcetis* cortoliſum temperando, iſtud eſt enim alcali temperatum à ſulphure.

Sanatio *Ulcetis* ſordidi conſiſtit in eo, ut ſanguiſ & ſucci noſtri attenuentur, fluidiores ac ſpirituofioreſ, ſive magiſ fermenteſcibileſ reddantur, hinc conducit ſæpiuſ dictum decoctum ex lign. ſant. rad. ſaſſaparill. Enucl. c. rad. chin. pimpinel. herb. ſ. cord. ped. Leon. ſal. tartari, & ad eundem finem obtinendum conducet interne ſequenſ.

*R. Aq. Regin. Hung. ʒß.*

*Balf. nerv. n. d. ʒß.*

*M.* aſſumantur gutt. 20. vel 30. in cereviſ. aut vin. Hiſpan. & cum acidum in ſucciſ imperium exerceat, interponi poteſt pulv. ex an- timon. diaph. chalyb. & ocul. can- cer. quod ſatiſ potenſ eſt in abſorben- diſ acidi aculeiſ, nec negligenduſ eſt ſpir. matric. tum interne ad gutt. 60. aſſumendū, tum externe adhibendū, cui aſſociari poteſt momentuſ gummi guajac. vel ſaſſif. vel

*Curatio  
Ulcetis  
ſordidi.*

vel alius: sudorifera ac diuretica hic nunquam negligenda sunt, quæ diximus superius in speciebus Ulcerum.

Inter Topica eadem, quæ jam in reliquis Ulcerum speciebus diximus, usurpari possunt, commodemus præprimis sequens vel simile linimentum calide usurpandum.

*R. Vng. Apost. Zi.*  
*Bals. nervin. n. d. Zi.*  
*Aq. Regin. Hung. Zi.*  
*Extr. absynt.*  
*cent. min. aa. Zi.*

*M. F. Unguentum.*

Ungu. nicotian. Vigani in Ulceribus sordidis proficuum est. Sequenti mixtura sive decocto eluantur Ulcera sordida.

*R. Rad. calam. arom.*  
*gentian. aa. Zi.*  
*Herb. absynth.*  
*ruthæ*

*scord. aa. M. i.*

*Sal. tart. ,*

*ammon. aa. Zi.*

*pulv. colocynth. Zi.iii.*

*M. Coq. in Vin Gall. add.*

*colat. ad Zi.ii. Elix. vitæ Zi.*

*aq. Regin. Hung. Zi.*

Omnia enim hæc salia volatilia conducunt, quare & sequenti plures curavimus feliciter.

*R. aq. Regin. Hung. Zi.*  
*bals. nervin. n. d. Zi.*  
*Tinct. galban. Zi.iii.*  
*myrrh. Zi.*  
*aloes Zi.*  
*ol. tartar. Zi.*

*M.*

*Vel: R. Herb. trifol. fibr.*

*scord. aa. M. i.*

*absynt. M. ss.*

*myrrh. aloer aa. Zi.*

*In Vin. Gall. vel aqua calc. vit.*

*coq. ad Zi.ii. cui adde*

*aq. Regin. Hung.*

*bals. nervin. n. d. aa. Zi.*

*M.*

quod calidè abluantur Ulcera, dein unguentum sequens calidè imponatur.

*R. aq. Regin. Hung.*  
*myrrh.*  
*aloes aa. Zi.*  
*sal. alcali*

*ocul. cancr.*

*anim. diaph.*

*camphor. aa. Zi.*

*M.*

quo Medicamento quater de die imbuantur plumaceolæ & imponantur calidè Ulceri. Extr. absynth. scord. card. bened. egregia sunt aliis addenda. Saccharum & myrrha in Ulceribus putridis reliqui Medicamentis addi possunt. Myrrha enim Ulcera putrida verminosa & Gangrenam minantia curat. Sal fixum fuliginis, quod reperitur in mor. resolvi potest in oleum, quod in omnibus Ulceribus mira præstat, cum alcalica sua vi destruat acidum; lixivium scoriarum reguli antimoni, egregium est mundans in Ulceribus sordidis: ol. tartari per deliq. non contemnendum est remedium.

Dura labia scirrhum tumorem *Cura VI.* referentia, ceu dictum, oriuntur *cotis cum* ab obstructione & inde facta sta- *duris la-* gnatione succorum, è quibus om- *biis.* ne sal. volat. evolavit in auras, quæ labia tum debent emolliiri variis emollientibus seu solventibus volatilibus maritatis ex Elix. vitæ aq. Reg. Hung. bals. nervin. n. d. spir.

sal. armoniaci asthma. compos. Sunt, qui causticis nituntur hunc scirrhum tumorem tollere, inter quæ lapis infernalis notissimus est, vel sæpe Ulceri imponantur absummentia, inprimis sequens.

*R. lap. calaminar. Zi.*

*virid. aris*

*alum. ust.*

*vitriol. alb.*

*sal. com. tost. aa. Zi.*

*cera,*

*resin. q. s. vel aa. Zi.*

*M. & f. l. a. emplastrum.*

Hic & interna decocta sudorifera, in quibus totius curationis cardo vertitur, non negligenda, & dietæ stricta, & etiam sudorifera observanda est; ab acido & salis prorsus abstinendum est inprimis verò cavendum est ab album. ov. bol. armen. alijsq. repellentibus remedijs, quæ omnia succos magis coagulant inspissantque, & sic ad motum &

circu-

circulationem ineptos reddunt : interponenda ergo sunt liquida varia & spirituosas ac oleosas , ut aq. Reg. Hung. bals. nervin. & merc. sublim. aliaque mercurialis inprimis sal. notatrum Merc. hic quoque profunt : alii seq. vel similem commendant pulverē.

*R. ocul. cancr. ʒʒ.*

*Antihelct. Poter. ʒi.*

*sang. dracon. ʒʒ.*

*precipitat. alb. gr. vi.*

*myrrh. ʒiʒ.*

*M. F.* Pulv. inspergendus bis de die Vlceri Fistuloso . Rad. gentian. hujusmodi Vlceribus angustis sepe immittitur , ut callum Vlceris. Fistulosi exedat . Circa turundarum applicationem , ceu dictum , melius plumaceolæ imponuntur quam turundæ , si verò quis præjudiciis occupatus eas potius amet , monendus est , ut filo alligeturundas , ut tutius , si altius descendere , & promptius , si tenacius adhaerere , revocari possint . Nostates hoc cavent superiori turundæ parte incisâ & explicata , ut reducta turunda materia prius effluat , quàm altera & nova substituatatur , suppressa enim illa , sinus major dilatatio , dolor , inflammatio metuenda , quæ contigisse memorat Scultet. armamenth. Chir. p. 2. Obs. 86.

Hoc in Vlcere verminoso & sanguis ac reliqui succi corrigendi sunt decocto lignor. & interponantur simul antihelminthica , seu amara quæcunque spirituosas juncta ex. gr.

*R. Elix. vite ,*

*aq. Regin. Hungar. aa. ʒii.*

*ess. cent. minor.*

*R. tanacet. aa. ʒʒ.*

*myrrh. ʒiii.*

*ol. sassafr. gutt. x.*

*arant. gutt. vii.*

*M. D.*

assumantur 60. & plures guttulæ in vino Interponatur pulvis talis digestivus & resolutivus .

*R. Tarr. vitriol.*

*antim. diaphor. aa. ʒʒ.*

*myrrh. gr. i.*

*ocul. cancr. gr. vii.*

*M. D.* bis in septimana .

Sic & Mercur. dulc. cum resin. guajac. & gumm. ammoniac. qui hebdomade semel assumi posset. Pueris vel infantibus conducet decoct. chinæ , vel rad. contrajervæ calidè bibendum & propinandum , & seq. mixtur.

*R. Elix. vit. ʒi.*

*bals. nervin. ʒi.*

*ol. sassafr. ʒʒ.*

Gutt. vii. usque ad 10. pro ætatis ratione exhibeantur in vino Malvat. & potui ordinario adi potest tart. vitriolatus .

Externè imponatur panis mellitus Norimb. cum pipere vel. mel cum pipere .

Si vulnus ob negligentiam in *Vlcus Verminosum* transierit , ut vermes viventes in corpore vivo conspiciantur , quale quid dum hæc scribo , in milite observavi , qui curatus fuit spirituosas adjectis myrrh. & aloë , inprimis verò Extr. absynth. cent. card. bened. scord quæ egregia sunt in hisce Vlcibus Verminosis : ubi Vlcus cum maxima inflammatione & pustulis reperitur , omnia conveniunt , quæ de *Inflammatione* diximus , inprimis , sequens vel simile .

*R. Spiritus vini aromat. n. d. vel*

*aq. Regin. Hungar. ʒiv.*

*camphor. ʒʒ. M.*

Maximè enim his acidum inflammatorium Vlcus excitans temperat & obstruere refertur . In Vlcetibus cum maximo frigore calidiora usurpanda sunt , & cum hæc superius dicta sint , nolumus oramben bis costam apponere , & toties repetendo lectosî nauseam parere .

Audiatis de *Curatione Fistularum* Cura Etiam *Nostram Crism* , juxta methodum *Antaræ* . dum verò nostram instituitur curatio hæc per remedia interna sanguinem & succos nostros corrigentia , dein per remedia topica : 3. per ferulum sive cultrum .

Et , quæ sanguinem ac succos corrigunt , sunt acidum temperantia , ac sudorifera superius jam dicta , v. g. decoct. lignor. item anti-

dia-

Cura Vlcis verminosi .



diaphor. ebezoart. mincr. ocul. cancr. crystall. ppt. five volat. spir. C. C. sal. viperar. imprimis pulv. noster ex antimonio & merc. paratus: unde in specie *Felix Platerus* in Ulceribus ex lue venerea aliisque diuturnis Diaphoretica potissimam curationis partem absolvere scribit, Diatamque sudoriferam eundem in finem *Marsinus ap. Riverium commun. 4.* prescripfit. Hæc enim acres ichotes & ferofas superfluitates in continuum ad locum affectum fluentes eliminant, exque glandulis expriment. Sic quoque diuretica in Fistulis suam spondent opem, hinc potiones vulnerariz seu diureticæ maximo in usu sunt Germanis seq. modo præscriptæ.

*Æ. Herb. heder. terr.*

*fl. hyperic. aa. M.ii.*

*Rad. chinæ.*

*Gentian. aa. ʒi.*

*irios Florent.*

*aristol. O. aa. ʒβ.*

*Galang. ʒiii.*

*alb. græc. ʒii.*

*sem. anis.*

Minutum concis. coq. in vin.

Gall. vel Rhenan & aqua.

In hunc etiam finem & commendantur acidulæ de Vetrolo Martis, Ole & alcali volatili participant modicè tutius & securius conducunt thermæ seu acidulæ calidæ Embenses aliæque, à quibus plures Fistulas observavi exsiccatas sanatasque. Loco harum & artificialia parari possunt thermæ & acidulæ. Salia volat. oleosa & quæcunque antiscorbutica egregii hic usu sunt, spir. matric. cum gum. sassafras & ol. Ballam. Peruvian. destill & ad gutt. v. vel plures, in aqua convenienti assumptus, & præsertim in sequenti vel simili mixtura propinetur.

*Æ. aq. flor. sambuc.*

*veron.*

*beton. aa. ʒii.*

*ocul. cancr. pp.*

*corall. rubr. pp. aa. ʒi.*

*sal. nitri fixat.*

*alcali aa. ʒi.*

*camphor. ʒβ.*

*Spir. sal. armoniaci volat. ʒi.*

*Syr. trifol. fibr. ʒi.*

*M.*

*Æ. sal. volat. oleos. n. d. vel Sylv. vel alius, dentur gutt. 15. ad 20. & plures. Mercur. dulcis etiam aliis remediis admisceri potest, vel sal viperar. &c.*

Inter Topica & Chirurgica præprijis commendamus ferrum seu cultrum, quo incisio instituitur, sine qua *P. de Marchettis* Fistulum ani nullam curatam vidit, sub 60. annorum praxeos suæ cursu, in omnibus enim Fistulis sinus denuandus venit, ut melius Chirurgus operari possit, totus ergo ductus, modò partis conditio terat, præeunte & quasi viam monstrante specillo aut liquore quodam infuso, syringotomio instrumento hinc inde apud Auctores obvio & depicto, ab orificio ad extremum usque fundum inciditur. Aliquando verò sine specillo prævio, cera munitum in cuspide scalpelli, ne ladat innocuas in transitu partes, vel cultro obtusis cuspidibus, ex arte ita paratis ad fundum Fistulæ immittitur. Tota caverna ergò aperitur, quæ incisio, ut omnium citissima & momentanea quasi, ita ferè optima censetur, feliciterque in Curatione abscessus in tibia sinuosi *d. Fabr. Hildan. adhibita fuit cap. 4. Obs. 48.* Curatio Chirurgica per filum olim quidem etudum & lineum, nunc sericum & infestum, ab *Hippoc.* de Fistul. memorata, & à *C. Celso* plenissimè explicata l. 7. c. 8. confectatur. Tertiam ex filo & syringotomio compositam operationem monstrat *Scultetus tab. 45. f. 3.* His autem omnibus irritis pro partis conditione, ad aqu. Stig. itur, successu sæpe infelici, quem nuper in desperata partis inferioris Fistula post vulnus plumbea sclopeti manuarii glande illatum, relicta laborante observavi; ubi cum ob venarum & nervorum majorum ramos sectio tuto institui non posset, aliis etiam Medicamentis nequicquam proficientibus, post extractam prius ex inferiori & externa

na femoris parte glandum, *Frater meus Iob. Frid. Dolaur, Chirurgus*, & à seruitiis Sereniss. Marchion. Branderburgensi penicillis ex lana carpta extructis, ex aqu. Stig. sub connubio Mercur. dulc. imbutis breui & feliciter sinus callosos curavit, nec non balsamo quodam divino Nobis dicto mira in Fistulis curandis præstat. Sunt tamen, qui malè hanc aquam, nec non ol. vetrioli suspectum reddunt, præsertim in lachrymali Fistula, ob metum excursus in vicinas partes, plusque solidis & crassioribus confidunt, metus hujus expertibus. Fistula aperta Ulceri imponantur specilla & plumaccola, quæ labia solutæ unitatis distendant & coitionem impediant, post calli studendum ablationi est, sive Medicamentis, sive ferro, sive igne munita in ambitu parte. Cautica remedia jam sunt nota. Ferro precipitur callositas, si æger consentit levi doloris sensu: ex sanguine effluente feliciter peracta operatio censetur. Nouacula ita callum à Fistula incurabili removet Chirurgus apud *Borellum c. 4 Obs. 53.* post mundandum Ulcus aquis vulnerariis, decocto apii, & suprà dictis incarnandum, & ad cicatricem ducendum est. *Borellus* ubi æger sectionem admittere recusaverit, labia Fistulæ alumine usto corrofa, post ungu. ex alum. ol. nuc. cer. & cineribus formato, & ungu. ex sacchar. ol. olivar. argent. viv. ad partes equal. confecto obtentum vidit *c. 2 Obs. 67.* Solusquoque succus plantag. & urtic. vel decoct. persicariæ, ad motus sinul parti affectæ foliis contusis curam absolvit. Antequam verò ad ferrum sive ignem actualem accedamus, ad quem verò meo iudicio raro confugere aptum erit, facile enim nervosæ partes & venæ siye art. riæ læduntur, tentanda ergo sunt generosa remedia, quæ sæpe callositates sanaverunt, ex. gr.

*Be. Aq. Regin. 3 i.*  
*merc. sublimat. 3 i.*  
*R galb. 3 ss.*  
*Camphor. 3 i.*  
*vitriol. alb. 3 ss.*

*Spir. sal. armoniaci volat. 3 ii.*

*M.*

Si ignem amas, applica prius oleum cerebinthinæ cum plumaceolo, & dein admove ferrum candens, quantum ferre potest æger. Ubi plures & anfractuosi sinus, ibi convenit sequens.

*Be. Vnguent. Egyptiac. 3 ss.*  
*aloer 3 ss.*  
*mercur. dulc. 3 i.*

Coq. ad consistent. pro turundis conficiendis. Instari etiam possunt pulveres sicci cum calamo scriptorio. *Sachsus* maximè commendat fucum cancerorum, qui & nostra experientia comprobatus est in Ulceribus ad cancerum tendentibus. Seq. ergo per siphonem injectum conducet.

*Be. lignisant. 3 i.*  
*sassafras.*  
*rad. chin. aa. 3 ss.*  
*gentian.*  
*aristol. O.*  
*ireos florent. aa. 3 iii.*  
*Herb. nicot. M i.*  
*Fl. hyperic. M ss.*  
*alum. crud.*  
*aloer.*  
*alb. Græci aa. 3 iii.*  
*aq. fontan. 15 ii. vini Rh. 15 i.*

Coq. ad consumpt. Med. colat.

*Be. 3 iv.*  
*succi cancer. 3 ss.*  
*merc. dulc. 3 i.*

*M.*

Alii quint. essent. antimonij, alii liquor. fl. tartar. immittunt. Alii Empl. stictic. de gratia Dei, Oppodeltoch, Saturninaque commendant.

Si ossis caries conjuncta sit, prius illa curanda supra dictis & infra adhuc dicendis remediis, pars enim cariola abradenda, hocque legitime peracto, caro laudabilis brevi iterum accrescit. Potest & tantum ossi corrupto euphorbium inspergi per se, vel eum melle rosato permixtum, quod in squamis & ossis carie auferendis, felicissimum semper invenit etiam *Hildanur*, hinc mundificato satis Ulcere & reducta carne, pulv. præcipit. balsam. Toletanum, vel ol. Peruvian. filamen-

mentis applicuit, ut cicatrix plana & pulchrior fiat. In Fistulis diuturnis crystalli stanni cum melle rosato applicati commendantur à pluribus Chirurgis.

Ceterum saturnus tanquam quarta Chirurgie columna est, absorbendo acida, destruit causam proximam omnium Ulcerum. Nuper in puella 7. annor. Futulam in coxendice habente felici cum successu sequentem injeci curavi mixturam.

℞. Decoct. calc. vlv. ℥i.

merc. sublimat. ℥i.

succi absynth.

veronic.

scordii aa. ℥i℥.

M.

Spir. essentif. cancror. vel viper. vel tartari, Balf. sulphur. cum ol. lign. lassif. parata. Balf. flor. vel sulph. antimonii fixati egregiam est sanguinis purificans. Inter sudorifera sequens laudamus.

℞. Antimonii martis cachectic. ℥℥.

cinnabar. nativ. ppt.

pulver. viperar. aa. ℥i.

eleosacch. cinas. ℥℥.

M. F. pulv. in 3. dof. divid.

℞. Diaphor. Helmont.

aur. vita Burri ℥℥.

sulph. antimonii fixat. ℥lv.

gr. vi.

eleosacch. citri ℥℥.

M. F. pulv. divid. in 3. part. aq.

Vel pro pauperibus:

℞. Flor. sulph. ℥℥.

pulv. enul. ℥iii.

viperar. ℥i.

myrrh. ℥i.

sacchar. ℥℥.

M. F. pulvis.

℞. Extrac. cinisaur. min.

Diaphor. Helmont.

bezoart. solaris ℥i.

ol. still. safras. gutt. ii.

M. F. pil. 60. ex pro dosi 20.

Externa exsiccantia sunt cineres cancrorum, tabaci, fulig. omnes calces metallor. edulcoratæ, Antimon. diaphor.

℞. Lapid. calam. ℥iii.

stibarg. pulv.

ol. olivar. aa. ℥ii.

massich.

Tombr II.

oliban. aa. ℥ii.

M. f. l. a. Empl. confert. etiam Empl. saturni, vel sequens.

℞. minii ℥℥.

ol. olivar. ℥i.

ianiper.

petr.

sulphuris aa. ℥℥.

antimon. rubr. ℥i.

M. f. l. a. Emplastrum.

Fontanellæ conceduntur à Michaele, item Jungken Chym. Exper. de Ulcerib.

Acidula & therma à pluribus commendantur, thermas artificiales ex alumi, sal. & paucis sulphuris laudat Celeb. D. Ioh. Mich. Fehr. Praes. Colleg. Curios. Amicus noster singularis. Succus betulae & pini assumi potest.

Diuretica in Fistulis, spir. tartar. spir. cancror. sale suo volat. essent. sal. volat. succin. & ejus liquor, essent. chazefol. ocul. caner. D. M. liquor. diuret. ex test. ovor. & lap. caner. Balsam. sulph. cuminat. juniperin. succin. pineat. & terebinth. Ex antimon. & calc. viva & tartar. cum aq. lixivial. & applica calide item confert lixivium ex scoriis antimonii, ol. saturni item liq. antim. balf. ℥i. ol. sulph. rubti saturni aa. ℥i. M. oppodeltoch Paracels. balf. sulph. saturnisat. confert. etiam in cancro. In foraminulis verminosis applica seq. Agricola.

℞. ol. tartari per deliq. q. s.

vitriol. calcinat.

ol. olivar. q. s.

M. ad confist. linimentum.

Balsam. vulnerarius cathedictus D. Hapendornti egotius est, nec non Balsamus vulnerarius contra sphacelum, ne accidat hic Fistula.

℞. Ol. saturni & caryophyllor. aa. ℥℥.

Camphor. ℥ii.

M.

Dein consolida cum Vngu. Aloepaticis Hielingii. Sequens etiam conducit liquor balsamicus ad Ulcera in Fistul.

℞. Terebinth. Venet. ℥i.

Vernic. pistor. ℥℥.

massich.

myrrh.

ibur. aa. ℥i.

X

Spir.

*Spiritus vini* ℞iv.

*M. F. Bals.*

digerendo & destillando.

In Ulceribus verminosis commendatur à *Poterio* decocto calc. viva cum merc. dulci paratum.

In Fistulis optimè instituuntur fuffumigia ex mastiche thur. ass. fortid. gumm. galban. succino, &c.

Sequens magnificat *Cl. Blankardus*, Amicus noster, in sua *Chirurg.* & tribuit compositionem facminæ cuidam Anglæ, quo remedio ut ille ait, plures mille hominum curati fuere.

*℞. Camphor.* ℞i.

*Varioli alb.* ℞iv.

Contund. minut. & imponatur vasi lapideo, torrescant parum ut miscéantur, ut in confectioe lapidis Alchymiz fieri solet, donec rubeant, & add. bol. rubr. ℞iv. sedulo deinceps custodiantur. Hujus pulveris 3. cochlear: plena *M. & aq.* pluviali ℞iii. paulisper ebulliant, tum parum agitentur, ut aq. clarescat, qua mixtura eluantur sæpe Fistulæ imbutanturque plumaceola. Pralaudatus Dominus *Blankardus* commendat etiam sequens.

*℞. Sal armoniaci* ℞iv.

*Varioli Roman.* ℞iii.

*litarg. aur.* ℞b.

*Camphor.* ℞ii.

*℞. Hænis pulv.* ℞b.

*Cog. in aq. pluvial. dein add.*

*N. M.* ℞b.

*precipitat. rubr.* ℞b.

*M. & instar foter impone Ulceri Fistuloso.*

Sic & Ulcera cacoethica plura, frustra adhibitis aliis generosis remediis, cinere tabaci sanata vidit *Celeberr. Wedellius*, item inspersis pulver. terteis, mandibulis lucii piscis, imprimis Saturninis & mercurialibus, quibus remediis Ulcera Venerea antiqua & rebellia curantur quotidie.

In Ulceribus & Fistulis egregium est remedium Balsamum de Chili naturale, in Anglia apud *Dr. VVilliam Salmon*, Professore Medicinæ, usitatum & guttatim applicatum. Vide de balsami hujus

viribus *Encyclopadiam Nostram* Medicam in linguam Anglicam à prædicto Celeberrimo viro *VVilliam Salmon*, translata, & Londini impressam.

## CAPUT III.

*De Gangræna & Sphacelo.*

S. I.

Cum nullus ferè in Chirurgiam cadat ex innumeris calamitatibus myriadibus atrocior affectus, imò tota in Medicina vix ullus offeratur morbus lamentabilior crudeliorque ipsa *Gangræna & Sphacelo*, nullus certe intensior Tyrannus est quam Sphacelus; hic enim tanta atrocitate atque savitia in humanum corpus sævit, ut nulla propè pars sit, quæ ipsius tyrannidi & sevitæ se subtrahere, aut ab ejus invasione secunda esse possit, imò nobis viventibus integræ partes corporis nostri immanes inter cruciatus & æstus igneum, tandem omni sensu motuque destitutæ moriuntur atque putrescunt, & ne animantis necrosis subsequatur, congruisque remediis occurratur, ab initio, à vivente reliquo corpore, crudeli manu Chirurgi, ferro & igne separantur & abscinduntur. Neque enim in is adinstar aliorum morborum perfunditori infestat, aut ad salutem quandoque terminatur, sed ubi semel nidum suum elegit, pertinacissimè inhaeret, & haud duntaxat partem illam, quam aggredditur, corrumpit mortificatque, sed cito pede progreditur, ac sæpe, nisi, ceu dictum, citissimè occurratur, totam microcosmi machinam destruit, ærumque sine ulla salutis spe è medio tollit. Qui ergo hujus pessimi mali sevitia auxiliis generosis repelli ac coerceri possit Tyro-

Tyronibus hisce pagellis breviter declaraturi sumus. Primo itaque ut bene intelligant, de quo affectu scripturi simus, ejus nomen ante alia explicabimus. *Gangræna* igitur dicitur à γὰριν condecere, quia maximè devorat inquit cancri vel lupi, hinc etiam omnes fere Interpretes N. T. gangrænam in *Epist. D. Pauli ad Timoth. 2. c. 2. vers. 17.*

*Gangræna* gangrænam per cancerum venterunt, καὶ οἱ λόγοι αὐτῶν δὲ γὰριν καὶ ἔρπε, & serpens eorum ut cancer serpit. Omni enim Gangræna proprium est, quamprimum labem communicare partibus sibi vicinis, & hoc quidem brevi. Dicitur & aliis ignis S. Antonii, ignis Persicus, Esthiomenus. Germanis vocatur *der heisse Brand*, meliori jure dici potest, *die aufangende Ersterbung*. Describi potest, quod sit alicujus partis incipiens & imperfecta mortificatio, à pluribus causis obstruentibus oborta; hinc à nobis Gangræna incipiens mortificatio succorum nominari solet, siue principium ad perfectam corruptionem sanguinis & succorum.

*Sphacelus*. *Sphacelus* à Græco nomine σφακελ, σφῶν τὸ σφάζειν, à jugulando, enecando, dicitur, quia affectus hic partes corporis humani viventes, modò semel in his radices egerit, enecat: ab aliis dicitur σφακελ, σφῶν, item Esthiomenos, Necrosis, Latinis autem sideratio, i. e. sideris percussio, mortificatio, corruptio, putrefactio, plerumque tamen recentio Græcorum nomine appellatur *Sphacelus*, Veteribus Ignis S. Antonii vel Marcelli vocatus fuit. Germanis nostris audit & inproprie *der Kalte Brand*, meliori verò jure *die vollzogene Ersterbung*, siue perfecta mortificatio. *Sphacelus* describi potest, quod sit succorum & solidarum partium humani corporis corruptio ac mortificatio plenaria, ab obstructione tubulorum omnium orta. *Sphacelus* enim est mortificatio & corruptio ipsa, quæ nil aliud est, quàm scissio succorum, quod suc-

ci ita confusè inter se commoveantur, ut nunquam iterum ad pristinam suam mixturam redigi possint; sic & textura vasorum simul est dissoluta & rupta.

§. 2. De *Subiecto* Gangræne ac *Parti affecta*. *Sphaceli* disceptatur inter Medicos.

ac Chirugos; sunt, qui cum Galeno suo Angelo (anagramm.) Gangrænam in carnosissimis partibus residere statuunt; alii mortificationem & corruptionem in carnosissimis partibus Gangrænam vel *Sphacelum*, in ossibus verò exsiccationem seu erosinam vel *cariam* vocari existimant. *Sphacelum* verò nostro judicio esse tam carnosarum, quam ossium partium corruptionem, mortificationemque, quis inficias ibit? Omnes partes corporis humani, tum internas, tum externas Gangræna ac *Sphacelo* affecti possunt, præter experientiam quotidianam compluribus, & innumeris Practicorum observationibus patet: sic uterum, pudendum muliebri, scrotum, brachium, à pulvere pyro exploso, pollicem, faciem, pedem, tibiam, perinæum, anum *sphacelata* egomet observavi. Sic nec ab eo insontia sunt viscera, imprimis intestina, uti in dysenteria sæpius *Sphacelata* reperi, quo intestinorum *Sphacelo* Princeps quidam Hassæ, cheu! defunctus est. In gingivis & labiis vidi nuper in infante 3. annor. varioloso *Sphacelum*. *Dodoneus* vidit puerum 6. annorum, cui *Sphacelus* brachia, pedes, nares & aures occupavit, ita ut puer mutilatis ac amissis membris perierit. Cerebrum quoque *Sphacelo* affectum nuper in milite observavi. Nec cor immune, sed sideratum & escharoticum in peste interempto inventum tradit *Helmont. & Th. Baribol*. Aliorum viscerum *Sphacelos* notarunt Auctores.

Et Nos hinc concludimus, omnes partes corporis, imprimis verò solidas subiectum *Sphaceli* esse. In Gangræna verò sæpè sanguis

primatur, non facile decedat in profundum, nec postea refiliat & relevetur, nec foveam relinquit. Abscedit quoque à subjacente carne cutis, & foetidum tamque acrem emitit halitum atque ichorem, quem adstantes vix terre valent. Febris adest maligna in summo gradu, ac in ipsa peste.

*Ætiologia* §. 4. *Ætiologia Gangræna ac Sphaceli Galenici* hoc modo peragunt. Appellunt Gangrænam alicujus partis ob inflammationis, qua conflatur, magnitudinem, mortificationem non quæ jam confirmata sit, sed quæ etiam num fiat: nam quum jam pars emortua est, ipsis Sideratio, & Sphacelus Græcis, affectus nominatur, quem Gangræna terminum dicunt hanc esse partis corruptionem in fieri dicunt, illam vero in facto esse. Corrumpi autem partem statuunt, quando calor ejus nativus exstinguitur à valida quadam intemperie, aut à nimio frigore, sive ab hyemali tempestate, sive à medicamentis nimium refrigerantibus: ut in summis inflammationibus. Fieri etiam dicunt à nimio calore externo, qui nativa consumpta humiditate, nativum calore, subjecto carentem, dissipat & exstinguit; id facere ajunt summam inflammationem, & medicamenta frigida in Erysipellate, Sclopetorum, vel maxime venenatorum ictus, vulnera item ob intemperiem calidam, qua partes eliquantur & nativo suo calore destituuntur. Fieri quoque Gangrænam censent à morfu venenati animalis, à crisi, facta nempe humorum pravorum in partem aliquam translatione, ab arteriotomia & aneurismate, à marasmo, à luxationibus, vehementibus ligaturis, compressionibus, contusionibus, & pororum consipationibus, quibus secundum eos naturalis calor suffocatur.

Sphacelum tam mollium, quam durarum partium mortificationem

*Temus II.*

statuunt perfectam, & cum pars sensum admiserit, non amplius Gangrænam, sed *gangra* appellant. Hunc Affectum etiam ossibus accidere putant, quum circumscisa caro vitiatos humores saniosos generans his petrigaverit illa ac putrefecerit.

§. 5. *Paracelsus* partibus Gangrænam inferri arguit, si à natura Narcotica stupor quidam fuerit indutus abolito sensu, & tum calor præternaturalis supervenerit, abs quo ignis hujusmodi accenditur, hinc Author Gangrænam Anodynâ quendam vocat usionem inde ortam. Itaque plures ignis Persici species constituit, nam alium comparat lignario igni alium montano seu Æthno, tertium salis Nitri, alium Resinz, &c.

Alibi Author etiam Persicum ignem dicit Sulphureum corpus accensum, quod ex suo transformatum est liado, cum omnibus speciebus sulphuris, & est calx sicca & calx viva liquida, quæ suam accensionem à liquido sale recipit. Postmodum urit, consumitque membrum penitus, uti calx cadaver aliquod. Trium priorum transformationem mortalem efficere consumptionem air, cum proprium & innatum in ipso calidum sit elementum occultum.

*Sphacelum* partibus inferri air, quando calor ejus à salibus penitus sit absumptus, ita ut melior pars membri penitus destituatur.

§. 6. *Helmontius* Gangrænam parti alicui inferri dicit à sale quodam corrosivo, degenerante, ex lege, & à vitali Republica proscripto, abs quo ingens in parte producatur calor, eandem adurens, gangrænas, & instat gliris subinde carnes erodens. Gangræna quoque secundum Authorem totaliter mortificat. Hinc & sæpe ejus causam deducit à spiritu vitali alcalisato, nam ad transmutationis tam peregrinæ & exoticæ (à peregrina scilicet & exoticæ imagine productæ, à rabiem, quicquid est vitale in ipsamet.

X 3 solida

*Causa*  
*Gangræna*  
*ac Sphaceli*  
*secundum*  
*Paracelsum*

*Helmontium*



solida partium substantia , id totum excandescere principio vitali irato , ac succenso , accenditur , variosque morbos ( qui in Gangrana ac igne Persico , ) parit.

Ab eodem terrefacti & in rabiem succensi Archei initio contingere ait , nunc in stomacho , nunc in pelle , tum etiam subinde in ipsa met solida Similariuni , unde lethales deducit Sphacelos , atque Escaras contingere vult pro diversitate partium , ad quas Archeus furibundus ac terrore plenus diverterit .

*Causa Gangrana & Sphaceli secundum Villisii.* §. 7. Villisii opinatur , Gangrenam exoriri à cruore ob nimiam vel visciditatem vel crassitiem tartari diu circulante , & in laxiore quadam parte stagnante , atque à succo nerveo similibus vitii affecto in fibris , per quas fluit , restitente , sanguis enim in aliqua parte cespitans cito exardescit , ac ebullit , volatilioresque illius particulæ mox evehuntur , ipsumque vehementius commovent . Sed quum præ tenuitate sua per poros viam sibi parent , brevi evaporantur , dominiumque cedunt salinis particulis , quæ nec à spiritibus , nec à tenuioribus sulphuribus contemperata fluoris statum assequuntur , & acrimonia sua partis substantiam destruunt , spiritus verò animales glutinosiori crassiorive vehiculo fibras nerveas obstruunt involuti , partes , ad quas tendebant , attingere nequeunt , vel pauci tantum ad illam perveniunt , quo fit ut nulla vel exigua solummodo contingat solutionis contigui in parte facta perceptio .

*Sphacelo* partem quandam affligi auctorat Celeberrimus Author noster , quando scilicet succi extravasati visciditate aut crassitie donati tantam adepti acrimoniam , prorsus dissipatis vel oppressis , aut narcosi affectis spiritibus animalibus , ut partis , in qua resident , substantiam penitus destruunt ac disperdant absque ulla doloris sensatione , tum enim liquor ille stagnans fissilior existens , & fibras nerveas

comptrens , spirituum animalium sensus uti & motus ministrorum ad partem accessum impedit . Liquor etiam nerveus summa tum temporis pollens crassitie aut visciditate , surculorum nerveorum tubulis inhærens , viam spiritibus ex cerebro fluentibus omnino præcludit , partique omnimodum cum cerebro commercium impedit . Liquor autem accidit ex ampliatis ab humore corrodeute fibrarum interstitiis , à quibus lucis radii absorbentur .

§. 8. *Sylvius* ab acido acri cutem ac carnem corruptente *Gangrenam* oboriri docet , & quidem sæpe corruptionem hanc tantam esse dicit , ut pars colorem rubrum aut subpurpureum nanciscatur , talem tamen , ut ad integritatem redire possit pars affecta , quamprimum autem cutis vel caro ad nigredinem pervenit , conclamatum esse ait , atque tanquam extremè corruptam emortuamque cutem aut carnem considerat , unde *Sphacelus* ortum suum habet .

§. 9. *Cartesiani* ad succorum cum sanguine per tubulos partis alicujus prohibitum transfluxum , & omnimodam illorum in ea coagulationem in *Gangrena* causa proxima constituenda confugiunt . Obstructionem enim ad esse dicunt vehementiorem & contumaciorem tubulorum & canaliculorum per partem distributorum , ut ipsa illa pars nullum nanciscatur nutrimentum , vel non sufficiens , cum per obturatos canales oclusisque arterias succi & sanguis perfluere nequeat , sed hic in fluore suo impeditus subsistat , coaguletur & mora sua reliquo sanguini transfluxum impedit , ut hic similiter ob transitum denegatum subsistere & coagulari cogatur , unde interdum non una duntaxat pars , sed totum corpus subitanè emoriatur . Hanc autem succorum coagulationem & vasorum obstructionem originem quandoque sumere docent à frigore externo validissimo , abs quo

*Sylvius opinio de causa Gangra & Sphaceli.*

*Cartesianorum opinio de causa Gangra.*

quo motui succorum obfistente lymphâ primùm, tum sanguis ipse à circulatione ad quietem cogatur & coagulationem, particulæ verò succorum stagnantium porosæ & angulares mucronatæ à materia subtili fuscitate, in se invicem impetuosius agentes, fibras vicinas membranofas & musculosas dirumpant, discindant & partes ita destruunt. A remediis nimium adstringentibus & frigidis tumoribus calidis sive inflammationibus importunè applicitis, succorum transitum inpediri & stagnationem promoveri recentent, uti à combustione, rebus erodentibus, morsu animalium venenatorum, contusione & abscissione vasa & partes diffringantur, erodantur, & destruantur, ut tubulis ita vasisque destructis vel compressis nulli ulterius succi ad partem devehantur, insuper succi à venenis aut salibus scorbuticis coagulati ad fluxum reddantur inepti. Detectu necessarii alimenti sanguinem etiam & succos interdum inspissari & corrumpi norunt, ut partibus conveniens detrahatur nutrimentum, suæque privetur vitalitate.

*Sphaceli.*

Quandiu coagulatio ista succorum in vasis adhuc incipiat, & motus intestinus particularum etiamnum in succis alfit porosiorum & angulatum vehementior, ut pars cum tumore valde incalescat & rubeat, subtiliores verò & volatiliores eorum particulæ avolare pergant, relictis solummodò crassioribus obstructioni inducendæ aptis, Gangræna partem laborate fatentur, sed consumtis tandem particulis istis lymphæ, sanguinis & liquoris nervosi volatiliores, & succis istis totaliter coagulatis, ut circulatio in parte omnimodò prohibeatur, pars ipsa colore plumbeo aut atro obducatur, & fetore inficiatur, ipsum *Sphacelum* adesse dicunt, necrosin sive lethalem partis extinctionem, cujus corruptio partes vicinas facile inficiat, quandoquidem lym-

pha in proximis vasis, & sanguis in vicinis arteriis in fluore & transitu suo inpediri subsistere cogantur, qui dein succi stagnantes aliis affluentibus obicem ponant, usque dum omnes in universo corpore succi coelegantur, & mors totalis subsequatur, nisi pars emortua in tempore amputetur, & tota isti succorum coagulationi prohibendæ studiosè propiciatur.

§. 10. Enim verò *Nos* existimamus, *Gangrænâ* incipientem in totâ fere omnium tubulorum & *consa Gangræna.* pororum consistere obstructione usque adeò pertinaci, ut non amplius sanguis ac succi, sed subtilis saltem horum succorum vapor ad partem Gangrænosam perveniat, qui paucos illos succos ibi adhuc existentes commouet, turbat, aciores magisque corrosivos reddit, hinc fibræ nervæ penitus absceduntur, quo ipso pars magis obstruitur, & omni motu ac sensu destituitur, atque ob denegatam nutritionem liuorem induit. Sic Gangræna sæpè ab inflammatione in corpore cacoehymico vel scorbutico oborta natales suos habet, vel ab applicatis incongruis remediis astringentibus, repellentibus nempe, aut refrigerantibus & empiasticis, vel poros obstruentibus, quæ omnino circularem sanguinis cursum ac succorum impediunt, ipsos succos inspissant ac coagulant porosque obstruunt. Si enim inflammationibus imponuntur adstringentia, succi ab his quasi inearcerantur, ut coagulari & inspissari debeant, & cum inde fixatæ particulæ in tenellulis vasis hæreant eosque obturent, necessariò impediunt circulationem reliquorum succorum, ut sanguinis, lymphæ & succi nervosi, è quibus dein partes emori quasi coguntur, si ipsis congruis remediis haud propediem auxilium afferatur, & exulente remedia repellentia dista, per ista enim medicamenta imposita, v. g. boi um

cum album. ovar. pori cutis obstruuntur, ac sic particulæ heterogeneæ eliminari nequeunt, atque impeditur, ne materia coelestis influere & obstructionem queat referare. A frigore intenso oritur sæpe Gangræna, quoniam frigus succos facili Marte coagulat, imprimis lympham & sanguinem, qui succi stagnantes sæpe totum membrum in putrefactionem ac secidam corruptionem præcipitant, hinc à perniciosis ex frigore obortis Gangrænam observavimus sæpissimè. Notandum hic; quòd Gangræna ut plurimum extrema artuum, ut digitos pedum vel manuum occupare solet, ceu plura novimus exempla, quia his in partibus adsunt pauca vasa sanguifera, & consequenter paucus sanguis ad calefaciendum, & pressio sanguinis hic mitior est, quam in aliis partibus; sic & impetus sanguinis in has partes cessare incipit, & irradiatio spirituum minor est, & in partibus hisce maxime tunc sunt obstructiones. Ab hydropse sæpissimè oritur *Gangræna* ac *Sphacelus*, à quibus præ aliis inferiores partes hydropicorum affici solent, quoniam hæc per longum temporis spatium ab abundantia aquæ fuerint distentæ, sicque compressæ, à qua compressione tubulorum, imò ab eorum exsione & corrosione facile affectus hic oboriri solet, lymphæ enim in hydropicis corrosiva acrisque existit, & hoc in casu adsunt magnæ obstructiones in tubulis, pauci enim adsunt spiritus, instar fulminis aliàs influere soliti, & calor minor, quia nulla amplius circulatorum succorum in his partibus sit: à defectu succi nutriti seu chylosi, excitatur sæpe hic noster affectus, cum enim omnes canaliculi obturati, vel abscessi, vel nimis compressi fuerint, ut pars nullum amplius nutrimentum accipiat, non potest non fieri, quin pars ista emarcescat ac emoriatur, hinc affectus hic observatur in debilibus macris & ema-

ciatis sæpe subyctis.

Quandocumque affectus hic noster produciatur à nimis forti ligatura in fractura ossis, vel ob aliam causam instituta, imprimis si simul parti affectæ à Balneatore alioque Empirico estringentia & repellentia, seu refrigerantia ac poros obstruunt medicamenta malè applicata fuerint, quæ sæpe in hunc finem apponere solent (ut pessimè ratiocinantur,) ne affluxus fiat humorum ad partem affectam, & hinc uti solent bolo armeno, sib. ov. & aliis frigide applicatis obstruentibus. Rara est sequens observatio, quam Celeberrimus *Valdschmidtius* noster notavit: Chirurgus quidam septuagenario majore vesicatorium in tarsio pedis applicuit, subsecuta est statim Gangræna, quæ in Sphacellum degeneravit, tandem turbato à pestilenti hoc acore sanguine totius profundior accessit somnus, quem elapsis aliquot diebus ipsa mors excepit. Causa funestæ hujus experimenti fuit lymphæ defectus, quæ spicula cantharidum aliàs demulcere solet, hæc autem magis sic sui juris facta fibras nervosas amputarunt, quæ in cincinnos retroactæ angustationem pororum, partium vicinarum compressionem, & succorum in tali senectute, jamdum vi corrosiva contaminorum stagnationem crearunt. A Fractura Tibiæ in senibus facile observatur Gangræna, quod fit à nimia ecchymosi sive compressione sive à defectu spirituum, quale quid hodie observavimus in Aulæ magistra nostra.

Affectus hic à morsu venenatorum animalium, imò canum rabidorum oboritur, ceu non ità pridem exemplum hac in civitate contigit, ubi tæmina rustica à cane rabido fuit morsa, à quo morsu Gangræna & Sphacelus illico oboriebantur. in tibia, quam licet Chirurgus serra amputaverat, attamen altero die ad plures aluit, & à fermento venenatorum animalium

acido, salivæ inexistenti, dentibus sanguini communicato oritur, à quo massa sanguinea corrumpitur hinc oriuntur febres, deliquia, deliria, quæ maximam perturbationem sanguinis denotant. A dentibus quoque franguntur vasa lymphatica ac sanguinea ex quibus succi effluunt, hinc comprimuntur reliqua vasa nervea à qua compressione spiritibus influxus denegatur, hinc affectus huius oboriri solent. A combustione Gangræna sæpe produci solet, cum atate decrepita in milite observavimus, cujus brachium à tormento bellico VVeissensteinii solo pulvere pyrio fuit combustum, quamvis propediem congrua adhibita fuerint remedia, nihil potuit effici, quoniam à pulveris pyrii igne, netui, vasa sanguifera ac lymphatica omnesque tubuli fuerint corrosa, abscissa ac rupta, ut per ea planè nulli succi amplius ad partem, brachium nempe, fluere poterint, hinc brachium cadaverisatum fuit, quod tandem ferra amputatum fuit, secundo verò ab operatione die placide defunctus est æger. Tempus enim amputationis rectè observandum est, alias si jam sanguis fuerit infectus, frustra institues crudelē hanc operationem.

Affectus hic etiam producitur à maxima confusione succorum in hac vel illa parte existentium, item à contusionibus, abscissionibus vasorum, anthracibus cum carbunculis, præsertim à scorbutico contumaci & maligno, circa gingivas aliasque oris partes præcipue in infantibus, cum nuper observavi in variolis puero defuncto, qui etiam affectus Batavorum infantibus solemnis esse solet, & ipsi dicitur *der Waatertreeft*. Tandem ut rectè intelligatur, quo modo in Gangræna calor imminuat, sequentia perpendenda sunt. 1. Tubuli obstructi à tergo venientibus succis ita premuntur ut rumpantur, quibus ruptis, succi evasantur & fermentatio nulla amplius in iis observatur, stagnantes enim aquæ ef-

ficiunt paludes fœtidæ, hinc pars necessario corrumpi debet, simili-que modo, ac videmus in plantis, quæ reservandi gratia prelo premuntur, dein chartæ agglutinantur ad illas exsiccandas pro herbario vivo, primo eas prelo subjungimus, quod si parum premantur, colorem viridem retinent, si verò à prelo vel pondere nimis magno fortius premantur, & quasi læcerentur, tunc statim nigrescere solent herbæ sive frutices, quia sic succi unà vice, & cum impetu exprimuntur.

Affectus hic quoque facile à scorbutico producitur, item in infantibus in ore sæpe oritur Sphacelus, quia in his textura vasorum est flaccidior, & eorum sanguis nimis fermentans est, sed & crassior, imprimis, quando à scorbuticis parentibus nati sunt. Sic & in ore saliva separatur, quæ si existat ex sale, & acido aliisque corrosivis particulis, facile causam huic affectui dare possunt. Quod verò in Gangræna pars inflammata & rubore predicta in lividum transeat, ratio hæc est, quod ob obstructionem nimiam succi in partem affectam insilire nequeant, hinc reliquæ particule confusio & inordinata commixtio inspissatorum & coagulatorum succorum itidem oritur ab institutione.

Dein ab heterogenea mixtura succorum oritur sæpe corruptio, quia facile à corruptione reliqui succi corrumpuntur, pari modo, ac videmus, quod pomum putridum aliud pomum sibi vicinum eodem imbuat charactere. Sanguis evasatus stagnansque colorem vel rubicundum, vel ceruleum, vel sublividum refert, prout videmus in contusione aliisque coagulationibus sanguinis, pustulæ verò, in quibus sæpe aqua subrubicunda, vel aliquando flava continetur, oriuntur ex eo, quoniam succi acres & cutis tubulos, & per consequens vasa lymphatica & minutissima vasa sanguifera perfregit, ex

ex quibus vasis distentis & necessario ipsi ruptis liquor intus contentus effluere debet. Quod verò pars flaccescere incipiat, ratio est, quia spiritus animales aliique succi, imprimis ob obstructionem, factam influere, & ita partes distendere nequeunt, hinc privatæ partes his liquoribus talem colorem exhibent, dolor verò, & sensus pereunt, quia nervi comprimuntur non tantum, sed & rumpuntur, & per consequens spiritibus animalibus influxus denegatur, quo denegato fibra non irritantur, sicque neque dolor, neque sensus percipi solent.

In incipiente *Sphacelo* pars redditur sublivida & frigidissima: ratio est hæc, quod ab obstructione nervorum & denegato spirituum influxu, acidum & alcali in succis non amplius commoventur, hinc nullus motus, intestinus, seu fermentatio oritur, omnia enim hoc in casu, comprimuntur & effringuntur. Ex hisce ergo omnibus, abunde patet, partes tunc Gangræna affici, cum ipsarum tubuli ita sunt obstructi, ut paucissimus sit sanguinis succorum in illos influxus, aut per illos transcurfus, seu circulatio. Dicimus, paucissimum in gangræna esse influxum, ad differentiam sc. indicandam, quæ citius illam & Sphacelum, in quo nullus planè adest sanguinis & succorum reliquorum influxus: nam in Gangræna relictæ adhuc sunt tubuli quidam aperti, in quos spiritus & succi aliquatenus possunt influere, hinc quoque vita illius partis, ad breve aliquod conservatur tempus, nec tam difficilis hæc est, curatu, quàm Sphacelus.

*Causa Sphaceli.* Sic Gangræna ac Sphacelus tantum gradibus differunt, eandem enim ferè, seu dictum, agnoscunt causam, in Sphacelo verò omnia deteriora sunt. Nostro iudicio tubuli ferè omnes, in quibus circulatio succorum fit, disrupti, corrosi & fracti sunt, imò sanguis reliquique succi adeò corrupti existunt, ut nullus motus, intestinus, nullaque

fermentatio amplius inter ipsas fieri possit, imò sæpe induunt indolem mercuri, librati corrosivi, omnia erodentes, nil ergo nisi corruptio & mortificatio inde speranda, omnia redduntur cadaverosa, & vitæ expertia; in Gangræna verò adhuc paucissimi tubuli aperti sunt, per quos succi aliquantulum influere possunt. Cum verò tubuli omnes sunt disrupti, nullus succus in istis circulari potest, his enim salvis facile fermentatio in succis his excitari potest, novi enim liquorem, qui si in membrum, brachium sc. vel demotui alicujus arteriam infundatur, partem illam reviviscere dices, prout sæpius in demotuis hunc effectum observavi. Sphacelum ergò, gigni dicimus, quando in parte quadam adest totalis tubulorum obstructio. Videamus nunc paucis obstructionis hujus causam, crassi enim & acidi corrosivi succi, dum motum suum per partium tubulos persolvere nequeunt, ibidem hærendo obstructiones multas efficiunt, & interea ibidem continuo cum spiculis istis scindentibus partium fibras solvunt, adeoque efficiunt, ut in circinnos veluti chordæ tense resiliant, unde tubuli totaliter præcludantur, majorque evadat obstructio, ex quo quoque fibrarum solutione resultat ille in Sphacelo tam hebetus sensus, ut profunda fieri possit in parte affecta incisio, sive scarificatio, ullo sine sensu, motus enim fibrillis partium communicatus ad sensorium commune, perferri ob ipsarum fluiditatem nequit.

Remotiores cause possunt esse res extraordinariæ plures, & inter quas referuntur temperamentum, quod magni est roboris, hinc pueri, senes, mulieres facilius huic affectui obnoxii sunt, quia in his spirituum reliquorumque succorum circulatio est tardior. Sic novæ mulierem lactentem Sphacelo in facie laborantem insaniam eodem contagio infectisse. Inter alias nos ambientes res tanquam causas præ-

mò se offert aer, qui, docente *Hippocrate*, ut mortalibus est causa vitæ, ita & morborum & sæpè mortis, inprimis aer frigidissimus multum ad hunc affectum excitandum contribuere potest, in istis enim regionibus, ubi frigus semper prædominatur intensissimum, ut Islandia, Lappia, Gronlandia, Norvegia, &c. plures auribus, naribus, & digitis orbari asseritur: sic & nocet aer nimis calidus, novimus enim, quod decrepita ætate diebus sc. canicularibus tres vel quatuor fuerint Sphacelo afflicti & omnes mortui, quamvis membra fuerint amputata. Sic & alimenta frigida, crassa, acida, corrosiva suum symbolum addere possunt, ut & potus corruptus, aquæ paludosæ; huc referri possunt medicamenta incautius usurpata, vel nimis refrigerantia vulgò ita dicta seu repellentia, sic & *Tagaut. Instit. Chirurg. l. 1. c. 7.* jam dixit, Sphacelum aliquando contingere ab immoderata & inconsultè ac temerè molita inflammationum refrigeratione: à narcoticis & venenis citissimè Sphacelus oboritur. Motus nimis ob dissipationem spirituum animalium ansam dare potest, inprimis verò animi perturbationes fomites quoque Sphaceli esse possunt, ceu constat *Obs. Rolfscii in Ord. & Method. Med. Spec. l. 2. c. 109.* Nobilis vir 50. annorum territus in solitudine umbra corporis sui, lunaribus radiis expositi, existimans se videre spectrum, sentit levem rigorem, calorem circa serotum, inflammatio sequitur, quam illico excipit Gangræna.

Evacuationibus & retentis etiam quandoque ascribenda culpa, ut sunt hæmorrhagix magnæ, hæmorrhoidum ac lochiorum mensiumque fluxus immodicus ac retentus, sanguis enim ita retentus & stagnans ulcera ac necrosin inducere apta sunt, ut docent monumenta Medicorum: ex urinx suppressione Sphacelum procreatum in suo filio observavit *Hildanus*. Referri ad excreta potest spurcicies illa, quam

Chirurgi in ulceribus putridis relinquant, vel etiam immundities corrosiva, quam ægroti sæpe in corporibus suis minimè curant.

Ex causarum reliquarum censu sunt, seu superius jam dictum, scorbuticum miasma, quod sæpius fomitem subministrat, item inflammatio, quam sæpius Sphacelus excipit. Ex anthrace & carbunculo Sphacelum provenisse, *Paræus l. 11. c. 2. Observat.* dicit. In phthisi, hydropse, febribus, variolis & morbillis, passione Iliaca, à partu laborioso, à vena incautius secta, in fracturis quoque & luxationibus, ulceribus, vulneribus, item nervorum lationibus, & aliis plurimis morbis huic affectui fortes aperiri quotidie observamus. *Hildanus* in Podagrigo septuagenario Gangrænam vidit. *Borellus Obs. 82. Cent. 1.* meminit Sphaceli & mortis subsecutæ clavum pedis resectum. *Praterèa Obs. 7. c. 3.* narrat, in nobili quadam matrona digitum fuisse amputatum ob Gangrænam ab acicula punctura productam. Ex fortiori constrictione fasciarum in fractis membris quotidie observatur Gangræna ac Sphacelus. *Hildanus* rectè in immoderatum usum adstringentium, quæ Practicis defensiva malè dicuntur, Sphaceli causam sæpe rejiciendam esse censet. In contusionibus non infrequenter Sphacelo partes affici, observationes abunde testantur, rationem puto hanc esse, quòd cum sanguis vel extravasatur, & copiosius ad partes transmissus ob lacerationem venularum circulari sive egredi non possit, mora sua alteretur, corrumpatur, inflammationem putredinemque producat, imò ipsum Sphacelum.

In febribus materia obstruente ad exteriores & plerumque inferiores partes depulsa ibidemque stagnante, Sphacelum produci lippis & tonforibus notum est. Exemplum hujus sistit *Tulpius Obs. Med. l. 3. c. 48.* nam mulieri cuidam à febre ardente impensè extorreatæ, effudit se tanto impetu pestifer mor-



morbi humor in brachium sinistrum, ut facta initio non commissum humeri, precipitaretur una nocte in immedicabilem Sphacelum usque ad extremos digitorum apices sic prope Limburgum in pago Pastorem quendam 50. annor. post febrem malignam & petechialem Sphacelo sinistrae tibiae usque ad genu correptum fuisse observavi, qui spaciatus pes etiam in praesentia mea ab experto Chirurgo Limburgensi *Dn. Birkenbutel* amputatus, ægerque sanitati restitutus ligneum sibi adaptavit pedem, & sic cathedram ascendit & concionatur. Plura alia restant Sphacelum facili negotio inferre valentia, quæ ex *Ephem. Germ.* aliisque auctoribus peti possunt.

*Prognosis.*

6. 11. Commemoratis causis Gangrænz ac Sphaceli, methodus jubet subnectere *Prognosis*, & cum tanta sit atrocitas hujus mali & malignitas, ut nisi ocysimè suppetiæ ferantur, pars interitura, imò mortificationis suæ contagio vicinas partes comprehensura sit, insuper Chirurgus nonnunquam desperato jam penitus malo demum vocatur, instituta exquisita Prognosi merito sibi prospiciat, ne incautè se suamque artem prostituat, est enim juxta *Celsum*, prudentis Medici, ubi gravis metus est in morbis, indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse, ut si videretur ars malo fuerit, vel ignorasse vel fecisse vel non videretur, vel si mori contingat laborantem, Medicus occidisse credatur, quem fors dira peremit. Tria autem Medicus vel Chirurgus bene prædicturus considerabit tempus morbi, vires patientis & sedem affectam. Gangrænam ex quacunque causa profectam gravissimum morbum esse nemo est, qui ignorat. Sunt tamen distincti gradus, quibus alii mitiores & curatu faciles, alii perniciosiores & incurabiles existunt, ait enim *Celsus*, Gangrænam, si nondum planè obsideat & teneat partem, sed adhuc incipiat, curatu non difficillimam esse, præcipuè in

corpore juvenili. Dicimus ergò recentem Gangrænam, & corruptionem superficiariam in cute & carne, haud tamen insigniter nervos, venas, tendines & solidiores partes occupantem, medellam suscipere atque curari posse, minime verò contrariò modo se habentem, & in confirmatum Sphacelum degeneratam.

Partium laborantium, eorundemque dignitatis & situs respectu, Gangræna sanabilis vel immedicabilis prædicenda, sic partium internarum Gangræna, præsertim cerebri, hepatis, lienis, massæ sanguineæ, mesenterii, intestinorum, renum, &c. lethales semper sunt, externarum verò curationem admittunt; partes molles, laxæ, ut gingivæ, palatum, nares, aures, pudenda, osculum matricis vix curationem admittunt; sic & hydro-picorum tibiis & serbo quæ suppetvenit Gangræna difficilis curatu est, quæ tamen ab initio congruentibus applicatis remediis arceri potest, prout sæpius id præstiti, & non ita pridem in viro sexagenario factore hujus civitatis *Prang* dicto, hydroptico, quamvis Gangræna aderat, attamen remediis idoneis ab ipso Sphacelo liberabatur, qui morti jam destinatus erat.

A causis externis quæ provenit, contusione, motu, unctione, fractura, vulnere, &c. sanabilior & minus periculosa habetur ea, quæ ab internis proficiscitur causis sanguinem coagulantibus, sicuti & illa, quæ ex senili ætate, defectuali menti & succi nutritii oboritur, raro sanabilis est. Summatim, ut paucis multa dicam, Gangrænz omnes summo cum discrimine conjunctæ sunt, maximè verò, quæ cum humorum, uti dicunt, affluxu accidunt: & hic asterisco notandum est, si pus album apparet, signum esse, quod Gangræna separanda sit, & inferiores partes affluxum succorum habeant, quia chylus inter emortuas & sanas partes effluit, & pus exhibet. Si Gangræ-

ne non statim occurratur, transiit in Sphacelum, succi enim continuo magis magisque coagulantur, & sic mortificatio fit, in junioribus major affulget sanitatis spes, quia in his succi fluidiores sunt, in senibus frigidis verò ii facile coagulantur.

*Prognosis  
Sphaceli.*

Sphacelus terminum suum absolutus difficulter curatur, unde Paulus tantæ, inquit, est ferocitatis ut nisi quis supra omni mora præsentissimas tulerit suppetias, laborans particula facile emoriatur, vicinas sedes invadat, & hominem ipsum jugulet, itaque secundum Ovidii dictum.

*Ense rescindendum, ne pars fin-  
cera trabatur.*

Sphacelus enim seu mortuum membrum, nisi à sanis partibus tempestive præcidatur, & amputetur, primum proximas partes, dein totum corpus corrumpit, putrescereque cogit, quæ sanguis perfluere nequit, sed stagnare cogitur, & hominem sub frigido sudore exstinguit, illud enim, quod in Sphacelo computrescit, veneni in modum suo contactu; quod adhuc sanum, & integrum est, inficit, corrumpitque, partes etiam molles, ut podenda, os, uterum, & anum, pejorem statum prænunciat. De duratione hujus morbi nil determinare licet, modò enim brevioris termini est, & intra paucas horas vitæ finem imponit, modò longius durat, & ad unum alterumque diem protrahitur: imò in Dn. Brey, Hanov. Præceptore ad quatuor duravit septimanas Sphacelus pedis, antequam senem enecavit, tandem febre accedente extinctus est. Inter Chirurgos maxima his adhuc hodie exsurgit, an membrum scilicet sit amputandum? cum sæpe plures sint, qui statunt, membrum potuisse conservari idoneis remediis, & non statim ad amputationem transendum esse: alii dicunt, si nimis tardè amputatur, ut sanguis jam fuerit

corruptus, tunc amputatio non proderit, sed omnes ferè post eam moriuntur; ut ergò tempus bene attendas necesse est.

Ad salutem terminatur Sphacelus incipiens, si suppetiis à medicamentis generosis allatis omnia tolerabilia apparent, gravioraq; symptomata evanescent. Ad mortem verò tendit, si neque generosissimis medicamentis, & auxiliis quid efficitur, sed symptomata ingravescunt, pars nigrescit, & cada-verosum spargit foetorem, sudor frigidus à toto promanat corpore, & passionibus, deliriis, atque insomniis, ac singultu æger destituitur, vel syncope subsequitur, tunc enim cum horrore, & tremore mors horrida cito pede insequitur.

§. 12. *Dieta in his affectibus ita instituenda, ne illius sinister usus morbi causam gignat, & medicamentorum vim impediatur.* Aer itaque sit purus, temperatus, serenus, non autem fuliginosus, nebulosus, frigidus, ac nimis calidus, aut calius inquinamentis infectus, si autem talis, corrigendus erit suffumigiis ex santal. citrin. lign. Juniper. aliisque aromaticis institutis. Eligantur cibi boni succi, faciliisque digestionis, facile in succum, & sanguinem abeuntes, commendantur aviculæ, ova, juscula capontum, gallinarum, videntur contra omnia acida, austera, salsa, ac saccharata sanguinem, & succos nostros facile coagulantia, corrumpentia, & stagnationem, obstructionemque producentia, quæ hic ceu pestis fugienda sunt. Potus sit potius Theæ, vel Caphææ, vel alius calidus aromaticus, & succolatus, vel cerevisia bene cocta, ac herbis appropriatis correctæ, vel vinum dulce Gallicum, vel Hispanicum, vel aliud minus acidum. Potus exolet omnis frigidus. Hic potius Gallo-rum proverbium attendendum est: *il est sain boir, aussi chaud, que le Sang est.*

Motus & quies, somnus & vigiliaz ut respondeant sibi invicem, summo studio annitendum, alterna enim requie quod caret durabile non est. Quantum noceant animi pathemata in his affectibus, superius notavimus, idè rationis freno sunt coercenda. Excretorum & retentorum ut in omnibus, ità & in his affectibus maxima habenda est ratio. Alvus sit aperta, &, si officium suum denegat, suppositorio, clysterib. Tartaceis cum oleo amygd. dulci sollicitanda. Menses quoque, hæmorrhoides & utina ut legitime evacuentur, omni studio prospiciendum.

*Galenico-  
rum cura-  
tio Gang-  
græ.*

§. 12. *Veteres in Gangræna* curatione ità procedunt. Perfectè mortificatam partem celeritè resecant, quo loco sanæ parti appropinquat. Gangrænam verò eunt sanguinem quamplurimum ex parte affecta evacuando, quæ si fiat à magna inflammatione, poris sc. dissipatis, materiam, quæ non potest discedi, illicò evacuant, factis in membro profundis scarificationibus vel sectionibus, ut etiam ipsæ venæ sanguine plene exonerentur, animadvertunt tamen, ne nimia fiat sanguinis evacuatio. Aliqui scarificationum loco hirudines parti gangrænæ applicant. Post sectionem, seu scarificationem factam, partem muria calida, vel etiam aceto, vel sale, vel fixivo in quo lupina sint cocti, abluunt. Farinam erui, aut lolii, aut fabarum cum aceto mullis: si verò vehementius adhibere velint, sale adjiciunt, aut pastillum Andronis, aut aliquem similem extergunt.

*§. Farinæ orabi vel fabarum, vel sem. lolii &c.*

*Cum f. q. oxymeli ut.*

*F. cataplasma quod apponatur.*

*Vel:*

*§. Mollis rosæ cal. Ziv.  
ungu. Aegyptiac. &c.  
calc. viv. Zui.*

*M. & applica.*

Commendant etiam Galenici Veteres nuces, urticam & tithymali succum tempestivè & moderatè adhibitum; vel decoctum lupinorum amarorum assusum: quidam verò post sectionem, securitatis sectionis gratia, etiam cauterem adhibent, in quibus sale cum porri succo utuntur, postea autem ad crustam removendam, cataplasma ex pane, aut hordeacea aut triticea farina in aqua & oleo coctum imponunt, item capitalem siccum pulvillum cum melle applicant; tetrapharmaco etiam ac Macedonico appellato utendum esse ajunt. Probè verò separare dicunt crustas panem cum apio tritum, aut cum ocymo, aut iridem aut panacem, aut aristolochiam, aut acorum cum melle, aut thus. Aufert etiam secundum eos crustas, Machæionis medicamentum, & lîis, melle exceptis in linamentis, verum in mollibus corporibus farina erui sufficit cum melle.

Alii zurginis rase, minii, alumini scissi singulorum aequales partes aqua trias illiunt. Gangrænas circum scarificant imposita farina liliacea cum raphano & sale, quandoque etiam aceto, uva passa exemptis vinaceis cum cortice, addito sale & aceto mullis: nuncum regiarum nucleum commendant, alii myrti folia in vino cocta trita cum melle.

In Sphacelo partem mortificatam celeritè resecandam volunt, quatenus attingit vicinam sanam, ita ut nihil prorsus putridi ac cariosi relinquatur; deinde locum incurrunt, & postea sesamum cum melle, vel siccum capitale item cum melle adhibent, dein panem extenuis, vel farinam hordeacæ aqua & oleo subactam imponunt, sed & iris & panacis radices & aristolochiam ac ervum applicant usque crustas tollunt, singula cum melle miscenda esse contendunt. Item Machæionis emplastrum, & lîdem cum

*Sphaceli*

*rosæ*

rosaceo & melle diluta adhibent. Ubi verò crustæ exciderint, curationem reliquis ulceribus communem adhibent.

Paracelsi  
cura in  
Gangræ-  
na,

§. 14. Paracelsus ad Gangrænam curandam commendat Realgar sublimatum in aceto coctum, addito oleo majoranæ ut linimenti formam acquirat, item relecteria commendat medicamenta, ut sunt utrica, flammulæ, tum curativi eodem modo procedit, ut in ulceribus corrodentibus, approbatque emplastra ex resina abietis, visco consoldæ, paucis scammoniæ, & succo chelidonie paratum. Gangrænam autem sal-nitrosam per solum Vitriolum resolutum curant. In curando igne hoc Persico imprimis rationem hanc tenet, quæ in exterioribus ignibus observari solet. Itaque ignem ex lignis suscitatum quàm facillè effusione simplicis aque exstinguant homines, at ea ipsa aqua non ita in igne Persico operari vult, itaque penitus Medico introspicendum fore ait, in aque essentiam, & dicit, eam nihil aliud esse, quàm alumen dulce, ex quo eruitur alumen ad restitutionem ignis Persici adhibendum: itaque quia Sulphuris lacte Æthere ignis juxta eum restinguitur, illud ipsum quoque ad ignem Persicum accommodari vult. Et cum Author plures species ignis Persici constituat, hac ergo ratione in estinguendo Sulphure Microcosmi progreditur, nec ulla alia compendia ex Medicinæ fontibus excogitari vult illis ipsis exceptis, quæ de Mineralibus annotavit. Præcisionem membrorum Author maxime improbat, aque omnino cum Medicina pugnare dicit: ipse non serra vel instrumento, sed subserpenti emplastri usu emortuas partes ab integris separare solet.

℞. Colosonia ℞ iii.

Liquor. Myrrha ℞ vi.

Ex quatuor Gummis ℞ ℞

Fiat Emplastrum, quod ea parte applicetur, quæ sanum emortuo contiguum est.

Verùm ubi os ex ustiones nimium intumisse constaret, non præter rationem putat ipsum serra discindi, sed à sanis partibus sedulo cavendum & abstinendum ait. Hac ratione emortuas partes auferit, integris quandoque manentibus ossibus. Consolidationem denique per aquam salis & oppodeltoch auspiciandam esse censet. Sequentem aquam sanantem sanam partem agra jam remota, apponit.

℞. Aq. salis ex raphano ℞ i.  
ex cuticula ℞ iii.

Succi plantaginis digesti  
℞ viii.

Mixta mane & vespere adhibenda esse jubet.

Vel:

℞. Succi chelidonia.

Aqua Aluminis Rochi.

Tameniaa. ℞ i ℞.

Nitri resoluti ℞ ii.

M. & utere ut prius.

℞. Olei de Frumento,

de ovina. ℞ i ℞.

de Glandulis ℞ v.

Cera,

Picis communis aa. ad pondus omnium.

Fiat cerotum secundum artem, adhibet pro more vulgato.

Æthereas deinceps per bituminis navalis & Camphoræ resolutæ aqua pondera curet solet.

Gangrænæ autem igni lignario respondentes ab eo Thure & Myrrha curantur. Sulphureæ verò ac Resinosæ per Lac Virginis ex sulphure paratum ab ipso sanantur plerumque; in usum autem omnium horum eo intendit, ut subinde nova imponantur, nec unquam pars sicca relinquatur, sed perpetuò humectetur.

Abstinentur esse ait à Medicamentis secundum elementa compositis, à repersivis, à morbillosum unguentis, unctionibus, suffumigiis & Guapcano ligno. Ignis Persici curam duplicem dicit, unam priusquam natus sit morbus, alteram cum jam est vigentissimus. Ad priorem curam seq. laudat.

℞. Sper.

R. *Sperm. vanav.* ℥ ss.*Camphura* ℥ iiii.*Myrrha.**Ithuris aa.* ℥ i.

Reduc ad destillationem in Sole, donec liquefiant. In hunc liquorem pannos innectos superponit loco affecto, cum siccati fuerint, rursus intingit, superponitque tandem, donec sedetur. Ad posterio-rem curam sequens adhibet:

R. *Terebinthina indurata* ℥ iij.℥ *Oppopanicis* ℥ ss.*Colchotarvis* ℥ iij.

Reduc in emplastrum.

Mel desumptum cum superioribus ingredientibus mixtum parti sectæ imponi vult.

*Helman-  
rii mede-  
la in Gan-  
græna &  
Sphacelo.*

§. 15. *Helmontius* in cujuscun-que partis Gangræna Lixivialia magnificat, quæ etiam loco prius profundè scarificato adhibenda esse suadet, utpote in quibus Gangræna causa, acidum scilicet omne emoriatur. Lixivium enim forte Gangrænas profundè scarificatas potenter sistere contendit, quia in lixivialibus, seu distillat, omne ac- cidum commoriari necesse est. Sanguinem Talpæ in Gangræna appli- catum magnipendit Author.

*Sphaceli* curam nullam ipse ag- noscit.

*Vvillifur-  
na cura  
in Gan-  
græna.*

§. 16. *Vvillifur* sanguinis crassi- ticem & visciditatem corrigendo, succoque nervo subtilisanda flatu omnem operam impendit, vo- latilioribusque Diaphoreticis hunc scopum attingere conatur, & isque efforiat ea quæ spirituum, motum intendere, illorumque penu ada- gere valent. Quod ad externa verò medicamenta pertinet, scalpello partis superficiem exemplò disse- cat, & si Gangræna altas egerit radices, profundius ferrum insinuat. Deinde incisus carnes lavat Tinctura ex aloë & myrrha in spi- ritu vini facta, vel ungu. *Egy- ptiacæ* in spiritu vini camphorato dissoluto: partemque curat dige- stivo cui aloë & myrrha admisce- tur. Purgatoque ulcere corruptis istis carnibus, ejus consolidatio- nem idoneis medicamentis accelerat.

In *Sphacelo* eadem quæ in Gan- græna propinat med. camenta, sed cum in eo integræ adsit mortifica- tio, partem sanam ab ægro sepa- rat, vel cultri ope, vel *buryri* Antimonii beneficio: interim to- pica non negligit, & inter alia laudat aquam phagedenicam, decoctum scortiarum Antimonii in aceto factum, spirit. theriac. cam- phorat. quæ applicantur, ut pro- gressus ulterior impediatur. Post- modum ulcus curat suppuranti- bus & mundificantibus, illudque tandem justa methodo ad perfe- ctam consolidationem perducit.

*Sylvii cu-  
ra Gan-  
græna ac  
Sphaceli.*

§. 17. *Sylvius* in Gangræna cu- randa tanquam optima remedia Diaphoretica laudat quæcunque, suadet quoque cataplasmata ex ru- ta, scordio, absynthio, floribus sambuci, semine urticæ in muria coctis, addito spiritu fl. sambuci, vel spiritu vini camphor. quæ om- nia diligenter jubet imponere, & omni modo Sphacelum præcavere. Inter Diaphoretica laudat salis vo- latilia, ur & oleosa sæpius exhibenda, sic & myrrham, olibanum, mastichem, aloë aliaque plura, imprimis ex his confectum Elixir proprietatis internè summendum commendat. Externè verò laudat præter prædicta, aquam calcis vi- væ, vel decocta herbarum aroma- ticarum, quo refert foras, suffumi- gia, aliaque totalem corruptionem prohibentia, ut theriacalia, cam- phorata, aleotica, myrrham, &c.

§. 18. *Cartesiani* totæ in eo sunt, ut succorum & sanguinis in Gan- græna incipiente prohibetur ulte- rior coagulatio, obstructions va- sorum referentur, & necessaria re- stituetur circulatio, quapropter ad ipsa strim properant sudorifera, aliaque remedia satis porose, par- ticulas acutas & angulares frangenti- a, ne vasa ulcens lædant & succorum mortui obstant, quorum remedium sequentia communi- cant paradigmata.

R. *Aq. card. bened.* ℥ i.*Spir. Angelic.* ℥ iij.

Orul.

Ocul. cancr. ꝑ ꝑ.  
Sperm. cet. ꝑ ꝑ.  
Myrrh. gr. vi.  
Sal. C.C. volat. gr. iii.  
Camphor. gr. ii.  
Syr. Diascord. simpl. ꝑ ꝑ.

F. Mixtura una vice exhibenda.

Vel:

℞. Aq. Hyperic. ꝑ ꝑ.  
scabios. ꝑ iii.  
Theriaca. ꝑ i.  
Spir. C.C. ꝑ i.  
camphur. ꝑ ꝑ.  
Syrup. de scord. ꝑ ꝑ.  
M. d. una vice.

Interdum etiam ad ipsum accedunt sublimatum præcipitatum, quem cum electuario diascordii & theriaca in forma boli præbent assumendum. Partem Gangræna affectam abluunt spirituosis & lixivis, quæ remedia ut facilius penetrent, scarificationem ad partem usque sanam admittunt, & vel myrrham, aloem & sal Saturni, vel unguentum Aegyptiacum in spiritu vini dissolvunt, coque partem lavant, addito interdum pro separatione partis corruptæ à sana spiritu vitrioli, sulphur. vel nitri. Laudant etiam aquam calcis vivæ & spirit. armon. nec non decocta & cataplasmata ex radicibus gentianæ, valerianæ, angelicæ, aristolochiæ, herbis scorodii, alharicæ, cicutæ, phellandrii, rutæ, nasturtii, cardui benedicti, salvie, nicotianæ, foliis quercus, lauri, floribus hyperici, sambuci, meliloti, croci, semine sinapi, dauci, cumini, nasturtii, lupini, lini, baccis lauri, nucibus juglandis, cupressi, fructu colocynthis, sale Ammoniaco, tartari, sulphure, nitro, alumine, & rugine, sapone, fimo columbino, caballino, fermento cerevisiæ. Impetrata convenienti separatione partis corruptæ à sana, suppurationem promoveant unguento Apostolorum, aureo, vel basilico, & ulcus consueto more tractant, ut carne de novo expleatur & cute obducatur.

A Sphacelo partem totaliter cor-

ruptam penitus solent amputare, vel carnem corruptam cultro excindere, ferroque candente unctionem instituunt, ne partes vicinæ corrumpantur.

§. 19. Ut jam me audiat pau-  
lulum vestras mihi præbeat aures & oculos rogo, qui in curatione Gangrænae cō collimo, ut ante omnia obstruatio tubulorum tollatur, & stagnantibus succis liberior concedatur transitus & motus progressivus, in quem finem exhibere soleo varia Diaphoretica, absorbentia, spirituosā, balsamica, oleosa, salia volatilia quæcunque & simul aromatica facta, hinc prosunt Tinct. bezoard. Vel:

℞. Elix. prop.

Tinct. myrrh. aa. ꝑ i.

M. D. bis de die assumantur 20. gutt.

Vel:

℞. Elect. Diascord. ꝑ i.

confect. alkerm. ꝑ i.

pulv. cord. pres. ꝑ i.

c. Syr. scord.

F. Elect. Singulis horis exhibeat quantum cuspidē cultri capi potest. Theriaca sepe sufficit, si nil aliud ad manus sit. In Gangræna ab inflammatione, & in ipsa applicatis remediis contrariis frigidis ac repellentibus eodē respiciendum est, ut ista medicamenta prius abjiciantur. Dein rationis oculo examinandus status partis gangrenosæ, in qua sepe succi coagulati & stagnantes sale suo volatili, spiritibus destituti sunt, qui qua data porta avolant, sanguis cum reliquis succis non amplius circulantibus stagnat, perversecque mixtus est, salia acida ac corrosiva, cum ad partem læsam sibi imperium rapiunt, canaliculos ferè omnes disrumpunt, & sic fores effringunt reliquis obstruendis relictis: ad quas aperendas, vitam iis cum reliquis partibus reparandam, & succos corruptos stagnantesque fluidiores volatilioresque reddendos, sudorifera ex superius dictis, diascord.

Cura  
Pharmaceutica ac  
Chirurgica nostra  
in Gangræna.



theriac. spirit. C. C. vol. ocul. can.  
parata, aliaque acidum imprimis  
temperantia remedia conducunt.  
Sequens mixtura cochleatim assu-  
matur.

*R. Aq. card. bened.*

*meliss. a. ʒi.*

*ther. C. ʒʒ.*

*Spir. rosar. ʒʒ.*

*C. C. ʒi.*

*Syr. cinam. ʒʒ.*

*M. D.*

Exhibeas patienti per vices Elixir.  
vitæ ʒi. cum portione salis volatili-  
lis C. C. quam dosim singulis die-  
bus assumat necesse est, aliàs lau-  
dabilis effectus non sequi solet. Spi-  
ritus matricæ cum Elixir. vitæ ma-  
ritatus, & ad gutt. 20. sæpius de die  
assumptus excellens erit reme-  
dium. Statim verò externè appli-  
cetur linteis duplicatis calidè spi-  
ritus matricæ *Dn. Blancard.* qui  
seq. est.

*R. Mastich.*

*Myrrh.*

*Oliban.*

*Succin. aa. ʒii.*

*Spir. vini rectif. ℥ii.*

*F. l. a. destillatio.*

Nos verò statim accedimus ad se-  
quens excellens remedium, quod  
raro me fefellit: vel instituenda  
statim ablutio sequenti:

*R. Spir. vin. camp.*

*Aq. cal. vir. p. aq.*

*campbor. ʒiii.*

*M. & calidè applic.*

*R. Rad. vincetox.*

*ivcor,*

*aristoloch. O. &c.*

Superimposito cataplasmate ex mic.  
panis albi inveterati ℥ii. herb.  
scordii, absynth. aa. Mii. Vini  
Gallic. q. s. coq. ad formam cata-  
plasmatis. Vel imponatur seq. cata-  
plasma ad Gangrænam nobis so-  
lenne.

*R. Rad. Aristol. utriusque*

*hirundin.*

*scorzonæ.*

*angelic. aa. ʒʒ.*

*Herb. scord.*

*ruta recent.*

*absynth. aa. Miʒ.*

*prunell.*

*beton.*

*maioran.*

*origan. aa. Mi.*

*summ. rub. vulgar.*

*R. sambuc.*

*chamom. aa. Mʒ.*

*sem. lupinor.*

*cumin.*

*anis. aa. ʒi.*

*Bacc. lauri,*

*luniper. aa. ʒiii.*

*myrrh.*

*aloer. aa. ʒv.*

*sal. tart.*

*sal. armoniacæ aa. ʒii.*

*N. M.*

*caryophyll. aa. ʒiʒ.*

quæ species vel cum linteo duplic.  
in formam cataplasma. redact. ap-  
plicentur, vel quod melius, ex-  
trahatur cum spir. vin. tartaris. es-  
sentia, vel destilletur spirit. in quo  
dein myrrh. & aloes ad consistent.  
cataplasma. solvatur, addatur & spi-  
rit. matricæ. q. pl. spiritus hic ad  
usum reservari debet, ingredien-  
tia supra dicta stent infusa per ho-  
ram unam vel alteram, dein coq.  
addita portione panis biscotti &  
partis Caphæ, vel farinæ tibarum  
tostar. Aromaticæ species in fine  
prius addi debent, ne spirituosæ &  
efficaces particule inter coquendum  
in auram abeant, prima vice huic  
cataplasmati addere poteris Elix. vi-  
tæ ʒi. in quo campbor. ʒi. soluta  
fuit. Secunda vice addas adhuc  
Tinct. castorei ʒʒ. alia vice Tinct.  
assæ foetidæ, quarta vice spirit. sal.  
armoniaci ʒʒ. & pro re nata spe-  
cies mutare poteris, & singulis  
6. horis rursus applicari debent.

Vel:

*R. Lixiv. fortiss. spir. vinia. aa. ℥ʒ.*

*Herb. ruta salvia.*

*scordii, absynth. aa. Mʒ.*

*Rad. aristoloch. utriusque aa.*

*ʒi.*

*Sal. armon. ʒii. coq. ad tertiar*

*dein add. myrrh. aloes aa. ʒʒ.*

*aq. vite ʒiʒ.*

*M. f. l. a. catapl.*

Omnia hæc remedia juvant, quate-  
nus constant salibus volatilibus  
oleo-

oleosis & spirituosus, quæ omnia reviviscere faciunt, spiritus ac liquores nostros, & non duntaxat particulæ stagnantes ac ad corruptionem tendentes hisce fluidiores redduntur, sed & ipsi succi ad regularem mixturam disponuntur; hinc immediatè sequitur, quod obstructions referuntur, & sanguis in vicinas partes ejusque succi recipiuntur circulationem, spiritusque etiam animales iterum influere incipiunt, & vasa iterum coarctantur, & propellunt inclusos succos mediante pulsu ad partes quascunque, & sic partem salvam sospitemque reddunt: vita ergo hujus partis gangranosæ iterum cum aliis partibus communis redditur, h. e. canaliculi iterum restituantur, & succi iterum per hos circulantur, ut in statu sano, & in hoc consistit quod vivere dicimus. Si verò jam pars gangranosa fuerit sphacelata, ad separationem sine partis à mortua species prædictæ iterum accipiantur, & ex iis paretur cataplasma adjectis gummabus vel linst. ex iis paratis.

De scarificatione partis gangranosæ ac sphacelatæ hodie inter Medicos etiam Neotericos controversatur, ob sanguinem attrahendum, Veteres dicunt ad resolutas partes, in quibus hac ratione sanguinis motus & vigor restituitur, & vel lancetta vel novacula in parte inflammata & tumefacta per ipsius longitudinem & latitudinem, *Botallus de Vulnerib. Scopet. c. 23.* hoc remedium plures se liberasse fateatur, & nullum aliud præstantius neque totius, si tempore usurpetur, inveniri addit: sed *Celeberr. Overcamp.* alique rem attentius examinarunt inveneruntque, quod pars jam sufficienter sit scarificata per minutissimos cuspellos intus latentes, per quos textura partium laceratur, dein viz per quas medicamenta penetrare debent satis apertæ sunt, & non opus esset majores efficere: magis ergo juxta ipsos noxiæ sunt scarificationes, quia vasa lacerant, in-

cludunt discinduntque, ex quibus sanguis & succi evasantur & coagulantur, sicque magis ad putredinem ansam dant: addunt quod aer externus sanguinem magis corrumpit ac coagulat, quia ipsum jam aperte aggreditur, quod non potuerit efficere cum sanguis vasculis suis inclusus fuerit. Experimentia quoque constat, siustum carnis recentis incidatur sæpius illud citius putrescere, quam si non fuerit facta incisio. Contra *Celeberrimus Broen de duplici bile Veterum p. 173.* ait: Verum me hercle alia plane ratio est inter scissionem illam internam ab acidis particulis, & externam per cultellum incisorem: illa enim malum augeat, hæc vero mitigat non quidem per se, sed per consequ. Primò enim sanguis sanus & floridus in partem afflictam effluens, quatenus per poros suos transmittit materiam atheream valde peregrinam ab illa quæ poros partis gangranosæ vel sphacelosæ perfluit, fermentum illud acidum ibidem hærens commodè valet infringere. Secundò mediante illa incisione aditus conceditur liberior medicamentis applicandis, & sic curatio evadit brevior, quemadmodum hoc felicissimè non ita pridem est expertus *Amstelodami*, ubi vocatus fuit ad curandum puellum quendam biennalem, cujus scroto tum sphacelo planè erat occupatum. Instituta circa vespertam scarificatione ad levem usque sanguinis eruptionem, adhibito uno lavamento ex spirit. vin. theriacal. & cataplasma. idoneo parato ex *philandr. scordio*, *absynth. aloë* & *myrrh.* animadvertit ipse matutino tempore insequentis diei jam factam fuisse separationem carnis putridæ à viva, ortum fuisse boni & laudabilis puris proveniunt, sive ut loquuntur digestionem, & sic porro adhibitis adhibendis brevi temporis spatio integrè ab eodem inquit restitutus. Multum ergo inquit prælaudatus *Author*, ad brevem curationem gan-

grænzæ ac instantis sphaceli contri-  
buit debite instituta scarificatio,  
alias enim facillimè proferpit ulte-  
rius malum, & tandem pervenit,  
uti vulgus loquitur, ad cor, h. e.  
fermentum illud gangrænosum re-  
liquas inficit & corrodit partes  
fluidas & solidiores circumjacentes,  
hæ iterum alias, & sic porro  
pergitur donec tota M. S. hoc fer-  
mento est imbutus, unde tandem  
prorsus coagulatur, in motu suo  
fistitur, & sic homo mori cogitur.  
Nec est air, quod quispiam aeris  
accessionem metuat in scarificatio-  
ne, eo forsan ductus exemplo,  
quod carnes concisæ facilius in  
aere corrumpantur quam solidæ,  
tempus enim non requiritur tam  
diuturnum, ut noxiæ aliquid ab  
aere possit adferri, inprimis cum  
egregium interea ad usum revoce-  
tur lavamentum sale & oleo volat.  
turgidum, sed ut has lites non  
nostras faciamus, dicamus, quid  
de scarificatione sentiamus, nempe  
eam non modò noxiæ, sed aliquan-  
do etiam utilem esse, cum remedia  
topica eo melius in vasa & tubulos pe-  
netrent, & succos in iisdem coagu-  
latis resolvant, potestque Medicus  
inde colligere, num sensus aliquis  
superfit, aliàs non valde juvar.

In malo contumaciori spirituo-  
sa, ut sunt Elix. vitæ, Tinct. ca-  
stor. assæ foetid. cum camphor. ma-  
jori quantitate usurpanda sunt, im-  
primis spirit. sal. armoniaci in bene  
clauso vitro calefactus calidissime  
applicetur, & cataplasma iterum  
imponatur calide, & omni biho-  
rio repetatur. Aqu. calcis vivæ,  
aqu. benedicta Chirurgor. dicta  
per se vel cum spirit. vini cam-  
phorato mixta in gangræna & in-  
epiente sphacelo egregium est re-  
medium: paratur item ex aqu. calc.  
viv. aqua phagadænica Gallis Chi-  
rurgis solennis, ex hac enim cum  
merc. dulc. & spirit. vin. paratur li-  
xivium scoriar. antimonii in locis  
gangræna affectis egregium est,  
aq. pomor. destillata contra gan-  
grænam magni momenti est. Uri-  
na humana & sterco vacinum ob-

sal volatile, quod possident, in-  
rusticis aliisque plebejis summum re-  
medium est.

Si Gangræna producitur, ceu  
diximus, ab externo frigore à quo  
succus nostri quasi congelati, & in  
coagulum abeunt, & quidem à  
defectu subtilis materiæ illos per-  
fluentis, cum nempe in aere non  
sufficiens materia subtilis adfuerit,  
ad succos fluidiores servandos,  
hinc stagnant obstructionsque pa-  
riunt. Ex hoc fundamento omnia  
phænomena explicari possunt, ad  
curam ergo hic transeundum. Non  
ergo membrum refrigeratum illi-  
co igni admovendum est ad con-  
gelationem tollendam, & mem-  
brum calefaciendum, ratio hæc  
est, quod repentinè irradiatio ignis  
particulas volatiles resistentes peni-  
tus expellar, unde maxima confu-  
sio & textura partium plane tolle-  
retur, quod experientia constar,  
cum id videamus in pomis con-  
gelatis, quæ si igni admoveantur,  
statim putrescunt: sic quoque  
observamus quotidie in nobismet  
quando digiti nostri à frigore im-  
mobiles facti, si statim igni ad-  
moventur, inde est ac si mille  
aciculis pungantur, sensum præ-  
bent. Congelata ergò membra pri-  
us aqua frigida nivea fricentur,  
vel cum ipsa nive: hoc aliis Pa-  
radoxum erit, sed si rite rem per-  
pendamus, ratio id nobis persuade-  
bit, cum cura tantum hoc mo-  
do inchoetur, sed non perficiatur  
sensim enim ac sensim coagulati  
succus debent resolvi, & ad pristinam  
mixtionem redigi, & hoc optime  
perficitur ope aqu. frigidaæ  
vel nivis frictione, ratio est, quia  
per partem congelatam aquæ im-  
positam plus materiæ subtilis per-  
fluit, quam per congelatas, & ni-  
mis stricte compressas particulas,  
per quam materiam subtilem parti-  
culæ iterum fluidiores redduntur,  
quæ in parte affecta fixæ fuerant;  
frictio quoque cum nive capro-  
pter juvat, quoniam ipsis in ma-  
nibus nostris liquefeit, & hinc  
amicabilis sit resolutio parti-  
cula-

# CAP. III. DE GANGRÆNA & SPHACELO. 341

cularum congelatarum; adde & quod commotione ista reliquos quoque succos stagnantes ad motum incitat, postmodum succi inspissati calore fortiori dissolvendi sunt in quem finem conducet seq. vel simile balneum, aut ex iisdem paratus fatus.

*R. Rad. angelic. galang. aa. ʒβ.*

*rapar. bryon. aa. ʒ ii.*

*Herb. ruta scord. rorismar.*

*absynth. nicot. aa. Mii.*

*Semin. comin. urtic.*

*erucæ aa. ʒ i.*

*piper. long. ʒ vi.*

*Sal. armoniaci, & sal. tart. aa.*

*ʒ iβ.*

Coq. in part. i. vin. Gallic. & 2. part. urinæ, & bene coct. adde spirit. vin. optim. ʒ vi. & membrum congelatum calide immitatur, & dein fricetur seq. vel simili lini-mento.

*R. Spir. vini camphor. ʒ ii.*

*Bals. nervin. n. d. ʒ β.*

*Ol. Guaiac. iuniper.*

*Terebinth.*

*Philosopbor.*

*Tinct. ass. fetid. aa. ʒ i.*

*Spirit. cochlear. ʒ iβ.*

*M.*

Vel oleo spirit. Lulliano simili fricentur partes gelu indurata. Si vero pars tendat ad sphacelum, imponatur cataplasma nostrum superius dictum, & procedatur eodem modo ac superius recensuimus: in hoc præter externa & interna interponenda sunt, præsertim sudorifera, quæ omnem implent paginam: detur etiam cum vino ʒ β. spirit. C. C. volat. vel sal ejusdem, vel:

*R. Vin. Gallic. vel Rhenan. dulc.*

*ʒ ii.*

*Elix. vitæ ʒ ii.*

*M.*

Animis calidis remediis aliquando agri Gangræna affecti malè se habent, hinc Author sum, ut semper calidissima remedia aqueis temperentur, ut sunt aqu. cal. viv. aq. β. sambuci &c. his enim succi à frigore quasi congelati, à spiritibus & volatilibus oleosis salibus pe-

*Tomus I I.*

dedentim resolvuntur, & iterum fluidiores redduntur. Imo internis remediis semper adjungendus spirit. matric. qui hisce in affectibus egregium remedium, quod nostra experientia constat, detur enim per se, v. gr.

*R. Spir. matric. ʒ β.*

*Bals. nervin. n. d. ʒ iβ.*

*M. d. 30. usque ad 60. gut.*

Si malum hoc fuerit productum ab hydrope, cum partes diu à succis evasatis & stagnantibus fuerint distentæ, hinc omnis textura partium perditæ ac disrupta à corrosivis istis & fermentantibus succis, qui instar lupi esurientis omnia corro- dunt devorantque, succi quoque in hydropicorum toto corpore existentes corrupti sunt, & privati omnibus spiritibus, hinc circula- tio debilis est, & febris lethalis simul coincidit: ad curam ergo properandum, quæ non multum differt à priori jam dicta, & sæpe magno cum effectu seq. remedio usi sumus:

*R. Aq. calc. viv. ℥ i.*

*Spir. vin. camph. ℥ β.*

*Bals. nervin. n. d. ʒ i.*

*Elix. vitæ ʒ iv.*

*M.*

applicetur calide cum linteis. Seq. non contemnendi usus erit in Gangræna ab hydrope producta.

*R. Rad. angel. bryon.*

*allior. aa. ʒ iii.*

*Muræ limon. ʒ viii.*

*Sal. tart. ʒ β.*

*Ext. absynth. spir. matr. Blanck.*

*Aloermyrrh. camph.*

*M. l. a. & applica calide cum cannabi vel lino, postmodum applicari potest seq. vel simile cata- plasma ex herb. menth. absynth. pulv. scord. bacc. juniper. sambuc. sem. sinap. scænic. bardan. Sal tart. ni- tri, armoniaci, quarum species in urina & scæcibus vini coqui possunt. Cui decocto dein addatur farin. lupin. vel fabar. ad consistent cata- plasmi. quod calide quantum ferri potest applicetur, & simul supra hoc cataplisma sacculum arenacalidissima repletum impone, quo*

*Y 3*

*enim*

enim pars calidior servatur eomelius, & si his malum non cedit addi possunt penetrantia remedia & in majori quantitate, Elix. sc. vitæ, vel spir. sal. armoniaci, vel balsam. nervin. ad 3 ij. &c.

*Cura  
Gangra-  
na à de-  
fectu suc-  
ci nutri-  
tiii.*

Gangrana ista quæ à defectu succi nutritii oritur, cum quasi ipsa pars vita priyetur à nutrimenti plenario defectu vix curatio superest, sed ne ægros planè deferas sequens vel similis fatus præscribi potest.

*R. Herb. scord. ruta salvie.*

*maioran. aa. Miv.*

*cochlear. Mv.*

*Rad. consol. maior. 3 vi.*

*Sem card. bened. eruca aa.*

*3 vi.*

*Bacc. juniper. lauri aa.*

*3 v.*

*Acq. calc. 15 l.*

Coq. in 15 urinzæ foetidæ & lixivio, & quater de die toveatur pars, simulque tricetur cum ol. rerebinth. Guaiac. succin. Tinct. ass. foetid. spirit. lumbric. balsam. nervin. spirit. cochlear. oleo ejusd. quæ omnia succos inspissatos congrumatosque attenuant: in rusticis aliisque quibus inopia est stercus bubul. calidissimè sæpe applicetur, cui cataplasmati & add. herb. aromatic. salv. sabin. sem. bardan. eruc. bacc. juniper. & cum urina foetida parari potest cataplasma calidissimè sapius de die imponendum, & diutioribus addi possunt myrrh. aloes in Elix. vitæ vel spirit. matricul. solut. vel:

*R. Spir. vin.*

*Ol. rerebinth. aa. 3 v.*

*Spir. sal. armoniaci 3 iß.*

*M.*

In hoc casu nec interna remedia negligenda sunt ad succos crassos fluidiores reddendos, in quem finem Patiens decoctum ex rad. chin. salsaparil. galang. zedoar. macis, croc. herb. cochlear. nastur. sem. anis. sal. tart. armoniaci in vin. Gallic. decoct. & pro libitu bis vel ter de die æger tres assumat unicas & interponat. spir. cephal. nostr. vel aliud sal volatil. oleos. ad 30. &

plures gutt. assumend. vel Elix. vit. 3 ij. sic & oleum cochl. ad gutt. 3. in vino Hispanico assumptum egregiam navabit operam, medicamenta enim hæc resolvunt sanguinem, & succos temperant acidos, circulationem promovent, sanguinem volatilifant, & quasi resuscitant, in succis enim alicujus hominis sani 4 j. salis volat. reperitur, 1 1/2. 15. olei, & 6. 15. spiritus.

Malum hoc ut plurimum infantes infestat, quorum dentes sæpe omnes excidunt, gingivæ fætent, os maxilla corruptum corrosivumque conspicitur, febris adeest continua, facies pallida, œdematosa ac humida, lingua sæpe multis foraminibus pertusa, qui infantes auxilium petunt, tristi ergo affectui ut ocysimè occurratur necesse est, hinc eluantur partes infestæ cum spirit. vini camphor. 3 vj bals. nervin. 3 j. M. vel quod fortius est seq.

*R. Murie limon. 3 ii.*

*Spir. vin. aromatic. 3 iß.*

*Spir. sal. dulc. 3 i.*

*Bals. nervin. 3 f.*

*Elixir. vitæ 3. iß.*

*tart. vetriol. 3 i.*

*Camphor. 3 ii.*

*Extract. centaur. min. 3 iß.*

*Sal. volat. oleos. 3 ß.*

*Myrrh. 3 i.*

*Ol. cochlear. 3 ß.*

*M.*

quæ mixtura sæpius abluantur partes infestæ & corruptæ: est remedium, quod Te rarò fallit, & experientia nostra sepiissime comprobatum est. Hæc omnia remedia ad principia magni Cartesii, Philosophi, correspondent, quæ ratio ergò est, quòd multi Philosophiam docentes relegantur. In promptu causa est, quia veritatis ac pacis amatores sunt, juxta enim Tacitum: *Non minus periculum ex fama magna, quam ex mala.* Deo veraci & æternæ Veritati nostram commendemus rem, qui Veritatem tandem in aprium ducet, per lapsum enim Adami

*Cura  
Gangra-  
na à scor-  
buto pro-  
ducta.*

dami hanc amissimus, & nemini, nisi cui ipse Deus revelavit cognita est. In Te speravi, Domine, & non confundat in æternum. Veritas premitur non verò oprimitur. Futuro sæculo omnes principis his Neotericorum imbutos videbis, & post finem Veritas de die in diem exsurgit. Sed sufficient hæc. Nos ad Curam mali nostri porro Nos accingamus. Si ergo hoc in malo observatur macula cœrulea & nigra, statim superius mixtura descripta calidissimè & sœpissimè applicetur & reiteretur, postmodum imponi potest cataplasma jam sœpius descriptum ex ruta rec. absynth. salv. caryophyll. N. M. myrrh. aloë. spirit. vin. aromat. farin. fabar. q. s. pro cataplasma. si durities partium fuerit, addi potest cataplasmati Tinct. gumm. ammon. castor. ass. fœtid. & spirit. cochlear. ol. caryophyllor. vel macis parum addit. Hoc enim in malo semper antiscorbutica admiscenda sunt, ut ex. gr. spirit. cochl. trifol. fibr. nasturt. boccabung. &c. Internè conducunt varia antiscorbutica in Encyclop. Med. nostra Capit. de scorbut. præscripta, imprimis sequens ad 20. & plures gut. in vino Hispanico assumendum.

*R. Elixir. vitæ 3 ii.*

*spirit. trifol. fibr.*

*cochlear. 22. 3 i.*

*Balsm. nervin. n. d. 3 ii.*

*M. D. usui.*

Hujus remedii ope mucus acidus in primis viis latens attenuatur temperaturque, ac ipse sanguis reliquique succi edulcorantur, interponatur decoct. lignor. supra descript. adjectis herbis aromaticis cochlear. beccabung. trifol. fibr. rorismar. bacc. juniper. sal. tart. armoniaci in vin. Gallic. decoct.

Si malum fuerit à combustione vehementiori, tunc cura non multum differt à priori & seq. simile conducet cataplasma hoc in casu:

*R. Herb. scord. sal. v. origan. 22. Mi.*

*Baccar. lauri juniperi 22.*

*3 i*

*Cepar. allii. macis caryophyll.*

*22. 3 3.*

*Myrrh. aloë, balsam. nervin.*

*spirit. matric. spir. cæpar. Gumm. galban. ung.*

*Basilic. sal. tart. sal. armoniaci c. lixivio.*

*F. l. a. catapl.*

*Vel:*

*R. Decoct. cal. viv. 3 3.*

*Spir. vin. camph. 3 3.*

*Balsm. nervin. 3 iii.*

*Mell. ros. 3 ii.*

*M.*

Quod si Gangræna fuerit à morbo vel ictu venenatorum animalium, tunc imprimis conveniunt sudorifera, quia stagnantes succi attenuant & fluidiores reddunt, acidumque corrumpens simul temperant emendantque: in eum finem præscribi potest seq. vel similis mixtura à cochl. uno ad duo singulis horis propinanda, donec sudor sequatur.

*R. Aq. fumar. 3 iv.*

*theriacal. 3 i.*

*Balsm. nervin. 3 3.*

*Spir. sal. C. C. volat. 3 3.*

*Camphor. gr. vi.*

*Diascord. sylv. 3 3.*

*M. S. Mixtura.*

Et assumat æger decoct. lignor. superius descriptum, vel dentur Theriacalia, Diascord. bezoartica, aliaque quæ in febribus malignis ac peste usualia sunt, omnia enim ea, & hic juvamen præstant. Calidissimè externè applicetur parti affectæ cataplasma superius descriptum ex herb. rutæ, scord. cum aloë, myrrh. camph. theriac. ol. n. m. &c. cum urin. & vin. Gall. f. cataplasma. Hic etiam proderit ipsa theriaca vel Diascord. in spiritu matricali dissolutum & tepidè applicatum: spir. vin. camph. theriacal. aq. cal. viv. &c. & hic in usum vocanda sunt.

Si Gangræna natales suos accepit à contusione quadam vehementiori, hinc cura non differt ab alia, uti & illa quæ fit à for-



ti ligatura, quæ statim solvenda, sed tamen cum hac cautela, ut tantum fiat laxior ne uno impetu ruant sanguis & succi in partem affectam, & ipsam nimis extendant, sed relaxetur ligatura sensim ac sensim, dein cataplasmata aromatica, & reliqua spirituosæ sæpius jam dicta imponantur: pulvis quoque ex cortice quercus ( gorbulo ) coquatur cum vino, & imponatur calide. Emplastra hic ut in aliis speciebus Gangrænæ haud conveniunt, quia poros magis obstruunt, & medicamenta calide apponi semper debent, si nimia adfuevit putredo, tunc pulveres exsiccantes ex aloe, myrrha, C. C. inspergi possunt. Si verò Gangrænæ fuerit oborta in fractura tibiz aut brachii, tunc prius Gangrænæ obviam eundum est, quam fracturæ, hinc conducent cataplasma ex spiritu vin. camphor. & aqu. calc. viv.

CHIR.  
Sphaceli.

De cura Sphaceli jam solliciti sumus, sed quorsum hæc, dicat aliquis? Sphacelus siquidem est morbus incurabilis, & pars quam occupavit, jam reddita est mortua, & ad primum suum elementum redacta, neque unquam in vitam restitui poterit, Deus T. O. M. solus hæc efficere potest, hinc ergo tantum eò annitendo est, ut pars corrupta eschara, & emortua bene à sana separetur, ne pars sincera trahatur; si ergo Gangrænæ à neglectis optimis, & generosis remediis migraverit in Sphacelum, isque plane perfectus fuerit, fortiori vi tractandus est, & quia, quamcunque etiam partem invaserit, brevi hominem trucidat, ultimum remedium ad manus sumendum est, parsque emortua citò, tutò tamen rescenda: optandum esset, quod nunquam in usum esset trahenda operatio hæc, sed persuasus sum quod mille ac mille homines ob defectum generosorum medicorum superius recensitorum neglecti talem

torturam pati coguntur, superius enim recensitis remediis certo certius avertes hoc malum, in casu verò ubi nimis sero vocaris ad patientem, vel si à causa nimis violenta tere omnes dilacerati fuerint canales, ut succis omnis transitus denegatus sit, ad extirpationem transeundum est. Consultius enim esse cum Celso existimamus anceps auxilium experiri in re gravi, quam nullum. Unicum enim servandi corporis remedium restat, membrum videlicet emortuum & corruptum à sano rescindere ac extirpare. Crudelum siquidem Medicum necessitas facit, nam crudele malum, crudeli remedio expugnandum. Nihil interest autem tutum præsidium sit quod est unicum; satius est anceps remedium experiri, quam nullum: melior est dubia spes, quam desperata salus: satius est motum alicujus partis perire, quam totum hominem: nec illa dura videtur curatio, cujus est salutaris effectus. Quamvis verò Auctores circa modos amputationis inter se valde discrepent, atque in iis enarrandis prolixi esse possemus, malumus tamen ut in omnibus sic & hic brevitati studere, & rem paucis tradere. Commodior modus nobis videtur esse sequens, quem feliciter cessisse sæpe vidimus, scilicet antequam incisio fiat, implorato ante omnia Divino auxilio, patiens volatilibus & spirituosius corroborandus est, quæ vulgò cordialia vocantur, quæ Me judice cordialia omnia ea sunt medicamenta, quæ morbi causam attingunt; & omnia quæ ad hoc opus requiruntur instrumenta & alia necessaria in promptu sint, ut citò votis suis respondeat institutum. Dein detineatur Patiens vel imponatur in scamnum conveniens, vel & sella imponi potest æger. Chirurgus si ex. gr. pedem sphacelatum altiori scamno firmiter fasciis alligaverit, trahat cutem, musculos & carnem sursum versus

fascias

sanas partes, ut scilicet operatione peracta ossi denudato iterum obduci possint, sicque archissime vinculo valido hæc constringat, partim ad doloris immutationem, partim ad hæmorrhagiam inhibendam. Peracta hæc ligatura in sana parte tres digitos latum, quem modum ego cum Hildano, & aliis longe præfero, qui in parte demortua, sit ob rationes ab *Hildano* aliisque sufficientissime adjectas, carnem usque ad os scalpello aliquantulum falcato circumcirca inscindat, ita ut periostium quoque bene percissum sit, quod postmodum in illo loco cui ferra imponi debet, abradendum, caroque musculorum in parte non amovenda, ne obstaculo sit, hinc ferram huic rei aptatam, qualem *Hildanus* describit, ossi imponat, sicque illud citò tutò, agilique cum dexteritate tribus vel quinque tractibus detruncet. Quod tamen nunquam factum vidi, sed ad minimum decem tractibus hoc factum fuisse notavi, nihil enim interest quot tractibus id fiat, modò æger leniter tractetur, nam per nimium motum plura mala obvenire possunt, ut citius ægi moriantur. Facta sectione & post solutionem vinculi sunt, qui cauterium actuale, aliquando crudele, sed non contemnendum remedium admovent, plii hanc adustionem damnant, & tantum imponunt stuppam canabinam albo ovor. madefactam, & pulvere styptico seu sola calce viva inspersam, vel solo liquore styptico imbutum linteum imponunt, & vesica bubula obtegunt, & dein deligetur, sicque deligatum per duos tresve dies detinea- tur, his ablatis ligaturis sic quæ indurata & adglutinata sunt prius emollitis, eschara ut decidat opera detur, ea delapsa, vel filo vulneris os latis saturis constringendum, vel per emplastr. cutis at- trahenda, fasciis ulcus involven- dum diligenter, ne ac- congluti- nationem impediatur & corruptio- nem ac nigredinem ossi inducat.

atque sic pergendum est usque ad plenariam ægri recuperatam sani- tatem.

Quamvis autem melius esset, si, quod *Thom. Fienus lib. Chirurg. 1. c. 4.* monet partem non semper in fine sanæ proxime apud ægram, sed quandoque remotè ab ea ampu- tare liceret, ex. gr. si Sphacelus sit in pede, etiamsi totum crus sit sanum & posset salvari, tamen prope genu amputaretur, quia præterquam quod non tantus metus sit reliqui miasmatis gangræno- si, cum sape etiam ipsam medul- lam ossium inficit, nihil quoque juvat ægrum ipsum crus longum habere, nulli quippe usui ipsi est, sed magno impedimento: obtem- perandum tamen in hisce ægris & adstantibus esse censemus. In brachio quidem res longe aliter se habet, & ipsius semper tantum relinquendum est quantum possibile, ut, immediatè ferrea manus ei ap- plicari possit. Plura de hujusmo- di amputationis operatione vide apud *Hildanum*, aliosque *Chirurgos celebres*.

Sed hic Asterisco notandum, quod ubi in parte aliqua fuerit Sphacelus, prius caro mortua ex- scindatur, & eò respiciendum, num membrum servari possit, & hoc in casu cauteriis utendum est, ad ambulationem, uti *Chirurgi*

loquuntur, impediendam. Si

verò pes vel manus rescen-

da est, operatio sit

cum ( *Meissel,* )

digitus rescen-

catur cum

forci-

pe,

mit einer Kneip.

Zangen.

(-.-.)

## CAPUT IV.

## De Combustione seu Ambustione.

## S. I.

**V**erum equidem est, infinitas ignem nobis præbere utilitates de tota ferè nostra vita. Imò hoc universum consistit in calore, illoque conservatur, totque insuper utilibus succurrit remediis, ut vix dentur meliora. Ast cum omnia sano perpenduntur sensu, nescimus, an Prometheus debeamus gratias, aut illi culpam attribuamus, cum velut è pyxide *Pandoræ* (sit venia fabulæ:) infinita inde etiam prodierint mala, tot tormenta, tot cruciatus, ac sæpè remedia ipso morbo, ipsaque morte crudeliora, id quod de *Combustione* videre est, ut taceam tot in Macrocosmo effectus satis funestos. Valeant igitur phantastici Persarum ritus. Valeant *Empedocles*, alique *Pythagorei* Vivicomburio immortalitatem acquirentes. Valeat *Agésilas* *Themistoclis* Frater ejusque *Constantia*, *Mardonium* Regis Persarum Satrapen pro Rege interimens atque errantem dextram comburens. Nos neque minimam corporis nostri partem comburendam trademus, sed potius curabimus, quomodo ignis crudelitatem effigere, aut mitigare queamus. Nobis enim hic est sermo de ignis particulis corpori nostro inflictis, quomodo damnum infligat, & quomodo istud curandum sit, quem affectum Medici ac Chirurgi Combustionem, vel Ambustionem, vel Ustionem dicunt, Germanis *cine Verbrennung*.

Combustio.

Eius Descriptio.

Affectus hic est adeo simplex, ut nulla indigeat descriptione, sed cum mala consuetudine receptum sit, dare & in minimis descriptionem & definitionem, in gratiam

vulgi hanc apponere lubet. Combustio est solutio continui in solidis partibus quibuscunque, cum inflammatione, vesiculis excitatis, doloreque à particulis igneis pungentibus pyramidalibus, vel extra applicatis, vel introrsum sumptis, facta.

S. 2. *Subiectum* Combustionis sunt vel partes externæ variis injuriis expositæ, quod toto observamus die; sic non ita pridem totum corpus (quoad externam superficiem,) infantis 3. annorum incidentis in ahenum aqua calidissima refertum ita combustum fuit, ut iterum feliciter curatus fuerit. Omnes ergò nervi tendines, membranæ, fibræ, arteriæ, venæ, ligamenta, caro, ossa, omnesque canaliculi comburi possunt. Sic quoque internæ partes ab hac combustione haud immunes sunt, quando scilicet particule igneæ altius & profundius in viscera tendant, faciliè ea comburere ac crispare possunt, quod etiam fieri potest ab aqua forti, spir. vini rectificatissimo, aliisque causticis acidis stygiisquæ aquis ignem seu igneas acerrimasque particulas contingitibus. Totum ergò corpus potest, ceu dictum, hic affici, ut & omnes Tubuli; quo enim partes subtiliores, eò faciliores comburuntur. Nullam partem in corpore nostro offendere potui, quæ minus Combustioni obnoxia est, quàm lingua, quia cera sigillata liquefacta & cum flamma ipsi imposita ei nullum affert damnum.

Partes affe-  
ctæ.

*Differentiam* Ambustionis quod attinet, differt Ambustio ratione partium internarum vel externarum, & ratione causarum, est enim vel ab igne, fulmine, ferro candente, titione, aqua fervente, vel spirit. vini, aqua forti, oleo fervente, vel pulvere pyrio. Ratione symptomatum, alia graviora, alia leviora inducit: ratione magnitudinis, alia enim penetrat cutim, alia musculos, alia nervos, arterias, venas & ipsa ossa: alia.

Differen-  
tia.

alia Ambustio pustulas excitat, alia non, alia cutim exsiccat, elevatque, alia non idem præstat.

*Diagnosi.* §. 3. Variant *Signa Combustionis* pro ratione causarum, symptomatum ac graduum Combustionis. Primi gradus signa sunt cutis rubedo, dolor acerbis punitivus, locus quoque combustus aliquomodo intumescit: imò à relatione agri nobis facile innotesceat, & non opus est plurimis signis, sed iis utimur, si nobis de profunditate Combustionis non constet; notitia ergò causæ nobis hic plura manifestabit. Si ignita corpora fortasse non satis propè admota, aut non satis fervida, aut consistentiæ levioris fuerint, tunc non profunda potest produci Combustio, quam excitant ut plurimum aqua fervens, pulvis pyrius accensus, scintilla ignis, linum, stipula, stramenque accensa.

Secundi gradus signa sunt atrociora, si nempe materia corpus tangat diutius, fatisque crassa ac tenax sit, ut oleum, vernix, ferrum, aliaque resinosa, unde etiam statim pars inflatur, rubescit, dolet, & in momento pustulæ elevantur, ægerque conquecitur de nimia cutis tensione, quia hæc corpora ob particulas ramosiores ignem diutius includunt, atque servant, pluresque abscindunt tubulos, unde etiam gravior oboritur Combustio.

Tertii gradus signa dicuntur, si cuti res ignita adhaereat, statimque pustulæ producantur, subiecta cutis nigrescit, sensusque nullus amplius addit, cuncta existunt exsiccata ac dura, quæ si decidant ulcus profundum aut putridum constituunt, imò hanc fortem Combustionem ut plurimum Gangræ ac Sphacelus sequi solent, ceu sæpius id vidimus, ubi scilicet maxima adfuerit confusio: hæc intensa Combustio fit à metallis fuis, chalybe, auro, stagno, aliisque vehementioribus igneas particulas diutius servantibus, & facile om-

nes tubulos usque ad os concretantibus, quia in his corporibus non duntaxat ignis, sed & particulæ metalli angulares & cuspidatæ continentur, quæ valde tubulos dirumpere ac discindere apta nata sunt.

Tumor in Combustione ut plurimum accidens, non, ut Authores communiter statuunt, à majore humorum affluxu propter attractionem facto oboritur, attractionem enim hanc falsam esse, lippis ac tonsoribus notum est, sed hoc in casu fibræ potius ac viæ obstructæ sunt, hinc succi non ritè per eas circulari possunt, sed semel allati, ibi stagnant, & nisi per canales subterraneos ressuant flumina, facile agetur mare; pari modo etiam in Microcosmo accidit, ubi succi affluentes reflueri nequeunt, necessariò stagnare ac tumorem excitare debent.

§. 4. Ad *Causarum* investigationem & enodationem ut me accingam, ordinis ratio postulat, ea propter ut profundius in Causarum Combustionis cognitionem perveniamus, aliorum prius de iisdem percipiamus opiniones, & quidem omnium primò *Galenicorum*, qui in Ambustione accusant ignem, & quæcunque ignita, inprimis globos Scleropetorum, unde contusio & laceratio musculorum, venarum, arteriarum, &c. oritur, vel etiam à fulmine hanc Ambustionem fieri posse non dubitant, vel ab aqua fervente, vel oleo aliaque materia utrente.

§. 5. *Paracelsus* notat, quæ ratione suas in corpus imprimat proprietates *Adufusio*, quocunque modo fiat: utpote casum *Adufusionis*, vel accidens calorem non existere, sed subcilium spirituum asperitas vel acuitas potius secundum eum corpus destruit. Sal iterum accensum ignescit protinus, & omne, quod ab igne hoc damnatum sit, & nitrum efficit, & non essentia complexio. Sulphur etiam accensum, aliam substantiam ad se recipit, est nihilominus Sulphur hoc ipsum, quod

*Ambustionis causa secundum Galenicos*

*Paracelsus.*

quod autem absument, istud est in eo, per accensionem tamen, excitatum. Non aliter de *Aduſtionibus* sentit Author. Quum ignis corpus aliquod arripit aduritque, non ad mentem *ipſius* externus ignis hoc efficit, quod damnum existit: Verum accenditur corpus, & quicquid inde ſequitur damni, ſolum ex eo procedere ait, quod accenſum eſt, ac in accensionem incidit, ut lignum carbo per ſeipſum fit. Nam ſulphur corporis, quamvis ipſum exhibeat flammam, ob fixam ejus conditionem, accenditur uriturque tamen, eſtque juxta ipſum, fixus ignis, & eo per externum adducitur, cui tantisper tantumque reſiſtit, quantisper & quantum adſuerit ignis.

*Aduſtionis* differentiam duplicem ſtatuit Author, unam per flammam, quæ molitur conſumptionem, alteram, quæ fit bullientibus. Flamma ſit ad mentem ipſius, ſive lignorum, pulverum, reſinarum aut pinguedinum: Bullitionibus, ut calidorum oleorum, aquarum bullientium, &c. Præterea reperiri aliam naturam habentem dicit, ut ea, quæ ſit liquefactis metallis, & ſimilibus.

Adhæc animadvertendum vult, utrum ex ſubſtantia quiſquam adhæreat, an non; ut ex pulvere, quod ſulphur, & ſal nitrum poſt ſe vel ſui conſumptionem accenſione factam, reliquam adhuc pinguedinem relinquunt. Similiter oleum peculiare ſuum reſiduum, aliud metallum, aliud reſina, aliud aqua, quodque proprium habet, cognitu neceſſarium; non propter ſanationem, ſed extremos dolores, quos inferunt hujusmodi reliquæ. Salis niri, ſulphuris & reſinarum ſpirituum acuitatem peculiare dolores edere ait, nam ibidem eſſe ſpiritum ſalis arguit. Ex metallis etiam alios ac ſingulares deducit dolores, quod eo loco ſit Mercurius. Ex aliis adurentibus adhuc alios, quæ ſulphur ſecundum ipſum,

ibidem eſt reſolutum. Hujusmodi ſulphuris ſeparationes in membro variare dolores ſtatuit. Aduſtionum dolores accidentia eſſe dicit, originem ex igne ducunt, poſtmodum ex aere quidem exteriore mineralem conditionem acquirentia, Notat inſuper, poſt veneni conceptionem iſtud per meatus & venas in primum ſuum centrum permeare, quo mortem inducere ait.

§. 6. *Helmontius* Ambuſtionis actum in vivis fieri ait efficienter ab ipſa vita, occasionaliter ab igne. Quod eſt dicere, vitam eſſe agens proprium ſenſationis in ſenſuivis: & vitam eſſe ejusmodi cauſam, quæ inſuper vim habeat Ambuſtiones faciendi in vivis, & in materia Medica, imò etiam reſiſtendi, vel non. Quamobrem reperit vitam primarium efficiens, ac immediatum ſenſus, ac doloris. Siquidem vis ignis recepta ac introducta in cadaver, ſecundum ipſum, non eſt ſenſibilis; imò nec propriè ambuſtiua, qualis in vivis: ſed potiùs aſſatiua vel toſtiua. In vivis namque liquor carnis, per indignationem animæ ſenſitiua, celerrimè in acre liquamen convertitur, ac ſubſtancialiter tranſmutatur: qui in mortuis non eſt vitali tranſmutationi obnoxius. Adeoque inter fibras bulliendo & frixando, carnes torret & aſſat. Caro enim mortua, ad mentem ipſius, patitur per gradus, quos alia corpora non ſenſitiva, univoco modo patiuntur ab igne. Verum in vivis etiam aqua bulliens ſtatim veſicas parat: pars ſolida dein velociter contrahitur & crematur. Idcirco iſtam Ambuſtionis actionem in vivis ac ſenſuivis fieri ait efficienter ab ipſa vita: ab igne autem effectivè per modum mediæ activi, occasionalis & externi. Vita nimirum ipſa ſentiens ignis rigorem, acuit ſuum liquorem, tranſmutatque in veſicas ac dein in eſcharoticum liquamen. Et quantum ſcilicet ab igne corripitur, tantundem poſtmodum per diſpoſitionem

*Helmontium.*

tionem relicta corrumpitur, quia mortuum est.

Villifus.

§. 7. Si à Villifio rescire voluerimus, quomodo fiat *Combustio*, ipsum *Causam* illius statuentem audiemus in particulis igneis summa subtilitate donatis, & rigidis atque acutis existentibus & introitu suo in quandam corporis partem continuum illius solvenibus. Tales enim particule turmatim, ac vehementi isto, quo aguntur impetu cutim subeuntes, glandulasque miliari impetentes, & fibrillas nerveas illas ambientes, aut in earum substantia distributas pungentes ac violentius vellicantes, humorem lymphicum à glandulis fibrarum conuulsarum beneficio exprimunt, & versus superficiem compellunt, qui ibidem aggestus cuticulam intumorem elevat, vesiculæque in ea exciatur. Si verò distæ particule majori vi polleant, copiosioresque partem aliquam subingrediantur, abundantius serum ex glandulis cutaneis eliciunt, cutisque fibris infixæ hærentes, illam in rugas extollunt, & liquoris transitum ad cuticulam usque inhibent, eumque in cutis poris remorari cogunt. At si particule tum mole, tum copia & motu adhuc potentiores partem quandam subintrent, fibras ejus ipsarum impetui sustinendo nequaquam pares dissecant & comminuunt, & crustam in illa exciunt, lympham in glandulis cunctis residente spissiore facta, post evaporatas ipsius aquosiores tenuioresque particulas, fibrarum ab igneis atomis dissectarum fragmenta obvolvente.

Sylvium.

§. 8. Sylvius calore ignem se nostris manifestare ait sensibus, adeo ut illo in sensu observato judicet Anima ignem adeste: ut autem ab eodem igne rarefiat oleum, Aqua, & quodvis aliud, præter calorem aliud quidpiam requiri in igne statuit, cujus vi absolvere possit rarefactionem. Cum enim secundum eum rarefactio sit partium densarum, densarumque distractio ab invicem, ac diductio quasi à Centro versus circumferentiam, uti-

que, ut fiat illa distractio, diductio, expansioque partium ab invicem, opus esse inquit, ut rarefaciens se insinuet inter rarefaciendi partes proximæ ac densæ applicatas, quo se ipsis interponendo illas queat diducere ac quasi removere ab invicem, unde concludit Author, partes ignis esse *Tetraedras*, hoc est Pyramides, sed aquilateras ex triangulis constantes, aut assurgentes. Docet ergo ille, ignem, ut, rarefaciat, non posse considerari tanquam calidum, h. e. Calorem producendo in sensu, sed tanquam Tetraedris constantem. Ex his facile Authoris opinionem de Ambustis hæriolari possumus, quod ignis cutem attingens suis particulis Tetraedris, in quibus solis est acumen, non item in Cubis, illam laceret aduratque, hinc vesicæ ac aliquando escara inducuntur.

§. 9. *Cartesiani* à re quavis adurent *Combustionem* fieri posse statuunt, si partibus corporis nostri propius admoveantur, qualia sunt ferrum, plumbum, stannum, titio, carbo, oleum, adeps, pulvis pyrius, calx viva aqua modò dissoluta, aqua fervens & ejusmodi plura. Læsionem verò istam hac ratione peragi credunt quatenus particule pruni elementi subtilissimæ, explosis globulis æthereis in rebus istis magna copia collectæ celerrimo agitantur motu, & corpora vicina crassiora & ramosa dissolvunt, destrunt & in pabulum suum convertunt, attingentes porro per approximationem corporis istius particulis hisce pleni locum quandam, corporis nostri impetu quodam poros epidermidis & aliquando cutaneos ingrediuntur, & fibras abrumpunt, unde dolor maximus oritur, fibre verò ita disruptæ & in cincinnos resiliences, vicinos musculorum tubulos obstruunt, quapropter humores per tubulos illos ordinariò ferri, soliti propter obstru-

Cartesiani  
not.

tiones



ationes illas circulationem suam illac perficere nequeunt, sed stagnantes & à sequentibus humoribus pressi tumorem in parte illa vel vesiculam producunt. Propius verò adhuc ad cutem ipsam accedentes contextum ejus gladiolis suis acutè scindentibus, quorum myriades in igne existere dicunt, & motu vehementissimo inter se agitatæ, diffringere, dissiccare & contundere asserunt, quæ textura undique confusa & dissecta Escharam exhibeat. Ad musculos penetrantes gladiolos istos vehementer agitatæ filamenta carnum transversim sita nervosa dirumpere addunt, ardoremque in parte ambusta remanere, quamvis res adiens jamdiu fuerit sublata, quoniam materia primi elementi cum impetu per poros ruens, eosdem sibi paraverit figuræ suæ convenientes, & quidem is in partibus, in quibus tales pori ordinari non erant, hinc cum per illos poros nil nisi materia primi elementi possit fluere, ardor in parte illa maneat, quamdiu pori in tali figura maneant. Nonnulli ignem fluidissimam dicunt esse congeriem tubulorum sphaericorum, è ramosis, maxime per materiam subtilem dilatatis & in gyros infinitos reductis, constare, è quibus sphaerulis tenuissimis circumgyrantibus salium puncta prominentia ferrulas & rotulas acuminate efficiant, superficie undiquaque instar limæ rotundæ acuta & scindenre instructa. Sphaerula itaque una de loco pulsa & extricata eminentiis suis asperis acutis alias etiam de loco pellat necesse esse pronunciant, unde omnes sensum per mutuum contactum & levem intricacionem ut rotulæ ferratæ in horologiis moveri debeant, quæ de causa & ignis corporum divortia acceleret, & sese interstitiis & meatibus à se jam excavatis in transiit suo celeriter mo insinuet & coarctet, sicque partium ejus situm commutet. Fibra igitur partium corporis celerissimo huc ignis motui obisten-

tes dirumpuntur, quæ verò tenuiores sunt; ut illi cedant, seque flecti patiantur, adeò non læduntur, nec diffinguntur, & quomagis variis particularum subtilissimarum ignitatum in se invicem motus ab occurrente quodam corpore rigidiore impeditur, eo impetuosius in fibras ruunt, easque dirumpunt. Ex diversâ quoque corporum ramosorum figura, in quorum poris materia primi elementi coarctata detinetur, diversâ illa emergere credunt rerum ignitarum effecta, & quod aliæ aliis fortius adurant.

§. 10. Præmissis aliorum de *Ambustione* sententiis, nunc & nostram apponamus *crisis*. Nulli dubitamus istam solutionem continui fieri à particulis igneis pyramidalibus pungentibus, scindentibus, duris vehementer motis, sine igne enim seu igneis his particulis non potest fieri combustio, & si consideramus flammam ignis, quæ est corpus densissimum ac simplicissimum omnium aliorum corporum, h. e. in omnibus suis partibus est ignis, quod è nullo alio corpore dici potest; Aer enim non est purus sed multis aliis conspurcatus particulis, item aqua, terra, acre aliisque crassioribus particulis sunt repleta, ex quo patet, ignem consistere in certo particularum densissimarum ac simplicissimarum motu, uti ejus probat effectus; videmus enim scintillas in flamma volantes sine intermissione moveri. Omnis enim ignis effectus dependet primario à motu, ejusque figura. A motu est, dum flamma collecta solidas partes à re combustibili continuo absunt, adversus externas aeris injurias, ut conservetur, necessarii aliæ debent succedere in earum locum, atque inde est, quod ignis indigeat pabulo, materia nimirum ad urendum apta, hoc si fieri nequit, talisque materia deest, ab acre exteriori corrumpitur, excurrit, evanescit atque transiit in auras. Idè videmus ex parva scintilla oriri posse maximum irac-

*Nostra sententia de causis Ambustionis.*

condendum, si nempe ignis congregatus in exigua quantitate conveniens invenit pabulum, illud consumit crescendo, dum partem in suam transmutat substantiam, partem etiam materiam tertii & secundi elementii propellit, atque à se invicem disjungit, ut globuli ætherei cò melius congregentur atque in ignem convertantur, teste *Magno Cartesio p. 4. Princip. Phil. p. n. 177.* A figura verò est, dum pro vario motu variè pellitur, figura sua pyramidalis partes occurrentes diversas incidit, attenuat, liquefacit, condensat, dissipat, utit, ebullitionem efficit, quòd autem ipsius figura sit pyramidalis atque acuta, probant ejus effectus indissolutione corporum, quippe si molestus motus in nervis excitatur & à mente perceptus fuerit. Sic ignis urit, cum partes corporis unitate disjungit figura sua pyramidalis atque celerrimo particularum motu nonnullas secum auferit, atque ita corpus reddit siccum, in qua dissectione tubulorum & succorum intus contentorum ablatione consistit *Vllo*. Imò si intimius ignis materiam & quidem ad leges chymicas consideremus, certum est, illum constare ex spiritu, oleo, sale & acido, ignis verò motum fortiolem quoad particulas suas ope subtilis cœlestis ætheris impellit. Ex hisce præmissis facili Marte Symptomatum in Ambustione obvenientium rationem reddere possumus; *Dolor* enim in Combustione oritur, cum particula ignis pungentes scindentesque fibras quastangunt, non tantum contundant, sed & discindant incidantque, unde molestus hic motus menti repræsentatus excitatur. Si verò omnes fibræ simul discissæ fuerint, nullus apparebit dolor, sed is vehementior erit, quando fibræ duntaxat inciduntur & premuntur. Sic ab initio Combustionis dolor statim percipitur, si sc. fibrillæ ab igneis particulis nimis commoveantur, & succis nimis effervescentius nimis premantur.

Vesiculæ in Combustione produci oboriri solent, quando minutissimi vasorum lymphaticorum ramuli per ignis pressionem rumpuntur, vel per falsas acresque particulas ab igne commotas vasculæ cutanea eroduntur. Omnia enim vasa ab igne aliquo modo constringuntur, hinc lymphæ à tergo accedens stagnare cogitur, quæ tandem nimia sua extensione vasa perumpit sicque has vesiculas producit. Vel etiam oriri possunt ab impedita transpiratione, quæ facili in Combustione oritur, ob cuticulam enim constrictam succi, qui ope glandularum cutanearum discerni debent, necessariò stagnare coguntur, qui tandem acriores facti succi vasa cutanea perumpunt, vesiculasque attollunt. Materia, quæ his in vesiculis continetur, dolorem producit, quia ex falsis, acidis, corrosivis aliis innumeris malè figuratis constat particulis, hinc ab ordinaria sua circulatione impeditæ facili fibrillas concutere valent, à qua concussionē dolor iste oboriri solet, hinc succi ad fermentationem tendunt, quæ particula fermentantes cum tempore *exulcerationem* in parte combusta efficiunt, prout id toto observamus die.

Considerato ignis actualis effectus, pergimus ad potentialem hoc nomine insignitum, ubi invenimus aquam fortem, cujus salia particulis suis aculeatis atque valde angularibus feriunt corporis nostri partes molliores, subciliores, easque incidunt, findunt, scinduntque pari ferè modo, ac ipse ignis qui ex ipsissimis constat particulis, dumque sanguis alique succi ad has partes lasas cum spiritibus perveniunt, legitimo modo circulari nequeunt, sed potius turbantur, ex qua varia commotione ac turbatione inflammantur partes, unde sæpè gangrenam inferunt, usque tandem propter nimiam exaltationem spiritus resolvuntur, emoriuntur atque abeunt in vappam, unde Sphæctelus actandem

dem mors sequitur, nisi in tempore ei occurramus remediis congruis. Non mirum igitur existimamus, quod has partes molliores spiritus acidi ita afficiant, cum Chymicorum ac Auritaborum laboratoria ac operationes abunde demonstrent, istos variè præparatos spiritus acidos & alcalicos solidissima dissolvere metalla, aurum, argentum, plumbum, &c. quæ solutiones probant, harum aquarum stygiarum vim unice dependere ab ipsorum salium particulis rigidis.

Pertinet huc Calx viva, quæ satis fortiter etiam comburit, uti observavit *Borellus C. 10. Obs. 30.* si ei aqua adspersa, quia ita ejus pori adaptati sunt, ut partes aquæ soli primo elemento septas recipiant, adeo ut globulis æthereis expulsi, sola remaneat materia subtilis, illaque dominetur, unde effervescenzia atque adustio: confer *des Cartes. Princip. Philip. P. 4. p. 174.* quam effervescenziam fieri videmus, & quidem haud dissimilem in spir. vitrioli atque oleo tartar. inter se mixtis.

Inter Causa Combustionis referimus etiam fulmen, quod sæpè combustionem infert, imprimis si est cum lapide tonitruali, cum vulnere, interdum verò sine vulnere fit Combustio, imò nos vidimus aureos annulos in digito fuisse à fulmine fusos absque læsione cutis, alios verò fuisse combustos. Si igitur particule nitrosæ pravealeant, non fit accensio sed duntaxat Combustio, quia nitrum impedit, quo minus possit concipere flammam, & plerumque fit cum sonitu atque fragore, secus verò ubi sulphur prædominium habet. Huc & pertinet Combustio à Sclopetis facta, hinc plures Medici ac Chirurgi nescio qualem vim & efficaciam vel pulveri pyrio vel glandibus adscribunt, dicuntque, quod Combustio prius debeat extinguì, alias malum esset incurabile, ajunt enim, quod incendat partes adjacentes, carnem nigrescat & ad corruptionem di-

sponat; sed huic sententiæ jam contrarius fuit *Paræus l. X. Chir. apol. 1. & 2.* ubi ait, glandestantum calorem non posse concipere, ut causticorum obeant munus; si enim incandescerent, colliquescerent formamque amitterent, quod falsum, quia si glandem ceram intrudamus in Sclopetum, non liquecet in explosione, quod tamen deberet fieri; ut taceam exiguum illam moram in pulvere pyrio accenso, imò neque charta, neque cera sit transiit, neque vestimenta, quæ prius occurrunt, liquefunt, aut comburuntur, sic etiam plumbum liquefactum aut trivittitio superfusum teste experientia non comburit. Combustio ergo hæc neque à globulo, qui frigidus est, atque me judice id, quod non habet, dare nequit, nec à pulvere pyrio, quia uti citò fit ita citò perit, neque etiam à motu, qui continuus esse deberet, dum urere possit. Sunt quoque, qui pulverem pyrium dicunt venenatum esse, quod cum *Paræo* citato loco negamus, cum nihil eorum, quæ ipsius compositionem ingrediuntur venenatum existat, ac sulphur, ac nitrum, ac carbones agris nostris exhibeamus. Symptomata enim maligna his Vulneribus supervenientia potius dependent à conqussatione globulorum atque tubulorum discessione, & neutiquam à pulveris pyrii venenata qualitate, dum ipsæ fibræ à violento hoc motu globuli, imò omnes serè tubuli & canaliculi ad nutritionem partis destinati infringuntur, discinduntur ac in cincinnationes abeunt nervuli, ut aliter efformentur, ita ut illa necessario deficiat, unde si sanguis, lymphæ & spiritus ad partes illas perveniant, viam non inveniunt inter se effervescunt, abeuntque in Vappam ac putrefactionem, unde Gangræna, Sphacellus ac nigredo labiorum Vulneris, de quibus *Cælius sequenti de Vulneribus* fusius dicemus.

Inter causas remotiores & ferrum candens, aliaque metalla ignita re-

ferimus, quæ vehementissimè urunt, superant tamen hec omnia Aurum, quia partes ejus artz inter se complicantur, ignemque ob hoc diu servant foveantque; porique adeo sunt exigui, ut soli materiæ primi elementi dent ingressum. Excandescit autem ferrum, dum parte ignis poros ferri subeunt, atque ita ejus substantiam augent, quod manifestè videmus ex vulnere illato, quod semper majus est, ac ipsum ferrum. Præterea id percipimus, si baculum ligneum ejusdem magnitudinis efformemus, atque adaptemus ipsi ferro jam ignito, videbimus esse dissimilem, idque quia particulæ ignis sunt in perpetuo motu, quæ latera ferri extendunt. Urit autem vehementissimè ferrum, quia ejus partes satis sunt rigide, angulosæ, ac proinde si accedant ipsius ignis pyramidales, fortiter impingunt in subiectam partem, atque sic continuum solvunt, comite dolore gravissimo pungitivo, Inflammatione aliisque Symptomatibus gravioribus.

Similiter fit combustio ab aqua fervente, alio tamen modo urit, effervesceat ac commoveatur dum partes igneæ subeunt poros aquæ, ejusque partes commovendo à se invicem divellunt, ut majus acquirant spacium, quia ab ingressa materia subtili augentur, quod videmus in cacabo aqua ebulliente semipieno. Omnis autem urendi vis hujus aquæ dependet, ceu dictum, ab igne, cum ob particularum flexibilitatem aqua fere nil contribuat, secus ac in ferro, ubi ejus particularum rigiditas augeat solutionem. Oleum eodem modo incalescit, sed cum habeat particulas ramosas variis hamis unisque inter se repentes, materiam subtilem intropulsam tenaciter retinet, atque ita vehementius ruit, quam aqua, imò ob hoc ipsum difficulter etiam empyreuma potest evocari; id quod vel cotidie videmus in cibis mensis appositis, ubi alii citius, alii diutius calorem perdunt.

Huc etiam tanquam ignis referri potest novum Anglorum inventum, Phosphorus dictus, quia levi frictione in apertam quasi ruit flammam, saponi Veneto duro est similis, aqua fontana frigida debet conservari, ne in auras abeat, calori expositus statim liquefeit, in frigore vero iterum coagulatur. Sunt, qui hoc Inventum vel adscribunt *Helmontio*, vel celeberrimo *Roberto Boyleo*, nonnulli vero attribuant hoc arcanum Medico cui-dam *Hamburgensi*: sunt ex *Anglis*, qui id tribuunt celeberrimo *Dn. Slare Anglo*, amico nostro singulari: alii quæ clarissimum *Domini VVeidenfelsium* pro autore agnoscunt. Omnes ferè fateri debent, Phosphorum hunc ex urina fieri; modi plures describuntur, uti apparet ex tractatu Germanico *Noctiluæ* nomine insignito. Sequentem verò Nobilissimum *Helmontius Junior Amico nostro Dn. Kutsnero* communicavit.

*Urin. fatid. coq. ad consist. mell. add. aren. part. iiii.*

*Destill. per retortam, recipiens sit magnum & aqua repletum, da ignem fortem. Alii addunt bolum.*

Phosphorum in forma liquida in Laboratorio nostro *Seren. Principis* ex urina laboravimus, in Anglorum sicco Phosphoro jam sumus occupati, ex hoc Phosphoro facile ignis indolem explicare licet, sed hæc ad alia nobis reservamus; nunc verò ad *Combustionis* Prognosin pergendum est.

*S. II. Cum Signa Prognostica Medico magnam famam, si rectè prædixerit, (quod tamen non semper, quamvis expertissimo, fieri potest,) ingens verò vituperium, si secus fecerit, sibi conciliare potest, merito ergo Medicus ac Chirurgus in eo totus esse debet, ut hac in parte quantum per artem licet, studium suum collocet. Affectus nostri Prognosis desumitur à magnitudine causæ, corpore laeso, ac symptomatibus concomitantibus. Sic levis combustio facile sanatur,*

*Prognosis.*

& sæpe nulla remanente cicatrice ; contrà verò magna , & quæ nimis profundè membranas ac tendines combusserit , est periculossissima , quæ aliquando lethalis à nobis aliisque observata est . Vix sanantur combustiones absque relictis cicatricibus , quia cutis & carnis fibrillæ planè aliter efformantur , ac erant ante solutam unitatem . Periculosa est combustio partium nobilium , ut oculorum , intestinorum , aliarumque partium maximè sensibilibus , partim ob earum constrictionem , ubi vasa per se satis exilia planè comprimuntur vel abscinduntur , vel comburuntur , ita ut nutritio in parte fieri nequeat , inde sequitur atrophia , sæpe si majora attingat vasa , Gangræna ac Sphacelus oboriri solent . Corpori cacoehymico si accidat combustio , faciliè in ulcus sædum ac malignum abit , ceu id non ita pridem in virginem scorbutica observavimus , & hoc accidit sæpe ob lymphæ celerimè circulantis ( lymphæ enim intra unius horæ spatium vigesies per vasa sua circulat , ) acrimoniam ac corruptionem , sæpe etiam lymphæ stagnat & continuo affluxu partes vellicat , nutritionemque plane tollit vel inutilem reddit . Si combustio nervos vellicet , supervenit faciliè convulsio , quæ lethalis , imprimis si fuerit universalis , teste Hipp. S. V. v. aph. 2.

Periculossissima omnium habetur illa combustio , quæ à fulmine oborta est , quia secundum Paracelsum lib. 1. Chirurg. Magn. tr. 5. Cap. IX. non extingui potest , ita ut omnia animalia solo contactu occidere , ac hominem vix evadere posse , testetur Plinius lib. 2. c. 540. Histor. Natur. Hinc cæci Ventes fulmina adorant . Sed hæc aliter se habere docet quotidiana experientia , sic novimus plures ex sexu sequiore in arce Schaumburgensi ad Lhanam fulmine tactas , quæ omnes à me , DEO benedicente , felicissimè curatæ fuere . Si verò fulmen fuerit intensum , &

quasi omnes combusserit tubulos , & sanguinem cum succis in acidam vappam una vice redegerit , ut videre est in cerevisia tempore fulminis , tunc existit lethale , & omnem nobis admit *invisibilem* spem , uti vult *Barbani Chirurg. pag. 2. l. 3. cap. 4.* & hoc non provenit à vi pestifera , quæ vulgo dicitur inesse fulmini , nec à facultate supernaturali , uti dicunt , sed potius , quia sulphur tenaciter ob particulas tamosas partibus inheret , sicque si causa difficulter tolli potest , multo magis caufatum . Multum quoque hoc in passu efficit metus atque consternatio , ubi spiritus animales satis turbati obruuntur , ac pessundantur . Eventus ergo curationis combustionis ambiguus est , ob diversitatem materiæ urentis vel ignis , diutius quoque tempus requiritur ad hanc vel illam curandam . Periculosa quoque est ista combustio , quæ est ab aqua salsa , sapone , alumine , aut vitriolo maritata , quæ facile possunt inducere pessima symptomata .

In varietatibus Combustionum id solum est observandum , inquit *Paracelsus præf. de Vulneribus pag. 568.* ut si combustio spiritum habeat penetrativum & vel cephalicam , vel cordis venam tetigerit , & combusserit , tunc illa penetratio tendit ad mortem . *Pergit* , olea , aque , ligna &c. quando calida sunt , nihil habent penetrativi , sed calor ex sale nitri proveniens affert mortem , nam habet , ut ille ait , vini penetrativam . Sed ad magis utilia . Certum est , quod combustio sæpe diu duret , & nullum sequatur pus , quod etiam celeberrimus Dn. *Meyer* notavit , qui vidit mulierculam 70. circiter annorum , quæ seniebria in ignem prolapsa fuerat , ac dimidiam capitis partem ita combusserat , ut quidquid etiam ageretur , nullum pus sequeretur , nec ullæ etiam vesiculæ excitatæ fuerant . Sed temporis progressu cutis cum panniculo carnofo . & pericranio in  
unam

unam escharam coacta, separabatur, nec hoc solum, sed dimidia fermè cranii portio ingentem ac valdè crassam laminam de se mittebat, qua ablata ulcus tandem licet tardissimè coaluit, subinde tamen parvis ulcusculis hic atque illic redeuntibus.

In Milite Castellano idem observavimus, qui brachium à pulvere pyriti ita combusserat, ut nullum sequeretur pus sed siccum manserat, tandem accessit Sphacelus & mortuus est.

*Diat.* §. 12. Aggrediemur jam ad ipsam *Curam Dieteticam* in Ambustione vehementiori observandam.

In Combustione ergo omnis vitetur aer, imprimis frigidior, quem incautè admissum mala varia posse inducere demonstrat *Fabrit. c. 4. Obs. 93.* quare etiam vulnera ob hunc intempestivè admissum caecotheca facta fuisse, testantur monumenta Medicorum. Aer ergo omnimodo arceatur à combustione & æger in conclavi sit temperato. Victus sit laudabilis, qui optimum nutrimentum lacteum præbet, ut eò laciior possit succedere sarcosis, seu appositio succi nutriti. Somnus ac vigilie sint ad ordinarias leges institutæ, vigilie si adint nimis à spiritibus maximè mobilibus, somnus provocandus. Corpus quiescat, motus nimis exulet, donec partes fibrosæ fuerint consolidatæ. Moderata sint animi pathemata, exulent ira, mœror &c. reliqua vide in *Diat. Vulnerum.*

§. 13. Cura juxta *Galenicor* ita instituitur in *Combustione*. Ambusta moderatè detergentibus medicamentis curare satagunt, citra hoc ut manifestè calefaciant aut frigefaciant. Proinde terram Chiam, & Ctimo-liam & Creticam & omnem levem terram cum aceto non valde acri, aut aqua admixta, illitam magnificiunt, quia bullas excitari prohibent hac medicamenta; item ovum totum crudum è vestigio imposi-tum laudant, quia moderatè perfrigerat, & citra mordacitatem

reficcat, sed & atramento obliniunt, aut thure aqua diluto, aut lenticula cocta trita, aut ervo obtegunt. Cæterum ad Ambustiones ex aqua calida, priusquam bullæ excitentur, olivarum muria conditarum aquam affundunt, & ipsas olivas cum polenta tritas imponunt, aut alumen scissum tritum cum aceto illinunt, aut fel taurinum cum aqua larga liquatum inungunt, aut lixivium affundunt, aut garo, aut muria perfundunt, aut bulbosiliorum, aut hyacynthi, aut narcissi cum rosaceo tritos, & ad strigmenti crassitudinem redactos illinunt: panniculum melle imbutum & in hordeo obvolutum exurunt. Hinc:

*R. Cineris eius ʒi.  
cerussæ ʒi.  
butyri ʒi.  
Cera ʒii.  
adipis caprin. ʒiʒ.  
rosacei ʒii.*

*M.*

quod si jam bullæ excitatæ fuerint, rhoem & prælentam tritam cum aceto imponunt, aut calcem vivam cerato admixtam, & linteo infarsitam applicant, quin & sphæriorum appellatum medicamentum conducere ajunt. Quæ verò ulcerata sunt, porro trito integunt, aut portulacam tritam cum polenta imponunt, aut columbinum stercus linteo involutum exurunt, & cinere ejus oleo diluto uti solent; admirandum esse dicunt remedium in ambustis pinum aut picem corticem, aut adianthum siccum tritum, aut myrti folia trita ambustis inpersa.

Ut pili ex ambustis nascantur, commendant fici folia in olla torreficta, cum cerato Emplastri vice imposita, aut sequenti utuntur:

*R. Caricar. ʒi.  
Sampfuchi ʒi.*

Trit. cum oleo excipiuntur.

Vel:

*R. Lapidum præseminis ʒc.  
squama aris ʒx.*

Cum aqua pastilli efformentur. Usu verò expetente, partem unam ad



octo cerati partes admiscant ac diluunt.

Ceratum ad ambusta sequens commendant Veteres.

*℞. Cera alb. ℥iij.*

*rosac. ℥iv.*

*ovor. num. 6.*

*perdicinis ℥iij.*

*M.*

Facta enim ambustione prodesse ajunt medicamenta frigida potestate pollentia, ut sunt album Rhazis, atramentum, cerussa, creta, calx cum oleo rosaceo applicata. Item utuntur unguento refrigerante *Galenii*, magnificiunt betæ folia, coriandrum, item populeum, item oleum olivarum cum sale mixtum, vel sequens:

*℞. Aqua fontis ℔i.*

*vitell. ovor. Num. ii.*

*optime agitentur, dein adde*

*olei olivarum liquidi ℥i.*

*M.*

Huic mixturæ intingunt lineæ duplicata & ambustæ parti applicant, siccatæ sine lineorum ablatione, iterum madefaciunt. Vesicas ante tertium vel quartum diem non esse aperiendas ajunt, nam dum citius aperiuntur, eas difficilioris esse curationis dicunt, & multum dolorificas.

Si magna adsit inflammatio, lenticulum cum melle mixtam applicant, si abstergere velint, miscant terebinthinam cum melle opponunt, & si ulcus remaneat, præ aliis sequens æstimant:

*℞. Vngu. popul.*

*ol. rosac. aa. ℥ii.*

*Mucilag. sem. rosar. aq. solan.*

*extr. ℥ij.*

*vitell. ov. Num. 2.*

*M. F. Unguentum. Oleo ovo- rum finitur curam.*

*Paracelsi  
curatio  
Ambustio-  
nis.*

*§. 14. Paracelsus* in cura *Aduſionis* eò respicit, ut solum Sulphur corporis superetur, cum in eo sanatio consistat. Flores tilix, verbaſciſque liquores, oleum lini, butyrum & lardum calida liquefactaque, nec non alia plura tanquam vulgaria non aliam præſtat æſtimat: commen- dat verò ſequentia.

*℞. Olei ex laganis avium ℥v.*

*Adipis cervi ℥iij.*

*cera.*

*liquorum exorvis aa. ℥iv.*

*M.*

Hujusmodi medicamentum ab initio curæ ſufficiens eſſe in ſinem uſque, nec opus eſſe alio, quod in eo mumia conſtituta ſit, qua caloris aduſtio curatur, vel:

*℞. Olei coſti ℔i.*

*ſervi hircini ℔ß.*

*cera ℥ix.*

Fiat Unguentum, quod ſingulis quaternis horis applicandum vult, aut ſæpius, quo locus melius humiditatem ſuam retinere valeat.

Cum Metallica ac Mineralia, juxta ipſum, ſingularem quandam veneni communicandi rationem obtinent, iſtis à propria Natura implantatam, atque hinc propriam quoque curandi methodum; quæ etſi ad omnia metalla generalis ipſa eſt, in particularibus tamen quandam diverſitatem obſervat: nam reſinſtio caloris diverſa eſt in Mercurio, Sale, Vitriolo, ac Alumine, tum in rubigine. Ad extrahendum autem, ac reſtingendum calorem ſeu uſtionem Metallo- rum ſequens commendat: *℞. Adipis ſuillæ, id eſt lardi, quantum ſufficit, liqueſcat ac incaleſcat, poſt calidiſſimè inſundatur in aquam ſolani, agitur dum conſiſtentiam unguenti naſtus fuerit, hoc unguento perungit malum, ac ſine aliorum remediorum acceſſione percurat. Ubi à Mercurio quis uſtus eſt, locum affectum in lacte calidiſſimo intinctis pannis vicies vel ultra fovere vult, ſic ut ubi refrigerit, ſemper immutetur, poſt unguento ex butyro parato calore extrahit Emplaſtro de Colophoniam, cicatricem efficit. Hunc uſtionis modum rarum eſſe ait, contingere tamen ſi amalgamata, quæ vocant, parentur. Singularem quoque hunc affectum habere ſcribit Symptomata, odontalgiam ac tremorem, quæ abſtinentia à con- tactu Mercurii, uſu aquæ vitæ in lotionem manuum, tum garga-*

gargarisatione , seu oris collutione , cum aqua lavendulæ sine negotio curari promittit . Frequentia hæc esse iis addit , qui Cinnabarim parant , Mercurium per descensum præparant , Metalla separant , aliisque Metallorum artificibus , &c. Ustiones porro ab aquis salinarum fontium , aluminis , & vitrioli , quocunque tandem modo esse fiant , periculosissimas dicit , nisi enim accuratè empyteuma , id est , calor , extrahatur , gravissima subsequi mala sæpius observavit . Hoc in casu , Author certissimum remedium sub unguenti forma promittit .

*℞. Olei Nucum ℥ss.*

*Servi cervini ℥i.*

*Butyri præparati ℥ss.*

*M. F. Unguentum :*

Utatur quotidie bis , manè , & vespèri , donec nihil doloris , phlegmones , ac caloris supersit . Denique si istis non planè cedat , Balsamo , Unguento , vel pulvere traumatico cicatricem facit .

Adustrationis differentias cum varias constituat Author , hinc etiam ejus curandi rationes diversas proponit . Nam quemadmodum medicamenta ad Solem cocta alias vires adipiscuntur , quam ad ignem parata , alias ad flammam , alias in prunis cocta , utique alia est sulphuris , alia aquæ vitæ , alia lactis , alia mellis flamma in præparandis remediis : sic adustiones à flamma simplici , lacte , aqua , pulvere tormentario , sulphure , fulmine , fulgure , &c. aliz sunt ab iis , quæ à vapore , metalli fusionibus , aqua salis Vitrioli , Aluminis , &c. fiunt , hinc etiam in his distinctam proponit curam . Et flammæ simplicis lignariz curatio ad mentem ipsius talis est . Primum omnium calorem ad exteriora attrahendum vult , & quidem hoc modo : Recipe Butyri recentis quantum sufficit , calefiat , calidissimum aquæ frigidæ infundatur , ac agitur , donec nivis instar albescat , post abjecta aqua servetur ad usum

in forma unguenti , quod valere dicit ad omnem Adustrationem simplicem à ligno , lacte , oleo , butyro , resina , &c. factam . Utendum esse ait bis , ter , quaterve aut pluries locum affectum eo perungendo , & studet semper pinguem ex butyro servare partem affectam , nec unquam exsiccare patitur , donec planè petcurata sit , hoc unguento quemvis maximum calorem extrahit . Quin ubi Adustio tanta fuerit , ut Ulcera fiant , ipsum sufficere ait , si emplastro stictico inungantur , nec opus esse aliis insudare remediis inquirendis , hoc unico tanquam certissimo contentus est . Observat tamen in Adustratione per pingues res , ut oleum , butyrum , &c. facta , majorem paulo Emplastri stictici usum requiri .

Adustrationem pulveris pyrii , salis nitri , sulphuris præter Cœlestem periculosissimam dicit , quemadmodum & eam , quæ à vehementibus Chemicorum aquis , ut Mercuriali , Gradatoria , Regali , &c. excitatur : hanc tamen magis ob Corrosionem , quæ à venenorum acrimonia excitatur , quam alia de causa gravem esse pronunciat . Itaque ut primum quis à pulvere tormentario ustus fuerit , utile fore ait hoc unguento locum passum perungere .

*℞. Butyri ℥i.*

*ol. Nucum.*

*Servi cervini. aa. ℥ss.*

*Medull. Tauri quartar.*

Liquefacta ac fervida infundantur in aquam Nymphæ ter quaterve agitentur probè & fiat unguentum , quo ungatur ager , ubi incaluerit , renovare convenit , donec dolor quieverit , ac denique ut vulnus simplex curat .

Sin à Chemicis aquis ustio facta sit , præter hoc oleis traumaticis , vel stictico Emplastro corrodentem vim frangere nititur , tandemque curat .

In Ambustis à fulmine & fulgure curam ferè nullam superesse ait , Medicinam verò quæ in hoc malo

fit, eam dicit, ut antequam empyreuma extrahatur, vehementissimè refrigeret: nam nisi ea adhibeatur, urendi nullus finis est, quemadmodum hoc ipsum in pulvere tormentorio sepius experitus est. Restinctorii illius medicamenti formulam talem proponit:

*℞. Spermat. ranar.*

*Succi fedi.*

*Astacorum fluvial. aa. p. xq.*

*Myrrha.*

*Vitrioli modicum.*

Mixta omnia imponantur membro affecto, donec calor remittat, quo restincto, unguentis præscriptis ad ustiones, curationem perficit.

Sin eousque malum sæviit, ut jam omnia instat Carbonum usta sint, sequenti emplastro utitur, tum pars emortua à sana abscedet, ac decidet.

*℞. Colophon. ℥i.*

*piceis commun. ℥ß.*

*Cera quartar.*

*olei & terebinth. modicum.*

Malaxetur, & Fiat Emplastrum, quod impositum, vivum à mortuo separat, dein Emplastro Stictico curam absolvit.

Empyreuma à glandibus tormentariis factum, sive ustionem hanc periculosam esse censet, quia ejus calor dioturnus est, & metallicam quandam venenositatem comitem habet, tum ex violento ictu, ad mentem ipsius, difficultatis quid contrahit. His curandis malis primum omnium ad refrigerandum glandem restinguente Medicamento utitur, ut sunt Acetum rosaceum, succi solani, Nymphaeæ, Sempervivi, &c. Succus Astacorum, tum sperniole, si per Syringam injiciantur sepius, donec calor refederit, quo facto, unguentis, balsamis, &c. vulneratis tanquam puncturam simplicem curat. Refrigerantium magnam ubique adesse copiam dicit, ut Limacum, Ranarum, Astacorum, intestinorum terræ, succus Sperneolarum, & similia. Succus tamen herbarum

Nymphaeæ, Solani semper vivi potiores ab ipso habentur, neque continent etiam atramentum sutorium. Omnium verò præstantissimum parat medicamentum ex aceto rosaceo & succo Astacorum invicem mixtis: horum verò non hic saltem, sed & in pulveris tormenta ii ustionibus utitur. Accidere non raro ait vulneratos perterritos aquæ se immergere totos, vel frigida vulnus fovere, quod ubi factum fuerit, unguento ad Ambustia superius dicto curationem perficere jubet. Notat denique hanc Ustionis speciem interim lethalem fieri, si calor interiora, ac principalia inembra, ut cerebrum, &c. petat, quo in casu salutem nullam sperandam amplius esse prædicit. Sin lethale adhuc malum non est, intrinsecus per potiones datas calorem restinguere annuitur. Potiones autem ipsius in totum refrigeratores sunt aqua, lac, zythum, succus pomorum, præcipue verò commendat aquam prunorum Cypricorum minorum potam, à vino autem omnino arcendos esse agros monet.

§. 15. *Helmontius* in Ambustis præter interna diaphoretica, pauca vel nulla habet Medicamenta externa, sed reliqua cum Paracello approbat jam dicta.

§. 16. *Villifus* si quædam in hoc affectu interna adhibenda sunt auxilia, ex diaphoreticorum classe illa depromit: quod ad topica verò spectat, si cuticula integra adhuc subsistat, partem combutam fovet spiritu vini simplici aut Camphorato, vel essentia rorismarini, aut, juxta Paræ præceptum, capas crudas contusas cum pauco sale admixto illa applicat, vel succo aliam illinit; cum autem adsunt rugæ, ipsæ statim aperienda veniunt, & linimento ex partibus æqualibus ung. rosarum & populeon. sunt inungenda: tum verò linimento cum oleo communi & vino facto utitur, & deinceps nutritum calcis ex aqua calcis & oleo rosat. & pauca cerussa admixta paratum adhibet.

*Helmontii  
curatio  
Ambustio-  
nis.*

*Villifii  
ratio Cō-  
bustionis.*

hibet . Nec sequens unguentum contemnit .

*R. Ol. commun. cum aq. font. ad integram aq. evaporat. ℥i.*

*Cort. median. sambuc. ℥ii.*

*Umbilic. Venereis M. ii.*

*M. F. Ungu. f. a. servandum .*

Idem præstare ait decoctum hederæ muraræ , & cortic. median. Ulmi ; quando crusta inusta fuit , illius casus citò est promovendus linimento ex butyro recenti in mortario plumbeo agitato , cum decocto malvæ parato & foliis brasicæ tepidis applicato . Si tale medicamentum non sufficiat , vel ejus effectus expectari nequeat , fetro separanda est eschara . Ulcus autem ut recens aliud Ulcus deinceps est curandum , & solitis in iis casibus remediis ad integram consolidationem est deducendum .

*Sylvii modus curandi Ambustionem .*

§. 17. *Sylvius* cum *Villis* jam dicta Combustionis cura fere consensit , interna Diaphoretica & Salia Volatilia maximè extollit , linimenta quoque varia præferibit laudatque aq. calcis vivæ , spiritum Vini Camphoratum , æstimat quoque in hoc casu nutritum ex lithargyro , oleo rosarum & aqua vitæ factum .

*Cartesii notum ratio curandi Ambustionem .*

§. 18. *Cartesius* in principio statim ipsius fustæ Combustionis non modò approbat , sed etiam tanquam salutare remedium commendat partis ambustæ ad rem illam ignitam , qua combustio peracta est , propiorem admotionem , hac enim ratione non modò poros patris læsæ à particulis materiæ subtilis è re ignita egredientibus apertos reservari dicunt , ut intus in parte læsa contentæ particule gladio lætæ & fertatæ promptiorem reperiant exitum , sed easdem ipsas in motu quodam ulterius teneri vario , absquo jam assueto fibrulæ non lædantur , sed motu illo pedetentim cessante , & materiæ subtili majori in re ignita externa contentarum particularum homogenearum se sociante acervo remaneant integre ; contra enim si contigat , & pars ambustat aut in aere contineatur frigido , aut rei frigida ad-

moveatur , idem ei accidere profitentur , quod vitro calefacto subito aeri frigido exposito , aut aqua vel manu aut digito frigidis tacto , cum oclusis potis & fistulis à frigore rigefactis materia subtilis in easdem pettinaciùs ei obistentes vehementius commoveatur , easque inflexiles dirumpat : Haud dissimili ratione spiritum vini loco materiæ istius ignitæ proficuum existere pronunciant , siquidem subtilissimæ primi elementi particule in eo contentæ priorem præstent effectum , & partem combustam spiritui huic immerfam placidissimo afficere sensu , non aliter , ac si frigido quodam rore inundetur . Hac etiam de causa felici cum successu nonnulli cretam in spiritu vini dissolvunt , & linimenti instar adhibent , & *Dn. D. Vogel-sangius* ipsam calcem vivam in spiritu vini dissolvit ad tenuis linimenti formam , & parti ambustæ , etiam si ipsa cutis læta fuerit , illi nit , cujus ope dolor citò cessat , empyreuma separatur , & excitatum ulcus unguento albo camphorato brevi sanat . Laudant quoque eandem ob causam linimentum ex calce viva in spiritu vini soluta , & oleo hyperici invicem agitata compositum , & spiritum vini camphoratum in ipso principio adhibitu singulari habent in pretio . Ad escharam separandam remedia imponunt particulis constantia à subtilimateria facillè moveri & agitari valentibus , ut motu in carne emortua fuscitato , fibræ ejus à sanis placidè abrumpantur , uti sunt cepæ coctæ , & saponi , Veneto commixtæ , Mercurius præcipitatus ruber axungie porcina commixtus , succus ceparum , oleum raparum cum creta & camphora , lardum accensum & in folia lauri stillatum , donec folia ista vertantur in cineres , quæ pinguedo postmodum illinitur . In profundiore combustionem escharam scarrificari permittunt , posthæc Unguentum ei admovent ex fuligine , terebinthina , butyro recenti & oleo de

vitellis ovorum , vel quod sequens  
exhibet formula .

*aq. rosac.* ℞iſs.

*album ovi* Num. i.

*M. F. Unguentum .*

*℞. Cort. sambuc.* M.ii.

*fol. plantag.*

*salv.* aa. M. i.

*Cog. ex aqua* ℞xx.

*Culauræ adde*

*fulig.* ℞ii.

*butyr. non salit.* ℞vi.

*Sterc. Gallin. rec. alb.* ℞iii.

*Unguent. basilic.*

*Sapon. vulg.* aa. ℞ii.

*M. F. Unguentum .*

Illud etiam non contemnunt lini-  
mentum , quod ex stercore gallina-  
rum albo , foliis plantaginis & sal-  
viæ in butyro non salito affatis &  
per lineum tractis componitur ,  
cum felix curatio eo sapius sit im-  
petrata . Eschara separata curam ut  
in aliis ulceribus continuant , ad-  
hibito unguento aureo , vel basili-  
co , vel emplastro de gratia Dei .  
Vulgare quidem , sed non contem-  
nendum remedium existere promit-  
tunt , si farina avenacea in butyro  
aliquantum affetur , & linimenti  
instar illinatur , nihilque ulterius  
superimponatur , & illinitio hæc  
tamdiu continetur , semper reli-  
ctis prioribus linimenti reliquiis ,  
donec crusta collecta spondet de-  
cidat , & pars ipsa conspiciatur sa-  
na . Eodem modo linimentum ad-  
hibent *Mynsichti* ex oleo olivarum  
& albumine ovi , invicem ad spu-  
mantem albedinem agitatæ compo-  
situm , cui si sacchari Saturni  
quidpiam addatur , adhuc magis il-  
lud æstimant proficuum . Interna  
diaphoretica ex tinctura bezoardi-  
ca , spiritu vini camphorato , the-  
riaca & discordio , aqua florum  
tiliæ & sambuci summopere depræ-  
dicant , & consolidationi sequens  
sufficere dicunt unguentum .

*℞. Ceruss.* ℞iii.

*Lap. calaminar.*

*thuris* aa. ℞ii.

*cera albæ* ℞ii.

*olei olivar.* ℞iſs.

*Camphor.* ℞ii.

§. 19. Jam pergendum est ad ip-  
sam *Curationem* ex fonte nostro Chi-  
rurgicoac Pharmaceutico depromptam . Methodus verò mœdendi nos-  
tra aliquomodo pro causæ ambu-  
stionis varietate variat .

*Nostra  
methodū  
Ambustio-  
nem .*

Præservatoria indicatio est , *Procul  
ab igne* : apud Veteres ratione ful-  
minis se muniverunt vel lauro quam  
in capite gestarunt , qualem coro-  
nam ex lauro concinnatam turpissi-  
mus Imperatorum , Tiberius Nero  
ob id gestasse dicitur , teste *Sue-  
tonio in eius vita* c. 69 Sed fabulo-  
sum puto . Alii pavidi vituli mari-  
ni pellem super caput ponunt , alii  
aquilam ob Jovis armigerum ser-  
vant ejusque lapidem , sed omnia  
fabulosa , superstitionosa , imò irrita  
esse adversus altitonantis Dei iram  
credimus , iuxta Psalmistam *Psalm.*  
*139. v. 7.* quo ibo à Spiritu tuo , &  
quò à facie tua fugiam ? Si ascen-  
dero in cælum , ibi es , & si stratum  
fecero in inferno , eccetuades ,  
si assumam alas auroræ , & habitem  
in novissimo maris , etiam illuc ma-  
nus tua deducet , & apprehendet  
me dextera tua .

Missæ quoque facimus istorum  
Impostorum ignem devorantium ar-  
cana atque experimenta , quibus se  
muniunt , ut sine damno possint tra-  
stare ac devorare ignem , utut mo-  
dum nobis tradat *Plin. l. 29. c. 3.*  
& *Svender. in seinen Erquickstun-*  
*den .*

Majoris verò momenti est indica-  
tio curatoria , quæ consistit in hoc ,  
ut fibræ alięque partes combustæ ac  
dilatatæ non in tantas cinninna-  
tiones transeant , & statim applica-  
sequens Epithema , cum subtili &  
duplicato lineo loco ambusto , sic-  
que vesiculę impediuntur .

*℞. Aq. calc. viv.* ℞v.

*Spir. vini Campb.* ℞ii.

*M.*

*Vcl*

*℞. Spir. vini vel aq. Regiæ.*

*Flungar.* ℞iv.

*Cam-*

*Camphor.* ʒ ii.

*Aq. ad ambust.* Qu. ʒ iʒ.

*Bals. nervin. m. d.* ʒ i.

*vel Elixir. vite* ʒ ʒ.

*M.*

Sunt alii, qui ad vesiculas impediendas apponunt liquorem salum in dolio lis butyri salici reperibilem, ut & aquam marinam vel salum, alii saponem nigrum, mel, butyrum, decoctum raparum, muriam Harengorum, aut musum brassicæ, præprimis si conquassentur cum oleo lini vel rapatum, vulgus applicat acramentum, rustici hucce in locis loco combusto stercus vacinum parum rostum cum oleo lini vel raparum applicant. Alii albumen ovi tanquam volatile, constans ex animalibus partibus volatilibus ambustis applicatum pro arcano venditant. A Clarissimo Dn. Muys laudatur creta cum spiritu vini camph. imposita cum arcta ligatura.

Linimentum sequens ad Ambusta optimum effectum nobis præsticit, imprimis si combustio à pulvere pyrio fuerit producta.

*ʒ. Cernisse*

*pulp. rad. conf. mai. aa.* ʒ ʒ.

*Lithargyr.*

*La. calaminar.*

*minii aa.* ʒ iiʒ.

*Camphor.* ʒ ʒ.

*ol. rapar.*

*M. f. l. a. unguentum.*

Hoc tamen fateri debemus, liquida, ut decoct. calc. vel ejus aqua cum Spiritu vini Camph. vel Matriçal. plus nobis præstitisse, quam unguenta ac linimenta: Mixturis enim his continuo calide partes combustæ laventur & iis madefacta lintea imponantur.

Si tantum cutis externa fuerit ambusta, mulieres nostrates propriam inungunt salivam sale volatili constantem, aliæ cepas cum saponem in forma cataplasmatum parant imponuntque. Plures pro experto exclamant remedio calcem vivam cum oleo raparum commixtam, & calide ambustis partibus impositam, Alii utuntur oleo ra-

parum cum creta. Rustici stercus galinæ cum butyro & fuligine, aditis herbis Salv. cort. sambuc. misc. & ad formam unguentum coquant applicantque non absque levamine.

Aliquando ad generosiora transendum est, ubi enim desinit ancilla, ibi sæpe incipit Medicus in curandis scilicet morbis, in ambustis ergo profundioribus frequentia eligere solemus.

*ʒ. Vngu. Basil.* ʒ i.

*ol. Iuniperi* ʒ iii.

*Terebinth. Ven.* ʒ i

*ol. anisi* ʒ vi.

*macis* ʒ ʒ.

*cera* ʒ iii.

*Croci* ʒ i.

*Syrac. liquid.* ʒ i.

*Gumm. galban.* ʒ ʒ.

*M. f. l. a. unguentum.*

Quò etiam referri potest unguentum ad Ambusta seq.

*ʒ. Cort. med. sambuc.* ʒ ii.

*insund. & coq. in oleo rapar.*

*ʒ i.*

*colato oleo add.*

*axung. ovillæ,*

*cera flavæ aa.* ʒ iii.

Liquefactis insperge continuo agitando

*pulp. ceruss.*

*minii aa.* ʒ iiʒ.

*& si parum refrigerint immisc.*

*Camphoræ trita* ʒ ii.

*M. f. l. a. unguentum.*

In gradu secundo, ubi cutis nimis fuerit contracta, ad fortiora transendum est, & sequens calide apponi potest.

*ʒ. Spir. matrical.* ʒ ii.

*Tinct. galban.* ʒ ʒ.

*aq. ad ambust. vel calc.* ʒ iʒ.

*camphor.* ʒ i.

*aq. Reg. Hung.* ʒ ʒ.

*bals. nervin.*

*tinct. castor. aa.* ʒ ʒ.

*M.*

Urgente etiam necessitate superponi potest ad calorem partis conservandum sequens cataplasma.

*ʒ. Herb. scord.*

*rutæ aa.* ʒ ʒ



*fl. rapistr. Mi.**melilot. P.i.**malv. P.ii.**N. M.**caryophyll. aa. ʒβ.**Sal. tartari**armoniaciaa. ʒi.*

cum mulf. & urin. foetid. q. f. f.  
*adiecta farina fabarum* Cataplasma.  
 Si verò Gangræna ac Sphacelus parti combusta imminet, confugiendum est ad sequens Cataplasma calidè applicandum, quamvis hoc in casu etiam conducatur aqua calc. cum Spiritu vini camph.

*℞. Herb. salv.**rute**scordii aa. Mi.**cep. crud. rec. ʒiii.**sapon. liq. nigr. ʒβ.**myrrh.**aloeraa. ʒiii.**Croc. opt. ʒii.**Sal. tartari**armoniaciaa. ʒiβ.**l.a.c. vin. & mulf. f. Cataplasma.*

Et, si malum fuerit intensius, ut cutis planè fuerit contracta, Cataplasmati prædicto addi potest,

*Unguentum Basilic.**Syrac. liquid. aa. ʒv.**Gumm. elemi ʒvi.**Galban ʒii.**oleicera ʒiii.**M.*

Oleum Philosophorum etiam externè illitum egregiam sæpè navat operam, ut & omnia salia volatilia, quæ liberum ac convenientem succi motum restituere, meatus obstructos referare, & acridinem illius obtundere valent, hic adhibenda sunt. Omnia enim hæstenu recensita remedia ex particulis volatilibus constant, quæ à materia subtili facili Marte commoventur ac agitantur, hinc similem motum communicant carni combustæ ac emortuæ. In graviore Ambustione fæces cerevisiæ cum pane applicatæ optimum præstiterunt effectum, ut & allium, lentes palustres, Empl. diasturni *Myns.* Mulcilog. sem. cydon. cum aqua sperm.

ranar. extract. additis camphora & saccharo saturni, quod elegans est remedium tepidè applicatum.

Momordica in oleo lini infusa & ei addit. ol. saturni citra inflammationem Ambustiones sanat, oleum apum cum paucis olei ovorum vel scorpionum sæpè juvat.

*Vel:**℞. Calc. viv. lotæ. ʒi.**sulph. viv. ʒi.**ol. lini.**capar. aa. q. f.**M. pro linimento.*

Sunt quoque, qui in Ambustione commendant oleum Nucum cum ovorum luteis mixtum.

Si combustio per prædicta remedia sublata fuerit ad cutem deleniendam & dolores sedandos sequenti utere:

*℞. Ol. lini ʒβ.**N. M. dest. ʒβ.**ungu. Basil. ʒi.**Gumm. Elemi**galban. aa. ʒii.**Camphor. ʒβ.**Aq. Reg. Hungar. ʒiii.**Croci ʒi.**M. f. l. a. unguentum.*

Omni enim ope à combustione Gangræna arcenda est, hinc varia Cataplasmata ceu jam dicta, ex volatilibus & spirituosis paranda & calidè applicanda sunt, spirituosæ enim obstructions tollunt, tenacem mucum resolvunt, imprimis si Camphorata fuerint simul mixta, hinc sæpè sufficit Spirit. vini camphor. c. aq. calc. Tinct. castor. Spirit. capar. matric. Balsam. nervin. Tinct. Galban. quæ omnia compactas particulas valde resolvunt, & fluidiores reddunt: sic etiam salia volatilia oleosa adhuc sunt fortiora, quia eorum particulae melius penetrant, & solidiores ac firmiores sunt, & omnia optime resolvunt. Hic Chirurgus monito, ut omnia medicamenta in combustionem calidè applicent, quia actualis calor ipsam sæpè sanæ combustionem, succi enim coe-

*gula-*

gulati per externum frigus à calore iterum resolvuntur ac attenuantur. Cæpæ etiam locis ambustis applicata magnum afferunt solamen, quoniam in se continent sal volatile, cuius ope visciditates resolvuntur, hinc, ceu diximus, omnia falia volatilia, tum internè tum externè in combustionibus conveniunt.

Sapo Venetus est in combustione egregium remedium, quia constat ex penetranti sale volatili, & acri, cuius ope visciditatis facile resolvuntur, item ex oleosis particulis, per quas cutis fibræ demulcentur, & acidæ falsæque particule temperantur.

Aqua forti si quis combustus sit, non inconvenienserit imponi externum Epitema ex aq. sper. ran. cum butyro satur. *Mundererus in Med. Militar.* curavit Chymistam ab aqua forti combustum solo oleo lini atque cremore lactis. Sic etiam empyreuma vulgò dictum evocatur. Si in levi combustione membrum admoveamus igni, particule antea impulsæ, & continuum solventes ab illis ingredientibus retropelluntur, aque simul empyreuma. Male faciunt qui admoveant combustis partibus caustica quia magis dissecidunt fibras. Cavendum quoque, ne applicentur frigida, quæ malum potius augent, quàm imminuunt, omnia etiam tepidè applicantur.

Crusta vel eschara si adsit, illa incidenda ac leniter separanda est, si non potest fieri in tota parte, fiat diversis in locis, ut ita chor, devorans fibrillas, subius contentus queat esluere. Si verò ad nervos usque pertingat, summa cautione opus est in removenda eschara, & prius applicanda sunt nervina & demulcentia.

Si in oculo est ambustio, ratio præsertim habenda est doloris, in quem finem conducet lac muliebre sæpius tamen mutatum, quoniam facile accescit, reliqua etiam ophthalmica, aqua nempe rosar. mucilag. sem. cydon. fœnigræc.

croc. aqu. euphras. hic verò apprimè convenit arcanum *Timei à Guldenkleee* seq.

℞. Pomor. d. Num. 2

coq. in aq. Euphras.

rosar. aa. q. s. ad molliorem, traiciantur per setaceum: add.

Sacchar. alb. ℥ii.

camphor. gr. xv.

crocigr. v.

M. & applicetur calidè.

Si combustio in juncturis circa tendines, & ligamenta observetur, statim ad laudata Epithemata & cataplasmata confugiendum est. Conducet etiam in hac combustione ol. septem florum *Myrs.* cum album. ovi & mucilag. sem. cydon.

Quando ossa simul sunt ambusta eximantur frustula forcipe, si verò tota pars fuerit adusta, ense recidenda est.

Cùm à pulvere pyrio pars quædam corporis fuerit combusta, & grana remaneant cuti infixæ, non statim ea acu vel alio instrumento eximenda sunt, sed potius suppurationi relinquenda, quæ dein in conspectum veniunt, si enim grana pulveris pytii in frustula stegeris, tantum se magis cuti implicent, & difficilior aut nunquam eximuntur.

Quando verò prælaudata applicaveris medicamenta, grana illa pulveris è cute ab effervescente lymphæ facili marte propelluntur, quod etiam confirmat *Clariss. Muys* dicens in *Podalirio suo redi-viv. pag. m. 39.* Grana pulveris tormentarii relicta in facie quidam ope acus chalybeæ eruere conantur, sed superuacaneum est, quandoquidem fibrillas per emollientia in tantum flexiles reddere possumus ut grana sponte prolabantur. Ut etiam paucis interna remedia in combustionem proficua attingamus, sciendum est, si cacoehymia conjuncta est, & succus nutritius nimis acris sit, ut consolidari nequeat Ambustio, conveniunt omnia ea interna, quæ sequenti capi-

capite de Vulneribus præscribimus, imprimis hic commendamus diaphoretica ex Antimonio & Mercurio dulci parata, Antihect. Poterii, oculos cancri, sacch. Saturni, item sulphurata, camphorata, myrrhata, & semper interponenda sunt volatilia, quæ visciditates resolvunt, in quæ finem etiam Chirurgi cum commodo uti solent decocto lignorum cum Thea; cum sarcosis & agglutinationo partium dependeat à chyllo, & nequitiam à vulgò dictis sarcoticis emplastris, aliisque Chirurgorum medicamentis; hoc Chirurgis porro notandum est, ut fugiant in combustionem adstringentia, & poros obstruentia medicamenta, tum interna tum externa, quia his combustio magis exasperatur, visciditates cumulantur, & particula inclusæ & infixæ marcent partibus combustis.

Si Combustio abeat in fistulam, & Medicus nimis serò advocatus fuerit, sunt, qui in hunc finem commendant butyrum Antimonii rubr. vel lini destillat. ex capit. Mort. Vitrioli, sed nos commendamus potius balsamum nostrum divinum, rarò in Fistulis fallens remedium.

In quibuscunque Ambustionibus Agricola excollit sequens:

*℞. Sacch. satur. q. s. add. ol. rosar.*

*M. F.* linimentum, quo locus ambustus calidè inungendus est. Oleum Hyperici n. d. etiam egregium est sæpius applicatum: imò sexcenta alia possunt proferri, sed si hæc non satisfaciunt, alia certè etiam vix præstabunt: meliora enim & approbata Junioribus communicamus Medicis ac Chirurgis, quibus in praxi consummati non opus habent.

## CAPUT V.

*De vulneribus.*

## §. I.

**M**Achina nostra ex solidis, & fluidis constans, quàm fragilis existat, ex eo patet, quod Medicina excogitari debuerit ei suppetias ferendo, imò capropter Medicina ac Chirurgia apud Ethnicos de die in diem excrevit, experiendi enim occasionem dedit Necessitas. Nam quomodo homines laderentur à bestiis mordacibus, artem hanc excudere cœpere, quæ eo magis necessaria fuit, quo sæpius homo homini lupus fiebat, & bestia quavis pejor, juxta illud *Juvenalis Satyr. 15. vers. 164.*

*Serpentum maior concordia: parcat  
Cognatis maculis similis fera: quando  
Leoni*

*Fortior eripuit vitam Leo? quo ne  
more unquam*

*Expiravit aper maioris dentibus  
apri.*

*Indica Tigris agi rabida cum Ti-  
gride pacem*

*Perpetuam; Sævis inter se conveni-  
nit uris.*

*Asi homini ferrum lethale incude  
nefanda*

*Produxisse parum est, cum rastra  
& sarcula tantum*

*Assueti coquere & matris ac vomere  
lassi,*

*Nescierint primi gladios excudere  
fabri.*

Nunc ergo ad ipsa transeamus *Vulnera*, vel ab hominibus vel bestiis *violenter inflata*, quæ sunt ita simplicia, ut definitione seu descriptione non opus habeant. Vulgo verò in foro Medico *describitur Vulner*, quòd sit continui solutio in parte quadam molli, & carnosa (cur non aquè in dura ac fibrosa, caro enim discindi nequit absque

*Descri-  
ptio.*

absque latione cutis & fibrarum ? )  
ab instrumento aliquo secante vel  
pungente violenter facta.

Animum ergo Veteres intendunt duntaxat ad partes solidas, atque ad magis sensibiles; sed quis nescit corpus nostrum ex solidis & fluidis componi partibus? Neque illas dividi aut rumpi posse, ut non fluidarum ordo & mixtio turbetur, quo divortio semel admissa novæ statim fiunt combinationes, concreta, variz oriuntur excrescentiæ, coagulationes, stagnationes, quæque fabri existunt omnium illorum graviorum symptomatum, quæ vulnera comitari solent. Corpus enim nostrum nihil aliud est, quam congeries indefinitorum canaliculorum, tubulorum & vasculorum fluida varii generis corpuscula transmittens. Hinc Chirurgi æquè fluidarum quàm solidarum partium habeant rationem necesse est.

*Differentia  
Vuln-  
rum.*

*Vulnerum Differentiæ* quod attinet, nunc vulnera sunt majora, nunc minora, atque casum vel punctum insinista, nec ad eandem illata mensuram, sed mille modis variantur. Hinc variz ab Auctoribus recensentur differentiæ, quas vulgò in Essentiales & Accidentales dividere solent, illas desumunt à vulneris essentia, partis vulneris conditione & causa, has verò à fiendi modo, situ & tempore. Meliori verò jure dividi possunt vulnera in vulnera Scelopetorum, contusa, puncta & morsæ. Item in Vulnera Capitis, Thoracis, Abdominis, Hepatis, Lienis aliorumque viscerum, & externorum Artuum, qualem nos in Chirurgia hac nostrâ ordinem observare volumus.

*Partes af-  
fectæ.*

§. 2. *Partes affectæ* Vulnerum non tantum sunt canaliculi vel partes fibrosæ aliique tubuli totius corporis, sed & ipsi succi in iis contenti, itaque si turbæ his in partibus producantur, & harmonia illa stupenda à legitima pororum

dispositione, & particularum ordine dependens, auferatur, eadem contingit insaufa emergentia: ibi enim corrosivum senties acidum: hic varia habebis salia; illic tetridum restagnabit liquamen, alibi purulentam conspicias amurcam; hic intumescen- tiam, ibi inflammationem, alibi excrescentiam & dolores repe- riet atroces, qui cuncta non tam ex continui solutione, quàm ex fluidorum perverso ordine, statu & mixtione natales suos habent: Partes ergò aquè internæ ac ext- ernæ, quia ex iisdem constant tubulis, à causa violenta ladi pos- sunt.

*Diagnosis.*

§. 3. Quoniam ipsa vulnera quo- ad externam præsertim faciem in sensus incurrunt, inanem lude- rem operam, si recensendis *Sig- nis Diagnostice* diutius immora- ri vellem: quod enim internam concernit constitutionem, si- tum & magnitudinem, ea nonni- si sagaci conjectura, & accura- to Medici judicio sciri poterunt, siquidem haut semper facile judi- cetur sit, quæ partes internæ vul- neratæ sint, & quousque vulne- ra penetraverint, cum tale Scrutinium Scientia anatomica, & di- ligenti partium, actionum læsa- rum nec non excetorum exami- ne niratur, verbi gratia: in Vul- nere Thoracis sanguis cum tussi si rejicitur; & aer e Vulnere toras egreditur, certiores reddimur in- strumentum in thoracis cavitatem penetrasse, ipsosque pulmones cum vasis sanguiferis perfoasse. Ex anatomia ergò sciendum est, quis partis cujusvis situs, quis usus, symptomata simul consi- deranda sunt, ex quibus appareat succorum corporis indoles & di- spositio, hinc & eorum quæ per vulnera ejiciuntur, conditio no- tanda.

Propria cujusque Partis acciden- tia contemplari animus non est, cum vulnecum particularium in pro- priis Capitis mentionem jam injecimus, quo Lectorem remit-  
tamus,

timus, sed earum partium tum internarum, tum externarum, quarum nondum mentio facta est, considerabimus: Ex. gr.

Corde vulntrato vel percusso vel transtosso, sanguis multus effluit, ac praeteritum si dexter ventriculus vulneretur, unde etiam niger exibat sanguis ac fervens: Si vasa lymphatica fuerint simul discissa, magna lymphæ copia in thoracis cavitate reperitur, nam ex sinistro cordis Ventriculo sæpè flavus emanat liquor, in his Vulneribus arteria languescunt & albescent, vires collabuntur, sudores frigidi cum colore faciei pallidissimo erumpunt, tandem omnia externa frigent, quod frigus sæpè excipit mors atrox.

Septo transverso percusso & vulnerato, præcordia sursum quasi atrahuntur, spina dolet, spiritus rarus existit, anxietates præcordiorum cum sanguine spumante ejecto sæpè observantur, magna adeo spiratio cum gemitu & dolore per totam humeri partium compagem.

Medulla percussa quæ in spina est si vulneretur, nervi resolvuntur vel distenduntur. Sensus intercidit interposito tempore aliquo, inviti per inferiores partes vel semen, vel urinam, vel sterqus excernere coguntur ægri.

Ista aspera arteria exiguum sanguinem fundit, ad dorsum plurimus dolor, fauces paulatim sanguine replentur, vox rauca & linguæ aciditas percipiuntur.

Ubi Vulnera venenata sint, seu à venenatis telis aliisque instrumentis inflata fuerint, ea Vulnera reperiuntur statim sicca, & circumcirca pallida, sublivida & quasi cadaverosa apparente simul adsunt deliquium animi & cordis palpitatio, caput obfuscatur, convulsiones artuum, aliaque symptomata observari solent, tandem accedit Gangraena ac Sphaecelus, quem excipit ut plurimum Mors. Nota enim est historia de Balneatore, qui lancea sua ne-

cavit scarabæos, aliaque plura insecta, unde Vulnera, quæ instrumento hoc instituit in V. S. aliisque operationibus, incurabilia exorta sunt.

§. 4. Nunc ad *Causas Vulnerum Actiologia* accedamus, & primò de iis *secundum Galenicorum* iudicium audiamus, qui *Causas Vulnerum* dicunt omnia illa, quæ extrinsecus advenientia, continuum solvere valent: Vulnera enim patibus molibus induci fatentur ab externis instrumentis tundentibus, scindentibus, contundentibus, & dilacerantibus, vel animo hostili, vel ex ineutia & imprudentia adhibitæ, item vel à lapsu, vel ictu bombardæ, aliusque rei externa continuum violenter dissolvunt. Symptomatum quoque in Vulneribus obvenientium rationem reddamus ex ipsorum sententia. Dolorem, tristem illam sensationem deducunt vel à puris quantitate nimia, vel qualitate, vel à calida vel nimis frigida intemperie, doloris enim causa est continui solutio vel intemperies, non sensim sed confertim facta, continui autem solutionem fieri ajunt vel ab humorum influxu, vel à corpore præter naturam infixo, vel à qualibet alia re distendente, comprimente & aggravante. *Inflammationem* Vulneris supervenientem à sanguinis & bilis influxu nimio deducunt, *Oedema* verò eadem accidens ex debilitate caloris nativi, alimentum non concoquentis, sed in pituitam tantum vertentis fieri asserunt.

*Pruritus* Vulnera sæpè comitantem ab humore falso, mordace, & amaro contingere haud dubitant.

*Livorem* verò Vulnerum fieri ajunt vel ob caloris nativi extinctionem, vel ob frigidam intemperiem, vel ob nigum in parte contentum humorem, vel ob os subeas corruptum.

§. 5. *Paracelsus* inter plurima *Inter Pra-* quæ Chirurgum nosse decet, pri- *causa* mum ac præcipuum illud esse dicit, *Vulnerum*

ut quocunque tandem oblato Vulnere, primò statim intuitu, qualenam illud sit, cognoscat, qui de curationis possibilitate, ac fine, certi quid prædicere queat. Sanorum corpora tot casibus exposita esse inquit, ut à variis instrumentis externis inferantur varia & diversa Vulnera, imprimis à plagis casim vel punctim illatis, infici quoque dicit ab hostibus enses, gladios, hastas, tela: domesticis quoque usibus venenum contrahere ait instrumenta mechanica, ut falces, ex.gr. quæ usus tempore dum incallescunt naturam eorum quæ secant ut herbarum, rubetarum, arancarum facile recipiunt.

Febres in Vulneribus à cælo fieri contendit, & tales quidem febres, quæ statis periodis tigre & calore paroxysmi perficiant, quæ quotidianarum ac tertiarum typos observent, quæque non prius ægrum relinquunt, quàm vulnus ipsum coalescit: superveniunt adhuc Vulneribus affectiones, quarum radix non in ipso Vulnere, sed in toto corpore continetur, ut sunt phrenitides, epilepsie, spasmus, &c.

Fusorum verò ac aliorum instrumentorum, quæ frequenter manibus versant homines, ( mulieres præcipue, ) virus admodum pestiferum Vulneribus existere arguit, quod ea ex frequenti usu venenum in se recondant vehementissimum.

*Hæmorrhagiam* in Vulneribus vel ex ira, vel ex Venere, vel ex motu, vel ex repletionem, vel ex cælesti constellatione fieri existimat.

*Synoviam* seu *fluxum glutinis albi* duabus de causis in Vulneribus accidere ait, vel enim ægrorum libidine ac inobedientia, vel Chirurgi errore tum in medicamentis, tum in deligaturis commissis.

*Phlegmonem* per vim illatam Vulneribus obvenire ait.

*Spasmus* verò oboriri asserit à nervis in Vulneribus latis.

*Luxuriantem* verò carnem, vel ob medicamenti vim, vel ob plethoricam constitutionem fieri asserit.

§. 6. *Helmontius* in *Vulneribus* non solam continui fieri asserit solutionem, sed simul introduci exoticam qualitatem, unde labra Vulneris indignata, mox æstuant, apostemantur, imò totum abinde corpus febribus ac varia Symptomatura Syndrome consistatur.

Pus fieri Author in Vulnere ait, cum fundum vel labra Vulneris acor, putredinis index contrahit. Item vermes in Vulneribus ob putredinem produci existimat, uti in culinis, si carnes corrumpi incipiant illarum jacula accescere solent.

Ipsam Continui separationem esse ait quidem immediatam, atque sufficientem causam occasionalem, quatenus nempe aperit; contundit &c. quæque etiam consolidatione eget.

*Vulnerum dolorem* suscitari ait ab aqua glareali, quoniam vulnus ex cruore celerem copiosamque parat Synoviam sive glarealem aquam.

Sedationem ergo Archei indignati & irritati necessariam pro Vulneribus forinsecus inflictis & duplatis, quæ proprio nomine ad mentem ipsius dicuntur Vulnera sua, scilicet qualitas & dispositio exotica vel maligna, Vulneribus alias simplicibus introducta & impressa per ideas malignas indignationis, iræ, vindictæ &c. concepta, adeoque sola censura læsionis & sensationis injuriæ & indignæ; quando homo læditur, nisi à se ipso, currente simul aeris inimico congressu, unde mox sanguis, & Archeus in labris Vulnere offensus æstuat, intumescit, apostematur & suppuratur: idque per extractionem dispositionis hujus pergrinæ, qua labra ab omni accedente doloris, & suppurationis pure servantur, moxque per se sponte accrescunt, quia ipsa Natura est morborum Medicatrix.

*Helmontii opinio de causis Vulnerum*



*Secun-  
dum Vil-  
lissum  
causa Vul-  
nerum.*

§. 7. *Villissus* nullas alias Vulnerum causas agnoscit præter res omnes scindentes & acutas, quæ parti cuidam violentius applicata continuum ejus solvunt. Easdem etiam illorum causas cum aliis Authoribus statuit, tum quod ad ipsum vel partis affectus constitutionem, tum quod ad eorum prognosin attinet.

*Iuxta Syl-  
vii cau-  
sa Vulne-  
rum.*

§. 8. *Sylvius* easdem Vulnerum causas statuit, agnoscit enim continui solutionem à quacunque etiam re externa violentè inductam.

*Carbo-  
sanorum  
iudicium  
de causis  
Vulnerum.*

§. 9. *Cartesiani* Vulnèra in Continui solutione cum reliquis Authoribus consistere haud dubitant, & ea quæ in mollibus ac partibus durioribus contingere asserunt, laudantur enim juxta ipsos modo caro, ossa, modo tendines, vasa alia, ligamenta, &c. Vulnèra agnoscunt cum aliis externa & quæ ad internas penetrant partes, quæ enim fieri in Capite, Pectore, Ventre & Artubus toto observant die, sunt vel profunda vel superficialia, vel transversa, vel insiguntur punctura, vel à sclopeto, vel à morfu, vel à lapsu vel ictu.

Causas ergo vulnèrum esse dicunt vel *res scindentes*, ut sunt culter, forpices, gladii, enses, vitæ, glacies, crystallus; vel *res pun-  
gentes*, ut sunt acus, aciculæ, spinæ, dentes, tela, &c. vel *res perforantes*, ut sunt globuli grandiores & minores, vel *res contundentes*, ut lapsus, ictus, plaga, elevatio pondus majoris &c. Quæ omnia partibus corporis vi quadam intruduntur, continuum solvunt, & vulnus excitant.

*Notra  
sententia  
de causis  
Vulne-  
rum.*

§. 10. Vulnèrum *causæ*, nostro iudicio, sunt res externæ varix violentè partibus nostris solidis intrulse, sive sint perforantes ut gladius, stylus, hasta, acus, frustum vitri, spina, ictus ac morsus bestiarum, imò hominum iracundorum, globulus ex sclopeto ope pulveris pyrii accensis emissus, sagitta, & innumera alia, quibus discinduntur corporis nostri tubuli, canaliculi-

que, & succis conceditur effluxus, & hinc commixtio perversa oritur, à quâ plura ac innumera deducuntur symptomata: sunt & res secantes, ut ensis, culter, &c. sive contundentes, ut pugnus, baculus, lapis, &c. fortiter, & impetuosè machinæ nostræ partibus mollibus carnis fibrosis, atque duris membranis, imò aliquando ipsis visceribus impulsæ intrusaque, interdum & ipsis ossibus, tunc dicitur vulgus vulnus cum fractura ossis. Certum enim est canales & membranas in vulnere ladi. Apertio enim eorum vulnus facit, & vulnus sæpe est in membranis, quæ canales constituunt, quæ canalium ruptio fit vel 1. à ruptione, cum vi disrumpitur canalis ab humore quem continet impetum faciente, 2. ab erosione, cum ab acredine canalis perforatur, 3. à vi externa, contusione, punctura, incisione sive sectione.

§. 11. Relicta causa transitum facimus ad *Prognosin* vulnèrum, à qua plurimum salus sapius dependet, interest enim scire, vivente etiam adhuc vulnerato, an vulnus periculosum, vel an, uti illi loquuntur, per accidens aut per se lethale sit. Ubi statim sub considerationem venit distinctio vulnèrum in simplices & semper lethalia. Periculi certè plena res est iudicium ferre de Vulnèribus, atque an per se, an verò per accidens lethalia sint renunciare, etenim juxta hujusmodi renunciationes Medicas Juris-Consulti fontes reos condemnare, insontes verò absolvere solent: quia ergo hic de sanguine & curio humano agitur, qui sanguis semel effusus, nullam restitutionem in integrum à Prætorè impetrare potest, ideo probè & absque omni præjudicio singula accuratè circa vulnus insitum examinanda sunt, diuque deliberandum, quod de lethaliitate semel statuum est. Nobis displicet distinctio ab omnibus recepta, nempe inter vulnèra *per se* & *per accidens* lethalia. Si vulneratus moritur sympto-

*Prognosis  
Vul-  
nerum.*

matibus dirioribus; quæ necessariò vulnus sequuntur, cur dicetur tale vulnus per accidens lethale, cum enim vulnus tale non fuerit inflatum, eger non mortuus fuisset. Carnifex vulnera infligit per se lethalia, uno istu mortem inducens: meliori ergò jure, respectu grauiorum symptomatum vulnera possunt dici valde periculosa. Qua de causa enim vulnera cordis, cerebri, vesicæ &c. per se æstimanrur lethalia? certè quod tendinosæ ac membranosæ, ac nervosæ, item vasa diuersa fuerint læsa, liquorumque hinc effusiones, irritationes, hæmorrhagiones, convulsiones, deliria concitata & tandem mors oboritur. Contraria tamen testatur experientia & Autopsia edocens, quandoque stupendas fieri curationes, & generosum Medicum nunquam difficilimis in casibus terri debere. Sic visum est cordis vulnus non lethale in demortuo, ubi in cordis substantia musculosaciacatrix observata fuit ab inflatu ensis ante plures annos factò. Nec in simplici & absoluto lethaliæ temporis habenda est ratio, cum vulnerati in corde aliisque visceribus & partibus nobilibus quandoque ad diem undecimum, quandoque 15. & plures adhuc supervixerint, profecto non video, quomodo hæc vulnera & absolutè & simpliciter sive semper mortifera dicenda sint: confer *Prechlinium*, *Bonettum*, *Vilhelmum Rivam Chirurg. Roman.* Nos quoque Limburgi vulnus profundum cerebri observavimus sanatum. Sic quoque vulnus glande plumbea inflatum non fuit lethale, in *Ephem. German. Ann. 9. & 10. Obs. 85.* pari felicitate intestinum jejunum vulneratum sanavit ipse succus nutritius blandus in faucibus corpore existens, in *Zodiac. Gall. Ann. 1. Obs. 5.* adde *Decur. German. Ephem. Ann. 2. Obs. Tulpi*, in quibus stupendas plures vulnrum sanationes admiraberis. Plura enim olim lethalia Vulnera nominabantur quàm hodie, ubi dies diem docuit, & vulnera quadam tot retro seculis

pro lethiferis habita, nunc non nisi certis positis circumstantiis sunt mortifera. Ex quibus omnibus patet Vulnera Cerebri non nisi profundiora, nervorum principium & nervos alios attingentia, vel cum lethaliibus symptomatibus sociata, lethalia fore. Vulnera etiam cordis profundius acta nervos, atque magna arteriosa ac venosa vasa lædentia, item vulnera spinalis medullæ non procul à cervice inflata, nec non vulnera diaphragmatis in parte nervea, ut & vulnera arteriarum magnarum, venarum cavarum, vel etiam venarum arteriosarum venosarum non procul à corde illata lethalia sæpe sunt: ut & istus intestinum tenuium, ubi multa vasa sanguifera concurrunt, in hoc casu sanguis aliique succi effunduntur, & æger mori cogitur. Vulnera vesicæ & ventriculi majora, & in parte nervea inflata, majorumque tendinum nerveorumque cum dirioribus symptomatibus ex necessitate lethalia censerì possunt, & sunt periculosissima. Vulnera quoque hepatis, lienis, pancreatis, diaphragmatis in parte membranosa, item fibrarum plurium in abdomine contentarum, ut plurimum sunt periculosissima imò lethalia. Idcirco necesse est, ut inspectores Vulnerum in Anatomico Studio ritè sint versati, texturam, constitutionem, connexum, situm, & usum partium internarum probe sciant, Cadaver etiam cautè aperienti & sollicitè inspicienti modum calleant: præterea in vulnerati ætatem, statum pristinae sanitatis, vulneris modos & figuras, instrumentum, quin & posituram corporis in qua tum temporis Vulneratus læsus est, atque insuper in omnes illas circumstantias & accidentia, quæ in ipsa vulneratione, & ab ipso vulnerato, tum ratione curæ, & diætæ, ut & quoto die acciderint, anxie inquirent: & quæ ulterius scitu necessaria sunt ex actis à Iudice loci collectis petant, singula attendant trudentque. Unde manifestò patet, non cuius

Barbitonfori, aut Balneatori, aut Carnifici soli Vulnerum inspectionem aut Cadaveris apertionem tutò committi posse, sed artis probè peritos Medicos ac exercitatos Chirurgos consulendos esse, videantque illi Judices, quomodo conscientia suæ consulant, qui contingente graviore vulneratione, aut etiam non necessaria, si quis vulnegratus demortuus est, Cadaveris apertione & inspectione, imperitos & quemcumque tandem proximè habitantem Empiricum ad inspectionem vulneris ac curationem Vulnerati, apertionemque demortui requirunt. Etenim quomodo quæso accuratam, legitimam, ac juxta leges artis institutam inspectionem vulneris; aut apertionem Cadaveris, aut etiam æquum super lethaliæatem vulneris judicium expectare poterit Judex ab eo qui arti nunquam studuit. Hoc tamen non obstante, quantum hoc in passu toto die peccetur, optimè norunt Collegia Medica, utpote quæ hujusmodi à Barbitonforibus, & Balneatoribus & Carnificibus commissos errores, atque absurdas sæpe relationes vix satis detestari possunt. Materia hæc meretur ut intimius examinetur, nobis verò hæc vice non liber, testinandum enim nobis est ad reliqua prognostica, in qua prognosi ritè formanda observandas sequentes regulas experientia & rationibus sancitas, nobis præfigimus, ex quibus periculum hauriri potest. 1. Loco sit *pars læsa*. 2. *Vulnus ipsum*. 3. *Ipsius cura*. 4. *Vulnerati persona*. In parte læsa præprimis considerandum qualis illa sit, an nobilis, & qualibus partibus solidis & fluidis constet, & an ad vitam simpliciter necessaria sit nec ne? an majora vasa, nervos ac tendines habeat? In vulnere ipso videndum & sciendum est, quo instrumento id factum, an venenatum, an verò minus, an cæsum, punctum aut contundendo factum, explorandum quoque est, an vulnus sit magnum, transversum, profundum, an in ipso plures fi-

bræ, arteriæ, venæ, tendines, ac nervi discissi ac lacerati fuerint, quæ necessario & inevitabiliter graviora post se trahunt symptomata, ex. gr. hæmorrhagiam nimiam, dolores, vigilias, subitanæ inflammationem, Gangrænam, Sphacelum, deliria, convulsiones, &c. In *Cura* observandum est, an remedium adsit applicandi possibilitas nec ne? an Chirurgus peritus in promptu adfuerit, an iste cum Medico nihil auxilii & remedii omiserit, aut uterque vel ambo inter operandum aliquid erroneum commiserit. In *persona* Vulnerati pendendum est, an ante acceptum vulnus sanus fuerit nec ne, an nullum in Diata commiserit errorem, an ex præscripto Medici vixerit.

In genere vulnera punctim inspecta plus alunt periculi quàm quæ cæsum facta sunt. Vulnus cum intensa febris inflammatoria, dolore, convulsivis motibus, monstri quid alit, imprimis si ab initio Vulneratus se rite habuerit, & citra causam aliquam manifestam externam ruat in deterius. Vulnera Nervorum aliquando bona apparent, sed ex improvviso invadit Vulneratos convulsio, hinc infida sunt, si materia serosa effluat instar feri, (*wie Molken*) vel si lactea instar albuminis ovorum vel aquea, dicunt Chirurgi id esse *das Glied, verassen*: cum verò nostro judicio vel succus nutritivus vel lymphæ ex valis lymphaticis discissis emanans est. Si nervus, aut tendo, aut arteria aut vena, si in totum fuerint recisa, minus intendunt periculum, quàm si tantum ex parte fuerint dissecta. Vulnera hæc nervorum, item tendinum aliarumque membranarum gravioribus stipata symptomatibus sunt periculosissima, & ut plurimum lethalia. In vulneribus pus laudabile & maturum, seu concoctum ut vulgo dicunt, mox apparens, sicuti testimonium sanguinis succique nutritivi ritè dispositi perhibet, ita brevi sanationem pollicetur. Tempore æstivo, & qui-

quidem circa dies caniculares, nulum vulnus quamvis exiguum in subiecto cacochemico feu scorbutico superficialiter tractandum, cum eo tempore ex parvo vulnere magnâ oriri possit calamitas, prout id pluribus comprobare possum exemplis; Succus enim nostri non tam multis gaudent spiritibus, quia quia tum temporis calidissimi per apertam portam puta cutis spiracula evolvant, & sic sanguinem nostrum reddunt debilem & imbecilem, hinc & ipsa pars suis caret spiribus, & sic mixtura turbatur & inordinata fit mixtio, unde sæpe Gangræna ac Sphacelus natales suos habent. Sic videmus cerevisiam quoque diebus canicularibus facilius accescere quàm hyeme. Nimirum etiam frigus Vulneribus etiam obest-adeo ut Nobis persuadeamus, si aer à vulnere arceri possit, vulnus sponte iterum cœniturem esse. Frigus enim obstructions parit coagulando succos in vulnere existentes, impedit transpirationem intraslando omnes succos, hinc sæpius inflammatio, Gangræna, livor, &c. ortum suum habent.

Si in magnis Vulneribus & pravis tumor non appareat, id ingens portendit Veteribus malum, quod tamen nostra experientia falsum est, melius enim est nullum adesse tumorem, denotat enim partes fluidiores posse circulari, nec tot discissos esse canales. Vulnera quo diutius aeri exposita sunt, eò facilius sphacellantur. Vulnera à sclopeto. intus illata plus damni inferunt quàm alia, non verò propter imaginariam illam ambustionem, quam à glande fieri plures persuasum habent, aut ob variarum fibrarum, aliorumque canaliculorum fortiorum contusionem, & subitanam earum discissionem. Nisi enim is qui bombardam explodit, admodum vicinus sit corpori læso, ita ut flamma pulveris pyrii attingere possit, nunquam ambustio animadvertitur: hinc montes aureos frustra pollicentur illi, qui ar-

cana sua nescio quæ antipyretica contra ambustionem crepant jactantque. Vulnera venenata sæpius sub pelle vulpina ex insidiis suam exercent atrociam, & si in aliis, certè in iis momentum temporis, à quo magni exercitus clades hoc tempore sæpius dependet, reverenter habendum, cum præsentia tempora, uti olim, teste Curtio apud *Alexandrum*, & signes Medicos & lenta remedia non expectat. Vulnera quorum labia maximè disjuncta sunt, ut in rotundis vulneribus videre est, difficiliora sunt curatu, quàm eorum quorum labia faciliè conjungi possunt, ratio in promptu est, quia tubuli sibi propius accedere & sic accrescere possunt. Malum signum habetur, si convulsiones *Vulnus* comitantur, denotat enim lacerationem & contusionem majorum nervorum, ita tamen factam, ut istæ fibrosæ partes non planè discissæ, sed tantum punctæ fuerint, unde circulatio succorum immineatur, & per consequens inflammatio, gangræna &c. aliaque symptomata producantur.

Vulnera Sclopetorum summam etiam spirituum & sanguinis perturbationem inferunt, semper enim aliquid de ipsa substantia aufertur, sic quoque est semper Vulnus compositum, vix enim tranfir globulus cutim, ut non nervos, tendines, fibras atque varios cum contusione maxima tubulos lædat. Vulnera sclopetorum sunt vel cum vel sine ossis fractura: illa sunt periculosiora & curatu difficiliora, hæc verò non tam periculosa. Vulnera quæ cavitatem insignem penetrant, ut caput, pectus, ventrem, sunt periculosiora quàm si transirent partem carnosam.

Vulnus ab acu lethale observatum est, testantibus *Ephemerid. Germ. Ann. 3. Obs. 319.* Sic dum hæc scribimus, quidam duorum digitorum unguibus comprehendit mamme alicujus foemine partem, & fortiter comprimit, à qua pressione tumor urgens exortus est, qui

tandem exulceratus, & metus erat, ne cancer ipsam corripiat. Vulnere nervorum, ceu diximus, vix sanabilia sunt, instituimus sæpius in canibus experimentum, quibus nervos recurrentes ab utroque latero cultro dissectavimus ad omnem vocem vel sonum eis adimendum, altero tamen die vel tertio canes sic vulnerati utplurimum sine voce moriebantur.

Vulnus à sefe rabida Vetulæ cuidam inflictum non tantum maximam inflammationem, sed & gangrænam acceffit illi, quæ tamen congruis infra dicendis remediis feliciter curata fuit. Vulnere aliàs à rabidis animalibus inflicta periculosissima sunt, accidit sequens exemplum hoc anno. Puer 17. annorum auceps avium Orelans dictarum, ante 4. mensium spatium à cane rabido mordetur in manu, quo morsu lacto assumit theriacam & bene sudavit, vulnerique congruis etiam prospexit remediis, ut citè consolidata fuerint vulnera parvula. Quid sit? puer iste hisce diebus absque ulla data causa de cordis anxietatibus maximis conqueritur, & prorsus nihil deglutire potuit ob spasmus, & sic intra 24. horarum spatium absque ullo alio obveniente symptomate mortuus est. Sic sæpe seamenta ista venenata in tubulis diu latere possunt, data verò occasione facile sanguinem nostrum coagulare & mortem accersere possunt. Idus etiam vesparum & apum aliorumque animalium insigunt etiam vulnera, quamvis minima, attamen utplurimum pungunt corpora compactione ut sunt partes fibrosæ, tendinosæ ac membranacæ, hinc etiam oriuntur atrociora symptomata, ut sunt inflammatio, convulsio, gangræna ac nonnunquam ipse sphacelus. Nuper balneario quidam hujus civitatis venam secuturus loco venæ nervum tetigit, à qua punctura atrocissima symptomata, ut, Inflammatio, gangræna, sphacelus ac tandem ipsa mors subsecuta est.

§ 12. Atque hæc quidem de Pro-

gnosi in genere dicta sunt, cum Vulnere particularium prognosin suo loco jam dixerimus, restat ut Dietam paucis etiam attingamus. Ante omnia vitandus est aer, quicumque enim in vulnere attendus est, qui solus ita poros vulneris destruit potest, ut Gangræna aperiantur fores. Si enim recens Vulnus in momento constringi possit, ut nec aer externus irrueret, nec amplius quid è vulnere efflueret, à solo liquore nutritio dulci fibris aliisque canaliculis ruptis appposito consolidaretur. Maxime enim aeris habendus est respectus, qui sæpe quid in sinu gerit quod Vulneribus infensum est, uti constat ex obsidione Insulæ Candiz, ubi Christiani tum temporis levissime vulnerati, quicquid etiam adhibuerunt Medici ac Chirurgi, obierunt. Contrà Æthiopes ad caput bonæ spei habitantes gravissimis Vulneribus nil applicant aliud quam sebum ovillum, quod calidum Vulneribus instillatum, ea feliciter curat, nimirum aerem jam ingressum expellendo & recentem non admittendo. Inprimis verò vitetur aer frigidior ac calidior, & sit potius temperatus, pessime enim consulunt sanitati egrorum suorum illi Chirurgi, qui sæpius Vulnera detegunt & æticipiunt.

Videtur sit tenuis, boni lacteique succi, hinc enim generatur optimus chylus qui vulnere est balsamus universalis, & quod Veteres *Natura* adscripserit, id Nos huic succo nutritio adscribimus. Angue pejus fugiantur omnia acida & salsi saccharataque, eò enim semper respiciendum, ut succus nutritius dulcis ac fluidior generetur. Conducunt ergo omnia hordeata, aliaque jussula cum succo Chetefolii, Veronieæ, Beccabunge, Portulacæ aliisque eò, item convenienti varia aromatica. Malè ergo Veteres in Vulneribus commendaverunt dietam frigidiotem, inde enim magis

incrass-

ineraſſantur ſucci & functiones reliquæ impediuntur. Vulnereſ ſemper alimenta calida den- tur, imprimis, ſi febris adeſt, in hoc enim caſu frigida maxime nocent.

Potus non ſit liberalior, ſed moderatus, cereviſia ſit tenuis ac rite defæcata & herbis vulnerariis maricata, vini generoſi uſus præſertim in aſſuetis non planè interdicitur, uti fecerunt Veteres, eligatur dulce vel Gallicum vel Hiſpanicum vel Hohtadienſe crudiori Tartaro non abundans, nec adeo acidum, ut ſunt quædam vina Rhenana.

Sed Vinum optimum non ſumatur menſuratim, aſt cochleatim, ſic enim vinum ſanguinem & ſuccos noſtros corroboret, & hic multum conſuetudini dandum eſt, ſi enim ſucci noſtri ſingulari gaudent mixtura particularum vinoſarum, iſdem & ſuſtentari volunt, ex. gr. ſi enim quis vino aduſto aſſuetus ſit, & una vice id intermit- tat, certè maximum vitæ periculum incurreret, ceu pluribus exemplis demonſtrare poſſumus. A ſolo lactis potu calido periculoſè vulneratos bene habuiſſe hæctenus obſervavi- mus, imprimis ſi porus Theæ fuerit commixtus, vel ſolus potus Theæ vel Caſſiæ, vel Veronicæ aliſque herbæ Vuluerariæ conducet.

Somnus & Vigilæ mediocriter ſe habeant, ſomnus tamen ſit libera- lior, magis enim convenit quàm Vigilæ immodicæ, Æger non decumbat in latuſ laſum.

Excernenda aſſumptis reſpondeant quantitate, & juſto excernantur tempore. Vitentur præprimis in Vulneribus animi paſſiones, nocent enim ira, mœror, Venus, quæ exiſtunt ſanguinis, ac imprimis ſucci nervi coagulatores maxi- mi, quæ eapropter ceu peſtis ſu- gienda ſunt: ſic & riſus vitetur, cujus noxam vide apud *Hildanum Cent. 1. Obſ. 15. pag. 26.* Maxime enim, ceu dictum, ab animi paſ- ſionibus coagulantur ſanguis ac ſucci corporis reliqui, qui coagu-

lati quam tragadiam producant, Medicis omnibus jam notum eſt, imprimis in Vulneribus, ubi om- nes ſucci liquidiores ac fluidiores eſſe debent, ut eò citiùs per canali- culos minutiffimos fluere & reſlue- re poſſint, hinc enim ſit conſolida- tio Vulnerum, à ſtagnatione ve- rò & coagulatione è contrà ſunt inflammationes, tumores, ulcera & alia plura mala, alibi ad naſeam jam dicta.

§. 13. Perſpecta *Diætâ* nunc or- do nos jubet accedere ad *Curam* *Pharmacenticam* ac *Chirurgicam*, prius ergo *Veterum de Vulneribus* audiamus curandi rationem, quæ juxta ipſos conſiſtit in laborum diſ- junctorum reunione, ut illa, quæ per diſiſionem plura ſunt facta, unum ſiant per unionem, quam du- pliciter fieri aſſerunt, vel à *Deſtra* *Natura* vel à *Medico*. *Naturam* di- cunt id facere tanquam agens præ- cipiûm, & tanquam cauſam effi- cientem, alterantem, regenerantem, alentem, niſi fuerit impedita; *Medicus* verò ſecundum eos ſaltem tan- quam miniſter naturæ, impedimen- ta removet, atque ita ſecundariò curat: quod ut faciat, debet primò efficere, ne quid extraneum in *Vulnus* incidat; ut ſunt pili, pul- vis, oleum, quod conglutinationem impedit: ſecundò ut, ſi quid inciderit, tollatur, ut ſunt ſanguis grumi, oſſa, terra, &c. quæ ſi abſque ægri interitu demi poſſint, demenda eſſe ajunt, idque biſariam, vel iſtrumentis vel medicamentis. In telorum extractione diligenter attendunt eorum figuram & par- tem cui affixa ſunt, & quàm pro- fundè hæreant: *Inſtrumenta* telis extrahendis apta dicunt *roſtrum corvini*, *forſipes*, *novacula*, *cera- bras*, *impellens caruum*, ſeu *perpulſo- rium ſeminum*, & *perpulſorium ma- rem* &c. Medicamenta, quibus ex- terna tela ſcilicet ſpinas extrahunt, ſunt emplaſtrum diadiſtammum, ſapo niger, rad diſtami albi, ari- ſtoloeh. rotund. cum melle mixta, arundinis, radix thapſiæ, ſagape- num, ammoniacum, lignum viſci

*Curatio  
ſecundum  
Galenicæ  
Vulnorum*



quercini, succinum, magnes præparatus &c. ex quibus parant emplastra, vel unguenta vel cataplasmata. Extractis & remotis iis, quæ curationem frustabantur, partes disjunctas reuniendas esse consulant, labia Vulneris æqualiter & comitanter conjungendo, quod Medici potius quàm Deastræ Naturæ beneficio perfici ajunt, Fieri autem reunionem contendunt, vel vinculo ex duobus initiis circumdato, vel ligatura sola, vel sutura, vel fibulis impositis, aut horum quibusdam emplastris glutinantibus, omnem, quantum fieri potest, dolorem præcavendo: futuram plerumque fieri debere statuunt in partibus mollibus. Eodem respiciunt ut partes debito situ, pulvinariis, fasciis, aere competenti conserventur. Veteres de conservanda partis temperie in Vulneribus maximè solliciti sunt, hæc enim conservata vulnera facilius conglutinari & sanari dicunt, cum solius sit temperamenti & naturæ opus: Necessè esse proinde ajunt partis conuiri & siccitatem in suo gradu continere, quod fieri dicunt optimo instituto victus ordine, pharmacacia, phlebotomia & Topicis medicamentis, inter quæ siccantia, moderatè refrigerantia & adstringentia commendant, ut nempe suppetfluæ humiditates absorbeantur. Refrigerantia concentrare ajunt calorem & unire: Astringentia verò corroborare & repellere, laxitatem parti adimendo, quæ ad humorum receptionem plurimum facere assunt: Glutinatione enim & inviscatione opus esse monent, quæ plurimum corporum unionem per mixturem partium procurat.

Vinum nigrum stypticum seu austerum astringendi, & siccandi vi vel facultate pollere dicunt, item sequentia, ut sunt, succus millefolii, anagallidis, plantaginis, fol. fascicum, vesicarum ulmi, cupressi, equiseti, pulv. sangv. draconis, boli armen. cort. granat. balustiorum, gallarum immat. rosar. rub. corall. tub. lap. hamatit. terr. sigillat. fantal.

rub. mast. sarcocoll. aloë &c. ex his plura componunt medicamenta & magnificiunt empl. diapalm. de cerussa, ungu. atreum, citrinum, basilicum & partis robur conservandum ex iisdem parant varia defensiva, qui superiori parti membri, ad impediendum humorum affluxum applicant. Purgationem quoque Veteres in Vulneribus magnis suaserunt ob revulsionem, si nempe partes superiores fuerint læsæ, per inferiores partes corpus evacuant, & prout humores maximè peccare videntur, & patientis temperamentum indicat, ita & purgationem esse dicunt: Si nempe biliosi redundant humores, cholagoga, si melancholici peccent, melanagoga exhibent. Hippoc. & alii in Vulneribus (non verò sine periculo) scammonium promiscuè adhibuerunt. Quod symptomatum Vulnerum curationem attrinet, si dolor oriatur à calida intemperie, & post illam frigida, calidam intemperiem corrigunt decoctis, vel aqua vel succis refrigerantibus, ut decoctis, aqua vel succo solani, lactucæ, endiviæ, ros. violarum, nenupharis &c. sæpius applicatis, vel albuminibus ovorum benè conquassatis cum oleo rosaceo, iisque madefactis linteis sæpius adhibitis. Frigidam intemperiem contrariis curant: utpote coquunt salviæ, rorem marinum, folia lauri, lavendulæ, majoranæ, &c. in vino generoso, & applicant, madefactis in eo inteolis, vel spongiola in oleo vulpino, chamæmelino, de spica, lumbricorum & similibus intincta superligant. Si veneni adsit suspicio, hæc semper alexipharmaca & venenum attrahentia commiscunt, si verò corpus quoddam extraneum dolorem excitet, ut v. gr. grumi sanguinis partem distendentes, fluxiorem revellendam esse ajunt per venæsectionem; si alia qualiacunque, hæc quamprimum removenda: eodem modo si à vinculis, vel futuris excitetur dolor, illa laxanda esse dicunt, has verò tollendas.

Si

Si quantitas puris dolorem faciat, huic exitum per dilatationem procurant. Anodyna interdum adhibent, ut oleum nenufarinum, de mandragora cum pauco opio, & castoreo ad corrigendum frigus: vel contundatur solanum cum radice, & cum axungia suilla bulliat fiatque unguentum. Medullam panis cum lacte vel aqua ferventis costam ad modum cataplasmatiss apponunt.

Si inflammatio vulnere supervenerit, huic quantocius occurrunt, recurruntque ad venæsectionem, deinde contundunt malum granatum dulce in mortario, & affundunt vinum stypticum dulce, parantque ex his cataplasma quod apponunt. Si Erysipelas vulnere accidat, purgant vel corpus, vel cataplasma ex succo solani, & farina sem. lini, in ipsum autem vulnus digestivum sequens vel simile imponunt.

*℞. Terebinth. opt. aq. solani aliquoties lota ℥i.  
farina hordei vel lini ℥i.  
vitell. ovi No. i.*

Agitant bene simul, & efficiunt linimentum. Si consulti contingit vulneribus, & quæ sit secundum eos ab inanitione, Topica varia eligunt, & hydrauleum applicant calidè: item ol. amygd. dulce. rosac. violac. lil. alb. pingued. anserin. anatis, butyr. recens. In Vulneribus superficialibus sequentem commendant pulverem aglutinativum, albumine ovorum exceptum, & appositum.

*℞. Boli armen.  
aloe hepatis.  
Olibani  
Myrrhæ  
Masticis  
Sarcocoll.  
tragacanth. aa. ℥ β.  
farin. hordei  
fabar. aa. ℥i.  
M. F. pulvis.*

Exsiccata lintea semper vino medicari volunt, carnem verò generantia, vel debilitèr exsiccantia &

abstergentia sunt mastix, olibanum, colophonia, farina hordei, scænum græcum, aloë, resina, vinum rubrum. Mediocria verò sunt farina lupinorum, orobi, fabarum, aristolochia utraque, iris, ungu. basilicum minus, de betonica, de cerussa, aureum, de matrisylva. Maxime autem talia dicuntur limaces usti. plumbum ustum, myrrh. centaureum minus, unguentum Apostolorum de tutia. Primò ergò Galenici vulnus abluunt vino calido, & concoquentia adhibent, qualia sunt ex vitellis ovorum & terebinth. digestiva dicta: secundò detergentia quæ parant ex melle, vel syr. rosaceo, farina hordei, fabar. hisce factis ad sarcotica deveniunt, deinde cicatrizantia applicant, qualia sunt cinis cotii ussi, galla immatura, malicorium, balauſtia, acacia, sumach, bolus armena, cerussa alba, plumbum ustum, pulvis arnoglossæ, ungu. de cerussa, de minio, de lithargyrio, sangu. traconis, terr. sigillat. pulv. rosæ. santal. rub. Si cicatrix eminens fuerit, scarificant, deinde erodunt & alumen ustum adhibent, vel eminentiam novacula exciunt, vel pondere laminæ plumbeæ reprimunt.

Supercreſcentiam carneam tollunt corrosivis calidis in quarto gradu, acribus & absterſivis, talia sunt Chalcitis, misy, sory, chalcantum, ærugo, alumen ustum, rad. asphodeli, trochisci de calce idem faciunt, sed mitius spongia & stupa cannabina minutim incisa, linamenta antiqua muria imbuta & exsiccata.

Curationem *Vulnorum* à morsu vel istu venenatorum animalium illatorum dicunt esse debere extemporaneam, antequam vires proſternantur, instituunt sortem ligaturam, ne venenum cor petat, cucurbitulas siccas, si earum pars sit habilis, applicant, vel cauterium actuale vel potentiale, vel Theriacam cum aliis, capis vel Theriæ gentianæ apponunt, si magnus adsit dolor post cucurbitularum ad-

motionem, gallinam per medium sectam, vel omentum hēdi, procelli, vel agni adhuc calens superligant. Interea vitalem indicationem minimē negligunt, sed Theriacā 3ij. in vini generosi 3 iiii. dissolu. & exhibent vel.

*Bu. pulv. canceror. fluyiatil.*

*magnet. ppt. aa. 3 β.*

*Aq. scordii.*

*pimpinell.*

*vini albi aa. 3 i β.*

*Syrup. de succo citri 3 β.*

*M. F. potio.*

Item Theriacam diatesseron in vino dissolutam propinant, etiam theriacam in oleo rosæ dissolunt & in vulnus linamentis intrudent, item assinant scordium, centaureum minus, terram lemniam, pulv. cancerorum fluyiatilium, dictamn. &c.

In vulnere nervorum à punctura cæca, ut dicunt, instrumento subtili facto, egere ajunt dilatatione & interdum omnimoda incisione: si verò punctura non fuerit cæca sed aperta, tunc adhibent dolorem mitigantia simul & abstergentia, ut sunt oleum vetus calens thebeinth. hyperic. lil. alb. vlpinum, de castoreo, ovorum, quæ bis de die applicant. Membrum quoque vulneratum foveri jubent hydrelxo calido, ita tamen, ut semper ante refrigerationem depnatur & renovetur fomentum, vel emplastro vulnus inuniant, seu ce-rato ex cera terebinth. & pice facto, inuncta tamen prius oleo tota parte: semper verò ab acribus cavendum esse ajunt.

*Paracelsus*  
*cura in*  
*Vulneri-*  
*bns.*  
§. 14. *Paracelsus* Tyrones suos in curatione vulnerum ita docet, ut prius sciant quamnam sit efficiens causa curationis Vulnerum, eam enim conveniens medicamentum indicare posse dicunt; statuit ergo, Deastram naturam corporis, carnis, ossium, nervosarumque partium radicalem ac congenitum balsamum in se continere, qui vulnera, puncturas, omnemque continui solutionem curandi facultate præ-

ditus sit, quod sic intelligendum vult: Balsamus naturalis in carne reconditus, carnosum vulnus sanat. Sicque secundum Authorem omnis humani corporis pars curationis efficientem causam, i. e. naturalem Medicum in se continet, qui ipsius continuationem solutam denovo conjungat. Non Chirurgum sed Balsamum hunc vulnera curare ait, definit itaque Chirurgum custodem naturæ (balsami radicælis) ab actionibus externorum elementorum. Pus in vulneribus detentum aliud à putredine esse vulneris dicit, aliud à nutrimento medicamento, quod excrementitium pus dicitur. Monet quoque Chirurgo, ut vulgatum suendorum ac albumine ovi oblinendorum vulnere morem abijciant; tanquam naturæ adversissimum: Curationis internam causam intuentam esse vult, exterius verò vulnus mundum seryandum esse præcipit, & ab iniuriis tuendum. Hanc namque veram esse curandorum Vulnerum methodum arguit.

Deligandorum Vulnerum rationem tum in recentibus cum inveteratis plagis commendat maximè, aptam namque ligaturam mirificè in inveteratis prodesse scribit, recentia vulnera à symptomatibus præcavenda esse ait. Vulnus itaque vel mundum antea, vel jam demum mundatum, singulis diebus bis deligandum vult, præcisè semper duodecim horis interpositis; post duodecim enim horas cujusvis medicamenti actionem, & nutritionem elanguescere statuit; ex quo vulnus ipsi postea paulatim in deterius prolabitur.

Suturas rejicit author, dicitque, Naturam ipsammet vulnus fieri ac conglutinare, medicamentis enim legitime adhibitis nervos, ligamenta, tendines, cutem, carnem naturæ suenda ac glutinanda relinquit. Hinc suenda rationem non solum ut ab arte alinam, sed ut dolores, & fluxiones concia-

tantem improbat, & dolēt tam inartificioſam operationem inter artis ſecreta numerari. In quarum locum Author ſubſtituit pulveres glutinatioſos ac aquas collecticas.

Deligaturus initio Vuluſ, primum omnium ipſum oleo vel balfamo vel unguento vulnerario teodis, una cum his, quę in iis intabuerint, implet, dein Emplaſtro Stictico impoſito accuratē deligat, circa vulneris autem regionem eadem ipſa adhibet, vel oxyrrhodino ipſum membrum irrigat, & iſtud continuandum præcipit in novem vel octo dies, prout vulnuſ ipſum magnum vel parvum exiſterit: immutat autem ſeu iterat ſingulis duodecim horis. Iſtis ritē perfectis, majore cura nil opus eſſe ait, niſi vulnuſ admodum aniplum ſit, vel in quo tendo vel ligamentum aliquod vulneratum majora ſymptomata minetur: ubi vulnuſ punctim ſiſtum eſt, Syphone oleum aliquod ex prædictis injicere jubet, vulnuſque curat.

In Vulneribus ſacriſicationem vel venæſectionem naturę oppreſſę ſubvire ait, ſanguinis verò inmodicam proſuſionem culpāt, quę ſapē dyſpnoęam, quandoque hydropeꝝ alioſque tumores effeciſſe notavit.

Author in Vulneribus ad purgandum ſanguinem Aquam Cichoreę & Camedryos exhibet: hæc enim ſecundum ipſum, omnem ſanguinis noxam tollere aptę ſunt.

Vulnerariarum potionum facultatem in eo conſiſtere ait, ut auxiliante natura, intrinſecus omne vulnuſ tam caſum quā punctim illatum percurare poſſint. Potiones enim hæc natura ceu alimentum recipit, cui quę ineſt medicamentoſa vis non reſpuit à natura. Potiones hæc vulnerarię, juxta ipſum, conſervant naturale temperamentum, omnemque intemperiem corrigunt, adhęc naturę ſic alunt, ut planē niſi ipſa præterea deſideret. Simplicia ex quibus potiones vulnerarię Author parare ſolet, ſunt ſequentia: Sanicula alba, ſilveſtris, alchimil-

la, dracunculus, ophiogloſſon, ſapo, ſeneſca ſerpentiſ, trifolium, conſolida media, telephium, paſtinacę ſativę alterius herba, limonia utraq;e, mumia, ſperma ceti, noctua, terra ſigillata vera, Rhabarbarum, Buxi, folia, Cyclamen, Periclymenum, Tuber, Ariſtolochia, Agrimonia, Symphytum, Perſicaria, Beta utraq;e, pavonis pennę, polytricum aureum ſive Apuleji, lilium convallium, id eſt, Ephemerum non lethale. Inter hæc tria eſſe dicit, quorum ſucco epoto, omnia vulnera ac puncturę curentur. Item duo notata eſſe, quorum utrunque prius aquę intinctum, ſi vulneri imponatur, ipſum vulnuſ prius glutinari, quā herbę computreſcant. Eſtque & unum ex his, quod ter potum vulnera, omniaque Vuluſum Symptomata glutinare ac tollere efficaciſ eſt. Vinum cum nonnullis prædictis herbis in cantharum imponit, ac commiſſuris vaſis probē circumſiſtis in duplici vaſe decoquit, ſic enim de vini ſubſtantia ac viribus non ſolum nil perditur, ſed & in illud omnis facultas herbarum decoctarum tranſit. Deligit vinum antiquum album, tenue: vitandum autem eſſe ait rubrum ac craſſum. Poſſunt ad mentem Authoris vindemiarum tempore, ſine coſtura, potiones tales parari, ſi herbę enumeratę in muſto deſcuerint, ac poſt tertium menſem aliz recentis impoſitę fuerint, ut vinum omnem earum qualitatem induat, quod deinde abſque ulteriore præparatione, potionis vulnerarię loco dari poterit: cinnamomum hiſce decoctis adjicit, tum guſtuſ commendandi, tum reſtaurandarum virium gratia. Simili ratione alimenta vulneraria parat, ſi carnes vel pullos ac gallinas &c. cum aqua quantum ſufficit, adjectis herbis vulnerariis, in duplici vaſe decoquit, vel ſi aqua diſſoluerit, in vino bullire facit, ac dein gelatinam parat: hujusmodi enim alimenta mirum in modum

modum Vulnerum glutinationem adjuvare scribit.

Formulas potionum vulnerarium sequentes tradit.

℞. *Sanicula*

*Vinca pervinca*  
*centaurea*

*Betonica* aa. M i.

*consolidæ vaginalis* M β.

*Agrimonia* M ii.

decoq.

Vel:

℞. *Ophioglossi* M iii.

*Alchimilla* M ii.

*Vinca pervinca minoris* M i.

*Periclymeni* M i β.

*Rhabarbari* ℥ i.

*Rhapontici* ℥ iii.

coq. ut dictum est.

Vel:

℞. *Angelica* ℥ β.

*Mumia* ℥ i.

*sperm. ceti* ℥ ii.

*glandium* ℥ ii.

*Telephii* M ii.

*Ciclamini* ℥ ii.

*Limonii utriusque* aa. M iii.

*Vini* quantum sufficit, fiat decoctio in duplici vase.

Alios quoque preparationum modos habet, si herbae in aquis destillatis intabuérint, ac postea in duplici vase coquantur, ex. gr.

℞. *Aqua limonii sextarium unum*,  
*herbarum limonii* M i.

*Diapensia* M β.

*Vinca pervinca* M β.

Fiat decoctio eo quo dictum est modo in cantharo. Baccas Juniperi, in quibus latere dicit singularem ac secretiorem quandam facultatem vulnera respicientem, sequenti modo præscribit:

℞. *Baccar. Juniperi contus.* ℔ ii.

*Limonis utriusque*

*Periclymenti radices*

*Diapensia alba* aa. M β.

*Ophioglossi* M i β.

*Symphyti*

*aristolochiae* aa. ℥ v.

*periscaria* ℥ iv.

Destillantur arte Chemica, aquæ destillatæ rursus immergantur herbae dictæ, cum Baccæ Juniperi cum cinamomo, & fiat decoctio in diplo-

mate vase benè occlusa. Similiter ex floribus vulnerariis cum spica parare novit pinguedinem quandam quam parva dosi, tam in cibo, quam in potu sumptam vulneribus prodesse memorat. ex. gr.

℞. *Fl. spica* M i.

*hyperici* M iv. β.

*verbasci* M ii β.

*Bethonica*

*centauri minoris*

*prunellæ* aa. M β.

parat id more solito.

Sequens universale dicit:

℞. *Rad. Symphyti* ℥ ii.

*aristolochiæ* ℥ iii.

*calami aronis* ℥ i.

*Ireos* ℥ β.

*herbæ vinca pervinca* M iv.

*sanicula alba* M β.

*pennarum extremitat. pavon.* ℥ ii.

*Myrrh.*

*Masticis*

*Thuris*

*Mumia* aa. ℥ β.

coq. in vino vel aqua communi, prout necessitas postulaverit.

Idem Author inter Topica Vulnerum cum antiquis, Græcis, Arabibus, Mauritanis, Aegyptiis laudat unguenta quorum corpora sunt Mel sc. & Butyrum, ea ratione, quod Apes & Boves omne genus florum ac herbarum exfugere & depascere vidcat, existimans iis varias herbarum facultates communicari: seq. ergo communicat formulas:

℞. *Bulyri maialis* ℔ i.

*Arnoglossæ*

*limonii utriusque*

*Betæ cum radicibus* aa. M i.

*Ophioglossi* M ii.

contendantur & permisceantur cum butyro & insolentur per menses aliquot, post percolentur ac servantur ad usum.

Diligit ipse efficacissima, ut sunt rad. Symphyti, Aristolochiæ, Ophioglossum, limonium & intestinalis terræ. & radices & herbas ex commemoratis quæ placuerint, eas adhuc virides contondit in formam pulculæ, postea affundit vini tantum ut paululum supernatet, coquit.

coquit in duplici vase Cantharo inclusa per horas decem, dein exempta rursus commiscet & percolat, ac adjectis mellificii apum recentis vel butyri quantum sufficit, mixtisque omnibus imponit in cantharo & coquit ut prius, cocta iterum percolat, ac prelo exprimit, denique Alembico indita insolat usque ad justam consistentiam & reservat ad usum, quod unguentum magni aestimat.

Ex resina laricea & abiegna etiam parare solet unguenta, ut:

℞. *Resinae lariceae* ℥i.

*album. ovor.* No. 20.

Agitentur bene ac subigantur, fiat unguentum colore subflavum, cui permisce

*pulv. rad. Symphyti maioris* ʒi.

*aristolochiae rotundae* ʒi.

*farinae bordei* ʒvi.

subigantur omnia & fiat unguentum perfectum in omnia Vulnera.

Aliud parat ex abiegna.

℞. *Resinae abiegnae* ℥i.

liquefiat paulatim & à sordibus perpurgetur, post ad jice

*Medulla vituli parum,*

*radicis symphyti vel*

*intestini terra tantundem,*

contundantur omnia & permiscuantur in mortario calido, & imponantur vulneri.

Olea seu Balsama Vulneraria magnificat Author, & quidem sequentia composita.

℞. *Corporis olei vel Terebinth.* ℥i.

*Camomilla*

*rosar. rubr.*

*prunella* aa. Mi ʒ.

*Hypericonis* Miii.

*Fl. centaureae*

*Chelidoniae* aa. M ʒ.

Mixta omnia ponantur ad Solem per duos menses. Hoc oleo seu balsamo nura se praestare dicunt in vulneribus praeter omnem dolorem, sequenti anno eosdem flores in eodem oleo denuò macerate jubet; Vel

℞. *Herbar. Ophiogloss.*

*Limonis minoris*

*Agrimoniae*

*Sanicula* aa. Mi ʒ.

*Hyperici* M ii.

*rad. Symphyti* M ʒ.

*Vermium terrest. mundatorum*

No. 100.

*olei vel terebinth.* q. s.

pro maceratione omnium sistantur ad Solem, ad tempus legitimum digestionis, & utere. Sequens vero Balsamum Vulnerarium praaliis laudat.

℞. *Olei olivarium* ℥ss.

*Terebinth. quarzar.* i.

*Fl. hyperic. q. s. ad implendum,*

*Fl. verbas. tertiam partem ad fl. hyperic.*

*Vini alb. generosiss. sextar. j. & ʒ.*

Decoquantur ad consumptionem vini, postea ad tempus legitimum insolentur.

Vernicem cum vino carabe, ac Mastiche percoquit, vel cum ex oleo & terebinthina destillatis conficit Balsamum: Medullas quoque cum dictis herbis permittas, ad Solem in oleosam quandam formam reducit, praeter tamen aliis humanam, post hanc cervinam, in harum defectu Vitulinam substituit, item caponis, gallinae, Thimalli.

Paracelsus etiam curant per Medicamenta expurgantia, vulgo mundificativa dicta, inter quae referunt salivam, hinc dicunt canes linctu vulnera sua curare, in vino decoquant aliquas herbas vulnerarias modico salis adjecto, eoque decocto, lavant vulnera, nec non aluminatas aquas; succum plantaginis ac chelidoniz, pauco sale adjecto, Vulneribus medicari dicunt; Paracelsus ipse Perficariam oculata vi vulnera expurgare experientia comprobavit.

In vulneribus & puncturis curandis author magnificat Emplastra, & praeter plura sequens longo usu comprobavit efficacissimum esse.

℞. *cerae virginiae,*

*olei vulnerari nostri* aa. ℥ss.

*lithargyr. auri* ℥i.

*plumbi loti* ℥ss.

*fiat Cerotum, cui adde*

*Ver-*



*Vernicis cum herbis parati lbß.*

*Terebinthina quartar. 3.*

*Gummi ac pulveris quicumque placuerint.*

macerentur cum Balsamo Vulnerario, ac fiat Emplastrum secundum artem.

Vel:

*℞. Olei olivarum lbj.*

*cera lbß.*

*libanogr. lbij.*

coq. in cerotum, cui adde

*Thuris: Mastice, Myrrh. aa. 3 ii ß.*

commisceantur, & adjice

*Minii 3 iii.*

pinse manibus extrahendo cum

*Camphora 3ß. in oleo anethino, vel*

*ex verbasco.*

Vel:

*℞. Olivarum olei lbj.*

*Masticis*

*Thuris*

*Myrrhe*

*Oppoponaci*

*Serapini*

*Storacis*

*Edelii aa. 3 i.*

coq. in formam, postmodum accipe

*Cera 3 i.*

*Calaminar. ppt. lbß.*

coq. in Cerotum, & pinse cum

*Camphora.*

Pulveres etiam Traumaticos in Vulneribus ac Puncturis sanandis maxime laudat Author. exempl. gr.

*℞. Thuris*

*myrrh.*

*masticis aa. 3 ß.*

*corall. rubr. 3 ii.*

*aloes epat. 3 ii.*

*M. F. pulvis.*

Vel:

*℞. Acacie, succ. Gall. immaturar.*

*succi Santicula,*

*clematidis*

*ophioglossi aa. 3 v.*

exsiccentur ad Solem, interim dum siccantur, adjice

*Gummi Ammoniaci perpurati 3 ii.* omnia exsiccata redigantur in pulverem.

Curationem quoque Vulnerum per Cælestes operationes fieri posse approbat, nec non sublimata

quædam ac destillata ad Vulnerum curationem commendat, quæ omnia hic recensere nimis longum foret. Nunc ergo *Symptomatum positionum Vulneribus* supervenientium Curam ex ipsius principiis addamus, & primò *Hæmorrhagie* curationem tradamus, quam ex ira vel Venere obortam vix curari posse asserit, nisi animus fuerit pacatus. Si in profundioribus punctiionibus ac Vulneribus à sanguine pus colligatur, illud expurgandum vult lavamento ex vino, myrrha & sale coctis ac per syringam injectis. Emplastrum ergo sisticum imponendum vult, ante omnia verò membra calida servare & ambiens frigus devitare præcipit. Paracelsi sanguinem cohibentia remedia sunt sequentia: *Crocus Martis* subtilissimè reverberatus, *Æs ustum* instar *Croci Martis* paratum, *Farina volatilis* inspersa, ut cum sanguine mixta obstruat, *pili leporini* & præcipuè sub cauda, *Muscus* craniorum cadaverum, *Carneolus* suspensus vel in manu detentus, *Cinistranarum*, *Hæmatites lapis*, *dysenterica remedia*, *lana seu Xylon* in putamine nucis alligatum Vulneri. Cælestem vero operationem non contemnit Author, quæ, juxta ipsum, *Characteribus* perficitur.

*Ad Sinoviam seu fluxum glutinis albi* sistendum Author utitur traumaticis oleis, unguentis ac Emplastris. *Ad phlegmonem* tanquam ad caput & calor & frigus referuntur, quibus deindurities ac decoloratio subsequuntur, omnibus istis unicam curationem competere ait, quæ sc. per *Jusquiamum* absoolvitur, vel *papaver*, aut *solium*: *Hyosciamo* quoque Author noster plurimum tribuit, pro conditione scilicet & occasione ægri, ac remedium. Sic quoque juber, & tanquam pro Canone curationis habet, ut membro vulnérato quies, corpori somnus concilietur. Formula vero remèdii talis est.

*℞. Rad. Hyosciami q. s. digeratur in aceto rosaceo ad Solem, fiat epithe-*

thema, in eo madeant petiæ lineæ, imponantur loco dolenti tepida, donec dolor quieverit.

*Sparium* verò vulneribus frequentissimè complicatum per ea quæ nervos confortant Author pellere studet, inter quæ primum locum obtinere arguit oleum terebinthinæ, quod primò profluit, tum oleum oliivarum, quibus locus affectus & partes adjacentes perungi sedulo mandat.

*Luxuriantes seu suppuriscentes carnis* curationem non opus esse eam singularibus remediis vel corrodentibus, ut alumine usto, vitriolo, vel auripigmento vel Mercurio sublimato absorbere, sed si vulnera ritè tractentur, facile eam sponte absunni putat.

Frequens quoque & illud esse ait, vulneribus glutinatis ea denuò rumpi, eaque postea *Carcinomata*, *Syrcen* ac *Fistulas* subsequi, quæ impediri posse scribit, si vulnus, priusquam primò delibetur, viridi oleo vitrioli ablatur.

Quin etiam juxta ipsum vulneribus curatis *deflexiones typicæ*, (i.e. quæ tempestatum ac motus Lunæ ratione periodicè infestant,) succedunt, ea facile sanari posse promittit facta evacuatione per pilulas Artheticas, habito quoque personæ respectu, tunc oleo laterino in vulnus infuso, si scilicet dolores succrescant. Sed quis omnia ea recensabit, quæ Author habet de vulneribus, integrum enim complent librum: meliora ergò dedimus, qui plura cupit ipsum adeat authorem.

*Helmontii  
Chirario  
Vulnerū.*

§. 15. *Helmontius* Naturas ipsas *Vulneris* Medicatices esse contendit, Medicum illius tantum ministrum, nec phatmacum in vulnere carnem gignere, sed fatagit si obstacula removerit, quæ aliàs unicuique armorum unguentum arcetè facis securè & opulenter promittit. Magnetismum hujus unguentis trahere ait peregrinam illam dispositionem ex vulnere, unde labia, nullo demum accidente prægavata sine dolore sunt, & mox accrescere festinant, nullatenus impedita.

Vulnera quoque Author odoribus per inunda applicatis miscere scribit. Juxta ipsum enim certum est, non ipsum unguentum, sed ejus saltem Odores introserpere & curare Vulnera. Pulverem cancrorum Vulneratis contusus ac ex alto præcipitatis proficere scribit. Sic quoque lapidem ossifragum in Vulneribus internis sanandis magni æst. mat.

Si vulnus sit recens, ac balsamo à corruptione munitur, non advenire pus contendit.

In Vulneribus putridis ubi multum puris latet, vel vermes conspiciuntur sunt, commendat Author omnem potionem vulnerariam, occultum Alkali, & quidem volatile, in se continentem, quod omnibus accidentibus ex corruptione natis resistit, quatenus Alkali quodvis omnem aciditatem, quam attingit, perimit. Sic nempe lapis cancrorum diureticus est & vulnerarius. Nam vino maceratus, post diem sapit lixivium. Docuit quoque Noster, quantumvis potus vulnerari cohibeat in extremitate pedis, puris fabricam, accidentiumque formidinem, non tamen idcirco potus vulnerarios potiri, quam alioqui reliqua phar-maca, juxta ipsum enim non materialiter ad vulnus properant remotum, hinc vulneraria fabricari in stomacho arguit. Herbas quoque vulnerarias operari virtute ejusdam innati Alkali pluribus ostendit, docetque nimirum, Mercurium tam præcipitatum quam sublimatum facile revivificari, imbibito per bullitionem succo clarificato vulnerarium. Unde consequens, herbas excellentiores in hoc gradu esse, quarum succus ille bullitus cum præcipitato & dein ablatus, facilis atque copiosius Mercurium revivificaverat. Quapropter & in medendo magis præcellere lapidem cancrorum ait, si cum vino, quam si in aqua potetur; eo quod is lapis in vino facillimè vim atque saporem lixivii induat. Hinc juxta ipsum

ipsum Medicus non abhorrete debet vini usum in vulnere, febre &c. Nam eo ipso, ut sapit Alkali, vini vires atque proprietatem amittit. Sic nempe propinat feliciter Alkali è tiliâ non secus atque pulverem canerorum. Vulnere artuum imprimis sanari per potionem inquit. Collocat quoque necesse omnem vulnere corruptorem arguit. Cum vulnera consolidatione egeant, per collam in vino solutam (est quippe è pellibus animantum parata) mox conglutinari promittit: præsertim si colla è corio hominis violenta morte, id est, integris viribus interempti sit. Ast alterationes Archei à profuso cruore, conceptaque vindictæ aut indignationis alterius idea, genitæ, quas proprio nomine sua vocat vulnera, & non aliena: sive quæ forinsecus infliguntur, non sola indigent discontinui conglutinatione, sed alterati Archei sedatione. Huc nempe spectant olea, balsama, Emplastra, quæ injurati Archei insiti, & localis, pacem conciliant. Quorsum nata sunt balsama resinarum, florum, herbarum: Itemque quæ parantur è minio, cerussa vel colocare. Huc etiam facere ait Sal Tartari per spiritum vini rectificati, donec adstringentem gustum nanciscatur. Est namque balsamus Samech Paracelsi. Vulnus difficulter curari scribit, si lunæ radii illuxerint illud, citò enim putrent omnia.

Helmontius noster vidit frequenter venenatorum: Vulnerum factas sanationes, alioqui penitus desperatas, succino dissoluto in spiritu vini applicato.

In omnibus vulneribus commendat remedia quæ sunt mansueta, & sedativa, quæ pollent aguntque virtute balsamica, quæ Archei insiti & injurati & localis pacem & quietem conciliant. Internam verò, eam jam diximus, potionem vulnerariam magnipendit, cujus nempe qualitas spiritualis esse debet Alkali occulti, & quidem

volatilis in ea contenti, talem autem esse statuit in lapidibus canerorum & ossifrago, in spiritu aceti dissolutis, vel in vino bullitis, 2. in herbis vulnerariis dictis, vino & aqua decoctis. Item in Alkali fixo etiam ligni Faxini & Tilie in lixivio assumto.

Externa Balsamica, eaque vel magnetica, eam diximus, magnipendit, imprimis Balsamum Samech: Paracelsi sanans quavis vulnera statim sine suppuratione, aut dolore: estque Sal Tartari rectificatum & immutatum in Balsamum, addo ut ejus sapor lixivialis & causticus in saporem adstringentem & Balsamicum convertatur per conubium, copulamque, & imprægnationem salis volatilis spiritus vini.

Halecem crudam salsam, in morsu canis rabidi applicatam, eum sanare dicit, ante Hydrophobiam triduo renovatam.

§. 16. *Villifus* partibus separatim uniendo solummodo studens, idque tantum liquoris nutriti beneficio perfici posse certò sciens, ipsi conservando, vel degeneri corrigendo omnem curam impendit, & ea universa quæ vulneris laborum, quorum coalitum totis viribus promovet, unionem impediunt, removet. Vulnere ita ergo & balsamica sudoriferis salinis blandè volatilibus, ut & viperinis ac antimonalibus associata propinat.

Corpus identidem lenibus purgantibus excrementitis humoribus subleat. Balsamo autem Beruviano, Tolutano, Sulphuris, aut oleo hyperici vel therebinth. Vulnus consolidat, adhibitis tamen moderatis Sarcoticis, in Vulneribus autem capitis, aut in iis quibuscumque conjuncta est contusio, digestiva à principio adhibet, & deinde mundificantium & Sarcoticorum ope illa conglutinat.

§. 17. *Sylvius* in Vulneribus curam approbat Decocta Vulneraria ex veronica, fanicula, vine, pervinc. charitol. plantag. prunell. rad.

*Villifus*  
cura Vul-  
nerum.

*Sylvii* mor-  
dus cu-  
randa  
Vulnera.

rad. bistort. liquirit. & similibus parata, pulverem ex Antimonio diaphoretico & oculis cancr. sæpius internè datum magni æstimat, & in forma mixturæ ægris suis propinat. ex. gr.

℞. *Aqu. Chærefol.*  
*plantag.* aa. ʒ ii.  
*cinamom.* ʒ i.  
*antimonii diaphoret.* ʒ ʒ.  
*ocul. cancr. pp.* ʒ ii.  
*Syr. myrtin.* ʒ i.  
*M. D. cochleatim* usque sudor

subsequatur.

Salia quoque volatilia ex animalium partibus parata propinanda vult.

Si Hamorrhagia comixatur vulnera, eam curat mixtura contra fluxum sanguinis notissima. Balsamum quoque Sulphuris anisatum, terebinthinatum & succinatum internè ad guttas aliquot exhibitum magni æstimat.

Inter externa laudat myrrham, aloen, balsamum Capaiæ, cerussam, lapidem calaminatæ, plumbumustum, oleum Hyperici: item ex Sarcocolla, colophonia, resina pini, pice, mastiche, Gummi Elemi, varia parat Unguenta ac Emplastra, ut sunt unguentum aureum, Basilicum, Emplast. Opodeltoch. Stictic. Diasulphuris &c. nec non fots ex aromaticis & traumaticis paratos magnipendit.

§. 18. *Cartesianis* in curatione *vulnerum* secundum rationem cum salute ægrorum prudenter administranda, opera præcipua cõdirigitur, ut succi per dirupta vasa & rubulos in foramen partis dissociatæ confluentes, per remedia convenientia & aeris externi temperationem, aut à vulnere coercitionem ita præseruentur, ne quid particularum acutarum corruptentium admittant, quo fibræ partium solidarum exedantur, rumpantur ac discindantur, & reductioni fibrarum sejunctarum, mediante succo nutritivo glutinoso perficiendæ, obex ponatur. Ea propter quàm propediem fieri potest in vulneribus sequentem vel si-

millem internam propinant mixturam.

℞. *Aq. veronica*  
*alchimilla*  
*sanicula*  
*card. bened.* aa. ʒi.  
*ocul. cancr. ppt.* ʒii.  
*myrrh. cl.* ʒʒ.  
*lap. ceratit.* ʒi.  
*antimonii diaphor.* gr. xv.  
*Syr. veronica* ʒʒ.  
*M. D. cochleatim.*  
 Vel:

℞. *Aq. caprifol.*  
*alchymill.*  
*veronic.* aa. ʒi.  
*Tinct. hyperic.* ʒiii.  
*myrrh.* ʒi.  
*Spir. lumbriç. essentif.* ʒi.  
*Syr. de scord. f.* ʒi.  
*M.*

Vel:

℞. *Aq. alchymill.*  
*aq. veronic.* aa. ʒiii.  
*Antihæst. Poterii* ʒiʒ.  
*Ebor. f. ign. ppt.* ʒi.  
*sal. armoniaci depurat.* ʒʒ.  
*Syr. Heder. terr.* ʒi.  
*M.*

Decocta ac potiones vulnerarias etiam magnipendunt, & eos parant, ex traumaticis variis, inter quæ excellunt, rad. aristolochiæ, Symphyti majoris, Iridis: herbe saniculæ, verbenæ, betonicæ, vinæ pervinæ, veronicæ, virgæ aureæ, consolidæ faracenicæ, consolidæ majoris, Hyperici.

Antequam ad Topicam accedunt curam, omnia extranea vulneribus insita eximenda esse volunt, quæ vel remouent aut instrumentis, aut digitis, aut emplastris ejus ejaculationem promoventibus, ex melle ocul. cancr. succino. Sed duriora & solidiora eximi debent instrumentis, alias vulnera haud coalescunt. Dum hæc scribimus, sequens nobis obvenit casus. Juvenis quidam 24. annorum ab alio Sclopeto in dextri cubiti articulo adeo ladebatur, ut globuli minores ( *Schroot* ) Num. 12. in cute ejus loci percipi possint: Carnifex quidem vocatus, relictis istis globulis,

pin

*Cartespa-*  
*notum me-*  
*dus curan-*  
*di vulne-*  
*ra.*

pinguia ex adipe canina & humana pro more solito cataplasmata & linimenta parata vulnere applicuit : quid sit ? tertio die brachium totum usque ad scapulam planè sphacelatum ac teterrimè fœtens, Juvenem quoque delirantem & agonizantem offendit vocatus D. Valentinus Schadius Medicus Hamburgensis, quamvis brachium ab ipso amputaretur, altero die tamen mortuus est Juvenis, quod non accidisset si Carnifex apposuisset remedia convenientia. Gangrænz potissimum resistencia volatilia remedia & spirituosia & balsamica. Eapropter Caviesiani suadent, vulneribus recentibus & contusis indenda esse varia Balsama, Capayæ, Peruvianum, Elix. vitæ &c. Digestiva quoque in vulneribus ab initio imposita magnificiunt, quæ parant ex vitell. ovor. terebinth. croco, butyro recenti, mell. ros. Spir. matricar. imprægnat. farin. hord. fœnigræc. thure, resina pini, mastiche Gumm. Elemi &c. ex. gr.

R. Resin. pini ʒ i.

Butyr. mai. ʒ ii.

Thuris

aristoloch. long. aa. ʒ iß.

ol. hyperic.

terebinth. aa. ʒ ß.

M. f. unguentum.

Inter carnem generantia varia commendant traumatica, ut sunt Aloe, Myrrha, Balsam. Peruvianum, sulphuris, terra sigillata, cerussa, plumbum ustum, sarcocolla, mastix, gummi elemi, oleum myrrhæ, Hyperici, trifolij odorati, ungu. desiccativum rubrum, Aureum, Basilicum, Hispanicum, Anglicum, Empl. oppodeltoch de Bætonica, Divinum, vel seq. applicant.

R. Aqu. vitæ rectif. ℥ iii.

sol. Hyperic.

chelidon. mai.

solidag. sarracen. aa. Mi.

Thuris

myrrh. aa. ʒ iß.

Infund. destillentur & servantur usui : vel sequens :

R. Ol. trifol. odorat.

hyperic. aa. ℥ ii. ʒ.

resin. pini

Gumm. Elemi.

terebinth.

cere aa. ʒ i.

hyperic.

chelidon. mai. aa. M ʒ.

croc. ʒ i.

pingued. porc. rec. ʒ iiii.

coq. & cola per linteam, quo remedio omnia curant vulnera.

Vel :

R. Spir. vin. rectif. ʒ iiii.

myrrh. pulv.

camph.

mastich.

Styrac. liquid. aa. ʒ ii.

M. f. ariem.

Sequens unguentum traumaticum Celeberrimus Blankardus, Cartesianus magnificat in quibusvis vulneribus.

R. Cere cirin. ʒ iv.

ol. Hyperic.

trifol. odor. aa. ʒ v.

vin. canar. ʒ iiii.

coq. donec humiditas evaporata est, cola & add.

Terebinth. Ven. ʒ iiii.

Balsam. Capayæ

Peruvian. aa. ʒ ß.

Styrac. liquid. ʒ vi.

Santal. rubr. ʒ i.

Bol. rubr. ʒ ii.

M. f. s. a. unguentum.

Inter cicatrizantia vel epulotica sequentia commendant, cortices, nimirum granatorum, glandium, flores balauſt. ros. rubr. cineres & usta, ut sunt lana cremata, linteam ustum, gossypium ustum, spongia usta, testæ fornacum ustæ, pili leporis usti : Corallia, creta, terra sigillata, tutia, pompholyx, gypsum, scoria ferri, æs ustum, plumbum ustum, cadmia lota, sulphur, Antimonium ustum, & diaphoreticum, spodium, ebur ustum, mastix, aloes, sarcocolla, ungu. alb. camphorat. Diapompholyg. Emplast. Norimbergense, de Minio, barbarum, Divinum, griseum : Ex quibus varias concinant formulas. In vulneribus etiam ad symptomata obvenientia appri.

apprimè respiciunt , inter quæ accidere solet ut plurimum Hæmorrhagia , quam sistunt pulveres inspersi ex aloe , thure , mastiche , farina volatili &c. vel per se inditi , vel cum albumine ovi agitati illiti : vel imponunt vulneri linteum carptum , vel crepitum lupi , vel arancar. tela &c. Internè exhibent aquam Plantaginis cum Camphora .

In vulnere inflammatione ab impedito succorum circuito facta , interne exhibent varia sudorifera imprimis sperma ceti & oculos cancer. quæ omnia stagnantes particulas fluidiores & ad circulationem aptas reddunt , externè decoctum verbenæ , veronicæ , alchymillæ , purgæ pastor. cum vino Rhenano parant , applicantque .

Si dolor maxime urgeat , sequenti uti solent .

*℞. Olei papav. ʒii.*

*ovi Num. i.*

*croci gr. xvi.*

*Boli ʒii.*

*Camphor. ʒ ʒ.*

*M.*

Cataplasmata ex mica panis , croco , lacte , ovis &c. laudant . Convulsiones ac spasmi præcaventur antispasmodicis intus & extus adhibitis . Internè dantur Essentia Hyperici & Salvæ cum spiritu C. C. succinat. cinnabarina , camphorata , castoreata , balsamica nervina &c. Vulnere verò instillant oleum terebinthinæ , Spiritu lumbricorum & camphoræ maritatum . Conducunt quoque olea succini , spicæ , lavendulæ , majoranæ , castorei , ceræ , petræ , anthos &c. ex. gr.

*℞. ungu. nervin. ʒi.*

*olei petræ*

*orisimar.*

*Balsamum Peru. aa. ʒi.*

*M.*

Si vulneribus à punctura nervorum , vel à negligentia Artificis Gangræna vel Sphacelus accidit , iis statim convenientibus remediis occurrendum est , & in ejusmodi vulneribus imponenda sunt vel oleum ceræ , terebinthinæ , castorei ,

*Tomus II.*

trifolii , odorati , rutæ , lavendulæ , quæ omnia acidum Vulnere intensum necant ex. gr.

*℞. Ol. Terebinth.*

*Hypericon. aa. ʒi.*

*Mastich. ʒii.*

*M.*

*Vel :*

*℞. Cera*

*pleis*

*resinæ aa. ʒi ʒ.*

*euphorb. ʒ ʒ.*

*terebinth.*

*ol. hyperic. aa. ʒii.*

*M.*

Ad humiditates sedandas , quæ vel ex nerveis vel lymphaticis effluent vasibus , sequentem extollunt pulverem .

*℞. Boli armeni*

*Nuc. cupress.*

*sang. dracon.*

*sem. Hyperic. aa. p. æq.*

*M. F. pulvis.*

In Vulneribus venenatis uti solent theriaca , vel Orvietano intus & extus , aliisque remediis sudoriferis , vel imponunt Vulnere Cataplasma ex theriaca , capis , stercore humano , carne viperina , Spiritu vini q. s. paratum , suadent quoque salia volatilia vulneribus applicanda . Vel locum affectum adurunt ope moxæ vel ferri candentis .

Item in morfu animalium venenatorum vel apum approbant theriacam , quam internè ad ʒi. cum aqu. card. bened. exhibent , externè verò cum spiritu vini mixtam applicant . Commendant quoque oleum scorpiionum , item vesicatoria , rutam , lac , caricas , muriam , helleb. , folia lauri confusa , farinam hordei cum aceto , lac ficulneum , sterus bubulinum , thymum , melissam , vel etiam locum inurunt moxæ .

Vel parant emplastrum ex sem. lini , sale & aceto , imponuntque :

*§. 19.* Ordinis vult ratio , ut & nostrum propinemus Consilium curandi Vulnera . Ne itaque temerario ausu eam auspicemur , & periculofam subeamus alcam , remisque

*Bb*

*vclis-*

*Nostra  
methodus  
medendi  
Vulnera.*



velisque destituti, necesse erit, ut indicationes eruamus, quæ intentioni nostræ velificentur: sufficient quatuor indicationes, quibus Vulnera medendi methodus innititur. Prima jubet, ut omne extraneum è vulnere prius eximatur, siquidem commodè fieri possit. Secunda vult, ut adducantur labia & fiat cunctio partis lase ac lacerata, & simul partis vulneratæ temperies conservetur. Tertia graviorum Symptomatum medelam veget. Quarta denique consolidationem commendat. Totius enim curationis Vulneris cado in temporis momento vertitur, si enim acris ingressus arceatur, & fluiditas fucorum per partem vulneratam cuculantium, prædiis, temperiem partis foventibus vulgò dictis, conservetur, jam expedita erit via ad curam auspicandam. Itaque omne illud, quod vulnere immixtum est, siue sit glans, siue telum, siue ramenta, siue festuæ, siue ipsa caro Vulneris dilacerata & conqussata, siue ossum frustula separata, siue grumi sanguinis, siue pili, siue vitæ, chana vel aliud quid peregrinum, statim eximi debent, quia accretionem tubulorum, & per consequens Vulnerum curationem impediunt, modo citra largiorem hæmorrhagiam majoremque partis vulneratæ injuriam id tentare liceat. Si enim æger ob instantem hæmorrhagiam in præsentissimo versetur vitæ discrimine, satius est ante omnia eam sedare, ipsumque Vulneris probè deligare, quo cohibito sanguinis effluxu, eo tutius scopum suum Chirurgus possit assequi: id quod non duntaxat de Vulneribus sclopeto inflicto, sed & de illis in quibus grumi sanguinis deliuescunt, loquimur, nam & hi in primo accessu nequaquam vi extrahendi sunt, potissimum cum sæpè Vulneri grumi isti adhuc satis proficui sint, frigus externum arcendo & sanguinem sistendo: nuper enim observavimus quod Vulneratus à grumo sanguinis vulnus obdurante ad aliquot dies in vita

conservatus fuerit, quod nunquam fuerit factum, si grumus sanguinis defuisset: si enim hac extrinseca vi eximantur, itricum sapius crabrones, Vulneratum enim in motum precipitamus vitæ periculum.

Quod verò extrahendi modum rerum extraneorum attinet, quilibet exercitatus Chirurgus facile noverit, facilius enim modus ostendi quàm describi potest, hoc tantum notandum, ut Chirurgus ab omni dilaceratione Vulneris caveat, & si sanguis vel lymphæ in cavitate quadam extravasata hæreat, Siphone vel vulneris dilatatione circumspiciat is extrahatur, reliqua extranea vel forcepe vel alio instrumento è vulnere eximantur, nam aliàs impossibile est quod vulnus sanari possit, quia hæc res cunctionem canaliculorum impediunt, imò & pili circa Vulnus tonsura tollendi sunt, & omnis confurcieties amoveatur, si arena, vel frustula vitri minutissima, vel festuæ & similia vulnere indita sunt, quæ aut vino rubro generoso detergenda, aut linteis mollioribus abstergenda, aut vossellis similibusque instrumentis aptis tollenda sunt. In telorum, globulorum, fragmentorum osium, aliorumque, instrumentorum ludentium remotione ante omnia considerandum est, an post eorum extractionem aliqua vitæ spes supersit? Si enim nulla superest, horum extractio potius non tentanda est, ne Chirurgus ægro mortem accelerasse videatur, cum experientia testetur, quod hi per unam vel alteram horam ac diem supervivere possint, qui inter extrahendum aliàs exspirarent. Sin verò spes aliqua reconvallescentiæ subsit, mox & antequam inflammatione atque tumore corripitur membrum, extrahantur res extraneæ, nisi adeo firmiter inhaerescant, ut instrumentis haud cedant, sed deum interveniente suppuratione protrudantur. Scopo hoc felicitè obtento, videndum quo-

modo Vulnus probè deligari & pars vulnerata commodè locari queat, quibus satisfaciendis apparatus requiritur, ex splenis, ferulis, fasciis, emplastris, fibulis, acu, filo &c. quæ pro Vulnerum conditione nunc plura nunc pauciora numerantur.

Remedia generalia in Vulneribus fuere Antecessoribus V. S. & purgatio: sed quæso quod iuuant præstare hæc possunt, cum duntaxat ægrum debilitent peruenientque, succosque residuos incrassent acrioresque reddant; imprimis si simul parcum victum concedunt, annon hæc ægrum ad mortem potius disponunt, hoc modò certè sunt Vulnera per accidens, lethalia, hinc sequens Proverbium Veteribus adscribitur: Si *Medium accersas, læso affigeris*. Meliori ergò iure, si Vulnus requirat interna remedia, ea quæ acidum absorbent & simul succos fluidiores reddunt, ut succorum circulationem itus & reditus per partem vulneratam factus restusque seruetur, commendamus, inter quæ sunt diaphoretica, quæ simul sanguinem confortant, imò chylosin ut melius peragatur; & promouent; eum è contra V. S. non sanguinem emendet sed magis debilitet: observavimus enim hæcenus in Praxi nostra, quod instituta V. S. vel purgatione, materia seu pus in Vulneribus in minore quantitate quàm alias, reperiatur, imò quod inde majores obstructions & dolores in Vulneribus oboriantur. Certum enim est, quòd post institutam venæsectionem reliqui succi adhuc deteriores reddantur; si enim homo ægrotat, non ægrotat ob nimiam sanguinis copiam, sed quòd habeat febrem vel sanguinem nimis spissum, quem certè V. S. celebrata non attenuabis, nec febres, hæc instituta curabis, crassus sit enim sanguis à defectu salium volatilium & spirituum à coagulatione ab acido facta, quam certè per V. S. non impiedis, nec per purgantia. Cautè ergo hisce

incedendum esse Vulneribus author sum; Eneina tamen in obstructione alvi concedi potest, sed non singulis diebus, prout Chirurgi faciunt, impossibile enim est, quod Vulneratus læso affixus tor sedes habere possit ac sanus, qui laboribus incumbit, quare non dolores sumptusque frustra suis ægrotis faciendi sunt, propinetur potius pro re nata seq. in jusculo.

*Re. ol. amygd. dulc. rec. expr. ʒi. crem. tart. ʒi.*

M. D. cum jusculo.

Nos Diaphoretica præ aliis in Vulneribus quibuscumque magni æstimamus, quia chylum Vulnerum consolidatorem & sanguinem optimè purificant & dulcescunt, ut sunt ocul. cancer. Antimon. diaphoret. lap. Irland. terr. Japon. Antihæst. Poter. Martialis, Saturnina aliæque innumera. In Juniorum Medicorum gratiana unam vel alteram addamus formulam:

*Re. Antimon. diaphoret. ʒʒ.*

*ocul. cancer. pp. ʒii.*

*sperm. ceti ʒi.*

*Terr. Japon. ʒʒ.*

*Sal. saturni gr. iv.*

M. F. pulvis, divid. in part. 4. æqual. & detur in vehiculo conveniente calido & dulci.

Vel in forma Mixturæ:

*Re. Aq. menth.*

*aq. Cheresol. aa. ʒii ʒ.*

*pulv. ocul. cancer. ʒi.*

*antimon. diaphor. ʒi.*

*sal. abstin. ʒʒ.*

*theriac. Andr.*

*sperm. ceti*

*Elix. vitæ ʒi.*

*Syr. veronica ʒi.*

M. detur ad vitrum.

quæ mixtura coctionem assumi potest, donec sudor sequitur, sin magna inflammatio & calor cum siti enormi adfuerit, ea aliquo modo mutari potest & quidem sequenti modo.

*Re. Aq. menth.*

*plantag. aa. ʒii.*

*Fl. diaford. Fr. ʒi.*

*lap. prunell. ʒʒ.*

Bb 2 sal

*Sal. saturni gr. xii.**sperm. ceti 3℔.**Camphor. gr. iv.*

M. & cochleatim assumatur,  
& simul interponi potest  
seq. vel simile decoctum vul-  
nerarium.

*℞. Rad. Chin. 3 i.**Contraier. v. 3℔.**Zedoard. 3 vi.**herb. beder. terr. Mi.**serm. anis. 3 ℔.**sal. tart. 3 iii.*

*Infus. coq. in aq. commun. colat. ad*  
*3 xxx.*

qui potus calide bibatur, & addan-  
tur aliquot guttæ salis Volatilis o-  
leosæ. Certè in Germania nulla Ve-  
rula, nullus Barbitonsor, nullus  
Carnifex existit, qui non singula-  
rem potum Vulnerarium venditat.  
Hic verò, me iudice, planè alia  
incedendum est via Veteribus inu-  
sitata, decocta enim hæc non plem-  
nis buccis & mensuratum, sed tan-  
tum 6. cochlearia pro una vice vul-  
neratis nostris propinare solemus,  
præsertim primis diebus, quo de  
sanguinis statu atque acoris gradu  
reddemur certiores, id quod de-  
sumpto quidem signo à iuvantibus  
& nocentibus haud erit difficile:  
huic etiam jungenda sunt, & alia  
interna consolidantia & traumatica,  
ut Essentia traumatica Hagendornii,  
vel Nostra sequens:

*℞. Rad. Aristoloch.**contraier.**℥. hyperic.**Myrrh.**Aloes**Mastich.**Succin.**Terr. Japon.**ocul. cancr.**terr. Mart. aa. 3 ℔.*

*c. spir. charesol. q. s. f. digestionem*  
& rectificationem l. a. Tinctura tra-  
umatica, omnem effectum quem ex  
decoctis vulnerariis aliis expecta-  
bis, in sola hac invenies Tinctura.  
Hagendorni est hæc:

*℞. Mumie.**sang. dracon. aa. 3 ℔.**terr. Japon.**myrrh.**rad. tormentill. aa. 3℔.**℥. ros. rubr.**hyperici aa. 3 ii.**santal. rubr. 3 iii.**nucis. 3 i.*

*concis & contus. extrah. Sp. tartarif.*  
*opt. oculi cancr. sæpe soli sufficiunt*  
*potui ordinario inditi, vel sæpe in*  
*substantia assumpti. Traumatica*  
*etiam varianda sunt pro ratione*  
*affectuum & effectuum. Balsam. Per-*  
*uv. ejusque oleum cum cineribus*  
*clavellatis destillatum, cum spirit.*  
*quodam volatili junctum, erit con-*  
*veniens vulnerarium: item Bals. de*  
*Chili, Tolutanus, de Capaiva ad*  
*guttas aliquot exhibenda, quæ re-*  
*media egregia sunt in fucis corri-*  
*gendis acribus, & obtundendis par-*  
*ticulis cuspiditatis, in diuturnis*  
*vulneribus: nec diuretica negli-*  
*genda veniunt, quæ sæpe omnem*  
*implent paginam, hinc & potius*  
*Thæz & Capheæ & Veronicæ con-*  
*ducent, item decoctum lignorum,*  
*vel antim. Scarificationes, cucurbi-*  
*tulasque tanquam inutiles rejicimus.*  
*Ut verò ad externam vulnerum cu-*  
*rationem redeamus, omni sedulitate*  
*vulnus ab omni immundo liberetur.*  
*Galli in hunc finem omne vulnus*  
*vino rubro eluunt, sed cum vinum*  
*Gallorum non tam acidum quàm*  
*Germanorum sit, hinc non semper*  
*in Germania ablutio hæc conceden-*  
*da est, quia puris proventum im-*  
*pedit acidum quodvis, cujus verò*  
*generatio omni opera ac diligentia*  
*potius promovenda est, quem in fin-*  
*em digestiva dicta medicamenta*  
*optimis glutinantibus temperata vul-*  
*neribus imponenda sunt, & qui-*  
*dem calide, qualia sunt terebinthi-*  
*na, gummi. elem. resina, cera,*  
*thus, mastix, myrrh. ol. ovorum*  
*eorum vitellus, Bals. Tolutan. &*  
*Peruvianus, de Thilli. Succ. her-*  
*barum vulnerariarum recenter ex-*  
*pressi, & Balsam. Mindereri sequens*  
*Chirurgum raro deferent.*

*℞. Terebinth. cypr.**ol. hyperic. aa. q. pl.*

*liquefiant simul, interim gummi elemi*  
*liquefcat scorpius & addatur ad iussu*  
*com.*

*consistentiam ol. destill. cera parum f. Balsam. turundis vel plumaceolis applicand. superimposito Empl. Oppodeltoch à Zerualtero correcto.*  
Sequens etiam oleum in Vulneribus recentibus curandis maximas possidet vires.

*℞. ol. Olivæ. q. f.*

*Flor. hypericon.*

*trifol. odorat. 2a. q. f.*

Digerantur per æstatem, & si quid superest, sequenti æstate novis floribus imbuatur, egregium sic obtinebis oleum in vulneribus proficuum, quod nullo tempore corrumpetur, sed ætate evadet melius. Externè quoque mira in vulneribus præstat Tinctura Antimonii duleis, seu oleum dulce sequens.

*℞. antimonii crud. vel miner. pulv. q. f.*

*spir. vitrioli philosoph. ex cupr. vitæ rectificat. q. f.*

Diger. per mensem, Tincturam rubram decanta, inspissa, donec gutta flavescant, affunde spir. vini, digera, Tincturam iterum decanta & abstrahæ spir. vini, infundo manet Tinctura & oleum, & balsamus dulcis egregius.

Sic quoque oleum tartari per deliquitum vulneribus cum plumaceolis impositum sanat, quod etiam vidit Celeberrimus *Vedelius*, quod per se applicari vel misceri vult cum balsamo terebinth. vel balsam. de Peru, &c. Sequens Balsamus Vulnerarius externus nobis solennis est, conglutinat enim vulnera recentia sæpe spatio 24. horarum:

*℞. Sem. hyperic. ʒi.*

*rad. card. bened.*

*valerian.*

*contraierv. 3℔.*

*Infund. per biduum in vino albo generoso, add.*

*ol. vetust. olivæ. ʒii.*

*frumenti integri ʒi.*

*Cocq. ad consumptione vini, tum fortiter exprime, & add. terebinth. Venet. ʒiv.*

*pulv. oliban. ʒi.*

*M. F. l. a. Balsamus vulnerarius.*

Nos vidimus plurima recentia vulnera curata solis plumaceolis imposi-

*Temus II.*

tis liquoribus volatilibus olcofis, ex gr. aq. Regin. Hungar. spir. matricar. spir. vin. camph. sal. volat. olcof. aq. calc. maritat. Elix. vitæ. De Turundis tamen hic notandum est, & admonendū sunt Chirurghi ne, faciant eas longiores, cum alias carnis generationem impediunt, fibrillas etiam magis coarctant, sunt melius ex linteo inveterato in filamenta redactio quam aliis, quia nimis rigidas habent particulas. Nobis verò magis placent plumaceolæ variis jam dictis liquoribus imbuedæ; quibus etiam Chirurghi Batavi uti solent.

Vulnera debent quoque obtegi Emplastro, quod loco cutis infervit, & materiam & vulnus ab aere externo munit, qui aliàs maximam noxam inferre potest, hinc inquit Celeb. *Waldschmidius* in aureo suo libello Apollinea certe Bibliotheca digno, *Institut. Medicinæ Rational.* graviter peccant ii, qui vulnera sæpius de die detegunt, si enim coalescentiæ & unionis impedimenta tolerantur, sponte coalescant partes divise, & citius, quam si eruditè nimis & officiosè tractentur. Consistit autem ablatio impedimentorum in tubulorum obstructionibus, ut succorum circulantium itus & reditus per partem vulneratam satus testis-que servetur. Hinc Emplastra dicuntur defensiva, quia vulnera ab aere defendunt. Defensivum sequens Chirurgis commendamus:

*℞. Cera alba*

*resin. pin.*

*terebinth. Ven. 2a. 1℔.*

*ol. lauri ʒi.*

*mucaginis ex rad. consol. mai. ac sem. fenig.*

*contus. cum aq. extract. ʒvi.*

*sandarac. ʒii.*

*ceruss. 1℔.*

*croci ʒ℔.*

*opii. crud. c. ceruss. & croco pul-*

*verisat. ʒii.*

*camphor. ʒi.*

*ol. sem. lini; q. f. f. l. a. Empl.*

Emplastro hoc contegantur Vulnera, quod dolores lenit, inflammationem aliaque arceat.

In magnis & periculosis Vuln-  
ribus & Emplastris superponenda  
sunt varia cataplasmata ad tempe-  
riem partis vulneratæ conservan-  
dam, & succorum restagnatio-  
nem, Gangrænam tandem com-  
minantem, præcavendam, quæ ex  
farina fabarum, sem. lini, fœni-  
græc. baccar. lauri, rad. altheæ,  
flor. chamomæl. melilot. herb. ab-  
sinth. scordii, sem. cumin. &c. pa-  
rantur: ex. ge.

*g. Summ. absynth. Mii.*

*bacc. lauri*

*Tuniper.*

*sem. cumin. 3 iß.*

*Sal tart. 3 ii.*

coq. vel in vin. vel in aq. addend.  
farin. fabarum q. s. pro consistentia  
cataplasmatæ. Vel:

*g. Mle. panis discot. Bii.*

*fol. scordii*

*rutæ*

*summ. absynth. aa. 3 iß.*

*F. pulv. add. vin. Gall. q. s.*

Ducatur super linteum, & tepidum  
imponatur, tunc & optimum sit  
pus, cujus indolem paucis nunc  
examinabimus, quod Chirurgis ve-  
teribus & plurimis adhuc hodiernis  
est nescio quid novi & insoliti, à  
Natura Destra illa, ope medica-  
mentorum generati. Nos existima-  
mus, ceu sæpius dictum est, pus ef-  
fe lacteam sanguinis partem seu chy-  
losam, in ipso Vulnere plus minus  
alteratam, cui quædam subinde por-  
tionculæ dilaceratorum tubulorum  
una cum cruore admiscuntur. Pus  
ergo eò laudabilius erit, quo magis  
ad consistentiam chyli & succi nu-  
tritii accederet, sin verò acorem ni-  
mium contraxerit, inficiet sangui-  
nem, obstructionem pariet, febres  
excitabit, corrodet atque exedet flu-  
idorum canaliculos. Si aquosum &  
renue nimis aut viscidum foetidum  
fuerit, peioris meritò censetur no-  
tæ, nec puris nomine dignum erit,  
cùm contumacis obstructionis, præ-  
cipitationis, & putredinis indubi-  
tatum perhibeat testimonium. Pus  
illud primis diebus in vulneribus  
non prodit, non quod in dige-  
stivis primo produci debeat, sed

quod id primis diebus nec chylus  
nec sanguis secerni possit, quod  
ex fibrarum contorsione & illaquea-  
tione tanta facta sit obstructio, ut  
nec molliori sanguinis parti trans-  
itus concedatur, atque aliquot in-  
sumantur dies, quibus Chylus  
cum sanguine arterioso adfectus  
fibras reflexas & in situ valde tur-  
batas elongare, & in rectam viam  
protendere, sibi que liberum tran-  
situm procurare possit. Sic quoque  
consolidatio vulnecis seu carnis  
generatio, nec à Destra natura,  
nec à medicamento sarcotico fit  
vel generatur, omnes enim par-  
tes solidæ sunt ex lacte, quo si san-  
guis abundet, idque per partem  
affectam liberè dispense, Vulus  
brevis sanabitur: sin verò intemperic  
acida aut salina aut perversa mix-  
tione fuerit contaminatus, lentum  
opus erit sanatio. Imò frustra ex-  
spectabitur consolidatio, nisi prius  
vel infringatur acidum, aut sal  
acre temperetur, aut legitima san-  
guinis mixtura restitatur. Et hæc  
quidem sæpius ex voto succedunt:  
verùm si graviora vel primis statim  
vel ultimis diebus accedunt sym-  
ptomata, ea non raro Chirurgum  
usque adeo angunt, ut relicta ordi-  
naria methodo, omnes suas curas  
ad *Symptomata* urgentiora dirigere  
cogatur, quæ si non maturè avertan-  
tur vel tollantur, ægrum faucia-  
tum in præsentissimum conjiciunt  
vitæ periculum: quapropter & de  
his paucis discurrendum erit, quo-  
rum quinque vulgò recensentur, quæ  
præ aliis promptissimum desiderant  
juvamen, ut sunt *Hæmorrhagia*,  
*Inflammati*, *Dolor*, *Spasmus* & *Fe-  
bris*. *Hæmorrhagia* certè periculo-  
sum, si quod aliud, symptoma, re-  
liquis janua aperit, si enim hic  
vix balsamus *Sanguis* nimia copia  
ab initio effundatur, restans vix  
par est coercendis reliquis succis,  
ut metuendum sit, ne pars faucia-  
ta tandem emoriatur, & ex vulnere  
non lethali lethiferum fiat, ceu to-  
to die id accidere observavimus: sed  
quinam modus periculosum hoc  
sufflaminandi pro fluxum adhi-

ben-

bendus sit, cum quilibet ferè Chirurgus peculiare hic jactet arcanum, Nos experientia edocti, in Hæmorrhagia vulnerum sequentia probata reperimus.

*℞. Bol. armen.  
amyl. alb.  
sang. dracon.  
colophon.  
aloex. 22. p. 24 q.*

*M. f. pulvis*, qui vel plumaceolis siccus vulnere imponatur, vel cum spir. vini, vel cum album. ovi applicetur.

*℞. Terr. Hassac.  
calc.  
sangu. dracon.  
Turris  
aloex. 22. q. v.*

Redigantur in pulverem, & al. bum. ovorum & tel. araneorum misceantur in unguentum. Vel sequens pulvis Stegnoticus erit egregius:

*℞. Farin. volat. 3 ii.  
Bol. armen.  
Gypsi  
colophon. 22. 3 8.  
sang. dracon.  
alum. ust.  
Vitrioli alb. 22. 3 ii.  
calcis viv. 3 i.  
vilor. leporin. 3 8.  
M. f. pulvis.*

Nonnulli solo pulvere Colophonii vulnere sanguinem stillanti imposito contenti sunt, alii chartam bibulam, alii crepitum lupi, alii calc. alii linteum, quod in caligis virorum ubi ferorum gestatur eximunt concremantque, & in Hæmorrhagia narium Vulnerumque pro arcano venditant. Nuper quidem in mala dextra fuit vulneratus, & nullis remediis ab Hæmorrhagia vulnus comitante liberari potuit, quam sequenti appposito.

*℞. Vitrioli cypr. 3 ii.  
terr. Hassac. 3 i.  
calc. viv.  
Amyl. alb. 22. 3 8.  
pulv. caphe seu  
fabarum tostarum 3 vi.*

*f. pulv.* qui inpergatur, vel cum liquore pro libito excipiat, &

instar caraplasmati apponatur.

Certè Chirurgus sciendum est, lasso quocunque gravius vase sanguifero, nisi restringatur, omnem sanguinem effluere necesse esse. Plures Recentiorum confugiant ad Vitriolum seu salutis anchoram. neque dubitandum, quin ejus solutio rite facta sit idem ille liquor *sipticus*, quem Gallus quidam Regi Daniz vendidit, nunc autem publicè juris factus est à Cl. *V. Febero Archiatro Casareo*, cujus descriptionem dedimus superius capite de *Hæmorrhagia Narium*. Linteamina quadruplicata liquore hoc suspicio probe humectata, Vulnere, vel orificio arteriz, vel trunco membri exstipari superimponere, cum adæquata ligatura, & videbis sanguinem in monimento coagulari: linteamina per aliquot dies superimposita relinque, ne crusta sanguinis, vel sanguis incrustatus simul detrahatur, & sanguini fenestra profluentis aperiat, sic sapè Vulnus nullo alio adhibito remedio perfectè sanatum invenies. Sed famosum hoc arcanum suos habet navos, cum nec expectationi satisfaciat semper, quod propria testari possum experientia. Celebris quoque est liquor *Magnetis Dn. VValdschmidtii*. Sic ad mentem Celebrissimi *Bohnii* Spiritus vini hæmorrhagiam Vulneris cohibet. Alii omnem collocant spem in pulvere Sympathetico *Dn. Dygbi*: Inventor hujus remedii celebratur ab ipso prædicto *Dyghi*. Carmelita Monachus, qui hoc secretum ex Oriente adduxerit, & quo hoc arcanum didicit. Parator nempe ex quovis Vitriolo extemplo adhibito, & pulverisato vel soluto pro re nata, nam idem præstitisse testatur *Dygbaeus*: vel quod solennius est: *℞. Virriol. Cyprium*, vel nostras quoque calcinat. calcinatione nempe aerea, expositum Solis radiis mense Jul. vel Augusto, donec in pulverem album fatiscat, exuto virore vel cæruleo colore suo, addito pro libitu, quod nonnullis placet, gummi tragacanthi pulvis ad partem subdecuplam seu ad 3 x.



drachm. unam, inò quidam tantum pulveris solius applicatione id præstant, & sanguini effuso inspergunt; vide ipsum Dygbrum. Ab eo tempore quo in Germania inclausit, creduli cum omnibus vulneribus, & instrumentis quibus vulnera facta fuere, adhibuerunt, de cuius vero effectu mecum dubitant plures, confer *Cl. Dn. de Muralto in Ephem. German. Ann. 1. Decur.* 2. Vitriolum calcinatum, & cum ovi albumine mixtum, in linimento implicitum, vulneribus applicatum, optimum sæpe habet effectum: spectat huc alius pulvis colore jucundus, & ex lacca florentina & Orce paratus. Prælaudatus *Dn. de Muralto* pulverem exquisiti tenuissimum contritum sanguini vulneris calenti admiscendum commendat: Alii alia adstringentia austera & liquida, ut atramentum, oxycratum, ipsum acetum, item Ufneam turundis inspersam tenuissime prius pulverisatam laudant, quo & referunt terram Japonicam. *Celeber. VVedelius* in hæmorrhagia vulnerum tanquam arcanum commendat pannum xylum ustum & cum albumine ovorum exceptum, sicque vulnere sanguinem stillanti applicatum, posito desuper crepitu lupi, & cum splenis facta deligatione. Sic etiam concepta linamenta, pili leporis, turundæ compositæ ad mentem ipsius applicari possunt. Cataplasmata ex fungo pulverulento, pilis leporis, musco canini humani, pulvere gallarum, bufonium & stercore suillo, sæpe plus præstant quàm alia: pulvis quoque stipticus noster ex bol. gall. immatur. vitriol. de cipro & camphor. paratus rarò nos fecellit, vel sequens aqua stiptica:

*Bz. Limat. mart.*

*ol. vitriol. aa. ℥ss.*

*M. & effervescent, postea add.*

*aluminis ℥ii.*

*lapid. hæmatit. ℥i.*

*avis ussi ℥ii.*

*Verum effervescent, add.*

*aq. commun. pint. i.*

*M. f. s. a. per colat.*

*aq. stiptica* quæ internè guttatim propinari, & externè linteis madefactis applicari potest, quæ egregia & multa experientia approbata est. Terra Vitrioli mart. sæpè quoque sufficit. Crispant quoque & ferruminant cauteria mitiora potentialia dicta, in quem finem sunt qui laudant Colchotar Vitrioli, sed cum hæc corrosiva sint, non semper præstant effectum desideratum. Vix itaque aliud superesse videbitur remedium, quàm ferrum candens, ea sanans, quæ medicamenta sanare nesciunt, juxta versiculos sequentes:

*Si non morbosos sanant Medicamina,  
Ferrum*

*Arripe, sin frustra Phæmacon ignis  
erit.*

*Hæc triani possent agris adferre salutem,  
Amphitryoniadis robur inane cadet.*

Ignis enim si orificii vasorum admoveatur, & sanguinem & carnem ita adurit, ut veluti aggere facto sanguinis effluxus cohibeatur. Cauteria enim actualia ignita crispant, corrugant & crustam inducunt, quod certè remedium inter extrema, attamen probatissima remedia plures numerant, modo cum prudentia & exercitato administretur Chirurgo. Hoc remedii genus etiam magni æstimavit *Fabr. ab Aquapendente*, ut posthabitis causticis potentialibus semper ferro ignito prius usus fuerit, ex eo quòd legem illi modumque imponere potuerit, his nequaquam præterea tribuit ferro vim roborandi partem, cum causticum sæpè corrumpat, & putredinem inducat, *vid. l. 2. de Vulneribus p. 88.* Quod tamen remedii genus timoris ac periculi plenum absque effectu adhibitum vidimus: sic nunquam tuta fides! quod remedium non ita pridem in Nobili de Boynebourg frustra adhibitum fuit. Alium novimus ligni sabrum Hanoviensem in tibia sauciata, ex quo Vulnere sanguis fortiter exsilliebat, omnia hoc in casu à Chirurgis frustra tentabantur & æger defunctus est. Alii tutius rem confici posse autumant, si situs

vafis

vasis sanguinem fundentis prius accurate exploretur, post, digito labia arteriæ comprimantur, ut impetuosior sanguinis effluxus retardetur: & non inficior compressionem talem digitis factam plura sæpius præstitisse, quàm alia styptica, iis præsertim in casibus, ubi vas fauciatum non adeo profundè delituit. Sic in Principe Auriaco optimè cessisse id remedii genus monumenta Medicorum testantur. Sic quoque exemplum recenset Cl. Ronnhuyfen, de famoso quodam adultero, qui ex lue Venerea gravissima sanguinis profusione correptus, è faucibus orci revocatus fuit per vasis exesit compressionem, frustra adhibitis remediis stypticis, & cum nullo alio sanguis cohiberi posset medio, conduxit Vulneratus suasu Chirurgi aliquot factores, vitæ sedentariæ assuetos, qui alternant in excubiis sedentes digito vasis fauciati labella conprimerent, & saluti hujus viri juxta lectum invigilarent. Quando verò plura vasa fuerint dilacerata, unius hominis digiti impares erunt foraminulis illis & rivulis obturandis atque occludendis, adeoque iterum efficaciora hic requiruntur remedia, & quidem superiùs dicta.

Alterum symptoma egro & Chirurgo multum in Vulncribus faciens negotii est *Inflammatio*, quando nempe in parte affecta sit obstructio talis, ut particulæ sanguinis & reliquorum succorum soli materię cœlesti seu subtilissimæ innatent, & talem nanciscantur statum, qualem habent particulæ succi nutriti in fœno recens dissecto; hinc ob obstructionem factam Vultus fit siccus, quia vasa sunt contracta; & sic denegatur parti influxus ac perfluxus succorum. Ad hanc Vulnerum inflammationem malè certè Veteres frigida & repellentia applicarunt, quæ tantum obstructionem tubulorum, & per consequens Inflammationem augent & humores inspissant. Dum hæc scribimus, Chirurgus quidam Senior Nobis objicit, quod secundum

hanc methodum plures curaverit, & præ aliis Camphoram tanquam frigidum remedium allegavit, hinc est quod Chirurgi quotidie utantur remediis, quorum vires nesciunt, cum Camphora non frigida sed calidissima sit. In Vulnere Inflammationibus proferibimus vulgaria ista externa pingua & oleosa, quæ specioso & splendido nomine *defensiva* appellantur, quibus tantum poros cutis insarcinunt, & sæpè Inflammationi Vulnerum januam laxant. Et Nos quidem non videmus, quo sub colore aliquod inde solamen expectare possimus, quin persuasum habemus rationi & experientiæ non duntaxat magis consonum, sed ipsi parti affectæ etiam proficuum fore, si vel sacculo arena calida repleto, vino generoso calido, aut spiritu vini camph. aut matrical. aut aq. Regin. Hungar. vel spiritu sambuci trifol. fibrin. crebrius abluatur. Exulcent ergo hic omnia repellentia, astringentia ac refrigerantia, quæ obstructiones augent, succosque machinæ crassiores detinent, qui subtilioribus evanescentibus actiores facti fibras discindunt, vel rumpunt, unde aucta obstructione major supervenit tumor, & ad gangrenam via redditur magis expedita. Quod periculum ergo ut maturè averruncetur, necesse erit, ut curas & cogitationes hoc in casu unice in obstructionem intendas, in quem finem conducunt alcalia volatilia aromatica, balsamica, verb. gr. spirit. vini camphor. cum Aqu. Regin. Hungar. spirit. sal. armoniaci Balsm. nervin. n. d. aqu. calc. viv. spirit. flor. sambuci. sal. volatil. oleos. spirit. matrical. aqu. mea ad Gangrenam, constans ex aqu. calc. viv. & spirit. vini cum multa Camphora, Diascord. & Theriaca, omnia enim quæ novas inducere valent fermentationes, proficua sunt. Inter omnia, quæ acidum stygium temperant, corrigunt, edulcorantque, quæ Capite de *Inflammatione* ad nauseam jam

jam dicta sunt, hic ea repetere non libet, ne Lectori cramben sapius coctam propinemus.

Inter Vulneris Symptomata & Dolor refertur, qui agris ac Chirurgis multum faciescit negotii, cui dolori sæpè tumor supervenit, non propter maiorem humorum affluxum, prout omnes Veteres hætenus crediderunt, sed potius ob eorundem stagnationem, dum interea semper à tergo sequuntur succi & priorum copiam augent. Dolor ille, qui percipitur dum Vultus infligitur, est ab agitatione, commotione, distensione, dilaceratione & concussionē fibrillarum nervearum, quo enim fibrillæ vehementius discinduntur, eò maiorem Mens de extremo aliquo insolito iudicans, percipit dolorem. Verùm ille dolor, qui facta solutione vulneratos torquet, & plerumque aliquot elapsis horis intenditur, est à novo impetu succorum circulantium, quibus transitus ab obstructione denegatur, hinc elabentibus, qua data porta succi ruunt, flexilibus suis particulis emissis, reliquæ aciores factæ rodendo dolorem augent. Sic in ipso Vulnere possunt quoque existere res extraneæ, vel festucæ, vel frustula vitrorum vel instrumentorum fractorum, vel grumi sanguinis acres ac acidi, fibrillas aliæque vascula minima concutientia, quæ dolorem intensum producant. Sic etiam dolor oritur à fluidis cum vulnere extravasatis & stagnantibus, unde sæpius accidit, quando aer frigidior Vulneri immittitur, tunc dolor in ipso observatur vehementer, quod etiam veteres notarunt, cum dicere solerent, quod aer frigidus Vulneri admissus dolorem producat, rationem verò non addidere. Ratio autem hæc est, quod ab aere frigido particulæ in Vulnere volatiles & mobiles increascentur & insistentur, imò hæ particulæ volatiles ab aere alias peregrinas nascuntur particulas, quæ ordinem turbant, hinc etiam mixtura perturbatur, & aliam indu-

unt indolem, & tunc tendunt ad fermentationem, & dein instar lactis aciescunt, quæ spicula acida tubulos, ac fibrillas concutiant, & sic dolorem producant. Ex hisce præmissis apparet, quàm malè Antecessores nostri fecerint, quod dolorem frigidis ac repellentibus remediis coercere allaborarint, quare etiam hocce in casu ea medicamenta rejicienda sunt, & ad ea confugiendum est, quæ succos fluidos reddunt: omnia ergo hic conducunt *resolventia* vel blandè emollientia remedia, quæ copiam salis volatilis in se continent, imò omnia ea hic conveniunt quæ commendavimus *Capita de Gangrena*, spiritusola nempe camphorata, imprimis spir. vin. camphor. sal. volat. oleos. spir. matric. cum fl. sambuc. chamomillæ imprimis. verò aliis præferimus varia Cataplasmata anodyna ex mica panis, flor. chamomill. thæriac. croc. cum lacte & vitell. ov. parata jam sapius dicta.

Ad Vulnerum Symptomata quoque refertur *Spasmus*, qui accidit Vulncri, ubi tantum causa fortior & commotio æ distensio fibrillarum major existit, imprimis ubi tendinosarum fibrarum læsio adfuerit, quam ut plurimum sequitur *Spasmus*, seu nuper in quodam prope claviculas vulnerato observavimus: & notandum est, quod sæpius hæc in casibus, ubi tendines vel nervi magni lāduntur, statim accedit *tumor fistulentus*, qui, me iudices, nihil aliud est, quàm ipsi spiritus animales evasati & forma vaporis subsistentes. Hic itidem eadem conveniunt remedia, & cataplasmata, ex nervinis aromaticis parata, ut & oleosa balsamica, castorina succinata, Armonicalia, ol. caryophyll. spic. lavendul. cinabarina, bals. spasm. M.

Inter Vulnerum Symptomata *Fæber* non finis sunt, & accidunt à turbata sanguinis mixtione, cum lalis tot vasculis necessariò succi effluere debeant, qui stagnantes, & mal-

& massa sanguinea iterum corrupti advesci mixturam ejus turbant. Febres in vulneribus varii generis deprehenduntur, vel ephemera, vel putrida continua, vel intermittens tertiana, vel duplicata, adeoque singulis diebus recurrens. Causa Ephemerae est saepe in principio, & ut plurimum vel ex calore, terrore, vel nimia spirituum agitatione. Febres etiam exasperantur à Medico, si intempestivè medicamenta adhibet purgantia fortiora, & sudorifica calidiora, vel acida &c. Item ab astantibus, dum ad iram concitant aegrum. Ab ipso aegro, si vinum acidum haurit, aliaque acida assumit, hincabit in pejorem putridam vulgo dictam febrem, cujus causa est in ipso vulnere, quando scilicet pus cum succis circulantibus ad massam sanguineam abripitur, eamque nimis torbat. Calor in Ephemera est mitior, intensior autem in putrida, & omnia symptomata sunt graviora quàm in Ephemera. Inflammatio febrem excitat, & pro diversitate & constitutione sanguinis, Febris vel continua vel intermittens oritur: si enim sanguis semel turbatus, diu manet saepe talis, sed si pus per intervalla aduehitur sanguini, tunc Febris habet suas intermissiones. Purgantia semper nocent vulneratis praesertim febricantibus. Curatio ergo Febris Vulnerum consistit 1. in blanda diaphoresi, 2. in succorum fermentescensium praecipitatione, ex gr. sequenti modo:

℞. *Lapid. cancr. ppt.*

*Bezoar. occ. aa. ℥ss.*

*M. F. pulvis una vice assumendus.*

℞. *Aqu. fl. sambuc.*

*veronica aa. ℥i.*

*Essent. traumatic. ℥ss.*

*Syr. trifol. fibr. ℥iiii.*

*M. pro vehiculo.*

In omnibus vulneribus *Veronica* palmam aliis praeripit, hinc etiam omnibus formulis addenda est: pro altero scopo obtinendo inservit sequens:

℞. *C. G. f. ign. ppt.*

*lapid. scissil. Irland.*

*ocul. cancr. ppt. aa. gr. vi.*

*arcan. duplic. gr. iiii.*

*M. F. pulv.*

Lapis enim scissilis magnam habet praecipitandi vim, hinc nobis solennis est: quod si cui mixtura arideat, sequens proderit:

℞. *Aq. febrifug.*

*card. bened.*

*papa. Err. aa. ℥ii.*

*C. C. citr. ℥i.*

*Mixt. f. ℥ss.*

*Syr. papa. Err. ℥ss.*

*M. D. omni bihorio cochlea-*

*re unum & alterum.*

In forma Tincturae vel essentiae datur Tinctur. bezoard. volatilis, Essent. citr. tot. aq. cordial. Saxon. Theriacal. Camph. vel Theriac. cum aq. Scordii.

His in Febris Vulnerum conducunt omnia praecipitancia, salina & absorbentia, v. g. lap. cancr. C. C. Myrrh. Camphor. arcan. 2. pl. lap. prunell. chin. de chin. rad. gentian. fl. sal. armoniac. Nitr. perslat. vel nitrum cum carbonibus alcolisatum.

Chirurgis notum, est quod vulnerati vel per nimiam haemorrhagiam, aut ob terrorem, aut ob venenum à morfu scilicet animalis in *Syncope* incidunt, aegri enim pallescent, pulsus cessat, sudore frigido corripiuntur: non mirum est quod à nimio sanguinis effluxu vulnerati deliquium animi patiuntur, quia si sanguis non ad cor lege circulatio nis redit, necessario ad alias transit partes, sicque horologium pervertitur, per terrorem cor contrahitur ut sanguis ad partes ruere nequeat, & simul spiritus animales ad liberum suum fluxum impediuntur, hoc in casu conducunt omnia salia volatilia, spiritus volatiles & oleosa, quae sanguinem ad circulationem incitant. In Juniorum Medicorum gratiam unam & alteram communicabimus formulam.

℞. *Aq. menth. ℥ss.*

*cinamomi, duplo. ℥ss.*

*Spir. menth. ℥ii.*

*rosar. ℥ss.*

*ol. fassae frax gut. iv.*

*Syr. de cinamomo ℥vi.*

M. Mixture hæc chochleatim absumatur.

Vel.

*℞. Elix. vitæ ℥ii.*

*ol. cinamom. gt. ii.*

*sal. volat. oleos. gt. xx.*

*aq. Regin. Hungar. ℥i.*

M. dentur aliquot guttulæ in vino vel alio liquore convenienti. Ante nares derineatur spir. sal armoniac. volat. vel aromat. cum spir. anthos, vel sal C. C. volat.

Reliqua quæ in Vulneribus occurrunt symptomata faciliè Medicus ac Chirurgus ex jam dictis petere potest.

*Vulnera*

*sclopetorū.*

Nunc nos conferamus ad Vulnera à diversis instrumentis inflicta. Cum ergò humana astutia in excogitandis variis machinis ad lædendum hominem de die in diem affurgit, sic quoque inventa sunt sclopetæ cum pulvere pyrio, ex quibus Vulnera fiunt periculosiora, quàm ab aliis instrumentis, quod lædendi genus vetustati ante 300. annos ignotum fuit, hinc quoque hæcenus eorum ferè omnes Vulnera sclopetorum pro venenatis habent, atque in eo quidem prudentiæ edunt argumentum, quod ignorantiam suam celare, atque successus parùm felices malignitati ac virulentæ tribuere satagunt: tantum enim abest, omnia sclopetorum Vulnera venenata esse, ut potius ob rationes satis notas omnium illorum Symptomatum ferax sit. Præterquam enim quòd in his Vulneribus aliquid de ipsa partis læsæ substantia auferatur, etiàm hoc majus adhuc infert periculum, quod plures fibrillæ contundantur ac disrumpantur, in aliis autem Vulneribus paucæ duntaxat discindantur, inde enim est, quare Sclopeto læsiati Gangrænæ & Sphacelo aut putredini, nec non Spasmo ac febribus præ aliis sint obnoxii, major enim hic est obstructio, major tubulorum & pororum perversio, major in fluidis perturbatio quàm in Vulneribus casum vel punctum inflictis. Hic

etiam simul indolem pulveris pyrii examinabimus, & quoque consideranda est velocitas globulorum ex sclopetis emissorum, à qua Vulnera producantur periculosa, juxta enim velocitatis gradum & globulorum magnitudinem confusio partium varia est, quæ verò de combustionis partis globo trajectæ aut Vulnerum horum empyreumate pro exaggerando periculo plures adducunt, ea cum Celeberrimo *Waldschmidio* nostro ceu anile commentum inter fabulas collocamus, quis enim, inquit, unquam vim ignitam in globulo observavit? Equis nescit ipsos tormenti globos acervum pulveris pyrii transire, sine ullo accensionis metu? nisi forte impetum fecerint in corpus durum, ex quo ignis excussus ipsum pulverem pyrium accendant. Videmus ergò illos qui remedia sua contra Emphyreuma in his casibus venditant, quibus se & alios inani lactare spe imo fallere solent. Vulnera à Sclopeto inflicta apparent ab initio livida, nigra & sæpè flava ut alia Vulnera, & æger conqueritur de dolore gravativo, interdum sequitur tumor, nonnunquam aliquid sanguinis è Vulneris effluit, post idem Vulnerus quasi contrahitur, ut vix turunda intrudi possit, ad quod multum facit sanguis congruatus ibi hærens obstipansque, succi enim nostri cum spiritibus animalibus vasis inclusi non sufficientes sunt ad reprimendam vim globuli explosi, hinc non tantum vasa & canaliculi disrumpuntur, sed & succi cum incredibili velocitate à suo statu permutantur, unde reliqua symptomata facilius deduci possunt, quod jam alibi deduximus. Nunc verò ad Sclopetorum Vulnerum curationem transcamus, magnam enim ex antedictis fœneramur in curatione lucem. Si Vulnerum non satis amplum fuerit, id cultello incisório magis dilatandum est, partim ut materiæ effluxus concedatur, partim ut si adfuerint Ossis festuæ vel globuli minores, eximantur felicius: & hoc statim ab initio considerandum,

dum, si enim pars leſa fuerit nimis tumida ſeu tumore obſeſſa, tunc nimis tardum erit, & ſi in Vulnere res extraneæ adſuerint, ad eas eximendas debet Patiens in hoc ſitu locari, quo accipit Vulnus, alias fibræ diſtorqueri poſſunt, inde dolor oboritur maximus. Digi- ti ſæpe melius inſtrumentum ſunt ad has res eximendas, & ſi globus nimis profundè lateat, incifio faciendâ eſt, & forcepe eximendus eſt globulus, nos enim non approbamus iſtud inſtrumentum quod Chirurgi *Kugelzier* nominant, quia lædendo magis nocet quam prodeſt. Dein accedendum eſt ad deligationem Vulneris, & cum ut plurimum caro & fibrillæ contuſæ, & ſucci incaſſati fuerint, hinc optima remedia ſunt illa, quæ ſuccos attenuant, ut ad circulationem idonei reddantur, & ſeparatio quovis modo tentanda, proderit ergo ſequens vel ſimile remedium in & ſupra Vulnus applicandum:

*R. Vngu. Baſil. ʒi.*

*Aloes.*

*myrrh. aa. ʒvi.*

*aq. Regiæ. Hungar. ʒi.*

*Sal. ſaturni ʒiii.*

*Spir. ſal. armon. caryophill. ʒʒ.*

*M. & detur uſui.*

Hoc calidè cum plumaceolis in & circa vulnus applicetur, vel ſuperponatur vulnere ſpir. magiſtralis cum ſpiritu ſambuci, Vin. camphorat. Spir. ſal. armoniaci. Myrrh. Aloes &c. Hiſce enim remediis inſiſtendum eſt uſque Tumor evanuit. Nihil tamen excellentius quam ſequens unguentum *Baſilicum*, quo ſolo Chirurgus Caſtreſis in vulnribus à ſcolopeto inſidiis contentus eſſe poteſt, nunquam enim ipſum deſereret.

*R. cera citrin.*

*reſinæ aa. ʒʒ.*

*ol. olivarum ʒii.*

*piciſ nigra ʒʒ.*

*M. F. unguentum.*

ſi primæ 3. ſpecies refrigeratæ fuerint, add. picis nigri q. v.

Vulnera magna cum contuſione

vehementi, ſolo applicato Spiritu Mattricali, Spir. ſal. armoniaci ſaturato, obſervavimus curata abſque ullo ſubſecuto pure. Ubi contuſio major eſt, ibi ſuppuratio promovenda, & additis aliis croco & vitello ovorum, & ſi ſuppuratio vix appareat, ſeq. cataplaſmâ calidè applicetur.

*R. Gum. Abſinth.*

*roriſmar.*

*cent. min. aa. M. i ʒ.*

*bacc. lauri*

*ſem. cumin.*

*ſenicul. aa. ʒʒ.*

*camphor.*

*myrrh.*

*aloes aa. ʒi.*

*Cog. in aq. & add. Farin. fab.*

*bar. q. ſ.*

Hiſce impoſitis neceſſario ſucci ex canaliculis diſruptis effuſi fermentari debent, quo factò pus ſubſequitur. Hoc in caſu internè quoque conducunt omnia ea quæ conſtant particulis volatilibus ſpirituofis ac oleoſis, ut & omnia quæ acidum temperant, & cum ſuis particulis volatilibus ſpicula acidorum amplexantur, prout videmus in butyro quod acetum amplectitur: & cum ſpiritus nihil aliud ſit, quàm ſubtile & attenuatum oleum, eundem præſtat effectum, ſic Spir. Sal. Nitr. dulciſcantur cum ſpiritu vini per cohobationem inſtitutam. Commendamus ergo internè Sal. volatilia oleoſa, baſam. Nervin. Peruvian. de Chili, aquam Theriacal. camph. lap. caner. Tinct. Bezoart. Traumat. volat. Omnia ex Scordio & Veronica conducunt, Antimon. diaphor. Antiheſt. Poteri, aliaqua abſorbentia interponenda ſunt, eſto formula.

*R. El. diaphor.*

*aq. ſenicul. ʒiv.*

*chereſol. ʒi.*

*Baſam. nervin. m. d.*

*ocul. caner. aa. ʒii.*

*camphor. ʒʒ.*

*M. D. coctentim.*

Si globi vel tela fuerint venenata, *vaſant* a vel ſi vulnus à morſu animalium morſu excitetur, diaphoretica bezoardica animalia.



ac Camphorata, Theriacalia per diuturnum tempus continuanda sunt, sæpius enim in tubulis latet venenum, quod data occasione erumpit, & coagulando penitus sanguinem hominem à medio tollit, ceu hoc vidimus in puero Venatoriis superius dicti: ea propter sunt qui radicem gentianæ internè ad ℥i. datam magni æstimant. Nos viperina, imprimis pulverem Angelicum & Bezoarticum nostrum, item Tincturam viperinam Vigani, ut & ejus Elix. propr. commendamus. Adversus morsum canis rabidi infallibili euporiston commendat Hannemannus, cujus mentionem facit *Buribolin. Ab. Haffn. Volum. 2. Obs. 110.* beneficio enim ejus multos commorsos, & aliquot jam actu rabidos, felicissimè restituit, & est seq.

℞. *Herb. ruta,*  
*abrotan.*  
*betonic.*  
*angustifolii.*

*Salvia fol. angust. aa. Mi.*

*M. incis. affund. Vin. opt. ℔i.*

Sique tempus permittit, per aliquot horas maneat in infuso, exprime, expresso add.

*Theriac. Andr. ℥i.*

*M.*

Adultus magnum de eo faciat haustum, junioribus verò & puerulis detur cochleatim, sin verò periculum metuator, additur herb. card. fullon. Mi. i. vel hujus sem. contus. ℥i. Vulnus commorsum per plures dies apertum servandum esse necessum est, & semper ad sudorem disponatur æger, in quem finem sequens vel similis propinetur haustus.

℞. *Aq. theriac. ℥i.*

*cinam. ℥ss.*

*Ol. sassafras gt. vi.*

*cinamom. gt. iii.*

*Bals. nerviv. m. d. ℥ss.*

*vin. q. s.*

*M. F. haustus.*

Nec externa negligenda sunt, vulnèr ergo imponatur sequens calidè cum plumaceolis:

℞. *Aq. Regin. Hungar.*

*Spir. matric. aa. ℥i.*

*myrrha*

*aloer*

*terebinth. aa. ℥ss.*

*ol. caryophyl.*

*sassafras aa. ℥i.*

*camphor. ℥ss.*

M. & calidissimè infundatur vulnèri venenato, vel sæpius eluatur vulnus decocto scord. rad. contrajerv. rutæ, abrotan. betonic. sal. in decocto ℔i. dissolv.

*El. diascord. ℥i.*

*Spir. vin. camph. ℥ss.*

*M.*

Alii theriacam morsui applicant, alii busonem vivum loco cataplasmatibus imponunt. Boyle ferrum candens morsui applicari vult, sic etiam lapidem serpentum contra quæcunque commendat venena. Æstivo tempore vidimus canes à canibus rabidis morsos, ex quorum vulneribus observavius prolem vermium prodire, quia, me judice, à muscis hisce vulneribus non deligatis impositis opula imponebantur, quæ à carne semiputrida & quasi fermentante exclusa sunt.

Dum hæc scribimus, Vetula à rabida fele in manu mordebatur, tumor manus & totius brachii intensus subsecutus est, exhibitis verò internis sudoriferis ex *El. diascordi. antimon. diaphoret. Bezoar. aliisque*, & impositis Cataplasmatibus aromaticis, illicò remiserunt symptomata & brevi convaleuit: inter externa optimè tulit sequens.

℞. *Ol. Hyperic. n. d. ℥i.*

*scorpion. ℥ss.*

M. calidè vulnèri infus.

Dolores ac tumor inde statim cessarunt. Si ex colore livido vulnèrum sensus motusque ablatione, atque cadaveroso frigore mortis principium, Gangrænam nempe adesse animadvertant Chirurgi, profundiore statim in confinio instituunt scarificationem, quo sanguis acidus & cruoris nomine magis dignus exprimitur. Nos vulnus gangranosum absque Scarificatione

*Vulnus cum incipiente Gangrana.*

## CAPUT VI.

catione eluimus spiritu nostro be-  
zoardico , vel decocto superius di-  
cto vel aqua muriatica , quo ob-  
structiones vel pori obstruisti eò  
facilius aperiantur , mox liquorem  
ex calce viva cum aqua pluviali,  
spiritu vini camph. & Mercurio  
vel melle applicamus , superimposi-  
to cataplasmate de 4. farinis dict.  
vel fotu ex Scordio , Absynth.  
Marrub. Theriac. spiritu vini aliis-  
que parata . Neque enim hic ulla  
admittenda est mora , aut inducię  
concedendę sunt , cum locum hic  
habeat illud quod *Tiberio* cunctan-  
ti dictum est : *Aut age aut desiste* :  
quoniam quo citius pars cadaverosa  
à sana separetur , eò certius eger  
in tuto collocatur , sin autem ni-  
mis serò advocatur , & extremę  
calamitatis , & agro periculosa su-  
beunda erit alea , atque ad extir-  
pandam hanc hydram ferrum in  
subsidium vocandum .

*Nam , quod non sanat medica-  
mentum , hoc sanat ferrum :  
quod non sanat ferrum , sanat  
ignis .*

*Hyper-  
sarco-  
sis in  
Vulneri-  
bus .*

*Hyper-sarcosis* etiam in vulneribus  
obveniens Chirurgis sepe impedi-  
mento est , quę aliquando propter  
victum & inde generatum chylum  
copiosum , crassiorē tamen ac fa-  
cile coagulabilem exoritur , eò ergo  
imendendum est ut caro ista spon-  
giosa tollatur , & in quem finem  
pulveres inspergantur absorbentes ,  
ut Calx. viv. Sal Saturni , mandibul.  
luc. Corall. Camphor. vel Eli-  
xiv. vitę , Spiritus Matricar. spirit.  
vini camph. cum aqua calc. Elixir.  
vitę cum sale saturni & campho-  
ra , vel unguentum Ægyptia-  
cum inspicuum , vel im-  
ponatur Emplastrum  
divinum Barbette ,  
vel Sticticum ,  
vel Op-  
po-  
deltoch.

*De Ligamentorum Stupore & Laxa-  
tione , Nervorum contusione , In-  
scurvarum Incurvationibus & Lu-  
xationibus .*

§. I.

**E**X innumetis Calamitatum my-  
riadibus , quibus machina no-  
stra undique per omnes sui partes ,  
proh dolor ! est exposita , imo hu-  
mani corporis pars aliqua , quo di-  
gnior ac pręstantior quantoque ma-  
jorem prębet usum totius œcono-  
mię , hæc pluribus , hæc atrociori-  
bus morbis est obnoxia , in machi-  
na enim nostra plures reperiuntur  
partes quę ligamentorum & tendi-  
num texturam participare videntur ,  
eò quod aquę dura non sint atque  
illa , & his minus mollia sunt ,  
cartilaginee indignantur . Primaria  
ratio propter quam nos conicimus ,  
cartilaginee nil aliud esse quam fi-  
brarum tendinosarum compagem ,  
quę induratz fuere ex alcalicorum  
volatiliū insarctu , hoc est , quod  
nulla sit cartilago , in quam non  
desinant multę fibrę tendinosę :  
verisimilis ex eo redditur conjec-  
tura nostra , quod cartilaginis sub-  
stantia quę oculis percipitur , ni-  
hil aliud sit , quam fibrarum con-  
geries , res enim extra dubium po-  
nitur , eò quod in junioribus ani-  
malibus multę partes quę tendino-  
sę erant , tractu temporis cartilagi-  
næ deveniant , & in vetustioribus  
animalibus quidem tendines in car-  
tilaginee mutari conspiciantur . Sic  
hęc ligamenta tendines , ut & ner-  
vi suos patiuntur manes , & à Me-  
dicis Chirurgicis expectant auxi-  
lium , imprimis in *Ligamentorum  
Stupore & eorum Laxatione , Ner-  
vorum contusione , Inscurvarum In-  
curvationibus & Luxationibus* . Quos  
affectus omnes ordine & more soli-  
to

to examinaturi sumus. *Stupor* dicitur etiam *Narce*, *Narcosis* seu *Torpor*, est propriè sensus motusque abolitio.

*Descriptio* *Stupor* *Ligamentorum* describi potest, quod sit obstructio ligamentorum à succo nervo coagulato, vel à compressione alicujus rei extraneæ, exorta.

*Laxatio* *n. s.* *Laxatio* verò *ligamentorum* describi potest, quod sit eorum in longum extensio, à causa violenta vel succorum abundantia ipsa relaxante, producta.

*Contusio* *n. s.* *Contusio Nervorum* sufficienter intelligitur, nec opus est *Descriptione* prolixiore, aut definitione *Logica*, eos Tyronibus magis inutili, eos duntaxat confundente.

*Incurvatio* *n. s.* *Incurvatio Iuncturarum* itidem facile percipitur, cum sc. junctura à causa violenta quadam vel ligamentorum vel nervorum causa incurvantur ac intorquantur. Latinis hic *Affectus* etiam dicitur *Contractura* membrorum, Germanis, *er ist contract*, *er ist krumm und lahm*, vel, *sine Lahmung*. Grecis dicitur, *σπασμός* à verbo *σπασμαίνω* quod ipsis incurvare dicitur. Gallico, *contract de nerfs*, Italis *incortato* audit. Sed sæpe contingitur *Spasmus*, *Convulsio*, *Paralysis*, *Stupor* & *Contractura* inter se confundantur.

*Laxatio* *n. s.* *Laxatio* est capitis articuli è propria sede, sive proprio sinu in alienam insolitam sedem prolapsus, cum motus voluntarii laxione.

*Partis affecta* *n. s.* *Partem Affectam* esse *Ligamenta*, *Tendinesque* ut & *Nervos*, ex jam dictis abundè liquet, nec excludimus *Spiritus animales* ad hos *Affectus* excitandos symbolum suum addentes. Ad rem ergo extimius examinandam, ut eò facilius *Causam* horum affectuum eruamus, in texturam & compositionem harum partium inquiramus.

Uti ergò tendines nihil aliud sunt, quam compages fibrarum purissimarum, quæ ideo fibræ tendinosæ appellari merentur: sic etiam non magna differentia est inter tendinem & ligamentum; Fibræ enim

arctè juxta se invicem oppositæ, constituunt *Tendinem*, adhuc magis verò coarctatæ, *Ligamentum*, firmius tandem junctæ & proximè appositæ *Cartilaginem* & *Os* ipsum exhibent. Et hic asterisco notandum, quod omnes hæ fibræ tendinosæ seu ligamentosæ cavitatem habeant, quæ illas percurrit *Siphonis* instar, cavitatis equidem illa visu apprehendi nequit, sed prostat experientia, quæ validè satis evincit, cavitatem eam esse necessariam, ut ab iis, quibus recta ratio satisfacit, non rejiciatur. Hæc est experientia, nimirum quotiescunque musculus quidam officio suo fungitur, fibræ ipsius maxime abbreviantur, & eodem modo crassiores evadunt. Interim mente nullo modo capere possemus, quo pacto fibræ flexiles crassiores, & breviores eodem temporis puncto fierent, nisi id contingat ab aliquo liquore, qui adimpleat earum cavitatem, quæ longitudinem earum occupat. His positus admodum difficile non erit videre, quæ ratione ea omnia operari debeat: Singulæ fibræ tendinosæ nervum recipiunt, & singuli nervorum ramuli spiritus animales: fundunt in cavitatem singularum fibrarum tendinosarum: Spiritus animales sunt sanguinis partes subtilissimæ, & agitativissimæ, cum cavitates fibrarum tendinosarum subingressi sunt, illas tumefaciunt, & abbreviant: Eodem planè modo, quo aer in intestinum insufflatus ipsum in tumorem extollit, illudque eodem instanti brevius facit, prout etiam videmus in vesicis inflandis.

Sic etiam nervos in ipsorum constitutione pro parte affecta agnoscimus, quorum constitutionem, & texturam etiam paucis examinabimus. Superficies cerebri & cerebelli æquæ ac media medullæ spinæ dorsi, observantur ex corpusculorum rotundorum congerie esse constata. Percipiuntur arterias recipere, venas emittere, & ex iis fibrillæ albæ proficiuntur.

Cum

Cum anteriori animo corpora ista rotunda examinentur, nihil aliud in singulis conspicitur, præter arterias, venas & fibrillam albam. Particula, quæ à sanguine sequestrantur, per arteriam non abeunt, cum sanguis ad corpora rotunda ab arteriis advehatur. Vena quoque non excipiuntur: & hoc enim foret, nulla interesset differentia inter arteriæ & venæ sanguinem. Superest igitur ut fibrillam albam subeant, & ita comperimus Cerebri superficiem ex minimistan- tum glandulis constare, quæ ab arteriis sanguinem accipiunt, per venas demandant, & canales habent excretorios, ex quibus manat liquor quem à sanguine separarunt. Vasa quæ Cerebri aut Cerebelli, {cujus substantia est glandulosa,} hujus verò substantia corticalis dicitur, corpus callosum componunt, ita in illis mutuo sunt complicata, ut recte quoddam referant. Nondum liquet utrum mutua sit inter ipsa anastomosis, an recte simpliciter contextatur ex eo, quod se decussatim invicem subeant. Tandem in parvos combinantur fasciculos, qui in membranaceis vaginis occluduntur. Prout in animalis corpus progrediuntur, in plures ramulos dividuntur, & hoc pacto in universas partes expanduntur, ita ut paucissimis Corporis animalis partibus aliqualis eorum portio denegetur. Fasciculi isti vasorum excretorios cerebri, cerebelli & spuræ, *Nervi* de quibus sermo est, appellantur. Denique spiritus animales examinandi veniunt. Quo ad liquorem istum attinet, ex tenuissimis & volatilibus sanguinis particulis necessariò est compositus. Instar auræ subtilissimæ consideratur, quæ in fibras nervorum sese insinuat. Cum liquidum oculorum nostrorum aciem fugiat, nec vel optima microscopia eam visui nostro representare possint, merito jure autumare valeamus, liquorum omnium, qui ex sanguine in glandulis corporis animalis segregantur, cum esse tenuissi-

mum. Cognominatur liquor iste, *spiritus animales*, propter summam suam subtilitatem, & illi sunt ea anima, qua Bruta vivunt, quamvis liquor isto colligi nequeat, ut ejus inquiratur mixtura & constitutio, ab ipsis admisione cum acidis & alcalicis, nihilominus examinabimus, alcalicum volatile in illo pradominium obtinere, cum sulphure supra modum volatili, quod isde constat, quod alcalia omnia volatilia internè usurpata Spirituum animalium penu augeant. Sulphura Volatilia idem ferè operantur: & nihil tantoperè eorum abundantiam promovent, quam alcalia volatilia sulphurata, qualia sunt alcalia omnia volatilia atomatisata. Effectus etiam alcalicorum in sulphura nos in hac opinione confirmat. Nam alcalia sulphura dissolvunt, eorum partes ab invicem semovendo, & hoc pacto impediunt quo minis eorum rami inter se intricantur. Inde fit ut interstitia aut spatia ramorum à materia athera implentur, & quæ ac pori, qui inter sulphura & alcalia remanent, qui tum ampliores sint, quam forent, si liquor simpliciter alcathus aut sulphureus fuerit, copiosiores etiam in se materiam atheram continent: & quoniam materia ista athera in rapidissima versatur agitatione, maximo nixu cunctas partes hujusce liquoris commover, quod partim non confert ad ejus activitatem & tenuitatem. Sed ne diutius extra oleas vagemur, nunc ad ipsam partem affectam *Juncturarum*, quæ sunt illæ conjunctiones articulorum, qui mediantibus ligamentis & ossibus connectuntur, deveniamus.

§. 3. Quod *Diagnosin* horum Affectuum concernit, *Stupor Ligamentorum* cognoscitur ex motus sensusque ablatione, sensus enim in parte est obscurior, instar fornicarum percurentium, pars quoque cui annexum est ligamentum, vix de uno loco in alium moveri potest, torpescit enim pars,

*Diagnosin*  
*Stuporis*  
*Ligamen-*  
*torum.*

& maxima totius artus debilitas percipitur, quia spiritus animales haud influere possunt, hinc necessario pars quasi flaccescere debet; Sic & cognoscitur ex prægressa causa violenta per Compressionem seu Contusionem fortiolem producta. In Stupore seu Torpore non distinctè sed obscurè & velut in somno constitutus, percipit actionem objectorum satis fortiter Organum tactus moventium.

*Laxatio-  
nis Liga-  
mento-  
rum.*

*Laxationis Ligamentorum* signa perunt expressa causa violenta, laceratione artuum, vel à nimio onere, ut non ita pridem talem Laxationem vidi in viro, qui magnum pondus elevare frustra conatus est. In membro ubi laxatio facta est, nullum adest amplius robur, & sæpè excidit, cū id observavimus in Virgine Nobili quadam, quæ ex effuso in terram adeò fortiter rucbat, ut Laxatio ligamenti in junctura cubiti facta fuerit, & simul exciderit cubitus, quamvis is bis vel ter à Chirurgis repositus fuerit, attamen semper rursus excidit, & plures sumptus ac dolores per aliquot annos sustinere coacta, tandem per thermas aliquod solamen percepit. Per vim lapsus caput ossis acetabulo suo est excussum, quod tamen nunquam fieri potest, quin ligamenta debeant laxari, quæ sponte sua quandoque iterum contrahuntur, & os sursum trahunt extra acetabulum suum. Magnus quoque adest dolor, quia ligamentosæ fibræ, quæ sunt in parte opposita, maximè tenduntur. Motus aboletur, quia Os non firmatur in acetabulo suo. *Imperfecta Laxatio* dicitur, cū laxantur tantum tendines membrana, ita ut in acetabulo suo Os vix contineri possit.

*Nervorum  
Contusio-  
nis.*

*Nervorum Contusio* facilius cognoscitur ex partis motu & sensu imminutis, & prægressa causa quadam ponderosa contundente, & plaga, istu, lapsu &c. & inde exorto partis dolore intenso.

*Incurvationum incurvationes* & ri-

gor membrorum ex relatione ægri & sensibus ipsis satis innoscunt, oculis enim Incurvationem ac rigorem membrorum percipimus. Incurvatio enim cognoscitur ex membri contorsione & eurvatura, signis propriis causæ externæ non indigent, utpote in sensus incurvertes, quamvis hoc in passu aliquid lucis concedat dispositio parentum, quatenus claudicantes à claudicantibus sæpe generari experientia docet, nam partium solidarum vitiosa constitutio per hæreditatem in prolem transfertur, prout videmus etiam à debilibus parentibus generari rachiticos. Coniunctus sæpè est tumor & durities, succedit his curvitas membri, quatenus sc. ligamenta ac tendines ob fibras musculi breviores redditas, adducuntur versus principium, unaque cum iis ossa quibus inferuntur, retrahuntur. Nec tamen ullus percipitur dolor, adest aliquando partis atrophia, sic vocatur artuum contractio sensim facta, unde flexio impeditur, & non nisi cum dolore & vi quadam peragitur, in vicinis partibus fit macies seu atrophia.

*Luxationis* signa Diagnostica sunt communia & propria, quæ ejus causas harumque differentias manifestant. Illa sunt vel mutatio figure membri ordinarii, quatenus in parte ejus altera, tumor, circa sinum seu acetabulum fovea apparet, quod solis oculis dijudicare licet in tenerioribus ac mollibus subjectis ac membris; in carnosis verò & crassioribus contrectatio simul requiritur: vel longitudo membri vitiatur, quatenus hæc modo deficit; in Luxatione perfecta & ad superiora contingente modo nimia est, sc. in subluxatione & prolongatione. Dein motus membri lesi cū hic aboletur in luxatione completa, seu imminuitur aut depravatur in Subluxatione. Postremo dolor circa juncturam, nisi tendines & ligamenta nimis laxata fuerint, v. gr. in Luxatione à causa interna, ab humorum ad

*Incurva-  
tionum In-  
curvatio-  
nis.*

*Luxatio-  
nis.*

liga-

ligamenta atque tendines effluxu, & stagnatione circa juncturas, luxationem esse colligitur. 1. Ex succorum evasitorum copia. 2. Si Luxatio sensim atque sensim fit, ita ut luxandum membrum per aliquod tempus huc atque illic motibus inordinatis agitetur, vacillet, ac licet reponatur mox iterum prociadat. Callum verò subesse judicatur, si membri ante luxati restauratio contigerit, præsertim in articulis non multa carne stipitis, ut in cubito, genu &c. Callus autem sicuti modò durior modò mollior est, ita illius signa sunt, quòd articulus gracillimus ac siccissimus deprehendatur, nec ab ægto nec ab assistantibus violentiori manu moveri queat, extenuatio & gracilitas membri si sit diuturna.

Molliorem è contrà adhuc significat, si recens fuerit dislocatio, si membrum aliquantum adhuc moveri queat, ad tactum quoque tumor mollor observetur. Denique Tophum subesse, præter signa causarum internarum & calli durioris generalioris suadet dispositio ægri arthritica.

**Ætiologia secundum Galenicis Stuporis Ligamentorum.** §. 4. Galenicus causam Stuporis Ligamentorum dicunt esse ex cerebro & dorsi medulla, nervisque & inde exortis, vel in ipsis ligamentis ex nervosis partibus constantibus, idque vel ex intemperie quapiam, vel ex aliquo impactu humore provenire ajunt, potissimum tamen Torpores Ligamentorum & sentiendi difficultates ob refrigerationem accidere volunt, Ligamentorumque sensibilibus obstruere meatus.

**Luxationis seu Resolutionis Ligamentorum causam effectricem deducunt ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiam terrestri & Melancholico humore, volunt etiam vitium hoc ex qualitate calida aut sicca proficisci, ubi calida intemperies sanguinem & humores nimium torrefecerit: similiter etiam ob frigidam qualitatem solam vel ab evacuatione nimia Laxationem**

hanc provenire contendunt.

**Nervorum Contusionis** causam dicunt continui solutionem à causa violenta, à re externa quacunque contundente, & dolorem insignem inducente, imò sæpè cutem ipsam solvete & exulcerante, obortam.

**Juncturarum Incurvationes** seu Articulorum contractiones ob humorem pituitosum aliumque impactum, aut nervi affectum quempiam in artubus, oboriri dicunt. Imò has contracturas ex ellebori potione sæpe contingere, scribunt.

Articulorum Luxationum causas dicunt Veteres vel internas vel externas. Internæ ipsis sunt humores excrementitii, & status: nam humores ligamenta ita humectant & resolvunt, ut articulos continere non possint, status autem distendunt, ut ossa conjuncta divellant, uti sæpe in passione arthritica & ischiatica apparere dicunt. Externæ causæ sunt casus, ictus &c. Hereditaria sunt quæ licet non necessario fiant, sæpe tamen contingere ajunt, ut gibbosi à gibbosis, luxati à luxatis generantur.

§. 5. Paracelsus Ligamentorum stupescionem dicit, quando ea læsa dormire videntur, ac si formicæ discurrerent in iis. Laxationem vero ligamentorum ait à nullo alio esse quam à defectu glutinis albi, seu sinoviz, ligamenta nervosa non amplius irritantis, sed ab aliis humoribus effluxis ea relaxantibus.

**Nervorum Contusionis** causas pro catarticas habet vel ruptionem, vel casum ab alto, vel plagam à re externa violenter nervos contundente, nam istis de causis non tantum sanguinem extra vasa effundi existimat, in parte dolente colligi, in grummos abire, ac tandem putrefactum, vicinas partes erodere, ac vulnus facere; sed & nervos ita lædi, ut Sinovia vel gluten album evasetur.

**Juncturarum seu articulorum Incurvationis** seu Contracturæ causas



INURVATIONE  
DE SEN CŒ-  
STRATURA.

fas plures dicit Author: Unam fieri ait ex læsione corporis, & quidem ab externis accidentibus, utpote verberationum, vel fodicationum ictibus, casu, vel alias diversimodè, jaculis, telis, bombardis, abstrusionibus, fractionibus &c. quandoque etiam propter constipationem in carne, quæ nutrimentum impedit, contracturam contingere statuit, vel propter venarum obstructionem quæ nutrimento suum transitum impediunt, non ut ille amat loqui, per naturam, sed accidentibus extrinsecis: item contracturas oboriri probat ex alteratione pororum & meatuum in arteriis, sæpius etiam illam contingere arguit, ut propter abbreviationem alicujus membri, vel curæ defectum, ( quæ fiat plerumque ex medicamentorum impertinentia ) contractura nascatur, quia, juxta ipsum, causa per quam lapsus jam factus fuit, carnes & venas obstruit atque mortificat, ut nervi prorsus in se ipsis deficient, membroque nullas vires adhibere valeant, unde etiam ipsum deficere cogitur. Aliam contracturam ex calculo vel tartaro procedere scribit: omnes ergo partes quæ à Tartaro vel calculo recipiunt impressiones, tartaræque proprietates, quas retinet, secumque velut ad regiones, ad quas à natura disponitur, ibidem contracturas oboriri contendit. Quod si pauca fuerit hujusmodi substantia, manet in fundamento hærens, & Incurvationem dorsi facit. At si paulo plus fuerit substantiæ, progreditur ad femora: si plurimum, ad externas corporis partes, infimasque transiens, contrahit omnes, impotentesque reddit. Arenæ lithiasisque materiam lapideam esse dicit acerrimæ concretionis & coagulationis: cum igitur venis, juncturis, ossibus, medullis, & carnibus admiscetur, horum naturam immutat nutrimentum, ductus obstruit, venas & medullam ossium frigidificat, ut, instar aceti coagulati fiant, per acetosam & tartaream

hujusmodi frigiditatem prorsus immobilia membra fieri memorat: nec solum propter frigiditatem, sed etiam ob auctam æredinem ipsæ venæ corrodon-  
tur.

Contracturarum ex colica originem humorem acetosum esse dicit, quare humoris vis causat ejusmodi attractiones, & postmodum inducit intorisiones in membra capitalia, cum concepta humorum pravorum receptione, ibidemque manentem irrationem huic similem ramdiu, donec per eum humor perniciosus illæ vitæ penitus absumat.

Sic quoque contracturas ex cholera ortum suum habere singulari explicat capite. Fieri ergo potest juxta ipsum, ut ex invidia nascantur Incurvationes, & ex istis contracturæ, prout ex cholera proveniunt.

Sic quoque contracturas ab excessivo potu vini tartarei provenire scribi explicatque.

Dolor qui *dislocatio juncturæ* infest, Author non aliunde provenire scribit, quam ex liquore, qui extra suam Anatomiam excessit, & ex acetositate hac membri dolores oriuntur. Nam liquores juncturarum ubi corrumpuntur, secundum eum in incendium transeunt. Pariter Anatomia corporis pati minimè potest absque dolore, membrorum dislocationes, aut læsiones fieri, quod in sua sanitate rectam dispositionem capiat: ejusque natura talis est, ut prout concatenata, nervis, arteriis, venis &c. juxta hunc ordinem fore manereque velit & debeat, à quo si perturbetur, dolorem concipit illi similem, qui fit ex vulnere, fodicatione, vel ruptura. Quare juncturarum dislocationes optimè considerandas esse monet, quod nonnullæ proveniant ex rabilibus, aliquæ ex dislocationibus Anatomiz humore acido, veteri crescentia, reliquæ ex Synochia humorum corruptione. Ex quibus omnibus dolores membro-

In Luxa-  
tione seu  
Disloca-  
tione.

rum oriri posse contendit, ariditas postmodum & contraturas.

Spasmi similiumque morborum occasionem esse dicit Fluxum mineralem ex arsenico, natura cuius & conditio est excitare humores & calores.

*Helmontii sententia de causa Ligamentorum Stuporis.* §. 6. *Helmontius* dicit cruorem esse spiritum, item traduci in sanguinem arterialem, & dare spiritum vitalem, ejus favore à mente informetur atque animatus fiat, & hinc demum transferri in sinus sive stomachos cerebri, ibidem variam suscipere characterum determinationem, ita ut motivus fiat in spinali medulla, visivus in opticus officinis. Qui si aliquo errore ad linguam ducantur, gustatui sunt plane inutiles. Quapropter fieri ut non raro partes vel membra *stuppeant*, ut in nostro affectu, in quo pars aliqua mobilis vel sensum vel motum, relicto sensu amittat, *causam* esse hujus *Stuporis*, eò quod alieno spiritu & devio, partes irrorentur, sunt nempe juxta eum tantum auctores motui impares & vicissim. Stupefacto membro sensum redeuntem fieri quasi titillando scribit.

*Ligamentorum Laxationis.* *Ligamentorum* verò *Laxationem* dicit esse à copia laticis ligamenta nimium relaxantis.

*Nervorum Contusionis* causam esse dicit injuriam quandam externam nervos contudentem: juxta ipsum nervus est organum delativum, imperii arbitralis, intus nervum dicit esse medullarem, extra verò tegi membranam suam, qui etiam motum ad musculum defert, quoties ergo illis accidit injuria, vel contunduntur vel etiam contrahuntur.

*Incurvationis seu Contracturæ.* *Incurvationes* seu *Contracturas* Juncturarum Author esse dicit à convulsivis motibus juncturas contrahentibus. In unoque dolore contracturam observasse scribit.

*Luxationis.* *Luxationis* causam eandem agnoscit cum reliquis Authoribus jam dictis, & modo dicendis.

*Tomus II.*

§. 7. *VVillivius* statuit, *Fibrarum* musculi compagem constituentium motum ac sensum à spiritibus animalibus vel influentibus vel insitis pendere, ad idem opus peragendum magnopere non currentibus, & liquore nerveo & latice sanguineo. Dum enim liber est spirituum animalium per nervos in fibras tendinosas commectus, liquor nerveus in debita crasi perseverat, & sanguis absque ullo impedimento in musculo circulator, tendines ac ligamenta acutissimo sensu gaudent, & ad omnes motus promptissime exercendis parata existunt. Si verò ex fibris tendinosis aliquales spirituum animalium irradiatione propter compressionem vel obstructionem, aut in ipsis aut in fibras nerveis contingentem orbentur, vel liquor nerveus degener existens spiritibus rapide convehendis amplius non sit idoneum vehiculum, aut sanguine tum ob crassitatem tum ob visciditatem tardius circulante, vel à compressione aut obstructione vasorum sanguineorum prædita ejus in musculo circulatione, levius tantummodo advenit spiritus animales in fibris tendinosas, ligamentorum motus & sensus hebetiores fiunt, spiritibus nec motus nec copia sufficientibus tum fibris tendinosas distendendis & contrahendis, tum impressionibus in ligamento susceptis, undulationibus suis ad sensorium commune deferendis, unde Author *ligamentorum stuporem* deducit.

*Laxationem* verò *Ligamentorum* oriri vult à fibrarum nervicarum in ejusdem musculi ligamentum tendinum obstructione, vel compressione, aut continui solutione. Fibræ itaque ligamenti spirituum afflatu amplius non extensæ, collabascunt & concidunt, & contractioni penitus inhabiles fiunt. Si verò dissectæ fuerint, spirituum penu ligamento communicare nequeunt. Sed præter jam enumeratas causas, particulares quasdam narcoticas spirituum extinctorias eundem effectum producere

*Juxt. VVillivii sententia de causa Ligamentorum Stuporis.*

*Laxationis Ligamentorum.*

re posse affirmat, quæ si potentiores fuerint, sine magna viarum-obstructione ligamentum laxate valent, in nervis ductibus quosdam spirituum manipulos deiciendo, vel à motu supprimendo.

*Nervorum contusio.* Nervorum contusio nem Author adscribit gravi cuidam instrumento violenter parti alicui applicato, & vim suam ad nervum usque parti insertum exerenti, fibrasque ipsius propius ad se invicem admoventi, spirituumque animalium & humoris nervosi per canalem ejus liberum influxum prohibenti.

*Incurvatio.* Incurvationis causam reputat Author non solum pendere ab irritatione musculi antagonista, in cujusdam articulationis interiori parte positi, verum etiam & præsertim à copula explosiva & nimis elastica spiritibus animalibus adjuncta, cum liquore nervo à Cerebro descendente, & per nervos in musculos delata, & in eorum tendines transiente. Fætur tamen extraneas istas particulas, nullamque cum spiritibus animalibus proportionem servantes, in nervos sese insinuate posse per eorum fines, & musculi quem ipsi subingrediuntur, contractionem hoc pacto inferre posse, indefinenter autem contingere hujusce materiz heterogeneæ & spirituum collisione, violentæ ac continuæ eduntur explosiones, spiritusque tanquam æstro perciti vehementer exiliunt, fibrasque ipsos continentes instant atque extendunt. Fibræ enim hac ratione in latitudine sua auctæ, in longitudine sua imminuuntur, partemque musculo, quem component, appensam ad se retrahunt, ejusque incurvationem inducunt; Talis verò persistit Jundituræ Incurvatio, donec materia illa explosiva à genere nervoso deturbata fuerit, succusque spirituum irriguus ab ipsa fuerit repurgatus.

*Incurvatio luxati.* Incurvat luxati statuit Author vel ab externis vel internis causis, externæ sunt motus cujusdam par-

tis violentiores, ejusdem contusiones, casus, ictus, contusiones &c. ad internas veto causas refert succi netvei varia vitia, quando scilicet liquor iste partibus spermaticis nutriendis viscidior existens, terestribusque particulis abundans, fibras cartilaginis cavitatem ossis caput excipientem obducens, quas subingreditur, transcutere nequit, in iisque remoratur, & congeritur. Fibræ verò illius aggestione inflatæ, ampliusque spatium occupantes, ossis caput à receptaculo suo tandem ejiciunt: humor quoque nervus copiosioribus particulis aqueis dilutus, & in ligamentorum fibras delatus, earumque fibras adimplens, ipsas laxiores efficit, & ossi in proprio situ contingendo illas inhabiles reddit.

*§. 8. Sylvius Ligamentorum stuporem deducit à defectu spirituum animalium & eorum denegato totali influxu, malè affectos depravatosque censet spiritus animales, quando 1. nimium torbidi agitatione sunt, aut etiam perpetam moti: quando 2. impuri sunt & à re quavis præter naturam ipsis admista inquinati. Animalium spirituum Torporem, vel agitationem nimiam, motumve inordinatum observari facillimè ait Author in animali motu tunc simul læso. Torpidos & ad motum ineptos esse Animales Spiritus censet ob vim Narcoticam ipsis admistam, vel in corpore paulatim productam, vel forinsecus introductam, nunc ex aere inspirato, & carbonum fumo inquinato, nunc ab alimentis medicamentosis, potu generoso præsertim, ac inebriante, ipsisque medicamentis, opio puta, omnibusque opiatis perperam, h. e. immodicè cujusvis respectu assumptis, vel Ligamentis applicatis, hinc ipsorum sapius oboriri scribit ligamentorum stuporem.*

In Laxatione Ligamentorum author culpam humores pituitosos & aquosos circa ligamenta hærentes, ipsorum tunicas, membranasve hinc & Medullam humedantes,

*Secundã  
Sylvium  
causa Li-  
gamenta-  
rum stupe-  
rit.*

ac forsan eatenus laxantes, ut ipsa per subsistentiam collabens Tubulos suos transmittendis Animalibus spiritibus ineptos reddat, evincere videtur Laxatio Ligamentorum à pluvia frigidiore, post vestes inde madentes partem hanc aut illam afficiente orta, ut nunc vel hæc vel illa vel plures partes motum ac sensum plus minus amittant.

**Nervorum Contusio.** Nervorum Contusionem Author fieri ait à causa externa, istu, lapsu &c. nervos contundente, unde spiritibus animalibus denegatur totalis influxus, hinc necessario in parte affecta sensum ac motum imminui statuit aliquando cum aliquo partis Stupore ac Torpore.

**Juncturarum Incurvationem** dicit oriri vel à Ligamentorum obstructione, à materia viscida tenacique, vel ab eorundem læsione violenta, spirituumque animalium influxu denegato.

**Luxatio.** Situm Ossium vel Juncturarum extraordinario mutatum Author dicit esse *Luxationem* vel *Subluxationem*, prout vitium fuit gravius vel levius. Juxta ipsum fit Luxatio, quando partes duæ pluresve solidæ, duræque, ossa puta, sibi mutuo adaptantur, ut alii functioni, motui nempe inserviant, uti fieri asserit in Ossium articulatione, dicuntur ab ipso ita sitæ, hincque ipsarum esse situs, quem quoties mutant, dicit Ossia luxari ac dislocari, patique morbum in situ, quoniam functionem, motum partis lædunt.

**Cartilagineorum opinio de causa Ligamentorum Stuporis.** §. 9. Cartesiani causam *Stuporis Ligamentorum* deducunt ab ipsorum obstructione, non enim dubitant illa usum eundem ac nervos præstare, obstrui verò Ligamenta posse concedunt vel à causa externa premente vel contundente, vel à ligatura fortis, vel à tumore vel ab onere incumbente, itidem à succis nimis crassis viscidis ac tenacibus, spiritibus animalibus transitum denegantibus, quibus partes destitutæ necessario stupere debent. A defectu spirituum animalium

à magnis morbis defunctis oborto, hunc affectum sæpe observasse notarunt prædicti.

**Cartesiani** lymphæ copiosioris circa ligamenta stagnationem causam pronunciant eorum *Laxationis*, quatenus fibrosa substantia ab ex nimium distendatur, hæcque ita distensa & relaxata lapsum quandam mentiat. Nec quoque vim violentam excludunt à qua sæpe ligamenta ita distendantur & relaxantur, ut elabi debeant, nullumque amplius robur relinquatur Ligamentis.

**Nervorum Contusionem** vel istu, vel casu à re quadam externa dura & obtusa excitari statuunt, unde cute non soluta, non tantum venulæ vel arteriolæ conquisitione dilaceratæ sanguinem, sed & ipsi nervi contusi aliquando succum nerveum profundunt, qui succi extravasati, nec in debitas vias regredientes cutem extollunt, & pro majori vel minori sui corruptione filamenta membranæ, & nervulos plus minus exagitant; vel vehementiorem vel remissiorem causant dolorem.

**Juncturarum Incurvationem** esse vel ab ortu, vel à causa interna vel externa statuunt, internam esse vel contractionem ligamentorum à succis acidis, vel acido Incurvationem ob Luxationem, Fracturam, vel ob humoris serosi copiosam in junctura quadam collectionem & stagnationem, subsequentem tumorem durum ac sæpe dolorem. Sic quoque Juncturarum articuli sæpe quasi ligantur & immobiles redduntur, debili existente succo nerveo spirituosos, & imprimis à stagnatione, & coagulatione humorum ab acido. Vel etiam fieri posse contendunt hanc Incurvationem, à motibus convulsivis & paralyti, motui quarumcunque partium maximè contrariis.

*Luxationem* sæpius contingere norunt ab ingressu infeliciter peracto, aut re violenta obveniente, lapsu, concussionem & interdum, quam

*Ligamentorum laxationis.*

*Nervorum contusionis.*

*Juncturarum incurvationis.*

vis rarius, à musculorum debilitate, ob spirituum animalium parciorem influxum, quo fieri solet, ut musculorum fibræ non sufficienter tendantur, sed flaccescunt ad levem quamcunque causam articuli protuberantes pristino suo loco excidere possint. Sed ut plurimum Dislocationes seu Luxationes oboriri solent à casu, ictu, saltatione, cursu, extensione violenti Juncturarum. Vel ab internis causis, si scilicet humores in Juncturis evasantur ibidemque diu stagnant, tandem Subluxationem efficiunt.

*Nostri* §. 10. Restat ut & *nostra* nunc addatur *Crisis*. Nor verò mediotutissimi inter prædictas opiniones habemus. Verissimum est quod *Stuporis Ligamentorum Cause* plures esse possint; Est verò ut plurimum ab eo, quando scilicet nervi premuntur, ut liquor nerveus per suos tubulos liberè persuere nequeat, si ve viz præcludantur à succis coagulatis ibidem latentibus, vel à tumore vel callo ipsos comprimentibus, vel à fortiori ligatura aliaque causa violentiori graviter premente. Hic enim notandum velim de Ligamenti, quòd non sunt tantum partes simplices ut Veteres existimarunt, nec duntaxat Ossæ colligant, sed, me judice, ligamenta præstant usum tendinum ac nervorum, & plus ad motum quàm musculi contribuunt, quia ceu dictum, ex fibrillis constati sunt, qui pro succo spiritus animales vehunt. Et cum in Stupore obstructio non adeo sit vehemens, ac impacta, ut omnes fibræ tendinosæ conspiciat fuerint, sed nonnulli spiritus adhuc transcant, si enim totalis obstructio fuerit, partis etiam totalis mortificatio seu paralytis oboritur. Præter has causas adhuc aliæ eundem, nempe tumores, polypi, hydropes particulares, succi extravasati, unde canaliculi & fibrillæ tendinosæ comprimuntur, ut spiritus eas persuere nequeant, item lésiones ex Vulneribus, casus ab alto, similiaque, quibus fibrosa Machina quoad par-

tem quandam articuli læditur: quod etiam fieri potest à quocunque liquoris nervi defectu oborto: quem admodum enim obstructio in cerebro Apoplexia dicitur, sic & in nervis facta obstructio, & quidem extra cranii mænia, Paralysis vocatur, qua impeditur, ne ad hanc vel illam partem spiritus vel succi moventes transcant, hinc vel in uno latere existit, vel ambo latera medullæ spinalis obstructa sunt, & tunc Paralysis universalis dicitur. Ita quoque particularis dici potest, cum brachium, crus &c. moveri vel officio fungi non possit: sic quoque quando ligamentosæ fibræ obstructæ sunt non in totum sed quoad partem hanc oritur stupor. Statuimus enim esse interceptas non in totum sed quoad partem vias, hæc autem viarum interceptio vel oritur à compressione, ceu dictum, vel obstructione, vel in spirituum depravato influxu & quasi narcosi. In *prima* à succis in vasis, aut extra eadem existente tumore, vel luxatis membris fieri potest. In *altera* à succis crassis ac viscidis intra eadem vasa. In *hac* à fumis narcoticis variorum vel simplicium vel compositorum, vel à spirituum animalium consumptione nimia à quacunque causa etiam facta fuerit. Compressionis itaque causæ quandoque erunt succi crassi, viscosi, in vasis vel extra eadem, in juncturis circa ligamenta, & in eorum poris collecti, neque per emunctoria expurgati, vel unico momento elapsi, si ve crassi sanguinei Asephlegmatici fuerint, quorum singulorum moles porosam fibrosarum tendinosarum substantiam vel sensum comprimendo *Stuporem* hunc inferre aptæ nata sunt: Tumor quoque adjacens Stuporem hunc inducere potest, ceu bigam exemplorum novimus:

Sic etiam ab ictu, casu, percussione aut allisione ad corpus dorum ligamenta hæc comprimi possunt, ut spiritibus animalibus transitus denegetur. Obstructionem etiam

in nostro affectu producent vel sanguis, vel lymphæ, sanguis potissimum crudus, quando scilicet sub forma sanguinis in ligamentorum substantia porosa extra vasa effusus, poros ibidem occupando, tales obstructions inferre valens; hujus autem sanguinis effusionis causæ internæ, (procatarticas enim negligimus,) possunt esse vel tenuitas, vel illius motus & volatilitas, aut acredo. Effuso autem jam sanguine fluida & volatilia evolant, & disfluunt, unde à tergo grumofam terrestremque sui portionem relinquunt, hujus Affectus sæpe Fabrum.

Serum quoque subvifcidum & lentum, quod eodem modo extra vasa ibidem locorum depositum, relictæ suæ viscidioræ & lenta portione, tantas clades introducit, & hinc sæpius catharhosis, imo iis qui ad Apoplexiam inclinant, hic Affectus solennis esse solet. Sæpe & vidimus hunc Affectum à punctura nervi, vel alicujus membranæ, ceu in V. S. malè à Chirurgo instituta, obortum. Idem præstare poterit spirituum animalium influxus denegatus, atque inde emergens ligamentorum ac tendinum laxitas, prout observavimus sæpius in Paralyticis, & ob sanguinis & succorum effectam indolem in scorbuticis ac Cachecticis observatur Stupor.

*Ligamentorum Laxatio* fit, me judice, itidem à causa violenta externa, vel à lapsu, extensione nimia, per vim enim lapsus & duritiæ lapidum substratorum caput ossis alicujus articuli acetabulo suo excidit, quo vix fieri potest, quin ligamenta laxentur, inde oritur aliquando luxatio & articulus, imprimis si femur luxetur, fit brevior, & interim ligamenta, quæ sunt in parte opposita magis tenduntur, quam solent ordinariò, hinc intensius oritur dolor, atque perfecta vocatur luxatio. In imperfecta luxatione laxantur tantum tendones, membranæ, ita ut in acetabulo suo os articuli contineri vix

possit. Laxatio Ligamentorum etiam fieri potest à laxitate pororum, à colluvie serosa producta, prout sæpe observavimus in catarrhis, vel à fibrillarum tendinosarum ac ligamentosarum diruptione, & nimia extensione, ut luxatione artuum fibræ tendinosæ vix abbreviari possunt, utur elongatæ, sic & oritur à minima in istis fibris existente spiritu animalium, copia, quoniam horum virtus à robore elateris fibrarum augefcit.

Diximus superius de parte affecta, quod nervi nihil aliud sint quàm congeries innumerabilium filamentorum teretium, quorum multa, non tamen omnia ortum suum habent à superficie concava ventriculorum cerebri. Spiritus animales continuè ex ventriculis cerebri immadiatè per poros concavitate ventriculorum sive tubulorum, nervorum initium in omnes nervos insuunt & omnes tubulos implent, tum fibrillas omnes nervosas à se invicem separant, & singulas fibrillas in spiritibus innatare faciunt, & in hoc consistit nervorum tensio, flaccidi sunt cum spiritus non insuunt in nervorum tubulos, quare omnes subsident & supra se invicem collabuntur fibræ. Contusio ergo nervorum oritur ut plurimum à causa violenta externa, lapsu, ictu, plaga &c. hinc contusi nervi spiritus animales admittere nequeunt, sic partis interitus imminet. Et cum nervi ex plurimis fibris consistant, hinc plures sæpè contunduntur, salvis relictis, & aliis sufficientibus pro motu partis.

*Incurvarum Incurvationis causa* possunt esse internæ & externæ; internæ sunt variæ, & quidem vel ab ortu tales prodeunt, vel à succis effusis, vel à contractionibus Ligamentorum ac tendinum ab internis causis exortis, prout videmus in Affectu isto Anglico puerorum, ab illis Rachitidis nomine insignito, certè nobis Germanis itidem

*Contusio Nervorum.*

*Ligamentorum Laxationis,*

*Incurvarum Incurvationis.*



fatis familiari, cujus. Affectus causas deduximus in *Encyclop. Medica de morbis Infantum*, capite de Rachitide. A causa violentiori quacunq, itidem influxu spirituum animalium denegato hic Affectus oboriri potest. Sic quoque causa externa cum interna concurrat, unde etiam est, quod tenellorum puerorum ossa frequentius, & à causa externa leviore membrorum Contusiones, patiantur, eò quòd eorum articuli imperfectiores & molliores adhuc sint. Confer *Volch. Coiter. de Ossibus Infantum* l. 1.

Dum autem succi abundant & evasantur, spatia & poros fibrarum distendendo contractionem hanc artuum inferunt, imprimis si sint vel succi vel spiritus animales crassitie & tartaro sceti, hi enim ad motum & circulationem minus sunt apti, unde in musculorum spatiis stagnant, accedente frigore vel calore nimio volatili indurantur, unde topi Podagricorum sèpissimè produciunt contractionem. Possumus enim huc referre vapores raritate conspicuos, viscidis & acidis inter se non ritè effervescentibus, qui distendendo effectum hunc sinistram aliquando inducunt. Atro quoque notanda sunt carbone salia succis nostris immersa tartarea, austera, acida, tanquam summè nociva. Tanta enim ~~aditio~~ inter acidum partes solidas, & succos nostros, ut quamprimum istud augmentum capiat, centena præsto sint mala, tum omnium quidem partium, tum imprimis nervosarum fibrillarum. Acida enim ut & frigida figunt seu coagulant spiritus fluidissimos, nervos ac membranas stringunt, erispan, hinc non mirum est, *Juncturas* ob partes nervosas & membranosas ab iisdem tam sinistram inferri effectum. Motum tandem & quiete etiam peccant succi; isto quidem, quatenus copiosè ad has partes deportantur & emanant, sive in ipsa læsa parte colligantur, sive à massa sangui-

nea per vasa istuc ferantur, unde succedet quoque quies sive stagnatio, dum enim succi ob spissitudinem per poros expelli nequeunt, stagnat ibidem & partibus molesta fit. Multum hic facit dispositio hæreditaria, hæc enim sapius in gnatis arthritidem scorbuticamque frequentes se. contractione causas, producere apta est. Inter remotiores causas referri possunt aer tam calidus quàm frigidus, uterque tamen in excessu peccans. De quibus, ut & de cibis videatur *Dietæ*. Sunt nonnulli qui inter causas referunt fascinum, venena ac philtæ. Contracturam à Mercurio præposterè usurpato, non ita pridem in cive observavimus. A Luxatione & fracturis, ulceribus & vulneribus Juncturarum, si non ritè curentur, imprimis non rectè deligantur, non raro perfectam contractionem oriri quis negabit? in utrisque enim est distortio, & in priori quidem si ad latus aliquod fiat retractio & abbreviatio musculorum, quæ in causa est, cur ad membra hoc modo efflata restituenda sit necessaria quammaximè extensio & deligatura partitis.

Contractura alia est universalis, qualem vidimus in duobus Baronibus Thermis Embrensibus utentibus, qui rigidi & ita contracti erant, ut nisi à famulis portati non moverentur. Alia verò est particularis quæ accidit in artuum horum vel illorum juncturis, pedibus, brachio &c. imò ipso quandoque dorso quod contortum vidit *Thiernerus* in mercato quodam. Alia est connata, *Platorus* enim se vidisse ait quosdam rigido dorso vel inflexo alius, quæ partibus contractis natos. Hic Cassellis est puer, 9. annorum è Gallia profugus, laborans spiniventosa, ubi manus, digiti & femur sunt tumida, imò ipsa spina dorsi plane contorta est, & sic cum ventre tumido contortus incedit, & munia quadam peragit. Rati-

zione morborum affinium differt contractura à convulsione, quod hæc non tamdiu duret, sed citò terminetur, ista sit constans ad multos annos imò usque ad mortem perdurans, & quidem sine dolore, hæc verò summo cum dolore. Convenit contractura cum Paralyfi in genere, quod in utraque sit impotentia motus, differt tamen quod Paralysis à resolutione, Contractura verò à contractione, unde & nomen habet, oriatur.

*Luxatio-*  
*num,*

*Luxationum* causa itidem vel interna vel externa sunt: Internæ præter conformationem ossium, ligamentorum & musculorum vitiosam, (quemadmodum latius ossis innominati acetabulum, & exilius ossis femoris caput Luxationi incurabili occasione dedit *Kerkringius* Spicileg. Observat. 61. tradit:) sunt succi imprimis lymphatici extravasati, & in juncturis decumbentes, qui vel ligamenta interiora atque exteriora laxantes, ut horum tono vitiatò firmiter talis contineri nequeat, vel eodem musculos & ligamenta externa contrahentes, ut hæc abbreviata, illa è sedibus quasi protrahant. Illius generis humores, hincque emergentes Luxationes observavimus in hydropicis, catarrhosis, &c. quæ verò ex musculorum & ligamentorum contractione violentiore accidunt, convulsivus præcipue artuum motus pro causa agnoscunt. Imò iidem succi intra articulos congesti & stagnantes, mole & pondere suo ossa extra sedes deturbant, præprimis, si coagulentur, & in topum abeant, exempli grat. in arthriticis, quò etiam referri debent calli in acetabulis dictis, post tardiorum ossium luxatorum repositionem producti: confer *Sculleti Armament. Chirurg. Part. 1. Tabul. 36.* Dein Luxationem inferre potest spirituum animalium influxus denegatus, atque inde emergens li-

gamentorum ac tendinum laxitas quemadmodum in paralyticis quotidiana confirmat experientia. Externæ causæ sunt varia violenta, quæ machinæ ac imprimis ejus artubus accidere possunt, scil. extensio, lapsus, ictus, &c. ita ut horum vis fœtui quoque intra uterum adhuc latenti Luxationem inferat, prout nuper in puella recens enixa luxationem vidimus, imò in proprio filio meo Johanne Daniele, qui cum luxato pede in lucem prodit, tempore enim ingravidationis uxor mea *Charissima Susanna*, nata Svert Hanovicnsis, in terram ruebat, remanente pede in scala, & sic eodem modo prodibat infans, qui tamen facile curabatur.

Dislocatio juncturarum sex complectitur differentias, à loco in quem os prolabitur, petitis, nempe ad inferiora, superiora, dextrorsum, sinistrorsum, in anticam & posticam partem; quamvis paucissimæ articulationes has differentias cunctas sustineant. Dum verb. gratia, maxilla inferior antrosum saltem in adultis luxatur, os femoris ad interiora, exteriora atque anteriora, rarius ad posteriora: Os humeri rarissimè sursum aut extrorsum, frequentius deorsum seu introrsum luxatur.

§. 11. Pulchrum & ex Medici *Prognosis*, dignitate est, mortem ipsam aut vehementes dolores prædicere. Stupor ergo *Ligamentorum* est malum non contemnendum, hinc ei propediem auxilium afferendum est, aliàs desinet in perfectam Paralyfin, vel Gangrænam ac Sphacelum imò nonnunquam excipit Stuporem hunc ligamentorum arida seu macies, omnes enim affectus nervosarum ac tendinosarum partium, imprimis earum obstructions sunt periculosissimæ Prodromus quandoque est Apoplexiz.

*Laxatio Ligamentorum* est affectus curatu difficilis, & sæpè post se relinquit Paralyfin ac debilitatem partis, facile etiam malum hoc recrudescere solet, semel enim relaxa-

laxata istæ fibræ, facillimè iterum relaxantur.

*Nervorum Contusio* est affectus periculossimæ aetatis, quam facili Marte excipit partis Necrosis, aut Paralysis aut Stupor, imò inde etiam possunt produci deliria, febres, tumores, inflammationes & convulsiones, quæ symptomata sæpe excipit mors truculenta, cui id aliquoties observavimus; quare huiusmodi contusiones non parvi faciendæ sunt, sed statim appropriatis remediis obviandum. Nervus enim est pars nobilissima.

Quod signa Prognostica *Incurvarum Incurvationis* attinet, omnes consentunt uno ore Practici esse morbum chronicum, hinc magis molestum, quàm periculosum, quia nullis partibus nobilioribus aut ad vitam necessariis accedit, quod tamen, me iudice, experientiæ ac rationi contrariatur, nervi enim, tendines & ligamenta partes nobiliores, nobilissimum enim vehunt succum vitæ nostræ maximè necessarium. Non negamus tamen affectum hunc esse affectum chronicum. Imminens verò malum facilius curari possè, quàm inveteratum diuque affligens, quis negabit? præsertim in junioribus. Incurvabile verò habetur jam confirmatum ac tophaceum. Incurvatio quæ cum ligamentorum contractione est, difficillimè sanatur. Nisi enim primis huius morbi principis obviatur, chronicus fit, & plerumque commoriens, eoque molestior, & commiseratione dignior, quo non apprehensorios modò, sed etiam progressorios artus occupare solet, atque sic ineptos ad agendum & ad eundem reddit. Podagram sæpissime contractura artuum sequitur, si imprimis ab intempestiva topicorum applicatione materia figatur & in tophos coaguletur. Post coxendicem dolorem contracturam observavimus, ut & sæpè post hemiplexiam, pro ut jam pueri 4. annorum crus dextrum ipsius contractum est, cui medicinam facimus. Sic quoque

tumor durus, scirrhusus, item vulnera juncturarum, & ulcera ejusmodi contracturam inferre possè, Praxis quotidiana docet. Quam contracturam etiam non ita pridem à lue venerea obortam notavimus.

Quod Prognosis *Luxationum* attinet, sciendum, nullam harum per se esse lethalem, nisi capitis & vertebrarum spinæ, præprimis superiorum, luxationem excipias, utpote quam necessariò spinalis medullæ circa suum principium compressio, hinc ad partes inferiores spirituum animalium influxus denegatus excipit. Specialiorem verò Prognosis, & quæ curam faciliorem luxationum aut difficiliorem promittit, suppeditant forma, & conditio Luxationis. Difficilius curatur Luxatio perfecta, quàm imperfecta, ratione causæ, quæ si fuerit externa, faciliorem pollicetur curam, quàm interna conditio subjecti, quatenus in corporibus puerorum & adolescentum, alias mollioribus, Ossa luxata facilius equidem restituantur, non tamen adeo firmiter retinentur, cujus contrarium in adultis & solidioribus subjectis contingat. Sic quoque tempus observandum est, cujus ratione Luxatio recens cum minore inveterata, cum majore labore curatur. Dein ad Symptomata respiciendum est, quæ quo plura & vehementiora, eo magis curationi obstreperunt, quo pauciora & mitiora, eo feliciter promittunt restaurationem; hinc v. gr. Luxationes, in quibus Ossium supercilia franguntur, pessimæ sunt, cum articulus restitutus non firmiter suis retineatur, pariter quibus Luxationibus dolor vehementis, Inflammatio, fractura aut vulnus combinatur, curatu sunt difficiles, eò quod sine Convulsio-num periculo restitui nequeant. Tandem membrum luxatum considerandum, quatenus v. gr. Luxatio vertebrarum dorsii, potissimum ad interiora, difficilius curatur, difficilius quoque reponitur Os femo-  
ris,

ris, (Confer *Ephem. Germ. Ann. 8. Obs. 24. & Ait. Haffa. Volum. 2. Obs. 37.*) quàm humeri. In Luxatione imperfecta curatio quoque solet esse difficilis, quoties per longum tempus jam confirmatam incipit habere longitudinem extraordinariam.

*Dieta.* §. 12. Investigata igitur & cognita morbi cognitione, curationi jam studendum est, & quidem primò *Dieta*; Eligatur ergo aer temperatus, nocet enim frigidus, autumnalis ac austrius, dum succorum transpirationem insensibilem in his affectibus valde necessariam impedit, facitque ut nullæ excrementitiz particulæ in corpore accumulatz ac congestæ effluant, quæ reliquæ magnum inferre possunt damnum. Omnia quoque acida falsa & frigida abroganda sunt, imprimis potus acidus nocet, quæ omnia stagnationem augere, ac ligamentis, nervis ac juncturis incommodum asserre queunt. Sint ergo alimenta boni succi, in specie verò observatum fuit, electionem alimentorum glutinosorum & siccorum in tempore consolidationem promovisse, humidorum impedivisse. Potus sit calidus imprimis Theæ & Cossæ, vel chamædrys, salviæ, rotisuarini, sed ne quid nimis, ni mæcium repletio semper nocet. Nimum motum seu exercitium vehementius detrimentum attulisse hætenus observavimus. Somnus & Vigilia sint ordinaria. Dein alvus aperta semper est asservanda, sic quoque cum aliis excernendis faciendum, restagnantes etiam succi ex mora dum non amplius cum sanguine circulantur, & spiritibus de novo sapius imbuuntur, & sublimantur, acorem contrahunt, coagulationem subeunt, & sic magnam noxam inferre valent. Animi inter Pathematam, Ira Veneri & Baccho nupta, articulis laborantibus infesta esse solet, dum genus nervosum & articulos valde debilitat, spiritusque absumit. Cateri animi affectus, maior ac sollicitudines hisce affectibus ansam dare possunt, quare summa-

perè vitanda sunt, & potius gaudium aliisque exhilarationibus animus recreandus est.

§. 13. *Galenici ad Curam horum Affectuum accedentes*, attendere jubent causas à quibus producti fuerint, hinc Stuporem seu Torporem Ligamentorum amoliri student, refrigerata excalescendo, humoresque extenuando, tum meatus obstruantibus ac rarefacientibus medicamentis laxando, hoc enim loco commodum imprimis ac attenuantem vidum suadent. Prodest, inquit *Celsus*, torpentis membri summam cutem exasperasse, vel urticis casam, vel imposita sinapi, sic ut ubi rubere cæperit corpus, hac removeantur. Scyllam quoque contritam bulbosque contritos Veteres imponunt. Resina quoque cutem tertio die diutius vellunt, pluribus etiam locis, aliquando sine ferro cucurbitulas admovent. Unctioni verò aptissimum dicunt esse vetus oleum vel nitrum aceto & oleo admixtum: quinetiam fovere jubent aqua calida marina, vel si ea non adest, falsa: Thermas & Balnea hoc in affectu magni pendunt.

In *Laxatione Ligamentorum* Astringentia ad Laxantia admiscunt, & frictionem instituunt. Laxatis Ligamentis adhibent oleum cum momento nitri & sacis vini ustæ tritæ. Perfundunt quoque membra luxata aqua calida & maximè marinæ, in qua coctæ sunt Lauri bacæ aut viticis germina, aut sampuchus, &c. Rubificationes autem iis maximè convenire ajunt, proinde cadunt etiam partes ferulis, aut urticæ ramusculis, si verò permaneat resolutio seu Luxatio, dropacem imponere mandant. Omni varia etiam corroborantia applicari volunt, humorem quoque peccantem evacuant per appropriata, deinde dant Hieram addita Castorei portione, initio factò à dimidia drachma cum paucis melle & aqua calida dissolutam, aut per se, aut piperis scrupulo dimidio addito, deinde quatuor diebus interpositis exhibent drachmam perfectam, &

Guta  
pharmaceuticas  
Galenicorum in  
Ligamentorum  
Simplicia.

In Ligamentorum  
Laxatione  
Res.

postea fescuidrachmam, deinde duas tresve. Iplis autem Ligamentis luxatis imponunt medicamenta quoddam astrigentia, adjectis castoreo, aut pipere, aut pyrethro, aut rorismarini semine. Ad hæc commendant irrigationes ex oleo rutaceo, aut Sicyonio, aut veteri. Cucurbitas quoque aliquando Ligamentis resolutis apponunt. Alvim quoque subducunt per aloem, aut polypodium, aut scammonium, aut per pulcem ex colocynthide. Instituunt quoque pingues illinitiones ex oleo vetusto, in quo scylla inveteratur ad dies quadraginta ad Solem. Portiones ex castoreo, item ex Sagapeno pilulas formatas sæpius exhibent. Utuntur etiam acopis calefacientibus, & pituitam per Os detrahentibus. Balneum quoque suadent & post id dropacem: postmodum cataplasmata ex sinapi apponunt si sc. sensus ac motus perierit. Luxatos articulos contrahere ac firmare ajunt acaciæ succum aqua dilutum ac assusum, & spinæ Egyptiæ frustum, rubi item ac myrti, & malicorii, ac foliorum quercus decoctum, & myrteum ac lentiscinum oleum assidue illitum, & malicorium coctum, & cerato myrteo exceptum, aut per se vino coctum tritum ac impositum.

In Nervorum Contusionem.

*Nervorum Contusionem* à causa violenta quacunque, vel à lapsu, vel plaga, vel ictu, factam curare satagunt imprimis si cutis simul contusa fuerit & ulcerata, per farinam fabaceam cum aceto mulso, aut ervi farinam cum sapa, & modico aceto, applicata, ambas enim dicunt efficaces. Quod si cum contusione dolor adlit, picem liquidam ad fabaceæ farinæ Cataplasma addunt, & simul costâ calida adhibent. Si verò majori ressecatione opus esse considerant, tunc partem mensuram farinæ ervi admiscunt, itemque Iridem Illyricam, si adhuc fortius ressecare volunt. At si nervus fuerit contusus extra manifestam cutis Contusionem, oleo calido discussorio, ane-

thino aut rutaceo locum assidue perfundunt, & lana oleo imbuta adhibent; Porro si totus nervus fuerit dissectus, nullum quidem periculum imminere dicunt, verum partem mutilam fieri putant, præsertim si nervus dissectus magnus fuerit.

In luxationibus Incurvationibus.

*Incurvationum Incurvationes* curari posse promittunt medicamentis laxante, mollientique vi præditis; Ad has convulsorias contractiones, oleo imbuta lintecola calida parti affectæ circumdant, & cerata liquida, quæ & Castorei & Syconii quid habeant. Ante hæc quoque artus calida aqua perfundunt, item balnea commendant vel naturalia vel artificialia.

In Articulorum Luxationibus.

*Articulorum Luxationum* curatione quinque scopos Veteres observant: 1. tenendo: 2. trahendo, seu extendendo: 3. impellendo: 4. in debita figura & situ collocando: 5. Symptomata supervenientia corrigendo. Ad primum scopum quod spectat, quem tenendo assequuntur, ille fit, juxta Veteres, vel in toto corpore, vel in parte; totum corpus valido ministri amplexu firmant ubi humerus, aut vertebra, aut femur luxatum est: si verò pars aliqua sit reponenda, utpote cubitus, manus, genu, pes aut crus, partem manu tenere solent. Firmandum ergo esse membrum luxatum fixissimè, ne trahentem aut extendentem sequatur. Secundum scopum perficiunt trahendo, seu extendendo variè, pro vario musculorum Ossium, aut ligamentorum robore, & in hanc aut illam partem luxatione. Quod si ad hoc manus non sufficiat, in usum ducunt varia organa ac machinas à Galeno aliisque depictas. Nec magis extendendum esse membrum inculcant, nisi quantum. Os è directo. sui loci naturalis retractum fuerit. Hoc ubi consecuti fuerint, tertium scopum observant, nempe ossis dislocati Caput in suam fossam modè impellendo. Signa autem ossis repositi sunt strepitus quidam, seu sonus.

sonus qui percipitur, deinde conveniens figura, magnitudo, & doloris remissio. Hoc factoque quartum adimplent scopum, ut Os, postquam repositum est, in suo sinu contineatur, ne amplius resiliat: ad hoc instituunt ligaturas artificiosas cum stupis & spleniis, in oxyrrhodino mageratis, & convenientibus medicamentis oblitis. Quietem imperant & membrum quatruiduo ligatum relinquunt, nisi dolor aliquis, aut graviora, à forti deligatione, aut aliunde supervenerint accidentia: quæ secundum quantum scopum sui correctionem requirunt. Si antiquæ fuerint Luxationes, adsitque callosa aliqua durities, vel humor aliquis in Ossis cavitate; antequam eas pro repositione aggrediantur, fomentis prius ex Decocto intestinorum vervecis, malvæ, alchem, vel unguemollientibus, vel emplastris partem per aliquot dies humectant, & præparant ut magis sit tractabilis, dein humorem qui ad partem influxit, attenuant, lubricant, dissolvunt, ut muscoli, ligamenta, musculorumque fibræ laxentur.

*Paracelsi Cura in Ligamentorum Stupore, Luxatione Nervorum, & Nervorum Contusione, item in Incurvationibus seu Contracturis omnia commendat medicamenta aperitiva pororum, humorum calefactiva, humectantiaque nervos, & arterias. Hoc tamen animadvertit, ut in eodem gradu sint, in quo morbus ipse. Non omne calidum nec humidum quodvis, licet etiam aperitiva sint, facere ad Curam ait, sed ut inclinationem habeant à forma specifica, necessarium esse adjungit, particulariterque particularibus etiam Contracturis apta sint. Spiritum vitæ revocandum esse suadet, recuperandumque & renovandum, excellentissimis & confortantibus plurimum remediis, quorum humore novo spiritus ille vi quadam introducatur in membra, de quibus pravi cum suis venenis & infectionibus humores expellan-*

tur, singulari Medicina practica naturaliter hoc ipsum operante. Duobus modis Curam Contracturæ fieri statuit: uno quidem, ut illa membra quæ sunt à suo loco mota, restituantur, ut decet. Altero verò, ut maximis Confortativis, prout sunt *Aurum potabile, Oleum Solis, Materia Perlaram, Essentia Amimonii, Arcana quintæ essentie, Aqua vitæ, oleum Vitricli, Aqua Tartari, quintum esse gemmarum, Coralliorum, & similia*, paulatim sublevantur, confortentur, & in pristinas vires revocentur.

Sic quoque externum Contracturæ aliorumque Ligamentorum affectuum curandi modum præscribit, per fumigationes ex balsamis & arcanis: per balsama terebinthi, Lauri: per oleum ranarum, adipum, gummi, per arcana, compositum, solidum, & elementatum curat: varia quoque Unguenta describit. Dixit autem author, Contracturas alto modo curari minime posse, quam per Medicinas in supremis gradibus existentes, ut est earum Aurum Potabile, cujus dosis est ʒ i. qualibet vice olei dosi aurei pondus granorum hordei decem non excedat; & quintæ Essentie auri, granorum est trium similium per vicem aquæ vitæ bonæ, vel alterius aquæ subtilissimæ commixtorum, maneque, sub meridiem, & vespere sumptorum, pro medicinæ quidem exigentia & qua sine corrosivorum, aut corruptentium additione fieri non dubitat, sequentem Auri potabilis descriptionem tradit:

*℞. Auri foliati pulverati, necnon in succum soluti ʒ i.*

*& Aceti destillati q. s. est:*

Addito, simulque destillando toties à se mutuo separato, quoad saporis ejus, quod adjunctum est, nihil prorsus maneat. Postmodum sume subsequenti aquæ vitæ ʒ v. quas in pellicanum affusas, simul per mensem digerendo, perfectum esse Aurum Potabile scribit.

Authoris Aquæ vitæ descriptio est sequens:



*R. Tini ardentis* ℞ x.

*Rosarum, Melissa,*

*Rorismarini*

*Anthor*

*Cheiri*

*folior. utriusque ellebori*

*Maiorana* aa. Mj.

*Cinamomi*

*nuc. muscata*

*Caryophyllorum*

*Granorum Paradisi*

*piperum omnium*

*eubæarum* aa. ℥ ii.

*succ. Chelidonia*

*Tapsi*

*melisse* aa. ℞ β.

*Cinorum fabarum* ℥ v.

Mixta simul omnia per duodecim dies in pellicano digerantur, separa tandem & utere.

Olei Solis descriptio est sequens.

Postquam succus ab auro per acetum, uti supra, fuerit separatus, bulliat quindecim dies in digestione, quæ sequitur, deinceps balneo separetur, & in secundo manebit oleum spissum, quod aurum pernixtionis est expers.

Formula conficiendi margaritarum succum.

*R. Aceti destillati mundissimi,*

*Aqua vitæ circulata* ℞ β.

*margaritarum mundatarum* ℥ iv.

quæ postquam pulveratæ subtiliter & preparatæ fuerint, unâ cum aliis in circulatorio digerantur per mensem; subsidebit materia perlarum, ut pinguis liquor: qui cum apparche, separentur aquæ per effusionem, succo reservato, de quo dentur grana sex per vicem. Arcana & essentia quintæ sulphuris & aquarum vitæ pro Contracturis.

*R. Florum Sulphuris* ℞ β.

*alh. Antimonii* ℥ i.

*Succi auri* ℥ i.

*Aq. vitæ circulata* ℥ x.

Digerantur ad mensem, & in massam duram congelentur. Hujus qualibet vice ℥ j. administrat.

Aqu. vitæ descriptio penetrantissima.

*R. Aq. meliss.*

*rosar.*

*cheiri, salvie,*

*balsami* aa. ℞ i.

*piperum omnium*

*Cubæarum*

*Zingiberis*

*Cinamomi*

*Masticis*

*Myrrha rubæ*

*Maceris*

*Caryophyllorum* aa. ℥ ii.

*succi mellis*

*Aq. vitæ rectificat.* ℞ v.

Digerantur omnia simul per novem dies, & postea separentur, & in pellicano destillentur ad spiritum. Tandem ad liquorem hunc adde pomum tostum & fractum, & simul una cum subsequenter aromatis, digerantur super cineres per 3. dies, de qua sumantur grana quinque singulis diebus.

*R. Cinamomi*

*caryophyllorum*

*macis* aa. ℥ ii.

*anthor*

*cheiri* aa. ℥ β.

*ambræ* ℥ ii.

*musc. gr. v.*

*Zibet.* ℥ β.

*Zingib. cubæarum*

*N. M.* aa. ℥ β.

*amomi* ℥ ii.

*Zedoaria* ℥ ii β.

*gran. paradisi.* ℥ β.

post horum omnium digestionem separe servaque vasis vitreis obstruissimis.

De Medicamentis Vitrioli & Tartari pro contracturis vide ipsum Authorem latius differentem. Quoad externa; contractum sive pedem sive brachium includit in vas appropriatum satis amplum, ut in eo constrictum non sit, ac vas cooperiri valeat, ne fumus exhalare possit. Postmodum accendere jubet quod sequitur, & in vas reconditum cõperit, tantisper ibi maneat, donec fumus ille cessaverit: hoc faciendum esse ait per medium diem. Si suffimen unum videatur non sufficere, plura fiant, vapores in vase densabuntur in liquorem, ut in alembico solent. Hujusmodi subtilem vaporem, qui propriè fumus non

non est, penetrare dicit, membrum calefacere, venas & humorem vitæ resocillare, ac ad naturalem vitam revocare.

*℞. Olei olivarum*

*Iuniperi aa. ℥v.*

*Masticis ℥ss.*

*Terebinthinae ℥iv.*

*salis Petreæ ℥i℥.*

Mixta simul in cacabo succendens, accensa peroptimè super fundum vas inferius & intus pones, ac membrum teneatur super vaporem, cooperiatur vas fundo superiore, ne vapor exeat. Cum perceperis extinctam esse materiam, exemptam rursus accendas, & imponas toties donec tempus supradictum impletum sit. Sequens quoque commendat suffimentum.

*℞. Taxi pinguedinis*

*ol. olivarum.*

*adipis ranae minime viridis*

*calamiter appellatae aa. ℥i.*

*myrrh.*

*masticis*

*Terebinthinae aa. ℥ss.*

Ascende sicut dictum est.

Laudabilia quædam præscribit balsama, quibus *Ligamentorum Stupores, Laxationes, Nervorum Contusiones, & Contracturae* curantur, calidis enim membra optimè perungenda esse suadet singulis diebus ter, & absque intermissione.

*℞. Terebinthinae destillatae ℥ii.*

*Galbani destillat.*

*Gummi elemmi destill. aa. ℥ss.*

Rursus destilla simul, & inde fac balsamum à suis fecibus & phlegmate separatum.

Vel:

*℞. Terebinthina*

*ol. laurini*

*olivarum*

*Iuniperi aa. ℥i.*

*Masticis*

*Myrrhæ*

*Thuris aa. ℥ss.*

Destilla per se, quæ sunt ejusdem qualitatis, videlicet olea per se, reliqua tria etiam per se, quæ mixta simul iterum destilla semel, & utere, vel:

*Tomus II,*

*℞. Adipis Taxi*

*sevicervini*

*ranarum adipis*

*cerae aa. ℥i.*

*masticis ℥ii.*

*Thuris ℥ss.*

*Euphorbit ℥iii.*

Destilla sicut narratum est.

Vel:

*℞. Storacis liquide ℥i℥.*

*ranarum No. xx.*

*adipis taxi ℥ss.*

*aceti destillati*

*vini ardentis aa. ℥i℥.*

Postmodum mensem exprimens, usuique reservat.

*℞. lignorum Iuniperi*

*fraxini*

*sabine*

*fagini aa. ℥i.*

E quibus arte communi destilletur oleum, quo quidem rectificato per pellicanum, utere.

Arcanorum quoque in contrasturis quatuor species existere ait, videlicet, Arcana Compositum, Solidum, Elementatum, & Metallicum.

Formulae arcani compositi sequens est:

*℞. Alcohol. vini ℥vi.*

*Cantharidum ℥x.*

*Canapi*

*fol. tassi*

*chamomill.*

*Hypericonis aa. Mvi.*

Terre, misceque simul, & in Sole, vel fimo digerantur per menscm, destillentur postmodum, & huic ea quæ sequuntur, impones.

*℞. Canapi, florum tassi, camo-*

*milla, Hypericonis, Cent-*

*auræ, Prunellæ, Betoni-*

*cæ aa. ℥ss.*

*Masticis, Mumie aa. ℥i℥.*

*Thuris ℥v.*

*Lumbricor. terrestr. ranar.*

*aa. ℥ss.*

Destillentur in circulatorio per octo dies, hoc utere tanquam balsamo:

Arcanum solidum est sequens.

*℞. Succis flammule ex tota sub-*

*stantie, hoc est, ex florib. cau-*

*le, foliis & radicibus.*

*Dd*

*Succi*

*℞. Succī florum tapfi aa. ℥i.  
alcol. vini ℥i.*

Digerantur in ventte equino per decem dies.

*Arcanum clementium.*

*℞. Chelidoniæ, Melissæ, Erucae, Iva artheticae, florum tapfi, papaveris, Centauræ, Bethonicae, Parthenionis, Hypericonis aa. M. ii.* terantur omnia simul, & acetī parumper addito, putrescentur & exprimantur optimè, succusque per circulatorium vas, decem diebus ascendat absque intermissione, quo liquore utere.

Arcanum metallicum est sequens: Resolutum accipe metallum, quod circuletur 8. diebus, dulcificetur postmodum & in usum assumatur. Metallorum tamen discrimen erit faciendum: Solis est aqua metallina, præ cæteris ad contracturas præstantissima.

*In Junctura  
rarā Luxatione  
seu Dislocatione.*

In Cura Dislocationis Juncturam scire Chirurgos vul, ut in dislocatis hujusmodi Juncturis, istas non fore prius medicandas, quam suis restitutæ locis fuerint, eoque redierint, unde exiverant, & harum Juncturarum suo loco restitutiones manu & oculis addisci posse memorat, quod in usu maximo & in promptitudine consistant. Contingit etiam sæpè, dislocationes ab imperitis Chirurgis depravatas, per se ipsas sanari, ut concrecant & à patientibus non extimentur amplius. Item ut liquores illi cessent, ac ita postmodum in suum locum redeant.

Item sapienter evenire solet, ut juncturis non dislocatis, vetus crescentia nervique similes dolores concipiant, ut è suo loco fore putentur, & ut Synovia quandoque discedat, & membrum contractum fiat, non alias ac si dislocatum esset. Notare vult ergo Chirurgos, ut hæc signa probe cognoscant, ne quando Juncturas præsumant restituere, quæ minimè dislocatæ sunt, & hæc via dislocant eas, quod sæpe contingere ait, ut posteriora peiora fiant perioribus. Suo ergo primum loco membrum dislocatum

restituendum suadet, post camomillæ succo vel agrimonie ligandum. Si tamen infrigidata Junctura sit, oleo ex floribus herbæ, flammæ cæli distillatæ, mixtæ cum petroleo, cumque maturuerit, in locum restituendum amat. Animadvertere etiam jubet, ne facillè terreæ reponendum inter, aut extrahendum: nam sæpè contingere solet, ut dolores hujusmodi non transcant absque punctiōibus, quod Junctura contra sit, quæ verò subductæ sunt, curandum esse taxo laterino. Et si dislocatæ non fuerint, visco de consolidâ dolore atque morbum sedandum esse præcipit.

§. 15. *Helmontius* in *Ligamentorum Stupore* præ aliis interna Diaphoretica ac arcana commendat jam sæpius distilla, externa verò Topica, fomenta nempe, aliaque quæ Ligamenta confortant.

*Laxationem* verò *Ligamentorum* per Tincturam succini vel Elixir suum propriet. & per externa nervina curandam esse præcipit.

In *Contusione Nervorum* internè lapides cancerorum & ossifragi commendat. Inter externa verò rad. bryoniæ albæ rasam & superimpositam contusioni præ aliis eligit.

In *Incurvationibus* vel *Contracturis* aquæ externa fomenta, quàm interna quæ convulsivos motus placent, maximè necessaria esse inculcat.

In *Luxationis Curatione*, articuli restitutionem desiderat, & præterea aliorum curam tacitè approbat.

§. 16. *VVillisi* *Ligamentorum Stuporem* curat & interiorum & exteriorum medicamentorum subsidio: Internè Diaphoretica porrigit, è quibus præcipue notæ esse asserit, decoctum guajaci, sarsaparillæ, &c. spiritus & oleum guajaci, inter quæ & sunt Mixt. simplex, spiritus & flores salis Armoniaci, aurum Diaphoreticum, viperarum sal, pulvis & vinum.

Bezo-

*Helmontius sensu de Curatione Ligamentorum Stuporis. Ligamentorum Laxationis.*

*Nervorum Contusionis.*

*Incurvationis vel Contracturæ.*

*VVillisi methodus in curatione Ligamentorum Stupore.*

Bezoaricum minerale, solare, tinctura Antimonii &c. administrationibus externis sudationem etiam promovet, ut materia tendinum poros occupantes per poros patentiores facilius exhalentur; Ipsi ergo suavis craticula cum carbonibus aut spiritu vini accensis, Laticonicum, & balnea varii generis & formæ, ac thermæ naturales adhiberi solent.

In Ligamentorum Laxatione.

Ligamentorum Laxationi medetur per internæ sudoriferæ remedia, quales est decoctum lignorum infra descriptum.

*℞. Rasur. lign. sanct. ℥vi.*

*sarsaparill.*

*sassafras aa. ℥iv.*

*Santal. alb.*

*citrin.*

*ras. eboris.*

*C. C. aa. ℥℔.*

*f. a. infund. & coq. in aq. font. ℥vi.*

*ad medias, addend. Antimon. crud.*

*pulv. & in nodul. ligat. ℥iv.*

*rad. calam. arom.*

*galang. min. aa. ℥℔.*

*irid. flor. ℥i.*

*cardamom. ℥vi.*

*sem. coriandr. ℥℔.*

*Dactylor. No. vi.*

f. Dec. utatur etiam pro potu ordinario. Suadet etiam ut ægri utantur per 15. aut 30. dies dosi tincturæ sulph. ierebinth. aut tincturæ antimon. vel Succini, quandoque item elixir. proprietatis aut pæoniz, capiantur in cochleari aquæ destillatæ superbibendo ejusdem ℥iii. Externè commendat decoctæ ex salvia, roremarino, lavend. origanò, pulegio &c. & tandem ægris thermas præferibit.

In Nervorum Contusione.

In Nervorum Contusione diaphoretica volatilia exhibet, nervumque contusum oleo flavoterebinthinæ illinit, partem vero adjacentem oleo chamomillæ aut catellorum illinit.

In Laxatione Incurvatione.

Incurvationem incurvationem curat sequentia medicamina extemplo administrando.

*℞. Castor opopanax.*

*sang. dracon.*

*Antimonii.*

*sem. pæon. pulv. etis. aa. p. xq.*

*M. F. pulvis, dosis a ℥℔. ad ℥i.* utatur manè cum vino aut decocto appropriato, aut cum aqua cerasorum nigror. vel:

*℞. Cran. human. ppt. ℥i.*

*visc. querc.*

*cinnabar. factis.*

*ungul. alcis aa. ℥℔.*

*M. F. pulvis, dosis ℥℔. ad ℥i.*

Articulum verò contractum hocstringit linimento.

*℞. ol. irin.*

*verm. terrestr. aa. ℥ii.*

*Castor. pulv. Div.*

*M. continuo agitando.*

Oleum etiam laurinum, lini, saponis, decoct. lumbricorum, pinguedinem humanam & animalium hoc in casu laudat.

VVillisius *Luxatam Incurvationem* In *Luxatione* firmare satagens, facta repositione, partem fovet decocto ex flor. hyperic. & ros. rub. in vino rubro facto, vel petroleum illi calidè inungit, aut emplastrum ex tacamahæa cum balsamo Peruviano malaxato ipsi applicat. Si verò *Luxatio* à causa interna ortum duxerit diaphoreticis insistit, lignorumque decoctum pro potu ordinario præscribit, & partem fovet decocto ex radicib. gentianæ, aristol. ros. flor. rosar. hyperic. ros. marin. fol. absynthii, salvia, origano, querc. &c. vel de Vigone illi imponit.

§. 17. Sylvius in *Stupore Ligamentorum* respicit, ut torpidi & ad motum ineptiores spiritus animales excitentur, & à vi narcotica ipsis admixta liberentur per salia volatilia, sed aciora, medicamenta que omnia mordacitate aromatica prædita, pipér, caryophylla, castoreum, allium, raphanum rusticorum, Sinapi, Cochleariam, Erysimum & similia sæpius minore quantitate usurpata: exem. grat.

Sylvius modum. randi Ligamentorum Stuporem.

*℞. Aq. cochlear.*

*Erysimi aa. ℥i.*

*Dd 2 Tin-*

*Tinct. castor.* Zi.  
*ol. caryophyllor.* gt. ii.  
*syr. cochlear.* Zvi.  
*M.*

Huius mixturæ cochleare unum accipiat sæpenumero Ager, vel seq. decoct.

*B. Rad. galang.* Zii.  
*raphani rusticar.* Zii.  
*fol. erysimi* M. ii.  
*caryophyllor.* Zß.

Fiat decoctio in vase clauso, ex aquæ & vini albi aa. q. f.

*In colat.* Zxx. *dissolv.*  
*Syr. cochleariæ* Ziii.  
*Tinct. cinamomi* Zi.

M. F. Apozema.

Hujus Apozematis cochlearia quinque aut ex aliquoties in die usurpet Ager in lecto decumbens, ac mediocriter tectus, quo si possibile, sudor erumpat levis, ægrum levaturus. Horum enim medicamentorum ope non tantum Animales spiritus liberari ait à suo Torpore, verum ipsam vim narcoticam vel in corpore tractu temporis genitam, vel forissecus admissam quoque corrigi & tandem superari. Externè varia olea aromatica & volatilia illinenda commendat, item partis frictiones, asperis linteis aliisque pannis institui vult.

*Ligamentorum Laxatione.* Author in *Ligamentorum Laxatione* humores pituitosos & aquosos circa Ligamenta hærentes, ipsorumque membranas, medullamque nimis humectantes laxantesque corrigit ac tollit per interna sudorifera, imprimis aromatica, tum externa incidentia & discutientia, inter quæ iterum laudet salia volatilia; quod si multum in corpore redundant humores suprâ dicti pituitosi, commendat phlegmago- & hydragoga per vices usurpata.

*Nervorum Contusionem.* Sylvius curari dicit per interna Diaphoretica, Salia volatilia, his enim Spiritibus animalibus liberior conceditur permeatus, quæ simul defectum Spirituum animalium restitunt. Externè itidem commen-

dat varia nervina ac aromatica, oleum Terebinth. Philosoph. Ung. Dialtheæ compos. Martialis. Ol. succini, Lavendul. &c. fatus quoque haud negligendos amat.

*Luxaturarum Incurvationem* itidem per interna volatilia sudorifera curandam esse suadet, item decocta lignorum Mercurialia, aliaque ut viscidum solvatur, & obstructio Ligamentorum reseretur, spiritibus liberior concedatur transitus, magnificat. Externè varia præscribit nervina, linimenta, unguenta, emplastra, ex aromaticis institutos fatus, balnea &c.

*Luxaturarum Luxationem* quod attinet, in pristinum suum locum articulum elapsam restituendum vult. Dein varia Emplastra corroborantia, & modicè astringentia applicari amat, quorum descriptiones jam alibi dedimus.

*S. 18. Cartesiani in Ligamentorum Stuporis curatione* commodè perficienda, ipsas advertunt causas, à quibus fuerit productus, has enim removere annuntur, si possibile est, ne quid remaneat obstaculi, quo minus spiritus animales per Ligamenta perfluere possint: quapropter si fuerit à Luxatione, Os luxatum restitunt; si à fractura, illam sanant reponendo Ossa fracta, & postmodum eadem glutinando. Musculorum verò vitia corrigunt, sive ulcera sint, sive vulnera, sive convulsiones, sive paralyces, quibus in casibus remedia appropriata seli-gunt, potissimum proficua esse dicunt succinata, castorea, & nervina, imprimis ubi stupor est à defectu spirituum animalium, omnia conducunt salia volatilia, oleosa, inter quæ sequens magni pendunt.

*B. Elix. vitæ nostræ vel Hoffmanni* Zii.

*Spir. sal. armoniaci volat.* Zi.

M. detur guttatim.

vel in forma Mixturæ propinant.

*B. Aqu. Lavendul.* Zß.

*Vagar.*

*Luxaturarum Incurvationem.*

*Luxationem.*

*Cartesiani notum curationis Ligamentorum in Stupore.*

*Vngar.* 3 i.

*Elix. vite Matthiol.* 3 vi.

*Spir. sal. armoniaci succinat.* 3 ii.

*essent. castor.* 3 i.

*Syr. flor. Stechad.* 3 i.

*M.*

vel in forma Eleſtuarium ſeq. exhibent.

*R. Conſerv. roriſmar.* 3 iii.

*mentib.* 3 β.

*ſalu.* 3 ii.

*Cond. cort. aurant.* 3 iij.

*ſpec. diantib.* 3 i.

*diagalang.* 3 β.

*pulv. ſem. eruc.* 3 ii.

*ſlor. ſal. armoniaci* 3 i.

*ſal. C. C. volat.* 3 β.

*ol. deſtill. caryophyll.* gt. iv.

*M. l. q. ſyr. flor. tunic. f. q.*

opiata.

Externè etiam ſotus non negli-  
gunt, quos parare ſolent ex foliis  
roriſmar. ſalu. majoran. lavendul.  
origan. flor. paralyſ. anth. bacc. lau-  
ri, Juniperi, lumbricis, formicis  
in vino coctis, quibus tepidè ad-  
hibitis, ſpiritus etiam limacum,  
lumbric. armoniaci, eſſent. ca-  
ſtor. & ſuccini ſunt illinenda,  
ex. gr.

*R. Spir. lumbric.* 3 iij.

*Aq. Anhal.* 3 i.

*Spir. ſal. armoniaci* 3 β.

*M.*

Balnea quoque & Thermas magni  
faciunt.

In *Ligamentorum Laxatione* ſub-  
dorifera magno habent in prerio,  
& exhibent ſal volatile C. C. ad 3 j.  
in vino vel alio liquore appropri-  
ato, externè varios ſotus paululum  
ſubadſtringentes commendant, ut  
thermas aluminofas, Emplaſtra cor-  
roborantia & firmantia, qualia di-  
cunt eſſe de pelle arietina, ad fra-  
cturas, & nervinum cum terra Ja-  
ponica mixtum.

In *Contuſione Nervorum* levio-  
re ubi nervi tantum ſuperſicialiter  
contuſi ſunt, ſudorifera exhibent  
diſſolventia, attenuantia, ut ſic tu-  
buli laſi iterum aperiantur per no-  
vum ſpiritum affluxum, qualia  
ſunt oculi caner. Antimonium dia-  
phoreticum, Sal. C. C. volat. lum-

*Tomus II.*

bricorum, decoctum Bardanz, &  
ſanz mundz, Tinct. Mumiz, ſpir.  
ſal. armoniaci ſuccinar. In graviſ-  
ſima verò contuſione, in qua cu-  
tis & muſculi non tantum ſunt  
conquaſſati, ſed etiam ipſi nervi,  
ſanguis quoque & reliqui immiſti  
liquores imprimis nervei corrupti  
partes ſubjacentes Gangranam mi-  
nantur, omni ſtudio malignitati  
eorum reſiſtunt, acrimoniam mi-  
tigant, & partes ulterius defendunt,  
internè Bezoardicis & ſanguinem  
depurantibus, Eleſtuarium verbi gra-  
tia Bezoartico *Ang. ſale*, Tinctur.  
Bezoard. volatili Diaſcord. The-  
riac. &c.

Externè fovendo partem affectam  
ſpiritu vini theriacali & Campho-  
rato, applicando cataplaſmata ex  
ſarina orobi, lupinorum, & herb.  
ſcord. rut. abſynth. cum ſpiritu  
vini parata, vel inungendo aut im-  
ponendo linimentum ſequens:

*R. Medull. cervin.* 3 i.

*axung. caſtor.* 3 ii.

*ol. lumbricor.* 3 vi.

*petræ alb.* 3 β.

*Gumm. animæ* 3 i.

*ſalvia* 3 β.

*lavendul.* gt. vi.

*ſal. ſuccin. volat.* 3 ii.

*M.* Redigantur omnia ſ. a. in for-  
mam linimenti.

Incurvationis quoque Junſtura-  
rum curationem inſtituunt juxta  
cauſarum varietatem, ſi fuerit à  
luxatione vel fractura, eas prius  
curant, ſi verò fuerit ab obſtru-  
ctione, à ſpirituum animalium in-  
fluxu impedito, eos promoyent  
per ſpirituofa ac volatilia & ipſis  
propinant ſequ. vinum medica-  
tum:

*R. Rad. valerian.*

*Imperator.*

*pæon.*

*Angelic.* aa. 3 iii.

*Rhapontic.* 3 β.

*armorac.* 3 ii.

*ſol. chamædr.*

*chamæpyth.*

*ſalu.*

*roriſmar.*

*majoran.*

*Dd 3*

*menth.*



menth. aa. Mß.

flor. paralyf.

Stechad. Arab.

lavendul. P. 1.

raf. ligni Juniper. 3 v.

guaiaci 3 iii.

bacc. Juniperi 3 ß.

Cardamom. 3 iii.

Cinamom. 3 ii.

Cubeb. 3 i.

Sal. tart. 3 ii ß.

armoniaci depurat. 3 iß.

M. pro 4. vel 5. vini libris.

Externè varia commendant spirituosa aromatica ac volatilia inponenda, ut sunt spiritus lavend. lil. convall. matric. balsam. ischiat. lufuf. arthrit. Emplaftra varia nervina inponunt, inter quæ laudant Empl. de Labdano, cinnabarium, &c. Balnea, fofus ac thermas quoque magnificiunt. Balnea vel fofus parare folent ex falvia, majorana, betonica, roremarino, pulegio, chamædr. origano, bacc. Juniperi, cineribus Juniperi, Sal. tart. vel commun. in vino & aqua decoctis.

Luxationem curant articulum elapfum ad partem oppofitam manibus propellendo, & ita in locum priftinum reftituendo, & ne fucci craffiores interftitiis illapfi finit impedimento, tum diaphoretica intermæ, tum fpirituofa externè adhibent, ita enim illi fucci ftagnantes expelluntur, ad mufculos, & tandem apertis poris fub fpecie vaporis eliminantur, & penitus difcutiuntur, quod fofus præftant ex herbis majoranæ, falv. origani, chamædr. flor. fambuc. anth. Sulphuris in Spiritu vini maceratis, repide adhibiti, nec non fpiritus vini camphorat. aliquoties illitus: reftitutos articulos quiete & emplaftro nervino jubent corroborare.

Neftra cu. 5. 19. Nos in Curatione Morborum horum ita procedimus; In Stupore Ligamentorum advertimus caufas à quibus fuerit inductus, has enim prius remove reftudemus, fi poffibile eft, ne quid remaneat obftaculi, in eo enim totius cu-

rationis cardo vertitur, ut obftitutio in fibrillis tendinofis ac nervofis exiftens rollatur, ficque promoveatur influxus fpirituum animalium liber ac priftinus. Si enim Stupor obortus fuerit à defectu fpirituum animalium, vel obftitutione crafforum fuccorum, ante omnia incidendi funt & fimul volatilisfandi, in quem finem internè & externè conducunt falia volatilia aliaque diaphoretica oleofa, quæ maximè penetrare, & canaliculos fubtiliffimo fibrillarum tendinofarum aperire valent. Pottiffimum verò fuccinata, caftoreata, camphorata, aliaque nervina funt proficua. In Juniorum Medicorum gratiam unam vel alteram communicabimus formulam.

℞. Spir. Matric.

Aq. Reg. Lungar.

Spir. camphor. 3 ß.

Cephal. oleof. ʒi.

M. Dguttatim.

Vel:

℞. Aq. rorismar. 3 ii.

mirabil.

hirund. c. caftor. aa. 3 ß.

Spir. C. C. ʒiß.

Syr. fl. paralyf. 3 vi.

M. aliquoties cochleatim exhibenda.

Spiritus Lumbricorum effentificatus, item fpirit. anthof. falv. fpezæ, fpirit. fal. armoniaci fuccinat. Tinctura caftorei funt generofa remedia. Conducunt quoque Cinabarina, pro re nata Mercurialia ritè parata, præferunt commendamus pulverem noftrum mercurialem Solarem, qui nos raro deferit. Item Antimon. diaphoret. Bazoard. Min. Mercuriale, Joviale, &c. hoc in cafu æftimamus, ex. gr.

℞. Antimonii diaphor. ʒß.

bezoard. Martial. gr. v.

ocul. cancr. ppt. gr. vi.

Sal. abfinth. gr. v.

fperm. ceti gr. iv.

M. f pulvis pro una vice, detur cum aqu. lil. convall. vel flor. thiliz &c.

Pro-

Profunt quoque spirit. urin.  
cran. human. spirit. sanguinis  
mag. cran. human. spirit. fulig. C.  
C. eboris essentif. spirit. Tartar. volat.  
sal. volat. oleos. foet. Elix.  
vit. vel detur sequens sudorife-  
rum:

*Re. Aq. card. bened.*

*rorismar. aa. ʒi.*

*antimoniidiaphoret gr. xv.*

*Tinct. croci ʒʒ.*

*Sal. card. bened. gr. v.*

*Spirit. sal. Armoniaci succin.  
gutvi.*

*Syr. card. bened. ʒʒ.*

*M. D. ad vitrum.*

Hoc in affectu Purgantia V. S.  
Cucurbitulas, aliaque tormenta  
proscribimus, aliquando vesicato-  
ria concedi possunt. Si à nimia  
Lymphæ copia & acrimonia fuerit  
productus affectus, Diuretica  
commendamus, per quæ super-  
flua ac acris lymphæ è corpore eli-  
minari potest, sæpe cum maximo  
fructu.

Topica præsertim in Ligamento-  
rum Stupore astimamus, quæ sæ-  
pè totam implent paginam, inter  
quæ aliis palmam præripiunt spiri-  
tuosa volatilia, quæ obstructas fi-  
bras tendinosas hunc affectum ex-  
citantes summopere referant, hunc  
egregiè conducet spirit. Matricæ-  
lis, convulsivus, & topicus spi-  
rit. lumbricor. essentif. formica-  
rum, brucehorum, balsam. ner-  
vin extern. & intern. spirit. campo-  
rat. lign. guajac. Essent. castor. suc-  
cini. Cataplasmata, & fofus hic  
maximè conducunt ex fol. rorisma-  
rin. beton. salv. majoran. lavendul.  
origan. flor. Paralyf. anth. baccis  
lauri, Juniperi, mace parat. Item  
suffumigia ex succin. aff. foetid. gal-  
ban. castor. mastich. thure concin-  
nata: qui amant mixturam externè  
applicandum sequens erit profi-  
cium:

*Re. Aq. Regin. Hungar.*

*Spir. vin. camph. aa. ʒi.*

*Matricæ ʒvi.*

*lumbricor. eff. ʒiii.*

*Elix. vitæ ʒi.*

*M. D.*

Emplastra ex gummi aliisque vo-  
latilibus fabrefacta egregiam sæpè  
navant operam, imprimis Empl.  
Norimbergense, cinnabarinum no-  
strum, de Thea, Nervinum,  
Thermæ sulphureæ-Martiales, vel  
nitro-sulphureæ utilem sæpè na-  
vant operam, in earum defectu  
artificiales parari possunt: conser-  
ea quæ inferius de contractura dic-  
cemus.

*Laxitas Ligamentorum* nisi pro-  
tinus & brevi tollatur, verendum  
est ne affectus diu duret, quoniam  
à decubitu & stagnatione succo-  
rum ligamenta relaxantur, pori li-  
gamentorum longa moræ figuræ ex-  
traordinariæ asluefiunt, similem-  
que capropter materiam, peccan-  
tem faciliè transmittunt, qui suc-  
cus si longas præterea moras circa  
ligamenta neſtat, Laxitatem majore  
producere poterit, laxando ac  
relaxando fibrillas tendinosas:  
& cum malum hoc potissimum  
oriatur à catarrhis, vel nimio se-  
ro evasato, id ante omnia elimi-  
nandum est vel purgantibus (præ-  
missis incidentibus Tartareis) pul-  
v. scil. laxativ. Extr. diacar.  
diacitr. aliisque pilulis aloeticis,  
vel quod sæpè melius succedit, dia-  
phoreticis ac sudoriferis eliminan-  
da venit lymphæ abundans. Dein  
semper eò incumbendum est, ut  
ligamenta laxata firmentur corro-  
borenturque. In quem finem con-  
veniunt fortiora exsiccantia vulgo  
dicta, cum nervinis juncta, nec  
non spirituosa, ut spiritibus ani-  
malibus melior concedatur transi-  
tus, & per consequens pristina fi-  
brarum fiat estensio, hinc com-  
mendamus seq.

*Re. Spir. matricæ ʒiv.*

*Sal. armoniaci succin. ʒʒ.*

*calc. viv. ʒii.*

*Elix. vitæ ʒi.*

*M. & applicetur calidè;*

quando relaxantur ligamenta ten-  
dinesque artuum, unde Luxatio-  
nès sæpè veniunt, oleum terræ il-  
litum experimentum est *Barbet-  
te*, firmat enim Ligamenta, re-  
solvitque lympham coagulata au-  
tho-

*In Liga-  
mentis  
Laxitate.*

thorem hujus relaxationis .

*Id Nervorum contusionis.*

*Nervorum Contusionis* cura potissimum in eo consistit, ut per contusionem evasati, congruati & stagnantes succi resolvantur, in quem finem præter interna diaphoretica, & incidentia sæpius dicta & assumpta, conducunt, ut sunt aqua chæresol. cum spir. C. C. ocul. canc. antimon. diaphor. pulv. contra casum, sperm. ceti, spir. matrical. lap. scissil. Irland. pulv. Anglic. &c. Externa Topica sæpe alii palmam præripiunt, sequens imponatur calidè cum quadruplicatis linteis, quod etiam quater vel quinque diebus repetatur.

*R. Spir. matrical. ʒv.  
Balsam. nervin. m. d. ʒʒ.  
camphor. ʒiʒ.  
spir. sal. armon. caryophyll. ʒi.  
M. D. usui.*

Focus, suffumigia ex nervinis discutientibus & emollientibus parata interponenda sunt. Si dolores vehementiores adsint ol. ovorum addi, & camphor. augeri potest, & si hisce non cedat Contusio, sequenti utere:

*R. Spir. matrical. ʒx.  
chæresol. ʒv.  
sem. cumin.  
carvi  
anisi aa. ʒʒ.  
Sal. Tartar. ʒiii.*

Sunt in digestionem, donec Tinctura rubescat.

*R. huius prædictæ Tincturae ʒvi.  
camphor. ʒii.  
balsam. nervin. ʒi.  
ol. Sassafras ʒi.  
spir. sal. armoniaci anis. ʒii.  
M. D. usui.*

Applicetur linteis uti antea, sed hac cautione ut bene clausum vitrum detineatur in aqua calida, ut tepida applicari possit. Suffitus gummi animæ optimum & tutum in Contusionibus remedium est. Et hisce medicamentis per aliquot dies continuandum, antequam ad alia accedat. Si emplastrum magis ardeat.

Empl. de Labdano, de Cumino, vel de Thea vel seq. resolvens aut simile conducet.

*R. Syrac. calam. ʒii.  
Empl. Labdan. ʒiʒ.  
benzoin. ʒiii.  
ol. Sassafras ʒʒ.  
cumin. ʒi.  
camph. ʒiʒ.  
spir. matrical. q. f.  
M. & f. l. a. ceratum.*

quamvis ab applicatis Emplastris plures vesiculæ in quibusdam excitentur, quæ non curandæ sed apériende sunt.

Nunc pergamus ad curam *Incurvationum Incurvationis* seu Contracturæ membrorum. Chirurgia hoc in affectu parum commodi afferens, cum pharmacia conjungenda est.

Proscribimus è foro Chirurgico V. S. Cucurbitulas, vesicatoria, fonticulos, quæ duo ultima præfidia admittimus quando malum abundante sero oritur. A Chirurgia in Incurvatione mutamur *Extensionem* & *Deligaturam* partis contractæ seu in curvatæ, quæ tamen non violenta sed successiva sit, adhibitis eo sine præter fots, spirituosis volatilibus linimentis & unguentis nervinis, paulo inferius tradendis, si præcipue exsucca sit pars, ut iisdem inunctis emollita & laxata eò facilius cedere discat. Quæ operatio ut eo melius succedat, excogitarunt Chirurgi & fascias, quibus membrum detentum sensim attollitur: ejusmodi instrumenta descripta & delineata invenies in *Artis Fruditorum Lipsiens.* imprimis in Luxationibus artuum maximè inservientia. Huic enim malo ut medeamur, oportet artubus ægri adnectere fasciam linteam tres digitos latam. Imò in Incurvatione pedum hisce in locis utimur ocreis in hunc finem à sutores aulico apprime factis, sic quoque in reliquis corporis artubus fasciæ vel instrumenta parti appropriata facillè excogitari possunt.

Et cum *Incurvatio* hæc sit potissimum ab obstructione, & inde facta contractione, eò semper respi-

cien-

ciendum est, ut succi crassi ac quasi tophacei incidentur ac resolvantur, unde pharmacia consulenda est, qua nobis ea lenientia, & incidentia quæ inucum incidunt, depromit, quo nomine præcipuè veniunt Tartarea, crem. & crystall. & Tinct. tart. vitriolat. resolut. Tinct. tartar. liq. terr. fol. tart. item nitrosa. Arcan. duplic. Nitr. Antimonial. sal. digestivi spir. aperitiv. Moebii: huc quoque referri possunt Martialia, essent. anrimonii, spir. matricalis, C. C. Eboris Ceph. oleof. &c.

Tandem & ob amuræ copiam ad Purgantia accedimus, quæ non ex primis solum viis, sed altius etiam infixam materiam morbosicam exstirpare possunt. Proderunt ergo radix laxativ. Massa Pilularum tart. vel detur Extract. diacartham. diacitri &c. & alia apud auctores prostantia, quæ proderunt variis in formulis adhibita.

Hiscæ præmissis ad Diaphoretica tanquam ad anchoram sacram coniungendum est. Hæc enim id quod in vasibus & glandulis subcutaneis à purgantibus intactum relictum est, expellunt, in quem finem prosumunt tam volatilia quam fixa & media, ex. g. Rad. scorzonæ. chin. falsapartill. herb. card. bened. scord. fl. galg. calendul. lign. sassafras, sanct. spir. serpent. viperar. tartarif. & oleofus, C. C. eboris Tinct. bezoard. volat. Tinct. Diaphor. Mynf. & liq. ejus, spir. volat. oleofus cephal. Balsam. Nervin. spir. matricalis, Mixt. scilicet per se & volatilis, item omnia ex Antimonio parata Orvietanum, Camphora, Bez. min. martiale, cinnabarina, lap. Bez. C. C. spir. viper. quæ omnia & alia pro variis indicationibus à Medico prudenti elegi, combinari, variari, & adhiberi possunt.

Succedunt his *Diuretica*, quæ id quod neque per Purgantia aut Diaphoretica expelli poterant, per ductus urinarios evacuant. Faciunt hæc tam Vegetabilia, quam animalia & mineralia. Inter Vege-

tabilia recensemus rad. asparag. rusc. fœnicul. ononid. vineetox. faxifrag. herb. heder. t. restit. bellid. &c. Ex animalibus ocul. cancr. testacea, ex Chymicis Arcan. dupl. Arcan. tart. Malv. Junip. spir. Junip. ex bacc. spir. Nephrit. Succinata omnia & Terebinthinata, sal. succin. volat. spir. & essent. ejusdem Tinct. contra calculum, liq. C. C. succ. bals. sulf. &c. Omne tandem fuerunt punctum appropriata, nervina, antiscorbutica, antiparalytica, antihypochondriaca vulgo ita dicta, quia hæc omnia obstructions referant, proderunt in eum finem omnia Martialia, croc. mart. aperit. verriolum mart. spir. ejusdem dulcis, vel pulv. Cachect. Cinnabarin. Si malum fuerit ex colica, conducerit præ aliis Volatilia spirituosæ, oleosæ, Essent. & spir. cort. citri, Essent. Zedoar. extract. castor. ladan. &c.

*Externa* nunc paucis delibabimus *Topica*, quibus pars incurvata foveri, humectari, sicque ad extensionem aptari potest: Excellunt hoc nomine Nervina, spir. matric. aq. Regin. Hungar. spir. Cephal. volat. & oleof. balsam. nervin. Elix. vitæ spir. sal. armoniaci arom. C. C. volat. ebor. cum aqu. Anhaltina Lumbric. Spir. Camphoræ Spir. formicar. &c. Linimenta quoque parari possunt ex pingued. human. axung. viperar. castor. vulp. urs. lupi, ol. Chamomel. aneth. dest. lil. alb. ruth. sapon. Ven. ol. scorpion. terebinth. &c. aliis mistum oleum paregoricum VVedelii, ol. hyperic. n. d. item conducerit balsam. de Catulis, bals. Indic. de Tolu. Chili, ol. elemi, ol. ex sangu. Cervin. & human. balsam. polychrest. Mynf. Oleis expressis semper addantur olea destillata tum spirituosæ, ut ol. succin. destill. macis, anisi, caryophyllorum, Cumini, Chamomill. Commendantur quoque pelles recentes mactatorem canum, leporum, vulpium, vitulorum, item immisiones membrorum in ventres canum apertos vel vulpium, vel luporum

porum, aliorumque animalium adhuc calentium. Ex Unguentis proderunt Unguentum Nervin. Martial. Dialthez comp. &c. quæ roboranda sunt oleis, ex-gr.

*R. Vngu. laurin.*

*martialia. ʒ j.*

*Ol. salvie dest.*

*majran. dest.*

*succini.*

*angelicæ.*

*spicæ aa. ʒj.*

Suffimenta pro usu exsiccatório adhibendo optimo cum successu adhibentur ex succino, mastich. gumm. animæ, sandar. cinab. antimonii, ad suffumig. commendamus spir. vin. vel aq. Regin. Hungar. accensum, super cujus exhalationem membrum contractum tenendum est. Sunt qui argillam peculiari sale maritatem membrum contractis applicant, qualem esse dicunt in fonte Socero (Heilbrunn) nuper in Hassia prope Hirschfeldiam invento; cujus argillæ ope, qua fons abundat, plures à Contractura convaluere, ita ut ligneis instrumentis innixi cum accederent, relictis iisdem tanquam testibus recuperatæ sanitatis abiissent. In defectu scaturientium fontium artificialia ex argilla aliisque mineralibus & nervinis paranda sunt, sequens commendamus:

*R. Herb. betonicæ.*

*salv.*

*rorismar.*

*majran.*

*hyperici aa. M. iij.*

*bacc. lauri.*

*Iuniper. aa. ʒij.*

*sulph. viv. ʒij.*

*argilla. lbj.*

*M.*

Profuisse etiam vidimus fatus paratos à capite mortuo cerevisiæ, vel ex jam dictis herbis, eisdem membrum contractum tepido immergendo & fovendo, cui fini etiam facculi ex nervinis parati, & spiritibus volatilibus irrorari, vel siccæ quoque applicari possunt, huc æfferri merentur infusus in fili-

quis uvarum, item fornicarum grandiorum acervo, vasi cuidam indito, quibus aqua calida infusa fuerit. Emplastrum ex gummi galban. commun. bdell. plurimum sal. volat. in se continentibus haud negligenda sunt. Item Empl. Diaph. Myns. de Thea, de Labdano &c.

In his affectibus præ alijs conducunt Therma, quarum minores tuto se concedere possunt ægri, imprimis Embsenfis fonticulus, delicatula martiali qualitate & vitriolata dulcedine (vitriolum enim pars essentialis ferri est, & polens pro potu, & Therma illa Sulphureo-Martiales pro balneo eligantur, plures enim contractos & à Colica pareticos factos hisce curatos vidimus; Equidem reparanda Valetudinis aquæ minerales, si mineræ bene constant, multum præstant, & sæpe plius, quàm è longo medicamentorum usu in eos redundat emolumentum, qui potu vel lavacro illarum utantur; hinc Sacra præcis dictæ, magnificis & sumptuosis ædificiis honorata; aut non sine præmeditatione ex iudicio medicinæ operam dantium, & earum minerarum exploratione accurata, atque cautelæ abusu, licentiæ immoderate victus libidine, administratione contrahatur, quàm emolumentum; quin potius sollicita illarum mixtura certæ portionis & quantitatæ, & temperamentorum seu morborum diversitatis curioso delectu habenda est ratio, thermis & acidulis scaturientibus, si deficiant, facillimè artificiales substitui poterunt.

Nunc curam *Luxationis* videamus: si unquam, certè in Juncturarum seu ossium repositione ipsi Chirurghi quandoque suam produnt ignorantiam, cum non luxatum pro luxato, non-repositum pro-reposito sæpius habent, quod inde fit, quoniam verum ligamentorum & tendinum strum ac texturam ignorant. Quippe os semel è suo acetabulo elapsum reponi nequit, nisi

*in Luxatione.*

nisi in ligamenta partis attendas. Tota certe ars Chirurgica consistit in accurata & mechanica cognitione œconomiae animalis, quam non nisi in Scholis Cartesianorum vel rationalium Medicorum ac Chirurgorum addiscunt, hinc merito iure Chirurgia Rationalis appellatur. Non negamus in luxatione curanda opus esse convenienti manuali operatione, cujus tamen fundamentum est ipsa œconomia animalis vel si mavis Philosophia Mechanica. Chirurgia enim pertinet ad Medicos tanquam Dominos, Practica autem ad Chirur-  
gos tanquam Medicorum ministros. Os ergo semel à suo acetabulo elapsum restitui nequit, nisi, ceu dictum, in Ligamenta partis oppositæ curas intendas tuas, hæc enim valde distenta & elongata magis, illa verò in parte, per quam os elapsum est, contracta utel breviora erunt: hinc summa utendum est cautela, ne extendendo membrum laxatum his vel illis ullam inferas injuriam, sed opera potius impendenda est, ut articulus accuratè per eam viam qua elapsus est, regredi possit, si enim hic erraveris, ipsam repositionem impossibilem & malum incurabile reddes, unde postmodum tumor, inflammatio, ingens dolor & quandoque abscessus excitantur, prout id quotidie experientia æquè sapientum ac stultorum Magistra comprobat. Quod si infantibus repositio ad plures dies differatur, penitus illa impossibilis erit, quoniam succi imprimis lymphæ in acetabuli vacuum copiosissime transfundans, & in mucilaginem tophaceam vel cartilagineam excre-  
scens, omnem elapso articulo præcludit ingressum, ceu id in puella 5. annorum hæc in civitate observavimus.

Extensio etiam vix in omnibus Luxationibus necessaria est, nempe (1.) ubi ligamentorum relaxatio nimia, nec (2.) in subluxatione; sed tunc demum, ubi m-  
asculi ossi luxato implantari hoc ver-

sus suum principium retrahunt. Quod si verò conveniat, quàm maturè erit adnotanda, antequam inflammatio superveniat, ejusque instrumenta varia sunt, quorum inventu duplex reponendi modus ab Auctoribus constituitur, *Palestrinus* nempe, qui solis manibus fit, & *Medicus*, qui iterum duplex, vel *methodius*, qui habenis, scalis & foribus, aliisque utensilibus peragitur, vel *Organicus* qui machinamentis diversis perficitur, de quibus videantur *Hipp. Paræus*, *Scul-  
tetus*, & alii, illius Galli machina in hunc finem excogitata antestatur machinæ Germanorum, quarum icon in *Actis Eruditorum Lipsienf. Ann. 1683. Mense Januario*. videre est.

Quod si ergo sufficiens videatur extensio, quod judicatur si luxatum os acetabulo suo è diametro opponatur, & si membrum idem sano aliquando longius appareat, restauratio *Mochlosif* dicta, debet fieri, quæ facillimè accidit, si os luxatum manibus suis ita dirigat, articuloque adaptet Chirurgus, ut musculorum tractus observet, ac extensione sensim laxata, illud quasi sponte sua sedem ordinariam repetat. An autem bene restauratum sit membrum, dignoscitur ex iisdem signis, quæ ossa fracta probe coapta testabuntur.

Deligatio, quia tam topicorum applicationem, quàm fasciationem ac ferularum impositionem involvit, medicamenta in principio convenientia sunt, quæ roborando dicuntur operari, uno verbo illa, quæ sub principium fracturæ etiam admovebantur: si ergo ossa luxata, reposita & succi crassiores interstitiis illapsi internis diaphoreticis discussi fuerint, externè institutis variis soticibus ex herbis majoran. salv. chamædr. flor. sambuc. anch. sulph. in spiritu vini maceratis tepidè adhibitibus, nec non spiritus vini, C. aq. regin. Hungar. Spirit. matric. aliquoties illiti; sunt qui Emplastra  
ma-



magni æstimant, seq. ergo appl. cari potest:

*R. Styrac. calam.* ʒ j.

*maslich.*

*succin.*

*Benzoes* aa. ʒ ʒ.

*bacc. lauri* ʒ vj.

*charyophyll.* ʒ iij.

*N. M.* ʒ ij.

*cerae norue* ʒ v.

*resin.* ʒ j.

*ol. myrtillor.* ʒ i. ʒ.

*ovorum* ʒ ʒ.

*succi chelidon.*

*c.ular.* aa. ʒ ʒ.

*M. f. l. a. Empl.*

Ad impediendam inflammationem fortiter adstringentia intermittenda sunt, sed potius tunc resolutivis, atque nervinis est agendum, verb. gr. Spir. matric. vin. camph. ol. lumabricor. terræ, vulpin. Peruvian. aut instituatür fomentatio ex scord. absinth. herb. salv. rorismar. fl. ros. balaustr. bacc. Juniper. lauri, sem. cumini &c. qua sc. tendinosarum fibrillarum rigiditas deligatione introducta aliquomodo corrigitur, spirituumque animalium influxus restituitur.

Quod *Fasciationem* attinet, fieri potest hæc simili modo ac in fractura retentiva atque expulsiva simul, seu eadem per unam fasciam, si scil. articulus ad prolapsum non adeo proclivis, seu tribus, pari ratione ac in fractura artuum fieri solet; ita tamen ut deligationis principium fiat in latere per quod os præcedit, itidem etiam fascia semper firmius constringatur; spleniorum verò quæ iis supponuntur, plura sint, non tantum melioris firmationis & retentionis gratia, sed ut juncturarum quoque cavitates & inæqualitates replantur, pro fasciarum commodiore injectione, horum tamen crassius & maximum illi articulo apponatur, per quem os luxatum prodibat, ne hoc extra sedem suam adeo facile elabatur: de cætero si membri ratio hoc patiar, & inflammatio non impediat

ferulæ imponantur, observatis illis circumstantiis, quas alibi indigtabimus.

Restitutos articulos quiete & emplastro nervino jubemus corroborare, optimè ergo articuli luxati post repositionem collocentur, ut melius firmentur, ut non rursus elabantur, sic brachium repositum ad pectus teneatur in fascia, pedes verò in situ optimo servantur, & semper commoda ac tempestiva fiat religatio, hinc vulgò dicitur renovatio deligationis ac ejusdem duratio. Quoad renovationem fasciationis, nisi circumstantia aliqua contrarium urgeat, scil. dolor ac fasciarum nimia restrictio, sunt, qui ante 6. & septimum diem hæc non solvant: sed me iudice periculosum est omnia sic testâ relinquere, melius enim esset, ut Chirurgus quotidie inspiciat, numne Gangræna aliudque malum acciderit. Nuper feminam quandam ita in deligatione reliquerat Balnear, cum Empl. tolleret, integra tibia sphacelata fuit, & matrona ad plures abiit.

Durationis tempus vix specialiter determinari potest, nisi dicamus, tunc demum tollendas esse fascias, si articulus sufficienter firmatus observetur, quod in articulis minoribus, ut digito, die 14. in mediocribus brachio ac tibia circa 20. in majoribus verò humero, scapula ac femore, vix intra 40. contingere solet. Quoniam autem pro diversitate subjectorum, regionum, ætatis, anni temporum, roboris, majore, ac minore, ligamentorum tensione, Luxatione recenti & veteri magis articularum quoque robur modò celerius modò tardius restituit, tutius illi agunt, qui supradictis diebus aliquot adhuc addunt, ac demum vinculis sublatis ægrum monent, ne membrum statim motibus vehementioribus exagitet. Dein ut rigiditatem fibrarum tendinosarum emendare laboret per sequens aut simile linimentum.

*g. Ol. lumbric.*

*Terebinth.*

*hyperic. n. d. aa. ʒ j.*

*Balsam. Peruv. ʒ i ʒ.*

*ol. mastich.*

*vulpin. aa. ʒ i ʒ.*

*bals. nervin. ʒ iij.*

*M.*

vel cum aq. Regin. Hungar. spir. to-  
pic. vin. camph. matricul. artus illi-  
nantur.

Si membrum luxatum ritè resti-  
tutum fuerit, ex signis sequenti-  
bus patet, si nempe in figura, ma-  
gnitudine, longitudine cum parte  
sana correspondet, & nullus dolor  
amplius percipitur, ac membrum  
moveri potest.

Atque hæc de deligatione simpli-  
ci, nunc de composita notan-  
dum, quæ scil. inflammationem,  
dolorem, spasmus, callum, vul-  
nus, fracturam aut ligamentorum  
laxitatem comitem habet, cum pro-  
varietate horum affectionum atque  
symptomatum curam Luxationis  
aliquo modo variare conveniat,  
quippe si dolor, tumor atque In-  
flammatio urgeant, & quidem  
statim ante repositionem, his cer-  
rè ante omnia succurrendum est,  
nisi articuli luxati restitutio mox  
tentetur ex partium nervosarum &  
tendinosarum fibrillarum violenti-  
ore distensione, & irritatione,  
convulsione, spasmus, aliaque  
atrociora mala, imò ipsa mors  
producantur, quare Luxationes  
non parvi faciendæ sunt: Hinc  
posito membro in medio minus-  
que doloroso situ, applicentur re-  
solventia cum Inflammatione at-  
que dolore mitigantia, qualia  
sunt spir. matricul. aq. Regin.  
Hungar. spir. vin. camph. Balsam.  
nervin. aq. calv. viv. addita semper  
camphora, item cataplasmata aut  
fotus, quibus simul admiscenda  
sunt anodyna, sc. herb. malv. parie-  
tar. rad. alth. flor. chamomill. ver-  
bas. sambuc. sem. lini, farin. fa-  
bar. &c. Sin post repositionem de-  
mum symptomata prædicta obo-  
riantur, ante omnia vincula sta-  
tim laxentur, ac recensita ap-  
plicentur remedia.

plicentur remedia.

Si vulnus Luxationi combinetur,  
in maximo zger versatur pe-  
riculo, inflammationem, spas-  
mum, imò Gangrænam & mor-  
tem sæpe infert, præsertim in jun-  
cturis majoribus sive membrum res-  
tituatur sive secus: Unde Chi-  
rurgi prudentiores suavis Hippocra-  
tis ab ejusmodi Luxationum restitu-  
tione abstinere, imò dicente Cel-  
so, nec minorum articulorum  
repositiones absque prædictione  
periculi suscipiendæ sunt, ita  
quidem, ut si reposito articulo  
inflammatio major ac spasmus  
superveniat, melius à quibusdam  
annotetur, si sine magna violentia  
hoc fieri valeat, articulum ex se-  
de sua iterum exturbare. Ante om-  
nia itaque in Luxatione membri  
majoris ratio habeatur Inflammationis  
atque Convulsionum me-  
tuendum, hinc in media pariter  
minusque dolorosa figura mem-  
brum collocetur aut suspendatur,  
eidem applicando topida appro-  
priata cum anodynis. Minores  
vero articuli aliquando ante in-  
flammationem interdum illa sopi-  
ta demum restituantur, & quidem  
extensione mediocri, quoniam va-  
lidam non ferunt: & si restaurati  
fuerint, inflammationem atque  
convulsiones prohibentia apponan-  
tur.

Fractura si Luxationi jungatur,  
affectus sanè periculosissimus evadit,  
quæritur ergo non immerito,  
Utrum huic in Luxationi pri-  
ma manus sit applicanda. Quam-  
vis in praxi hodierna & communè  
prius membrum luxatum reponi,  
ac postmodum demum Fracturæ ra-  
tionem haberi dicunt, quod si ta-  
men ante hujus curationem articu-  
lus sine periculo restitui nequeat,  
primò Fractura, & postquam tem-  
pus generationis calli accedit, Luxa-  
tio curetur.

Si callus in Junctura ante vel  
post repositionem oriatur, & qui-  
dem top hæc, ejus curatio frustra-  
nea erit; ceu in Virgine Limbur-  
genfi observavimus, cui ter vel qua-

quater iterum ex fede sua elapsa fuit ulna, ejus restitutio semper frustra tentabatur. In molliore verò successus desideratus aliquando contingit. Articululus ergo semper soveatur vel aqu. Regin. Hungar. spir. matriac. vel decoct. ex herb. malv. absynth. bis malv. majoran. rad. altheæ, cucum asinin. bacc. Juniper. lauri aliisque nervinis, ex quibus cataplasma parari potest. Item Empl. de Gummi, de Thea, de cicuta, de ranis cum merc. Cinnabarin. nostr. conducunt: hic asterisco notandum est, quod plures homines emplastra nullatenus ferre possunt, sed statim inde inflammationem ac pustulas in cute nascuntur, quia statim ab iis tubuli obstruuntur: sunt etiam qui pingua ferre nequeunt, alii verò cum successu tolerant oleum pingui human. remedium alias egregium & singulare in contracturis partium & luxationibus articulorum, pro consolidationis promotione. Suffusus quoque instituantur ex Gummosis mastich. succin. thure aliisque resolventibus &, cum alibi formulas tradiderimus eas repetere taceat.

*Sculptetur articuli uestionem commendat, eam omnibus aliis remediis anteposendo hujusque administrandi rationem tradit Armament. Chirurg. pag. 142.*

Quoniam ultimò non ratò à degeneratione membris luxatis pruritus molestissimus accidit, pro illo sopiendo, religatum membrum perfundatur aut fomentetur, aqua tepida communi, vel Sale Armoniac. aut marino maritata. Et cum ubivis particularium Luxationum mentionem fecerimus ea hic repetere non libet: nec Lectori nauseam, cramben biscoctam offerendo, pariamus, & generalia hæc dicta facillè ad usum specialem applicari possunt.

## CAPUT VII.

*De Ossium Fractura, Carie & Tophis.*

§. I.

**A**D Synthefin, operationem Chirurgicam, quæ adducit, conjungit & conjunctas servat partes machinæ nostræ, à quacunque causa extraordinariè separatas, schola Chirurgica refert inter alia & *Fracturam Ossium*, de qua, ut & de ossium *Carie* & *Tophis* sermo nunc erit.

*Fractura ossium* describi possunt, quod sint ossium continui solutiones, à causa violenta ut plurimum externa factæ. *Descriptio Ossium Fractura.*

*Caries* verò ossium describitur, quod sit corrosio ossium à succis acerbis & corrosivis proveniens. Imò *Caries*, nostro judicio, nihil aliud est quàm ossium mortificatio seu Gangæna, fibris enim tendinosissimis corrosis & discissis, necessario ejusmodi mortificatio oboriri debet.

*Descriptio Ossium Cariei.*

*Tophi* sunt tumores duri, & tactui renitentes, interdum dolentes in ossium medio enati, à viscidis succis ex acore vitioso ibi imperium sibi rapiente coagulatis, exortiti. Tophi etiam appellantur Nodi, seu, Tuberositates seu gummata Gallica, vel aliz partes lapidosæ & ferro quasi renitentem duritiem inducentes. Ejusmodi Tophi hinc inde corporis nostri observantur partibus, imprimis circa ossa, sic legimus in *Ephem. Germ. Ann. 9. & 10.* quòd membrana & arteria in ejusmodi Tophos fuerint mutatz. Sic quoque Celeberrimus *Dn. Drelincurtus* arteriam descendantem potissimùm Iliacam variis in locis totam in lapidem induruisse notavit. Nos impuro Dizenst vidimus unum digitum & quidem medium planè in duritiem versum: sic etiam Lugduni Batavorum viri quidam *Cariofis*.

*Descriptio Tophorum.*

riosis manum lapideam monstravit. Confer *Celeberrimi Franci Lapidicinam*. Podagricis ac Lue venerica affectis Tophi hi solennes esse solent.

Parti affe-  
cta.

§. 2. *Parti affe*ctuum sunt ossa: ut ergo ipsorum compositio & textura nobis constet, paucis in ipsorum constitutionem inquiramus. In animali corpore plures reperiuntur partes, quæ ossium indolem participare videntur, eò quòd aquè dura non sint, atque illa, & his minùs mollia sint, per quæ Cartilagine indigantur. Si euri tendines temporis tractu in Cartilagine convertuntur, ita etiam cartilagine in ossa abeunt. Si ergo novimus Cartilagine nihil aliud esse quam fibrarum tendinosarum compagem, ex eò quòd interdum tendines in cartilagine mutantur, inde necessariò judicare debemus, ossa tantùm composita esse ex fibris tendinosis, quæ postquam indurata fuerint, in cartilagineam usque consistentiam, denique in substantiam ossicam indurescunt. Observationes, quæ in fortis ossibus instituuntur, veritatem istam meridiana luce clariorem exhibent. Re ipsa permultæ in illis animadvertuntur fibræ tendinosæ, & nominatim in cranio, in principio membranae solum ex fibris tendinosis contextæ speciem refert, cartilagineum deinceps devenit, & demum in os penitus facessit. Quibus ita pensatis nullum supersesse potest dubium, quin ossa sint congeries fibrarum tendinosarum, quæ ita firmius junctæ ac oppositæ induruerunt, ut duritiem ossis adeptæ fuerint. Fibræ tendinosæ indurantur ex facto in se temporis tractu alcalicorum volatilium infarctu. Fibræ nervæ illarum cavitarum spiritus animales infundunt, & sic subtilius per poros avolat, & crassius remanet; ita ut fibræ istæ sint exemplo alcalicis volatilibus sulphuribusque volatilibus refertæ; dum adsunt sulphura, sub cartilagine forma apparent, sed simul ac sulphura absorpta fuerint, sive à fibrarum nu-

tritione, sive per poros avolando, sive sese comminuendo, Ossium faciem exhibent. Inde fit, ut nullæ sint partes in corpore animalis, ex quibus tam copiosum sal volatile elici possit quàm ex Ossibus.

Denique observantur Ossia à membrana contegi, quæ Periostium cognominatur; Membrana ista adeò arctè Ossibus adhæret, ut quibusdam in locis ab ipsis nequaquam avelli possit, nisi eam scindendo sive dilacerando. Cùm illa membrana attentius consideretur, ex triplici partium genere constare visitur, ex multis sc. fibris tendinosis, plurimis ramis nerveis, & aliquilibus arteriis & venulis, ita ut omnibus ritè perpenis comperiat *Periostium* nihil aliud esse, quàm contextum fibrarum tendinosarum Ossis, quorundam nervorum, & aliquorum articularum venarumque.

§. 3. Quoniam Medicus ac Chirurgus curam non aggreditur, antequam cognoverit, quæ curanda sint, de *signis* & hic agere necessum est.

Diagnosis  
Fractura  
Ossium.

Signa ergo *Fracturarum Ossium* sunt vel communia vel propria. Communia observantur, si sc. Fracturarum occasiones atque causæ præcesserint, & æger forsitan aut adstantes simul strepitum quandam pereceperint: Dein causam illam dolor atque inflammatio ingens mox excipiat, postmodum si membro inæqualitas notabilis hinc introducat, & si Ossium extremitates promineant, aut digito vel specillo in hoc immisso Ossis inæqualitas deprehendatur, ac ultimò, si membri lassi actio notabiliter vacillet. In specie verò transversalis seu obliqua dignoscitur Fractura, si ex contestatione membri percipiat strepitus, aut manu illi transversim supposita hoc incurvetur: dein quando illa cum extremitatum Ossium recessu accidit, aut hæc fragmenta separata deprehenduntur, aut membri notabilis observetur inæqualitas, i. e. in una hujus parte fovea, in altera tumor, postea membri motus tollitur, præsertim si à

sc

se invicem Ossâ recesserint, aut quamvis extremitatibus eorum adhuc sibi contiguus aliquid morus ipsi superfit, imperfectus tamen admodum hic est. Imò ultimò membrum non raro brevius redditur, quatenus recedentium Ossium partem inferiorem musculi sursum retrahunt. *Afferat* difficilè inè dignoscitur, nisi quòd post Fracturæ causam aliquando tumor atque inæqualitas in parte affecta observetur vetur cum summo dolore. Communionem tandem monstrat eadem membri notabili dolore combinata inæqualitas ac tumor, imò aliquando particularum Ossis fracti ad digitorum contractionem agitatio, membrique ad motum impotentia: quamvis & hæc difficulter quoque dignoscatur, præter signa enumerata exactione læsa; ut & symptomata ex suis signis judicanda erunt.

*Diagnos*  
*Cariei*  
*Ossium.*

*Cariei Ossium* quoad *Diagnosin*, sine ulcere sordido aut Fistula raro observatur *Cariei Ossium*, prout enim ulcus devorat carnosas ac fibrosas molles partes, sic *Cariei* duriores ac Ossas. Pus quod effluit ex tali ulcere carioso, est oleosum, pingue, ac maxime foetidum, aliquando flavum, viridè, ut plurimum verò tenue est, & fluidum, & plus materie effluit ex tali ulcere quàm ex alio, intense quoque, seu dictum, fetet, & sæpè emplastra nigro tingit colore. Caro quoque solet esse spongiosa, mollis & fungosa, & in superficie apparet sublivida pallidaque, est sæpe instar lardi. Quamvis tale ulcus curatum videatur sua sponte tamen iterum aperitur. Dein ex ipso detecto Osse carioso cognosci potest, si sanguis sit niger, coagulatus, & Os sit inæquale & molle & quasi cavernulis multis præditum. Cognoscitur ergò Caries in Osse denudato 1. per autopsiam: 2. ex materia prominente, quæ est tennis, oleaginosa, flava & graveolens; 3. si evulceratio vetustior juxta *Hipp. Sect. 6. Aph. 45. 4.* si coalescentia ejus difficilior aut post coalitionem de-

nuò rumpatur. 5. Si caro circumstans spongiosa, flaccida, pallida & livida observetur; 6. si supra turundas aut Emplastrâ macula nigricans appareat, comprobante hoc per experientiam *Sculteto Arment. Tab. 37.* quibus 7. addunt, si specillo immisso asperitas in Osse deprehendatur, imò hoc ab illo periorari videatur. Quorum tamen posterius ita se habet, ut quamvis non observetur, neutiquam tamen inferre liceat, nullam Cariem subesse: testatur siquidem *Paræus Lib. 18. Cap. 26.* Quædam Ossâ cariosa ab igne ita induruisse, ut nullo specillo penetrare, neque trepano perforare illa licuerit.

*Tophorum Diagnosin* quod speciat, illi sunt humiores duri ac tactui renitentes, aliquando dolentes in medio Ossium producti, & immediate incumbunt periostio, subinde ipsis dolore nocturnum, ostocopyum gravissimum inferunt, tandem partes molles & Ossâ subiecta erodunt, ipsorum fibras tendinosas corrodunt, dilacerantque, ac sic Cariem sæpè inducunt, atque tumunt. Isti communiter qui Luc Veneræ diu laborantur hoc malo infici solent. In Arthriticis observamus etiam ejusmodi nodos Tophaceos raro curabiles.

5. 4. *Ætiologiam* horum morborum quod attinet, *Veterum* sententia est, Ossium Fracturam oboriri à re violenta externa. Causæ enim sint omnia, quæ vim habent contundendi, distorquendi, rupendi, dividendi &c. Fractura enim ipsis est continui in Osse solutio absque incisione, violentæ extrinsecus à re rumpente, vel contudente facta, ut sunt telum durum & ictus vehemens, tum ipsaabilitas Ossis, ratione cujus alterum altero facilius diffingitur aut retrocedere potest, crassius enim majorem præbet resistum, quàm tenuis, durum, quàm molle. Ratione quoque ætatis & temperamenti Ossâ variare dicunt, in infantibus junioribus & scemellis tenuio-

*Galenicorum*  
*indici*  
*de causa*  
*Ossium*  
*Fractura.*

nuiora sunt quàm in viris & senibus, in humidioribus, quàm in siccis. Proinde tenuiora faciliore Marte frangi possè contendunt, etiam à re non valde dura, aut vehementi percussione, dura autem non nisi à re valida vehementiori impetu illata. Dicunt Fracturam vel simplicem vel compositam, vel completam, vel incompletam esse, si una tantum pars frangitur, ab ipsis dicitur *incompleta*.

*Carlei.* §. 5. Ossium verò Cariem deducunt Veteres ab acrimonia humorum Ossia singulariter impetente & nullis parente.

*Tophorum.* Tophos Galenici dicunt Gummata, quia gummosam in se continent materiam, Tumores hos duplices esse ajunt, sunt enim alii *Thophacci* alii non: Tophacci, ad mentem ipsorum, sunt ex materia lapidosa, & quasi ossa, dein si materia est mollis, tunc referunt ad speciem atheromatosis. Tumores Tophaceos ut plurimum oboriri contendunt circa pedes & crura, in ligamentis scilicet aticulorum Ossibus, periostis, in quibus fiunt dolorosissimi tumores, aliquando in Ossis superficie. Materiam, à qua generatur hic tumor, dicunt esse tenacem, pituitosam, melancholicam, imprimis crassam, ex qua fieri Tophos haud dubitant.

*Paracelsi opinio de causa Ossium Fractura.* §. 6. Paracelsus Fracturam Ossium non aliter contingere ait, quàm ubi quis accinctus gladio super hunc decidens, illam vaginam frangatur ensis, hoc de Ossè pariter intelligendum vult ad pellem & carnes comparando, prout vaginæ gladius, cui solum adhibendum esse remedium jubet. Item sæpius ait frangi Os, medullis penitus illatis. Chirurgus notandum esse præcipit, in qualibet Ossium Fractura, dolorem omnem casu proveniente in ruptura querendum esse. Fracturis plura accidentia contingere memorat, ut sunt calores, frigora, tumores, cruditates, pustulæ, nigri lauci.

*Tomus II.*

ve colores, insensibilitas, putrefactiones, fistulæ concavitates, incendia &c. quæ quidem ex primo casu non procedere ait, sed ex accidentibus, incuria vel imperitia Chirurgi causatis in hujusmodi membro. Liquores illos membrum sustentantes esse ipsomet Medicos scribit, curari enim ait Fracturas à Mumia Corporis in Carne, ligamentis medullis &c. existente, cujus in medio sium Os & circumseptum est, à quibus omnibus etiam persanatur.

*Cariei.* Cariem Ossium Author à sale fieri multis comprobat rationibus & experimentis, ab ulceribus enim diuturnis tanquam pessimum symptoma accidere solet, imprimis carne venis ac nervis erosis, Ossia tunc quoque cariola fieri notat.

*Tophorū.* Tophos Author ex mellisfluus fieri mineralibus provenire statuit, item ex arthritide sæpiissime Tophos generari, item ex lue venerea ac veneno Gallico.

§. 7. Helmontius Ossia acidissima dicens Fracturam ipsorum fieri à quacunque re externa violenta, & in eo cum aliis consentit. Ossia & enses facilius frangi sub frigoribus quàm æstate memorat. Cariem verò deducit à latice corrosivo ad Ossia delato eaque corroderent.

*Tophorū.* Tophos exoriri author existimat à mucilagine associata pulveri, mucilagines enim inspicillatæ & è corpore suo resolutæ facillè juxta eum in Tophos transeunt, quos ex mucilagine & pulvere fieri contendit.

§. 8. Villifus vult Ossium Fracturam ut plurimum à causa externa violentiori atque insigni eorum substantiam discontinuante prodire; nullo modo tamen inficias ire volens à nimis violentioribusque artuum convulsionibus Ossia querendam frangi ac discontinuari posse.

*Cariei.* Villifus accusat ut veram Cariei causam, acido salis & aeres Ee succi

*Villifii opinio de causa Ossium Fractura.*



fecti alibilis Ossium nutritioni destinati particulas; quæ ob molem & figuram evaporationi nequaquam idoneæ, & ad nutritionem, ob suam cum fibris disproportionem ineptæ, Ossis substantiam corrumunt, ejus fibras spiculis suis, quæ ipsarum poris defigunt comminuentes ac discindentes, atque in minutulas particulas contentes.

Ossa ex Villisio *Tophis* affliguntur, quando scilicet succus nutritivus particulis acidis saturatus atque coagulationes patiens, coagulatus, quas in se continet particulas in angustioribus atque in Ossium superficie politis deponit, evaporatis autem tenuioribus materiæ istius remorantis atque aggregatæ particulis, residua crassior devenit, & à liquore nerveo in substantiam ferè osseam commutatur. Cum verò in stagnante isto humore alibili contentæ essent salinæ particule, ossa ista substantia Ossis superaddita scabra fit, à salium spiculis foris prominentibus.

*Sylvii*  
*mens de*  
*causa Os-*  
*sium Fra-*  
*ctura.*  
*Cariei.*

§. 9. *Sylvius* cum aliis Auctoribus in causa Ossium Fracturarum consentit, & à causa externa quacunque eam provenire posse non dubitat.

*Cariei* verò Ossium produci statuit ab acido spiritu nimis puro in corpore existente, quod ex præviis sæpenumero doloribus intolerabilibus, & à sola aciditate provenientibus liquet. Acrimonia siquidem à lixivo sale oborta, fixior, juxta ipsum, permanet in eodem loco, partemque affectam videtur urere, dum spiritus acidus partem à se correptam repetitis lincinationibus impetere aut lacerare aut perforare judicatur, hinc *Cariei* in Lue Venerea sæpè contingentem ab acido venereo ardentissimè Ossibus sese insinuante, illaque ad internecionem corrumpente, deducit, difficultatem curationis hujus inde pendere dicit, quod venenum sese intus insinuat Ossibus, quo pe-

netrate nequeunt remedia illi corrigendo apta, nec si cillè igne sive cauterio actuali superari possit idem malum. Ossa sana vivere ait *Author*, in *Carie* verò Venerea Ossa *Carie* correpta pro mortuis habenda esse contendit.

*Tophor* seu *Tuberositates* *Sylvius* inter Luis Venereæ symptomata refert, quæ hinc inde Ossibus sub periostio accrescunt, & ubique deformitatem insignem ac inequalitatem comitem habent, Arthriticis quoque solennes sunt. Causam horum *Tophorum* ipse dicit esse materiam pituitosam valde tenacem viscidam ac coagulatam flagrantem & talem tumorem durum ac lapideum quasi producentem. Has protuberantias, pituitam viscidam pro materia agnoscere, visum evincere, dicit & curationem, quæ perficitur per medicamenta eandem pituitam incidenda sensimque dissolventia, Mercurium imprimis & olea stillicidia, ideoque sale volatili oleoso prægnantia confirmat. Ab acido pingui visciditatem hanc enormem produci statuit, hinc concurrere ait ad gummatum illorum, *Tophorum* ac *Tuberositatum* generationem Acidum, à quo ideo & Lue Veneream deducit.

§. 9. *Cartesiani* in Ossium Fractura non minus causam remotiorem ponunt rem quandam externam, duram, ictu vel casu Ossibus vehementius illatam, vel à lapsu, &c. Senioribus faciliè Fracturam contingere ajunt, adeo ut ipsa Ossis dispositio causæ proximioris vicem hic obeat, quæ ob filamenta, è quibus Ossa cum cæteris machine membris sunt composita, facilius modò uno findi volunt, quam alio, aut obliquè etiam frangi, cum eadem adhuc fibras retineant, postquam induerunt, quas habuerunt sub fornâ membranarum & cartilaginum.

*Ossium Cariei* causam constituunt particulas angulares acutas, vel cum

*Tophorum.*

*Cartesianorum opinio de causa Ossium Fractura.*

*Cariei.*

cum succo nutriente ex arteriis, vel cum lymphâ ex ductibus propriis, vel ex succo nervo Ossium poros ingredientibus, interstitia illorum tandem dissolvunt, maximè si ulcus vel vulnus adfit, & diu aeri exponatur.

*Topborum.* Ossium verò *Topbor* inde produci credunt, quod vel succi nutritii, vel aliorum succorum particulæ ob figurarum & magnitudinum suam convenientiam cum Ossibus, intercedente solâ quiete, iisdem fortius adherant, vel ob viscositatem & ramositatem à particulis quibusdam acutis lamellatis in ipsis ossibus jam contentis coagulantur & inspissantur, ut ita non modo in lapideam quandam abeant duritiem, sed Ossibus etiam ob particulas cuspidatas eorum poris una inherentes firmius annexantur.

*Nostra sententia de causis Fracturæ.* 9. 10. Ista aliorum, hæc nostra est sententia: *Causæ Fracturarum* Ossium sunt externæ ad infortunium pertinentes, ut sunt ictus, casus, lapsus & occurfus, plaga, &c. & quæcunque continuum Ossis solvere possunt, licet observationes Practicorum testentur, internam dispositionem illius vim non raro augere aut juvare posse, quatenus Ossâ seniorum ob rigiditatem atque siccitatem intensiorem franguntur, quàm puerorum molliora, & flexibilia. Pariter Arthritici, atque defluxionibus acrioribus ac erodentibus laborantes, Fracturis magis obnoxii sunt quàm alii: item qui frequentiore aut diuturniore Mercurii inunctionem passi sunt, quorum exempla *Marcellus Donatus Hist. Mirab. L. 5. c. 1. & Hildan. Cent. 2. Observ. 66. 67. 68.* recenset.

*Differentia Fra-  
cturæ Ossium.*

*Fracturarum differentias* quod attinet, Practici petunt illas à tribus, sc. ab earum forma, parte affectâ, & symptomatibus. Ratione formæ alia observatur *καυαία*, quæ per transversum Ossis fit, & *Fractura κατὰ τὴν μήκην* vocatur: alia *Ασφραλτίς* dicitur, quæ secundum longitudinem illius contingit: alia

denique *συνάρτησις* seu comminutio, quando os in plura fragmenta secedit. Ratione Subiecti alia est cranii, alia est costarum, alia brachii, alia tibiae, &c. ac tandem ratione symptomatum, alia cum tumore, alia cum Inflammatione, vulnere ac contusione est.

Sed è diverticulo in viam, & videbimus *Causam Cariei Ossium*, quæ verò nostro iudicio sequenti modo contingere solet. In Tumouribus quando obstructa sunt vascula quædam, liquor obstruens acidus & acrior factus periossum corrodit, unde sæpè gravissimus dolor, corrodendo enim ipsas fibras tendinosas Ossium frangit, & sic ipsum Os invadit, idemque totum sæpè usque ad intimam consumit, hinc Caries Ossium. Luc Venerea laborantibus solennis est, quæ acidis ac corrosivis scatent succis. Dum hæc scribimus in Nobili quodam diu Luc Venerea laborante observavimus à Carie non tantum omnia faciei, sed & nasi Ossâ cum maxillâ superiore ac inferiore ita exesa fuisse, ut eximi potuerint, imo ipsius facies cum naso tota collapsa fuit, ceratè horrendo aspectu, & sic miserè vitam finivit. Facile quoque Ossâ corroduntur ac corrumuntur, si vulnus exsangue diu exponatur aeri, ita etiam ulcus putridum & usque ad os profundum, ob acidum acre mordens & spiculâ corrosivâ, fibrillas tendinosas discindere, & sic Cariem Ossis inducere potest. Sunt ut plurimum succi circa Ossâ stagnantes & aciores fiunt, qui hæc fibras ossis seu tendinosas corrodunt, ac Cariem inferunt. Quod succi fibras tendinosas persuolentes Cariem inducere possint, ex eo patet, quia Ossâ facilis in corpore vivente corrumuntur, quàm in defunctorum Ossibus. Ossâ enim constant ex sale volatili, dein spiritu & postmodum oleo, & ultimo sale fixo & acido volatili, quæ particulæ volatiles non tantum in

*Causa Cariei ex nostra sententia.*

mius impingat, eorum chyrum cor-  
rumpit coagulatque, hinc necessa-  
rio ejusmodi succi accedente acido  
forti, indurari debent, qui indu-  
rati & Tartaro maritati constituunt  
ejusmodi Tophos, qui tandem  
partes vicinas erodendo in ulcera  
abeunt. Podagricis Tophi isti so-  
lennes sunt, quia abundant acido  
& viscido Tartaro, & imprimis  
eorum succus nerveus eodem  
charactere imbutus ad juncturas  
ac memerosana ligamenta & peri-  
ostium perveniens, ob tenacita-  
tem ac visciditatem stagnare cogi-  
tur, & si simul topica astringen-  
tia frigida ac repellentia loco affe-  
cto applicentur, magis compacta  
redditur, quæ tandem in Tophos  
coagulat.

articulo remotior existit, ac quæ  
in membro, quod duplici Osse gau-  
det, horum autem unum saltem  
fractum.

*Cariæ Ossium* difficillimè cura-  
tur, imò si ulcera ipsam produ-  
xerint, tunc res est periculi plena,  
nam acres succi incarnationem im-  
pediunt, sicut autem cuncta cum  
Ossis Carie ulcera non adeò facile  
consolidantur, hinc inter mali-  
gna numerantur; irà majores dif-  
ficultates pariunt illa, ubi junctura  
atque capita Ossium, quàm ubi  
media eorum pars corruptione hac  
laborant, utpote quibus remedia  
Cariosum separantia non commo-  
dè applicare licet. Quæ Luem Ven-  
eream comitatur, difficillimè  
quoque curatur, sed agros usque  
ad mortem insequitur, ceu pluræ  
novimus exempla. Plures Cariem  
absque igne nunquam curari posse  
asserunt.

*Cariæ Os-  
sium.*

*Prognosis*  
*Ossium*  
*Fractura.*

§. 11. Quoad *Fracturarum Ossium*  
*Prognosis*, nulla equidem Fractura-  
rum à Chirurgis per se lethalis ha-  
berur, sed per accidens duntaxat  
talis interdum evadit, ex. gr. ra-  
tione contusionis ingentis, hinc-  
que emergentis Inflammationis ac  
Sphaceli, earum tamen alia facili-  
us ac citius, alia difficilior ac  
tardius curatur. Nam (1.) facilius  
sanaretur recens, cùm si ultra se-  
ptimum diem Ossis depositio pro-  
trahitur, extremitates hujus faci-  
li Marte callum contrahant, hinc  
ad coalitionem ineptæ reddantur,  
aut os corrumpatur (2.) facilius  
curatur, quæ in Osse minore, v.  
gr. digiti, quàm in majore, vi-  
delicet femoris: (3.) quæ à cau-  
sa externa sola, quàm quæ inter-  
nam dispositionem conjunctam ha-  
bet: (4.) quæ sine aliis morbis ac  
symptomatibus: (5.) quæ in Sub-  
jecto juvenili ac puerili: (6.) quæ  
in corpore puro & sano, quàm in  
cachectico: (7.) quæ membrum  
tale occupat, in quo restauratio  
ac deligatio commodè fieri valeat,  
ita ut v. gr. Fractura humeri, bra-  
chii, tibie, &c. facilius sanen-  
tur, quàm femoris, vertebrarum  
dorsi, &c. Longitudinalis facilio-  
ri Marte sanatur, quàm transversa  
seu comminutione facta, illa etiam  
facilius curatur, quæ à junctura &

*Tophorum Prognosis* quod con-  
cernit, illi facile in ulcera ac *Ca-*  
*riem* Ossium transeunt, hinc diffi-  
cillimi sunt curati; Arthriticos ac  
Venerea Lue laborantes usque ad  
mortem Tophi comitari solent, &  
vix curabiles existunt, hinc eos  
tangere non licet.

*Topho-  
rum.*

§. 12. Pessima jam *Prognosis*, re-  
stat ut *Diatam* his in affectibus Os-  
sium attingamus, quæ neglecta  
aliquando in iis curandis frustra  
laboramus, ceu id experientia  
quotidiana abundè testatur. Eliga-  
tur ergò aer temperatus, imprimis  
victetur aer nitrosus, ac frigi-  
dus, qui quocunque modo à Fra-  
ctura, Carie & Tophis arcendus  
est, hic enim solus ita Ossium por-  
ros destruere potest, ut Gangræ-  
næ aequè carnosarum partium ac os-  
searum laxentur fores. Victus sit te-  
nuis, dulcis ac boni lacteique suc-  
ci, ut chylus ac sanguis lauda-  
bilis generetur, alimenta condian-  
tur macere, N. M. croco, cina-  
monio, additis herbis aromaticis:  
victetur acida, salina, & indu-  
rata, nimis muriata, fixa, visci-  
da, ac glutinosa. Potus sit vel  
calidus Theæ vel Capheæ, vel salvia,

*Diatam.*

veronica, &c. vel cerevisia defecata ac dulci, inter quæ Angelica, Bregensis, & quæ tardius acescit, præ aliis palmam meretur Brunsvicensis duplex, nam cum nautæ lincam sive æquatorem nupertimè transirent, omnia potulenta, quibus naves instruxerant, acorem contraxerunt, sola Brunsvicensis excepta, quæ & saporem & odorem servavit. Vinum generosum, Gallicum ac Hispanicum moderatè sumtum concedi potest, vel si lubet aliud vinum infusione oculi. cancr. vel sale volatili alteratum assumatur.

Motus si moderatus, quies enim in Fractura Ossium summum existit remedium, qua sola ipsæ curantur Fracturæ. In somno & vigiliis aurea servetur mediocritas, alvus & vesica officii sui sint memores, ne excrementa in corpore cumulentur. Animi pathemata, ut terror, mæror, excandescencia ac tristitia tanquam Patroni Acidorum & Coagulatores Succorum, procul abesse jubeantur, contra animus servetur pacatus spe convalescentiæ erigendus.

§. 13. His prælibatis ad ipsam curam Pharmaceuticam & Chirurgicam transeamus, unde ægri plus levaminis percipiunt. Galenici in *Fractura Ossium* eò respiciunt, si Ossa sint tenella, ut extensio ab uno, utraque manu facta sufficiat: si verò fuerint dura, non tantum à duobus viris, sed etiam fasciis, circa articulos trahi, & ut reparentur, extendi docent, quam tamen extensionem primis statim diebus fieri debere suadent, nam tertio, aut quarto, dum adest inflammatio, fieri eam minimè licet, sed novum expectant: primoque inflammationem remove-  
rent student revulsionem instituta per venæsectionem, aut ecurbirulas. Signa Ossis repositi Ipsis sunt: quando dolor est sublatu, & contra percipitur ab ipso Patientē quædam quasi voluptas, quando membrum est alteri æquale, & nulla adest asperitas aut fovea, &c.

tali in statu membra continent & benè deligant, ut callus regenerari possit: Superponunt autem emplastrum aliquo modo refrigerans & adstringens, quale est ad Fracturas rubrum, quod tamdiu relinquendum non esse dicunt donec pruritus & dolorem excitet: quod si advertant, tertio die fieri dicunt solutionem: si minus, relinquere posse concedunt ad quintum, sextum aut septimum diem, sed aut tribus Galeni fasciis cum stramineis splendidiis, aut ferulis ligneis, aliquantulum cavis vinculis & lana benè munitis. Quoties autem solvitur membrum, toties calida aqua fovet usque ad rubiginem, dein iterum superposito emplastro ad Fracturas, vel Diachalceos cum bolo & sanguine draconis mixto instituunt ligaturam satis strictam, citra ullum tamen dolorem, nam per nimiam adstrictionem fieri dolorem & partis atrophiam observant.

Dum callus incipit fieri, cum augmentis, quæ faciunt ad callum generandum, inter quæ recensent orizum, hordeacea, gelatinas. Membrum sit quietum & satis elatum, ne copiosius humores illud decumbant. Callum plerumque 40. die confectum esse scribunt, nisi obstiterit Inflammatio, dolor, fortis ligatura, squama aliqua ab Ossē secreta, quam prius incisa cute extrahendam esse ajunt.

De crurum Fracturis rectius, seu fissuris, quas Germani vocant *Klag. Briiche*, videatur *Felicius Virgii Tract. Chirurg.* Coxend. & Humeri Fracturæ decocta Chirurgi manu adaptari & reponi debent.

Carici Ossium curationem quod attinet, partem Ossis corrupti tollunt, integrum verò conservant. Tollunt verò Os dupliciter, vel manu, vel medicamento, quod irritari ajunt Naturam ad putridi Ossis separationem, quamdiu enim illud, quod est corruptum,

Cura  
Pharmaceutica  
Chirurgica  
secundum  
Galenicos  
in Ossium  
Fractura.

In Ossium  
Cura.

tum, demptum non fuerit, tamdiu impossibile esse dicunt ulcus sanari & solidam carnem supercrefcere. Auferunt autem Os vel scalpro exciforio, cum malleolo ut solent ftatuarii, vel perforant Os terebro fabrili in tribus aut quatuor partibus scalpro pereurrendo cum malleolo à foramine ad foramen: agunt etiam aliquando scalpris ratoris. Imprimis totum illud corruptum ablatum esse signum esse dicunt, quando cruor fuccedit: & tum ab opere cessandum esse monent, infpergunt potius aristolochiz rot. radic. cum myrrha pulverifata. Sape etiam Os cariosum adurunt, ut quod corruptum est, omni alimento & humiditate privetur: ablata enim sustentatione, naturam ajunt facilius separare separanda: idem facere scribunt medicamenta siciffima & frigidiffima; quale est quod fit ex foliis & semine hyofcyami, cum vitriolo ufto confufis, item radix ireos, peucedani, aristolochiz rotundz, squama zris, ærugo, aqua aluminis magistralis, quz fapius Os mafeat, curate ajunt Cariem absque dolore: Euphorbium juxta cos tenet intercepta principatum: sed ita adhibent, ne aliàs partes vicinas corrumpat, mifcent cum pasta ex radice ireos, & ita soli Ossi corrupto applicant, ferro quoque candent: Os adurunt, & repetunt uftionem usque dum perficiatur opus. Pasta uftione Os ab inflammatione vendicant aqua rosarum cum oleo rosar. vel violar. & albumine ovi, stупpa exceptis & applicatis: deinde mitigato dolore procedunt ad Ossis separationem, denique sarcoticis ulcus curant.

In Tophis curandis Veteres applicant emplastrum Diachylon cum gummis, cui addunt galbanum & sagapenum cum ammoniaco, vel inungunt oleo amygd. dulc. cum oleo Scorpionum mixto, quando Tophaceam materiam eximere jubent, consumpta materia,

carne locus per sarcotica impletur.

§. 14. Paracelsus statuit Ossi fracto nihil accidere periculi posse, ac curari sanarique necessario debere à Mumia corporis in carne, ligamentis, medullis, &c. existente, cujus in medio suum Os & circumseptum est, à quibus omnibus persanatur. Quandoquidem apertum nil, per quod externis accidentibus pateret accessus. Quapropter aptè ligare, naturaque sua requies data, juxta ipsum, certissimum in istis medicamentum sunt, & industria cura.

Si tamen ad rupturas accedant Vulnura, per quz fragmenta quzpiam apparerent Ossium à fistulis soluta vel disjuncta, per vulneralia medicamenta jam dicta extrahentia suadet ut extrahantur, & nullo modo per ferramenta vel alia quzvis instrumenta fodiendo conatur extrahere: nam secundum ipsum vera Mumia potest quicquid est naturæ contrarium elicere, tum quz semififfuræ sunt, natura per se curat. Membrum liquidum, ubi rectè probeque rursus conjunctum suis aptis ad hoc instrumentis fuerit, ac in temperatura & situ conveniente conservatum, per Mumiam propriam citius multo curari, quàm herbis omnibus fieri queat, ipsius monumenta docent.

Principio ergo Fracturas Ossium ut curet, animadvertit, concaviss ut instrumentis membra concludens erigat, utque ab anteriore posterioreque partibus, & quaquaversum liberè possit accedere tangereque. Postmodum vulneralibus ligat medicamentis, & si promptus in eorum usu fuerit hoc notat, quemlibet viscum nigræ consolidæ, serpentinz & aristolochiz rotundæ rupturas optimè curare, mane vespereque superligatum, non usque adeo strictè, singulis vicibus iterum apertis ligaculis recentem & calidum appositum: alia enim medicamenta, quz per sparadrapp. rotularia ligacula, vel aliis pannis fiunt, tanquam me-

Paracelsi  
opinio de  
curatioe  
Ossium  
Fracturæ.

re futilia rejicit, & membri magis ad perditionem, quàm sublevationem facientia. Ligationes tertio quovis die tantum factas, item suffusiones, compressiones nimias, & similes vanas operationes contemnit, quia inde accidentium producuntur centenaria. Verum etsi vulnera forent, è quibus Ossa promitterent, erigit, ac ad modum Vulneris curat.

*Offiū Gariet.* *Cariosa Ossa* si *Paracelsus* curanda occurrunt, nec lima vel alio instrumento atteri vel frangit, juxta Carnificum tonforum vulgatum modum, sed tantum ea mundat, & si ulsa vel inflammata fuerint, exstinguit: deinceps faciliè carnem Ossi superinducit. Remedium ipsius quo Ossa erosa, inflammata &c. restituere solet, est sequens.

*℞. Olei de Camphora per albumen ovi preparati,*  
*Olei Caryophyllorum aa. ʒʒ.*

Mixtus invicem juxta reliqua remedia utitur felicissimè.

*Tophorum.* *Tophorum* curationem in eo consistere ait *Paracelsus*, ne ea quæ fixa sunt in transmutationem deducantur, siquidem omnia trasmutata in membris, non autem in mineralibus subsistunt, quantum ad fixa attinet. Duo mineralia una esse arguit, aliud dulce, aliud austerum, sic & juxta eum duæ essentia se mutuo conjungunt, quæ nisi *resolvantur*, omnem curationis spem præcludunt.

*Helmontius* *§. 15.* *Helmontius* in *Fractura Ossium* eò respicit, ut Ossa iterum consolidentur, quæ fracto poro osseo quacunque ætate consolidari existimat. Lapidem quoque Ossifragum, spiritu aceti resolutum & internè assumptum dono appropriato ac specifico sanare Fracturas Ossium scribit. Arcanis enim suis in omnibus fidit, in quavis ergo Fractura Ossium radicem symphyti & lapidem osteocolum aliis præter Chirurgiis, cum juxta ipsum *Archæus* iisdem sedatus & ad officium vo-

catus, ipsemet sanationem istarum Fracturarum quovis artifice melius & accuratius peragat.

*Cariem Ossium* oleo caryophyllorum, succini aliisque acidum absorbentibus curandam fore promittit.

Ad *Tophus* curandos *Author* commendat suum oleum Strumarum, item pinguedinem leporis maximè vetustam, & sanguinem hircinum exterius applicatum.

*§. 16.* *Villifus* noster *Ossa fracta* statim reponit, repositaque firmat, naturæque auxiliatrices manus confert ad eorum conglutinationem perficiendam, genuinam succi alibilis crasin conservando, vel alteratam corrigendo; & si opus fuerit ejus penu augendo: si pars fracta inflammata fuerit, prius inflammationem curat, & deinde totus est in curanda Fractura: reposita autem osse partem illinit spiritu vini, cui infusi fuerint flores hyperici, vel cum eodem cui admixta fuerit tertia pars spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem. Si contusa fuerit pars, inungatur illi mel cui admixtus sit spiritus vini, illinatur etiam locus fractus ol. Hyper. & Lumbric. terr. paucio oleo destillat terebinth. & paucio ol. ros. marin. acuat. Applicetur deinceps parti affectæ emplastrum ex resina alba, terebinthina & cera, quibus addatur pulvis radicis barbæ hirci. Interim medicamenta interna præscribit tum ad calum promovendum, tum ad symptomata præcavenda, & inter alia eminere præsit rorem marinum, folia agrimoniz consolidam majorem, Geranium, Robert. Sabinam, & lapidem Ossifragum.

Si *Cariem Ossium* juxta ipsum altius non penetraverit, essentia caryophyllorum, aut ol. Guajaci illam tollere conatur. Si verò profundius serperit, ferro candente illam corrigit, illudque sæpius applicat, ipsiusque ministerio eo usque utitur donec nulla sanies, nullusque alius corruptus humor exeat.

Abla-

*Cariet.*

*Tophorum.*

*Villifus*  
*modus*  
*curandi*  
*Ossium*  
*Fracturam.*

*Cariem.*



Ablata enim Carie, parti affectæ imponit pulverem ex radicibus aristolochiæ, lride, myrrha, &c. compositum, remediisque vulnerariis calli generationem adjuvat.

*Tophus.* VVillisius ad *Tophos Nodosque* curandos nullo peculiari utitur medicamento, in iisque tollendis alios Authores sequitur imitaturque.

*Sylviana cura in Ossium Fractura.* §. 17. *Sylvius* in *Fractura Ossium* à reliquorum methodo observanda, ne unguem latum secedere videtur, sed cum iis consentit.

In *Cariæ Ossium* curatione eò respicit, omnesque vires intendit, ut tota pars Carie affecta utpote mortua, separetur à sana & viva, cum qua nec coalescere, nec diu subsistere potest pars Cariosa, quin eandem itidem inficiat, & ad corruptionem similem paulatim deducat. Difficile autem esse notat ipse, aut igne ferroque ignito, aut medicamentis convenientibus partem Carie infectam separare ab integra, postquam per cuniculos in sanam se insinuat Venenum, imprimis Venereum non quiescens, sed cundo vires acquirens. Sicut manifestum est in omni Carie Venerea, cujus causa non sistitur aut infringitur ab Osse ipso quod corrumpitur, sed indies augetur, & acrior fit, unde tandem ubi ad summum pervenit, Caries Venerea fit incurabilis. Difficultatem autem summam in Carie curanda etiam inde pendere arguit, quod remedia ipsi curandæ convenientissima sæpenumero satis convenienter applicari, usurparique non possint. Partes namque Ossibus vicinæ, Membranae, Tendines, nervi, & similes ab actuali cauterio simul læduntur & intolerabiles dolores patiuntur. Augeri autem idem malum existimat, quando sæpius applicantur actualia illa cauteria, quæ una vice parum præstare solent, at sæpius iteranda sunt, si laudabilem effectum producere debeant. Cetera remedia quæ Cariei consumendæ aut tollendæ adhibentur, pro

invalidis habet, quia non satis penetrare possunt ad quævis loca, in quæ se insinuat venenum Venereum in Aciditate acri consistens ac penetrantissimum. Acidi acrimoniam debellant vel salia lixiva tam fixa, quam volatilia, vel spiritus volatiles, vel olea, vel aqua. Salia verò lixiva fixa, quæ acidis sunt inimica, pura & sola si fuerint, in superficie hærebunt, nec aliquid laudabilis magnivè præstabunt, sin aqua diluantur, simul partem aliquam virium suarum amittent; si cum spiritu volatili conjuncta fuerint, penetrabunt quidem quaquaversum facilius, operabuntur autem simul debilius. Si cum oleo in saponem mutata fuerint, debiliora sunt facta, nec facile ad interiora penetrant, quibus si aqua admisceatur, ut diluantur & ulterius penetrare possint, reddentur simul magis inertia. Adeo ut inter omnia venenum acido-aere Cariem producens corrigentia, & emendantia remedia, post Cauterium Actuale, nullum præstantius noverit; secundum verò locum assignat salibus volatilibus, utut satis debilibus ad tantum & tam grave malum curandum. Veram etenim rationem curandi reputat ut Os infectum, quoties tuto licet, totum tollatur, postquam vix unquam sisti potest in ipso Caries, aut pars Ossis corrupta separari à sana. Laudat maximè in quacunque Ossium Carie salis volatilis usum, quem laudabiliorem fore dicit, si quis salia volatilia plurium generum adornet, atque optima quævis per accuratam & attentam Experientiam seligat. Usurpanda esse quoque monet in Ossium Carie curanda Tutiam, Lithargyrium, Cerussam, imò Guajacum in pulverem trita, & inspersa: quæ omnia juvant quatenus acidum in se concentrant, & ab Ossibus allectum avertunt, ne ulterius serpere, ac ipsa corrumpere pergat. Hæc igitur esse blandissima curandæ Cariei remedia asserit, proxima verò esse sine

media salia tùm volatilia, tùm fixa, tanquam Cauteria potentialia, potissimum verò esse Cauterium Actuale audacter statuit, quorum ope nisi curari possit Caries, habet ipsam proincurabili.

*In Tophis.* *Excrecentes* in variis partibus sub membrana Ossis investiente, Periostio, *Tuberositates* insignes curare solet per emplastra & unguenta Mercurialia, imprimis universalem curam ope salivationis institutam. Si Ossis infecerint, & materia pituitosa viscidior illas constituat, vix curatas fore ait, nisi aperto Tumore, atque sublato sensim humore viscido, tum per gummas aromaticas, tum caustica potentialia & actualia; perseverando iamdiu in eorundem usu, donec Os mundatum & liberatum ab omni phlegmate observatur, atque tunc pergendo ad consolidationem per remedia Chirurgica vulgò nota.

§. 18. *Cariefracti* Ossium Fracturas curari promittunt, sola Chirurgici manu, Ossis fracta in pristinum restituendo situm & figuram. Dein Emplastrum quoddam ad rupturas imponendo, aut cataplasma ex radice symphyti, quando sc. Fractura existit simplex absque ullo vulnere contusione & inflammatione, cum pessimis verò hisce conjuncta majorem reposcere apparatus fatentur, & non modò remedia interna sudorifera, & post hæc volatilia ex Tinctura hyperici, spiritu lumbricorum, Tinct. bezoard. spir. C. C. volat. propinanda esse, sed per incisionem frustula Ossium separata eximenda, & partium carnearum, & membranarum aut præcavendam esse corruptionem per spiritum vini camphoratum, crocatum & aquam calcis vivæ, aut si hæc præcaveri nequeat, per suppurationem eadem à parte sana & integra esse separanda; tum portiones Ossium fractæ uniri jubent, eam quæ extra protuberat, manu in situm debitum, seu dictum, reponendo, à Chirurgo debitè locando, & impositis fasciis aut emplastro glutinatorio imposito penitus curando.

*Ossium Cariei* Curam quòd concernit, quando illa non valde accrevit, ne illa amplius incrementum capiat, omni studio prospicere mandant, adhibitis absorbentibus, & particulas acutas erodentes fragentibus, pulveribus sc. cancerorum, ex cineribus lumbricorum & camphora compositis. In Carie verò profundiori ipsi euphorbium commendant Cariei inspersum, vel ferro candente ipsa Ossis Cariei infecta exuri jubent.

*Tophorum* remotionem tentant variis medicamentis exsiccantibus, ut aloë, mastiche, sandaracha, alumine ustis, sale saturni, vel etiam aliquando ad fortiora accedunt, & commendant acida corrosiva, spiritum salis, sulphuris, nitri: vel ungu. Ægyptiac. vel cum melle spiritus matricalis misceatur & imponatur; cineres quoque fraxini, vel rosismarini magnipendunt impositos.

§. 19. *Nostram* nunc *Fracturam* Ossium curandi methodum referemus. Cura Fracturarum jure meritoque à Græcis *ἐντιυπή* nuncupatur, scilicet *extensio*, *compositio*, *deligatio* ac *repositio*: ad quas operationes antequam se accingat Chirurgus expertus ac rationalis, præparet instrumenta, tam quæ si fortassis manus non sufficiunt, ad extensionem, quàm quæ ad deligationem ac repositionem necessaria: dein æger ante omnia super lectum, in quo permanere debet, situ conveniente collocetur, nec in alio loco facile deligetur. Præsto habeat ministros dexteritate & robore polentes. Postmodum attendat, an fortean duplex subsit Fractura, ne una neglecta membri figura & actio depravata maneat. Hoc asterisco notandum est, quod in Fractura cum dislocatione, prius Os suo loco reponendum quo excidit, tunc *Fractura* obliganda est. Extensio autem non semper necessaria, imò sæpè impertinens est, si sc. Ossium extremitates extra situm suum haud commotæ fuerint, tum vero saltem ea opus est, si hæc invicem à se

*Nostra ratio curandi Ossium Fracturam.*

receſſi-

recesserint. Circa extensionis operationem notandum, quod manus Chirurgi perfici solet, utpote secundum ejus circumstantias extensio fit hodie ferè semper à Chirurgi manu, à Veteribus facta fuit habenis vel machinis in hunc finem à Veteribus variis depictis: ex. gr. in Tibia fracta, alter ministrorum tibiam fractam supra Fracturam, & circa genu comprehendat, ita ut utrumque pollicem ipsi Tibiæ imponat, alter verò si dextrum crus affectum fuerit, ejus alteri extremitati prope malleolos manum sinistram supponat, dextram verò tibiz applicet, contraria ratione procedendo, si pes sinister laborat, adeoque in ipsa extensione pars ita tractetur, ut lineam rectam atque tractum musculorum observet. Operationem hanc sæpè ab unico vidimus Chirurgo institutam, qui duabus manibus restitutionem Ossis optimè molitus est. Extendatur etiam membrum sufficienter aliquantulum longius, ne Ossa quæ in reducendo se invicem tangunt, eorum prominentia frangantur ac reposuionem impediant. Repositio fit, si Chirurgus manibus oleo quodam inunctis, an sufficiens sit extensio explore: quod dignoscit, si inter extrema aliqualis fovea, aut in Fracturæ loco nulla amplius inæqualitas appareat. Mox membrum hinc inde leniter impellat, semper partem ossis eminentiorem in contrarium agendo, quo prominentiæ Ossium sponie potius sua, extensione leviter interdum relaxata se mutuo excipiant, Chirurgus has saltem dirigat, usque dum omnes prominentiæ ad sinus suos repositæ fuerint, quo facto extensio sensim remittatur. Chirurgus pronunciat autem legiti-  
mam reposuionem 1. ex figura, comparatione facta nimirum cum artu sano, & verb. gr. si pollex pedis cum genu in recta stet linea.  
2. Ex superficie ac æqualitate restituta, ac ex doloris majoris cessatione.

Dein ad deligationem se accingat

Chirurgus, cujus usus est tam Ossa reposita, quàm medicamenta apposita retinere. Medicamenta sint in principio talia, quæ inflammationem arcant, huic Batavi imponunt suum Emplastrum de cumino, idque semper antea illinunt spiritu vini Camphorato: proderunt ergo spiritus Matricialis Camphoratus, spir. vin. Camph. spir. flor. sambuc. &c. hinc convenit præ aliis Empl. ad rupturam nostrum mille experimentis comprobatum, quod dum imponatur, membrum prius spirit. vini camph. illinend. vel cum linteis duplicat. imponend. imprimis si confusio adfuerit.

*Ba. Cere citrin.*

*Empl. Diapam. aa. ʒviii.*

*argu. Martial. ʒiv.*

*pulv. rad. alibee,*

*farin. fabar. aa. ʒiʒ.*

*sem. cumin. ʒiii.*

*barb. capr.*

*consol. mai.*

*senigræc.*

*lap. osteocoll. aa. ʒʒ.*

*camph. ʒiii.*

*Terr. Japon. ʒi.*

*spir. vin. q. s.*

*M. f. l. a. Emplastr. ad rupturam.*

Sunt etiam qui Empl. de cicuta imponunt, aliaque ad rupturam laudant; alii oxycroc. cum Diachalcit. mixt. commendant, quæ tamdiu continuant, donec callum producant esse conjecturantur, quod apparet ex doloris omnimoda cessatione (2.) si circa locum fractum color cutis nativis efflorescat, & si cum vulnere saniei copia immineatur.

Sequens mihi placet methodus restituendi & curandi Fracturam Tibiæ vel brachii: primò Os reponatur manu Chirurgi in suum locum, quod cum strepitu fiat, dein Tibia imponatur capsulæ ex charta (*Pappen*) confecta, & ligamentis largis ex linteis confectis, & fasciæ ita adaptentur, ut constringi ac relaxari, imò aperiri possint, restituta Tibia fracta in sua sede, ut sic quotidie Tibia à Chirurgo conspici queat,

queat, num Inflammatio vel Gangræna imminet, an forsan à commotione ægri intempestiva membrum è situ suo fuerit elapsum; cui dein congrua applicari possunt remedia: à pinguis oleo popul. ungu. ceruss. &c. abstinendum esse monemus. Quod ipsum deligandi modum arctinet, ne sit constrictior nimis, alias Inflammatio aderit, splenia membri conditioni adaptata, & deligationis faciendæ longitudinem emetientia, postquam hæc in initio uno vel altero superius recensitorum liquorum tepido fuerint imbuta. Hinc ad manus sint facia 3. pariter liquoribus supradictis imprægnandæ, quarum una eaque brevissima circa ipsam Fracturam pervolvatur, postmodum ad membri partem sanam 5. vel 6. circuitibus ascialibus adscendat; quo facto alteram quoque unius capitis & priorè duplo longiorem eidem Fracturæ, vel in contrariam plagam pariter bis vel ter circumliget Chirurgus, eademque quater vel quinque descendat, mox iterum per totam ligaturam & sursum ad finem usque prioris redeundo, quod tamen magis demonstrari quam præscribi potest. His aliquando loco spleniorum imponatur linteum quadruplicatum, cui, si pars deliganda inæqualis fuerit, minora quoque splenia apponantur. Ligatio quoque nec nimis laxa sit, alias non retinet, nec arctior iusto, præsertim ubi callus protuberat, ac corpus tenacius fuerit, alias dolorem atque inflammationem, imò atrophiam accerses, cum motus imbecillitate. Oportet ergò si metus adest Gangrænæ, ægrum sæpius inviscere, pro deligationis conditione inquirenda.

Circa Fasciarum religationem notetur, quamvis pluribus Chirurgis religio sit, illas ante diem sextum vel septimum solvere, tertio tamen, vel secundo quoque redissimè, & jubente divino *Hipp. de Fract. Text. 5.* solvantur, vel quia tunc laxari incipiunt, vel ob transpirationem impeditam sæpius in-

flammatio, pruritus, imò Gangræna metuenda veniunt, qualia exempla præter quotidianam Praxin apud *Hildan. Cent. 2. Obs. 92.* apparent. Nec etiam credas, quod vel fasciæ vel emplastra ad rupturam tantis polleant viribus ad Fracturam consolidandam, ut Tibi imaginis, quod sola efficit quies, hinc semper ad symptomata respiciendum est. Fasciis superimponunt ferulas tot quot ambiendo toti membro sufficiunt, & aliquando eas emplastrum nonnullum glutinoso incrustant, quo sponte quali adhærescunt, usque dum omnes admotæ tribus vel quatuor subligaculis sufficienter constringunt. Post septimum diem callum generantia non saltem exteriorius plures applicat, sed & interiorius consolidantia propinant. Inspergunt quoque externè Aloen, Myrrham, Labdanum, Tragacanth. &c.

Emplastr. de Labdano impositum egregiè juvat, item ultimò ad corroborandum, & omnes obstructions tollendas conducunt variæ lotiones & fomentationes. Imò sunt qui, si Callus tardius succedat, admovent dropaces. *Hildanus* & alii osteocollam tanquam specificum hoc in casu extollunt, alii succum primulæ veris, rad. & fol. agrimonie magnificiunt. Si vesiculæ cum nigredine partis oboriantur, istæ sunt aperiendæ, & cataplasmata ex scordio, ruta, absinthio, farin. lupin. add. spir. vin camph. aqu. calc. viv. &c. internè nec sudorifera negligenda, quæ egregiam navant operam. Chirurgi in Belgio sequenti modo curant Fracturam Ossium, ex. gr. brachii, tibis, &c. post Ossâ restituta imponunt Empl. de cumino, dein plura linthea spiritus vini camphorata imbuta, dein circumvolvunt vigesies, ultimò colligant. Omnia cum fasciis ex charta (*Pappen*) confectis, sicque relinquunt ad octo dies, antequam iterum aperiunt. Lugduni Batavorum vir quidam ante plures annos Ossium Carie laboravit, decidit in terram & Os tibiæ fregit in totum,

Ossa

Ossa enim non aliter ac vitrum dissiliabant sine ullis extremitatibus & inæqualibus: Ossa istius viri restitui nequibant, quia combinari non poterant, sed oblique locabantur à se invicem, & ex carne prodibant, ad hanc Fracturam curandam Chirurgi Batavi usi sunt tali fasciâ, qua uti solet *Celeber. Muys*, in eo intenti erant, ut Gangranam arceant, in quem finem decoctum herbarum cum spiritu vini Camph. & Theriaca adhibuerunt, cum plumaceolis & linteis duplicatis impositis, Ossa limabant, & sic feliciter restituebant virum.

*Ossium  
Cariem.*

Pergimus ad *Cariem ossium* curationem, quæ diversa pro causa sc. diversitate institui debet; à tumore & imprimis in eo contenta materia acida, acri ac corrosiva Oscorruptur; sic quoque ab exulceratione produci potest, à cuius acri materia facili Marte Os corroditur, quam exulcerationem comitatur ut plurimum excresecientia carnis seu hyperfarcosis. A diu denudate Ossa relicto & acri imprudenter exposito Os corrumpi solet. Juxta harum causarum varietatem cura aliquomodo variari debet, sed vix per medicamenta Ossa à Carie hac liberari possunt, si ad ea pervenire non licuerit: ante omnia ergo cò incumbendum est, ut per incisionem ad partem affectam deveniamus, ad Ossa Carie infecta denudanda, sed hac cautione, ne majora vasa aqûe sanguifera ac membranacea tendinosa dissecindamus, quod cuilibet in Anatonicis parum versato facile innatescet: hinc tantum cultro incisório simplici utendum est, ne cunctando pejus reddatur malum, imò ulceratio ipsa cum labiis suis induratis aprienda & abscindenda est, dein vel Os Carie infectum urendum, vel medicamentis, imprimis, balsamo divino utendum. Si patiens ferrum ac cultrum abhorreat, imponatur pulvis corrosivus Barbette, ulcerationi & hyperfarcosi, eschara facta eximatur usque Os denudatum conspicitur, vel

plumaceolis imponatur Mercur. sublim. cum aq. plantag. dein imponatur Cariet. balsam. divin. noster.

In casu ergo ubi ad aere Os cranii vel alius partis corruptum fuerit, applicandum est calidè Elix. vitæ, & hoc ter vel quater repetendum erit, & quidem plumaceola eo imbuta imponatur. Ossium quoque corruptionem, præcipuè superficiem in vulneribus, ulceribus, maxime tuctur pulv. ireos florent. Si verò corruptio fuerit in palato ossis, eluantur partes cariosæ seq. vel simili mixtura,

*R. Elix. vitæ 3iß.*

*extract. absynth. 3iijß.*

*Camph. 3ii.*

*Murie limonum. 3ii.*

*M. quæ mixtura sponsia imbuta applicetur.*

Omnem quoque Cariem Ossis tantum præservat, sed & curat oleum ligni Guajaci, vel per se, vel cum olco cochleariz maritatum, addito parum spir. sal. armoniaci seq. modo.

*R. Elix. vitæ 3iß.*

*Spir. sal. armoniaci 3ii.*

*ol. lign. Guajaci,*

*cochlear. aa. 3ß.*

*camphor. 3i.*

*M.*

Vel sequens:

*R. Rad. aristoloch. utrinque gentian.*

*irid. flor. aa. 3i.*

*calam. arom.*

*cinamomi aa. 3ß.*

*caryophyll. 3iii.*

*Infund. in aqu. Regin. Hung. per aliquot dies colat. serva.*

Tinctura hac lintea imbuta cariosis ossibus bis vel ter quovis die imponantur. Conducet quoque Tinctura euphorbii, additis granis aliquot Mercurii sublimati. Vel sequens:

*R. Spir. matricar. 3iii.*

*ol. caryophyll. 3i.*

*Spir. tartari 3iii.*

*Camphor. 3ii.*

*M.*

*Celeberrimus Dominus. Muratio* feliciter curavit Cariem ossis, frontis, & claviculæ sequentis remedio..

*℞. Ol. myrrh.*

*caryophyll. aa. ʒ i..*

*Guaiaci. ʒ ʒ.*

*M.* & plumaccola. madesacta pars affecta regatur, exfoliatio intra paucas hebdomadas, facta & æger curatus est, vide *Decur. Ephem. Ann. 3. Obsev. 131.* Pralaudatus Vir hunc affectum. ad Padarthrocacem sic Spinam ventosam reſcit, de quo affectu extat *Iosephi Pandolphini* libellus, cum *Celeb. Merclini* Annotationibus.

In *Cariæ Ossium*. eò semper incumbendum, ut ossa corrupta separentur & exulceratio curetur, & quidem sequenti modo..

*℞. Pulv. myrrh.*

*aloes. aa. ʒ i.*

*Elix. vite. ʒ iʒ.*

*mell. ros. ʒ i.*

*camph. ʒ ʒ.*

*M.*

Interponenda sunt quoque Medicamenta. interna. ad acidum. aere corrosivum corrigendum, & cum ut plurimum in Carie Ossium sanguinis massa à scorbuto infecta, & sanguine viscido acido referta est, in quem finem conducet decoctum chinæ aliorumque lignorum, item sal. volat. oleos. cum spir. coehlear. item antimon. Diaphor. Antihæst. Poter. sal. volat. viperar. C.C. succini, fuligin. eboris, &c. Omnia enim hæc medicamenta juvant, quatenus constant ex volatilibus salibus, aromaticis oleosis. & resinosis. particulis, quæ acidum. Os corumpens temperant, materiam viscidam attenuant, & sic obstructions referant, resolvuntque, sic enim succi corroborantur, volatilisantur & sic reliquos succos restaurant & præservant, imò amica iterum hæmorrhonia confluunt, & sic faciliè Os corruptum seu cadaverosum de se pellunt. Externa remedia omnia. eundem effectum præstant. Sunt qui in *Cariæ Ossium* prodiem ad ignem æqualem accedunt, ueruntque ossa cariola, & sic sæpe

curantur: sed cum ægri abhorreant metuantque ignem, & non persuaderi possint, quod ossa non sentiant, hinc potius præmittenda sunt remedia supra dicta generosa, his verò nihil proficientibus, nullum est securus, & utilius remedium. quàm: ustio, modo à Chirurgo experto festio ritè instituat, & dein. os cauterio actuali aduratur: dein applicandus balsam. divin. vel possunt ferro ignito infundi varii liquores, ut oleum Terebinth. prope ulcus, ut vapor ad Os penetrare possit, quod sæpe egregium præstat effectum. Si Lues. Venerea, vel Scorbuto. Cariem. comitatur, his curatis morbis, Caries faciliè sanatur..

In curatione *Tophorum* ac *Nodorum*, imprimis à Lue Venerea. obortorum. Mercurialium. internè, tum externè haud negligenda sunt, corpus enim ab impuritibus viscidis liberari debet, in quem finem ab initio instituat sequens purgatio. & repetatur singulis septimanis..

*℞. Gum. Guaiac. ʒ ʒ.*

*resin. Jalapp. ʒ i.*

*Mercur. dulc. gr. xv.*

*sal. Guaiac. gr. vi.*

*M. f. pilulæ pondere gr. i.*

Assumantur 13. & plures pro re nata, & interponatur sequens Essentia. *Antivenere* nobis dicta..

*℞. Essent. scabios.*

*lignor. aa. ʒ iʒ.*

*spir. matricar. ʒ iiii.*

*R. antimonitartaris. ʒ iiii.*

*M.* dentur 30. usque ad 60. gutta in vehiculo appropriato, vel decocto lignorum, vel in vino Hispanico..

Præter interna applicanda sunt varia gummata resolutiva, antequam ulcera inferant, convenit empl. de Labdano, cui: pro. libitu. aliquid mercurii addatur, vel Empl. de Ranis. cum quadruplo Mercurio, vel lamina saturni cum Mercurio vivo illita: Elix. vite, spir. matricar. cum ol. Guaiac. & si urgeant dolores mo-



mento addito opii, quod dolores sistit simulque resolvens, vel illinantur Tinctura nostra resolvante ex cinam. caryophyll. macere, cum spiritu vin. alcalisat. parat.

Tophi præsertim podagrici tolluntur illinitione olei sulph. spiritus lumbricorum & impositione Emplastri de Labdano vel Diasulphuris: vel applicetur seq. vel simile cataplasma:

*℞. Rad. alth.*

*allior.*

*ireos rec. aa. ℥i.*

*Jem. lini ℥i℥.*

*cog. cum vin. add.*

*farin. fabar. q. s.*

*camphor. ℥iii.*

*M.*

Pro arcano habetur usneæ querc. & avellan. cum sapone nigro & nitro mixtus calideque appositus. Sequens non erit contemnendum, mutanda enim sunt remedia.

*℞. Succ. nicotian. ℥iii.*

*resin. pini ℥i℥.*

*terebinth. ℥i.*

*Gum. ammoniac. ℥ii.*

*ol. chamomill. ℥i.*

*Elix vitæ ℥℥.*

*Cerae ℥ii.*

*M. f. ceratum.*

Egregium est sequens in Nodis ac Tophis quibuscunque, & à quacunque causa obortis:

*℞. Rad. Bryoniae nigr. excavatam imple cum mercurio librato, & colloca in humido celario ad 10. dies, resolutum exime, & radicem in partis divide, & expressum succum collige, quo Nodi ac Tophi inungantur tepide, deinde succo exarescente locum affectum illine sequenti:*

*℞. Ol. chamomill. still. ℥ii.*

*cerae ℥℥.*

*add. struthiocamel. ℥ii.*

*M.*

Sequens emplastrum ad Tophos & gummata multa comprobatum est experientia.

*℞. Empl. Oppodeltoch Penci aut Grollii*

*sal. alc. vulg. aut antimonii aa.*

*p. xq.*

Malaxentur simul cum pauxillo gummi Guajaci, & ex aluta nodis admoveantur.

FINIS LIBRI SEXTI.



# IOH. DOLÆI ENCYCLOPÆDIA CHIRURGICÆ RATIONALIS

## LIBER VII.

### De Morbis Manuum & Pedum in Specie.

#### CAPUT I.

De Morbis Manuum specialibus,  
nempe *fissura*, *sironibus* &  
*callo*.

##### §. 1.



Orpus nostrum, Machina sensu externo deprehenditur longè artificiosissima, mechanicè constructis organis gaudens; in hoc tamen differt ab aliis automatis, quòd hæc gravitate ponderum vel elatere pinnularum per vestes, rotulas, aliaque moveantur; nostra autem Machina à fluidis præsertim spiritibus animalibus tanquam elatere, movetur, quibus ergo spiritibus & opus habent Artus nostri, Manus scilicet & Pedes; sunt enim ejusmodi artus, quibus sine maximo incommodo carere non valemus, cum plures manibus se nutrire debent, hinc & ipsorum affectus nobis molesti sunt, eapropter eos hoc in Libro pertracturi sumus, & qui-

dem primò Manuum affectus considerabimus, qui sunt *Fissura*, *Sirones* & *Callus*.

*Fissuras* Manuum referimus ad solutionem continui. Hæ sunt vel *nativæ*, vel *adventitiæ*. Describi possunt, quod sint scissuræ seu fossulæ parvæ seu rimulæ in manibus à labore validiore, aliisque acerbis scindentibus internis vel externis causis accedentibus exortæ, hinc effluente liquore aeri exulcerationes quasi leves fiunt.

*Sirones* vel *Sirenes* vel *Cirones*, aut *Chirones*, sunt vermiculi scilicet minutissimi, quasi pediculares in pustulis serosis prurientibus sub cuticula manuum imprimis & pedum subsistentes; Germanis dicuntur *Seurn* item *Keitlisen*.

Describi possunt *Sirones*, quod sunt pustulæ in volis manuum & plantis pedum vermiculos intus habentes, à lymphæ seu ichore crassiore ovulis imprægnato, minutissimis tubulis in cutem desinentibus impacto, & ibidem à calore fermentescente, genitæ.

*Callus* seu *Callositas* in genere dicitur de omni duritie cutanea carnea

Descri-  
ptio  
Manuum  
Fissura-  
rum.

Descriptio  
Sironum.

nea & ossa, qua ordinaria, qua extraordinaria specialiter verò hic sit dictum de Callo in volis manuum oborto.

*Descriptio Callo.* Callus verò manuum describi potest, quod sit durities cutanea volarum manuum, à tubulis compressis & coarctatis, vel à labore, vel calore externo, &c. producta.

*Parti affecta.* §. 2. *Parti affecta* horum affectuum est manus, ceu organon utilissimum, unde & Philosopho Veteri Instrumentum Instrumentorum dicta est. Manus enim ex pluribus constat partibus, hinc à variis subiecta est affectibus: manus suos habet poros ceu certa spatia permeabilia, per quos illa sudat, aut perspirat, imprimis pori hi in manibus notabiles sunt respectu tam eorum positionis, quam amplitudinis. Etenim si quis modo operam impendet contemplandi, ope microscopii, palmam suam manus diligenter, & adhibito sapone ablute, advertere poterit, præter majores illas lineas à Chiromantis certis nominibus insignitas, ut & eas, quæ medix sunt magnitudinis, & rugæ cutis audientes, innumeras strias exiguas æqualis amplitudinis atque distantix, ac ubivis ad semet invicem parallelas. Speciatim verò striæ hæc deprehenduntur in summitatibus ac primis articulis digitorum ac pollicis, in summa parte volæ manus, & prope radicem pollicis parum supra carpum. In quibus locis striæ istæ perquam regulariter contextæ sunt in triangula sphærica, & ellipses, ut in manu ipsa. Super his striis exstant pori, quibus omnes ordinibus ac talis magnitudinis, ut absque microscopio etiam oculo visus acumine pollenti pateant. Quod si microscopii cujusdam ope conspiciantur, quivis porus speciem exhibet fonticuli cujusdam, ac sudor inibi stagnans apparet æquè limpidus, ut aqua fontana, dein etiam resurgens quoties abstergitur. Manus quoque omnivarios habet tubulos glandulasque, nempe miliares, item lymphaticas,

vasa sanguifera, nervea; membranaea, item musculos, ossaque. Sed hic nobis duntaxat sermo erit de partibus manuum mollibus: striæ autem manuum maximè juvant usum & motionem manus, cutis, quoque volæ densior est ac superior manus pars cutanea.

§. 13. Ut igitur expeditiorem medendi methodum indagemus Affectuum manuum, *Signa Diagnostica* faciem nobis præferent. *Fissura* verò manuum oculis nostris incurunt, neque opus habemus Microscopio ad istas viscendas querendasque, imprimis si præcesserint labores diuturni, vel lotio manuum aqua lixiviosa aliisque acribus.

Longè à Crinonibus Sirones disferunt, sunt pustulæ vesiculares, in quibus subsistunt vermiculi minutissimi acari dicti instar pediculorum. Pustulæ sunt serosæ ac prurientes, sub cuticula manuum quandoque & pedum latent. Vermiculi hi microscopiorum ope distinctè satis & accuratè conspici possunt, colore sunt albicante, pedibus exceptis, qui propius intuenti nigricare videntur, pedibus sex instructi sunt, binis utrinque mox juxta caput positis, quibus talparum ritu cuniculos sub cuticula agere, & oblongos non rarò quasi sulcos trahere, simulque molestissimum pruritus producere videntur, quod ipsorum dorsum sit squamosum seu squamis coopertum, affirmat Celeberrimus Dominus *Robault, Tract. Phys. Part. 1. c. 21.* inquit enim, non ignotus est *acarus* grano arenæ minus animal, quia progressus ejus observabatur, at tantum per excogitatum & inventum microscopium jucundo spectaculo deprehendimus acari dorsum squamis coopertum, tripedem esse utroque ex latere, & duabus maculis nigris in capite notatum, quas oculos esse verisimile est, quia ad præsentiam cuspidis aciculæ viam intercipienti ad latus deflectit; quando-

*Diagnosis Manuum Fissura.*

*Sironum.*

quæ acarus incedit, est præditus cruribus, necesse est ea crura juncturas habere, quo ex junctura motu fruantur, oportet adesse musculos, nervos & tendines, nervos illos fibris donari, quales deprehendimus in majoribus animalibus vel saltem iis æquipollentes: si verò ulterius structuram ejus perpendere velimus, ac de ejus corde, sanguine, cerebro, spiritibusque animalibus verba facere, id in altum mares nos conduceret: utraque visum eriperet, & consisti cogeret imaginationem nostram imparem esse, comprehendendæ summæ exilitati ultimarum partium animalculum illud constituentium. Optarem tamen mentem eò dirigi, dataque opera hic immoratus sum, vitaturus ingenii eorum tenuitatem, quibus quodcumque offertur ridiculum videtur, nisi congruat cum crassius illorum ideis, jocoque excipiunt dum apud illos sermo de materia aliqua subtili habetur. Cujus agitatio, & tenuitas viam ubique sibi aperit, locumque ubique concedit. Mirum de cætero est, quantas molestias tam pusillum animal cuti infixum excitare queat, quas stupenda historia pluribus explicat *Monsieur in Theatro Insect. l. 2. c. 24.* Nostri verò vermiculi, animatorum seminatomi communiter in extremis manibus pedibusque, in cubito verò & Tibiis rarissime deprehenduntur. Dignoscuntur ab aliis pustulis, à pruritu in supra dictis locis excitato, & præsertim punctis nigricantibus, in ipsis conspicuis, quæ nihil aliud sunt, quàm Sironum capita extrorsum protuberantia.

Calli.

*Callus manuum* ipso aspectu & tactu innotescit, cutis enim dura est & quasi ossa, non est dolorifica, quamvis novacula vel cultro scindatur, & fere tactus sensus in hisce partibus abolitus est.

*Ætiologia secundum Galenicum manuum*

§. 4. *Ætiologiam prædictorum affectuum nunc instituri, aliorum sententiam pro more consuetudo nostræ pramittemus. Agmen autem*

ducent Galenici in *Fissura manuum* causam adscribentes laboribus duris, vel actuum humorum ad manus affluxui, vel siccitati vel frigiditati. Rimas seu fissuras has aliquando profundas esse scribunt, aliquando superficiales, aliquando callosas & duras, aliquando molles & humidas, aliquando laticas, aliquando angustas.

Fissura manuum.

Sirones oboriri credunt à dulcis pituita copia, ad manus eutem delata, imprimis plurimo calore accedente, materiam putridam in manibus existentem animante, in *Sironibus* putrescentes culpant humores.

Sironum.

*Callus manuum* dicunt esse tumorem durum indolentem, ab humore pituitoso & melancholico, mediante pressu, attritu, & intertritigine, labore, &c. productum.

Calli.

§. 5. *Paracelsus manuum Scissuras* provenire putat ex sale, alopeciz, h. e. vitriolato, membrorumque locustas propter virtutem expulsiuam occupant. Juxta ipsum cum alopeciz generatio deviat, in alias quàm proprias locustas, in eis fit ejus etiam productio.

*Paracelsi indicium de causa manuum Fissuratum.*

Author vidit Sirones in cruribus apparuisse, & in causa cum aliis consentit.

Sironum.

*Callus* Paracelsus est arsenicalis tumor, ex liquore carnis aut sanguinis proveniens, si post fricationes aliquod exurgat Apoplema rubrum atque tumens, *Callus* esse dicit.

Calli.

§. 6. Helmontius *manuum Fissurarum* originem adscribit aut latici saliori eutem volæ manuum discendenti, aut duro labori; frigori que, unde rugæ nimium distense rumpantur, quod facilius contingat, si ob defectum laticis benignioris cutis volæ Manus non satis fuerit irrigata.

*Secundū Helmontii causa manuum Fissuratum.*

*Sironum* Author deducit à Latice putrido, ad manus volam delato, & in ejus glandulis miliaribus sub-

Sironum.

subistente, & pustulam cum vermiculis producente.

**Calli.** *Callum manuum* deducit à laticis glandulas pellemque volæ Manus non irrigantis defectu, hinc omnia sicca & dura fieri contendit.

**Vvillisi** *Sententia de causa manuum Fissuratum.* §. 7. Vvillisi existimat, *Fissuras Manuum* induci à particulis salinoacribus Lymphæ in glandulis miliaribus residuis, quæ aculeis suis cutis, cujus poros permeare nequeunt, texturam dissecant ac discindunt, fibrasque illius dividentes & erodentes Fissuras ea parte in qua aggeruntur, excitant.

**Sironum.** *Sirones* deducit ab aliquibus humorum particulis in manibus cespitantibus & putrescentibus, quarum principia cæcæ & unâ eocuncta invicemque conjuncta tales progignunt vermiculos manus insistentes.

**Calli.** *Callum* derivat ab humore nutritio viscidior atque glutinosiore, qui ad manus adfectus, illarumque fibris inhaerens, post dissipatas subtiliores & aquosiores particulas, spissior devenit, & tandem in *Callum*, eo in loco ubi congestus fuit, convertitur: ipsius etiam originem attribuit instrumenti cujusdam durioris, & insoliti contrectationi, à quo partis fibræ vel distumpuntur, vel sibi invicem superimpositæ & propius admotæ corpus durum constituunt, sub quo particula salinæ per insensibilem transpirationem exhalari asfuerit coacervantur, per coarctatos poros facili exitu illis non suppetente, callique duritiem aggestione sua adaugent, evaporatis, aquosis particulis, à quibus diluebantur.

**Sylvii opinio de causa Manuum Fissuratum & Sironum.** §. 8. Sylvius *Fissuratum Manuum* causam esse dicit humores acido-acres lixiviosas, eueni manus corrosidentes, atque Fissuras has producentes.

*Sirones* seu *Pustulas* cum vermiculis deducit à liquore sive sero acris & putrido ibidem in vermiculos degenerante.

*Callum* verò *manuum* vel à succis crassis, vel à labore duro oboriri statuit.

§. 9. *Cartesiani Manuum Fissuras* fieri censent à defectu humoris benigni, particulis suis teretibus finibus bras manuum irrigantis, sicque tunica mollem reddentis, ut citra noxam distendi possit, quem defectum interdum causant particulae rigidiores terrestres in aere existentes, slante borea exsiccante, vel à calore interno urente, omne humidum consumente, ut in Hæctica; quare volæ manus fibræ humiditate privarè, & ob siccitatem rigida, ad leviozem quamvis tensionem, vel ob laborem vehementiorem faciliè dirumpuntur, nonnunquam etiam à particulis angularibus acutis fibrille volæ manus discinduntur aut variis in partibus transodiuntur.

*Sironum* causam dicunt esse particulas acutas & oblongas seu salvas, vel cum succo chylosi ex sanguine per arteriolas, vel cum lymphæ ovulis impregnata per ramulos lymphaticos ad manuum cutem delatas, ibidemque à calore illo forui ovulorum & animalculorum ex iis exclusioni maximè accommodato, has pustulas veminosas *Sironum* nomine insignitas provenire contendunt.

A succorum quoque defectu & canaliculorum induratione, & quasi quiete *Callum* oboriri contendunt, presertim à labore duriore diutius instituto, unde comprimentur fibræ & canaliculi, & cum nullus amplius affluat succus nutritius vel lymphaticus, necessariò ductus hi una cum rete mirabili cute nempe in duritiem insensibilem ac ferè ossæam transseunt.

§. 10. Nunc & nos accingimus ad causas horum Affectuum explicandas, principiis Mechanicis ut ubique, sic & his insistemus, arduum profecto opus aggredimur, hoc præcipue tempore, ubi magna vis inest manibus agilibus, ubi sermonis suavitas & verborum copia, quamvis rerum apud plures adit

inopia , ignorantia Practicorum apud vulgum plus valet , quàm recta ratio Medicorum conscientiorum . Multi hodie plus aestimant irrationalem Medicinam vel Chirurgiam quàm rationalem operandi methodum , sed nos invidiorum calumnias non curamus , falsus publica nobis murus est athenus , rectè faciendo & veritatem docendo nil timemus ; experientur Tyrones Medicinæ nostris insistentes principiis plus efficere se posse , quàm aliorum sæpè multa frustra pollicentium . Nosergò in *Fissura manuum* causas plures agnoscimus , est enim aliquando quædam siccitas seu species contractionis in tubulis manuum , à quæ sæpe oriuntur ejusmodi rimulæ in manibus . Sic quoque particulæ rigidæ salinæ ad manus delatæ faciliè cutis fibrillas minutissimè findere , ac tales sulcos efficere queunt , quales particulæ observantur tempore hyemali in acre , à quo tum temporis in manibus Fissuræ oboriri solent . Quod etiam observatur à lixivio , hinc lavatrices post lotionem lineaminum ab aqua saponaria sibi tot Fissuras manuum & sæpè exulceratas accersunt . Quod etiam pertinent succi acres-falsi ad volam manus delati , in Hypochondriacis , Hæcticis aliisque Scorbuticis Fissuras manuum scindendo producentes . Ad quas Fissuras excitandas strig suum Symbolum addunt , per quàm enim providè super his striis , ac non in sulcis interjectis pori locati sunt , quò sic eorum structura tantò firmior esset , nec ita faciliè depravationi per compressionem obnoxia , per quam ipsam scilicet sulci tantummodo dilatantur aut coarctantur , striis constanter iisdem manentibus , porisque non adeò non alteratis , ac ob eandem rationem pori etiam hi lagiores sunt , ut semper tanto melius conserventur cute , quantum maximè compressa ac condensata per usum ac laborem manus : atque pori hi manuum , sic constructi ac muniti

admodum benè conveniunt , ac viam aperiunt evacuationi particularum sanguinis magis noxtiarum , ut salinarum acrium copiosè nempe ad eos advectarum ope continui usus manuum : hinc videmus quod plurimi homines Hypochondriaci , aut scemina hysterica tantum non continuum ardorem perferant in manuum volis , non autem in eorum dorso , quæ partes scilicet non adeò calefieri aut fricari solitæ , minus aptæ sunt ad recipiendas prædictas particulas noxtas , nec proinde isto pororum genere instructæ fuerunt . In Manuum his Fissuris deficit quoque *Succus lubricans* .

Quòd *Sironum* causam attinet , jam ejecta è Physicorum Scholis sententia est de rebus sponte ac sine femine nascentibus , illa è contra opinio invaluit , quod quicquid in hoc orbe sentire , imò quicquid vivere videmus , ex ovo emerit , ipsa quoque infecta , quorum magna pars ad unum illud principium generationis univocæ vix referri posse videbuntur , ex ovo originem ducere , demonstratum est jam à *Francisco Rhedi* , *Malpighio* , aliisque . Contra quam opinionem non ita pridem Jesuita quidam Italus , *Philippus Bonnani* , in Libro Romæ edito insurrexit , & veterum Peripateticorum Sententiam resuscitare tentavit , & ex putredine infecta produci voluit , imprimis limaces ac vermes , sed solidissimis rationibus iterum à prædicto laudato Viro refutatus est . Ovorum ergò doctrina apud eruditos omnes nimis inclaruit , quàm ut operæ pretium judicemus isti stabilizandæ diutius immorari : quapropter superest nobis impræsentiarum demonstrare , quomodo ova quædam intemerata ad manuum volas , pedumque , plantas deportentur ibidemque excludantur . Sciendum ergò est ex quotidiana experientia , muscas aliæque infecta ovis suis epulas nostras equè ac potus conspurcare , eaque brevissimum

*Sironum* .



temporis spatio, per æstatem nominatim, in carnibus excludi, sed quum nobis etiam mensæ accumulentibus vel paulò ante, muscæ cibariis circumvolitant, vel ea in quæ ova sua eructant, qualis est panis vel potus, ipsis ita propere excludendis non obstitriscunt, illa integra ore excipimus; & cum ob molis suæ ténacitatem dentium attritionem declinent, ea intacta deglutimus; eadem tenuitas à fermenti ventriculi spiculis ipsa tuetur. Quare cum cibus in eo concretus in duodenum descendunt, in quo uii & in reliquo intestinorum canali quodam exclusa in varias lumbricorum species commutantur; minutiora verò aliqua superant, quæ vel ob exiguitatem, vel immaturitatem cum chylo in venas lacteas abripiuntur, circulationisque lege sanguini permiscuntur, & in universas corporis partes devehuntur. Habitus autem corporis passim est poris pervia, iis verò quibusdam in locis patentioribus, & in aliis arctioribus: unde fit ut ova illa, vel etiam vermiculi exclusi, per priores una cum sudore vel halitibus perpetim per eos exeuntibus extrudantur; at cum pori in volis manuum plantisque pedum subsistentes posterioris sunt ordinis, seu à primis principiis, seu à continuo attritu, perpetuoque aeris ambientis tactu, ova retinent, quæ à vicini sanguinis calore soia, & ab halitibus indefinenter avolantibus irrorata, in illorum gremio excluduntur, vermiculosque *Sirones* dictos efformant, qui aliquoties & in facie apparent, in iis partibus, in quibus pori strictiores sunt. Multum & hic facit manuum applicatio rebus ejusmodi ovis conspurcatis, quæ dein se insinuant cutis porulis & interstitiis in hunc finem adaptatis, sicque produci possunt. Sicuti Acari è lacticio veterascunt faciliè oriuntur; sic *Sirones* etiam è corruptæ chylostatitis ovis cecidit, alimentaris fœci roridæ lymphæ particula ge-

nerari possunt. Quæ dicta animalcula *Sirones* dicti producantur sæpe maxima in copia, hinc vidit Celeb. D. *Daniel Ludovici*, *Eph. Germ. Ann. 9. & 10. Observ. 39.* sceminam corpulentam per totum aqualiculum confectariaque ejus miserrimè obfessam, & ad summam, impatientiam usque vexatam, quæ femina præ pudore domesticæ solum, nec incongrua adhibuerat remedia, sed frustra: unde affinem aliam, in effodiendis istis animalculis exercitaram, dato Sostro dimidio trumenti carioris modio, adhibuit, quæ continuato per paucos, totos tamen æstivosque dies, labore, ultra quatuor millia se excussisse, & cum glomeramen cannabis granum æquans collegissent, in cochleari, ferreo cum stridore cum-bussisse jurabat mulier à nugis aliena hodieque vivens. Illa verò sic sibi restituebatur, enchiridion fassa, veneficioque impetans.

Quod *Calli causam* concernit, sciendum est, quòd in Callo canaliculi sunt indurati, & motu non gaudent peristaltico, seu ad hæc canales sint, seu una oclusi in fibras, i. e. filum degeneraverint. Calli ergò ab induratione fiunt, cum canales membrana, quæ molles erant, eam duritiem adipiscuntur, qualis in tendinibus, cartilagine & quasi ossibus reperitur. Neque mirari licet, sic indurati tunicas vasorum, quia in cute imprimis manuum & pedum, non modò frequentes calli fiunt, maxime in iis, qui vehementes labores sustinuerunt, verum Anatome defunctorum docuit, arteriam aortam, & arterias carotides, aliaque vasa nimium quantum ossis duritiem assumisse; ita in ipsa senectute cutis à succorum defectu dura fit, & in rugas hinc inde contracta, quod etsi nullum foret, indicio est, membranas omnes cum tempore aut his vel illis de causis indurati, uti cartilagines & ossa, quæ in primis annis adeò erant

*Calli.*

molliā, ut nondum motibus in-  
stādo & incedendo suffecerint,  
paucis annis soliditatem acquirunt,  
quæ cū facta est, non subsistit,  
sed ultrā pergit: ita quoque mem-  
branis contingere & ratio docet &  
Anatome. Nam ut membra om-  
nia crescant, atque in maiorem  
molem sensim extenduntur, lon-  
gioraque & crassiora evadunt, ita  
etiam duriora redduntur, sensim-  
que per ætatem à fluido & molli  
principio, unde cœperunt, de-  
flectunt, atque quod senibus eve-  
nit ab annis, id hinc inde à mor-  
bis accidere solet, ut nimirum ca-  
nales indurati cartilaginē, callosi  
aut ossei facti idcirco sint minis  
fluxiles, & quod antiquitus cre-  
debant, fibræ, i. e. fila sine meatu  
interno, sunt plane exsucca. In  
Callo enim deficit *Succus lubri-*  
*cans*, qui membranas, tunicas,  
cartilagine & vasa omnia obli-  
nit, lævemque & glabram efficit  
superficiem, quali quoque exterius  
cuticulæ cutisque sulci adimplean-  
tur, hic autem potest deficere,  
vel crassior ac viscosior reddi,  
unde facilè callus in manibus aliis-  
que locis oboriri potest. Certum  
ergo est, Callum fieri vel ab indu-  
ratione & commutatione, seu com-  
pressionē ac condensatione cutis ca-  
naliculorum in duritiem cartilagi-  
neam, aut huic proximam, vel ea  
maiorem soliditatem, id quod à  
crassiore alimento efficitur: ita ut  
brevis ad senium suum perveniant  
membranæ, quæ solent alioquin  
molles diu remanere, imprimis  
si succi omnes in istis tubulis quies-  
cant.

*Prognosis*  
*Manuum*  
*Fissuræ*  
*Manuum*

*S. II.* Quod *Prognosis* attinet, Af-  
fectus hi ut *Fissuræ manuum* nihil  
mali portendunt, sed tantum ma-  
nus dedecorant, & quibusdam artifi-  
cibus impedimento sunt. Invetera-  
tæ manuum *Fissuræ* difficulter cu-  
rantur, sed sæpè homines ad mor-  
tem usque comitari solent, im-  
primis si fuerint nativæ.

*Sironium*

Nullum quoque à Sironibus im-  
minet periculum, sed facili nego-  
tio extingui possunt. Sed quum

innata partium succorumque dis-  
positio vel difficillimè vel nul-  
lo modo immutari queat, vix  
præcaveri potest nova eorum ge-  
neratio. Cū radices egerint  
altiores, diu sæpè durant cum ma-  
ximo & tadioso pruritu, & non  
prius curantur, quàm usque  
omnes vermiculi exempti fuerint,  
cui constat ex superius dicta hi-  
storia.

Cū & *Callus* sit affectus cuta-  
neus, nullum ergo infert peticu-  
lum, manibus verò defædationem  
quandam affert. Calli inveterati  
sunt difficillimi curatu, & cū  
affectus canaliculorum sit, qui ra-  
rò semel uniti & contracti iter-  
um dissolvi ac dilari possunt,  
hinc vix curabilis Callus invetera-  
tus existit.

Ut in minimis affectibus *Dia-*  
*ta* opus est, sic & hæc in his af-  
fectibus necessaria est, tutum enim  
bona *Dieta* remedium est, nec in  
externis affectibus negligendum,  
quod sæpè vel solum de malo præ-  
sente triumphat. In his ergo ma-  
nuum affectibus aer sit tempera-  
tus vitetur, frigidus ac nimis  
calidus, temperatus enim opti-  
mus est ad succos nostros fluidi-  
ores conservandos, è contra  
frigidus ac asper succos coagu-  
lat inspissatque; hinc videmus,  
quod cutis à frigore densa, cras-  
sa ac minis pervia reddatur. Ac-  
commodatissimi quoque cibi benè  
nutrientes sint temperati ac hume-  
stantes, fugiantur cibi viscidii, aci-  
di, salini ac frigidi, eligantur  
potius elementa aromatica & sale  
volatili turgida, quæ virtute in-  
cidendi ac corrigendi succos vi-  
scidiores, prædita sunt, in Sironi-  
bus præserventur imprimis alimen-  
ta, ne à muscis conspurcentur  
ovis. Potus sit largior, imprimis  
in *Callo* manuum, ubi maxima si-  
citas est & defectus succorum in tu-  
bulis, qui ergo sunt irrigandi, ea-  
propter potus Theræ vel Caffæ con-  
veniet. In *Sironibus* potulenta op-  
timè obtegantur, ne muscarum  
ovulis perturbentur. Quies corpo-

*Calli*

*Cura Dia-*  
*tica.*

ri concedenda , à laboribus enim abstinendum , ne per hos cutis manuum magis densa ac aspera redatur , imprimis manus haud laventur lixiviosis aliisque venenatis acrioribus .

*Chrastio Galenico- rum in Manuum Fissuris .* §. 13. *Galenci in Fissura Ma-* num ad causam à qua producitur attendendum esse inculcat , si à laboribus , nam accedente quavis violentia semper recrudescunt , si à lixiviosis saponariis aquis , ea omnia vitare debent , imprimis omnia acria , salsa , aut aspera , saponaria . Inter localia maximè laudant pingua , & adipe anserino aut caprino curant , aut cum medulla bovillæ aut cervinæ , ita ut cum semper vivo atque terebinthina unita , illinant , aut gallam omphactinam tritam , terebinthina aut æsypo li- quido aut melle excipiunt & imponunt . Alii gallam & mastichen quàm tenuissimè trita æsypo , i. e. lane succidæ sordibus in formam cerati redacto excipiunt & untuntur . Nonnulli gallarum unciam unam , cadmix unam , cerussæ quadrantem conterunt cum rosaceo & illinunt . Item Musæ pastillum cum sapa aut vino dilutum satis crassum imponunt . Alii Adipem anserinum , vel sebum caprinum melle ac solani succo mixto adhibent , vel lacte illinunt . Alii decoctum malvæ vel altheæ cum semine lini factum , vel cremor. hordei & mucilag. traga- canth. sem. malvæ aq. ejusdem extract. tepidè lavant . Alii rimas digitorum ac pedum Pice liquida oblinunt , cancerum stuviatilem ad carbones urunt , testam abradunt , ex oleo terunt ad mellis spissitudinem scissutis prius abstergis instillant , & cornu C. cum sevo caprino mixtum laudant .

*In Sironibus* Viteres commendant varia amara , imprimis sequens decoctum , quo manus lavandæ sunt sæpius .

*Be. Herb. absynth.*  
*tanacet.*  
*cent. min. aa. M. i.*  
Coq. in aqua communi vel vino.

Vel :

*Be. Ol. absynth.*  
*anagallid.*  
*cydon. aa. ℥iii.*  
In his dissolvunt  
*myrrhe ℥ss.*  
*pulv. C. C. ℥i.*  
M. f. Linimentum.

In Callo Manuum balneum ex herbis emollientibus parant & manus imponunt . Pinguibus quoque & oleosis manus callosas lavant .

§. 14. *Paracelsus in Scissuris Ma-* num sequens magnificat .  
*Be. Ex quatuor gummi. oppopanac.*  
*Serapini ,*  
*Galbani aa. ℥i.*  
*Colophonie ℥ii.*  
*Terebinthinæ lotæ ℥iiii.*

*M. f. Unguentum .*

Liquefac illud super carbones , & sic manibus calidum superponatur per duodecim horas , deinceps laventur aqua munda , sursumque superponatur eis calefactum , hoc toties repetendum est , donec liquorem amplius non emittant , quod plerumque fit in quindecim plus minusve diebus . Quatuor gummi peculiarem admirandamque virtutem absterisivam exsiccativamque habere memorat . Abstinendum vero esse inculcat ab aquis corrosivis , cantharidibus , à purgationibus , undionibus , fumigiis , & ligno Guajacano .

*Sirones* Patacelsus expellit per vermes in hominibus ottum & sustentationem exhibentes , siccatos , pulverisatos , nec non hominibus intrinsecus administratos , cum quovis liquore , præsertim in caprino lacte . Externa omnia quæ in ulceribus verminosis prorsunt , hic quoque conducere ait .

*Callum Manuum* resina locustarum Abietis curari affectit . In Calli cura postquam in apostema transierit , hac utitur descriptione .

*Be. Olei rosar. ℥vi.*  
*calcis vivæ extindæ ℥iii.*  
*capburæ ℥v.*

Ff 4 Fiat

Fiat Mixtura, quæ superponatur unguenti loco.

*Helmontiana Chirurgia in Manuum Fissuris.* §. 15. *Helmontius* in *Fissura Manuum* Medullosa inungenda suadet, unde pellis volæ manus rigidior emolliatur, & dissoluta reduniatur, capropter præ aliis medullam cruris vituli in linimen redactum, appropriatum satis reputat esse remedium.

*In Sironibus.* *Sirones* Author dicit haud melius curari posse, quam si animalcula hæc in pustulis existentia interimantur, in quem finem commendat aquam communem cum Mercurio vulgi bullitam, qua sæpius laventur manus.

*In Callo.* *Callum* velè *Manuum* curare tentat per balnea & foveæ, aliæque calida foveæque unguina pellis volæ manus applicata, item varia Emplastra, quæ odoribus suis resolvunt duram manus pellem.

*VVillisia Chirurgia Manuum Fissurarum.* §. 16. *VVillisius* *Fissuras Manuum* curat illis inungendo vel balsamum Arcei, vel Peruvianum, vel linimentum ex sivo hircino, pauca cera & paucis ol. hyperici paratum.

*Sironum.* *Sirones* enecat partibus ipsis infectis illinendo essentiam aurantiorum, vel pomatum, cui admixtus fuerit Mercurius sublimatus dulcis, vel illas lavando decocto ex herbis absinthii, scordii, centaureæ, aurant. aut tandem illas inungit aqua sublimata.

*Calli.* *Callum Manuum* Decoctis emollientibus, & emplastro de Mucilage applicato emollit, eumque dein scalpello aufert.

*Sylviana Chirurgia Manuum Fissurarum.* §. 17. *Sylvius* in *Fissuris Manuum* omnia ea commendat, quæ acrimoniam humorum temperant ac corrigunt, in quem finem laudat oleosa plura, oleum ipsum, lac quodvis, & alia acidum absorbentia, ut cretam, saccharum Saturni, tutiam, mastichen, Fissuris manuum inuncta, aliaque cataplasmata sæpius dicta.

*Sironum.* *Sironum* cura, juxta ipsum, absolvitur aquæ decoctis internis sudoriferis, quam evacuationibus Mer-

curialibus, Decocto Guajaci, centaureæ, min. tanacet. foveri vult, quibus non proficientibus ad Mercurialia transit, nec non Mercurium præcipitatum unguento Diapompholygos admixtum, & pustulis verminosis manuum applicatum commendat.

*Callum* verò *Manuum* variis emollientibus impositis curare satagit, in quem finem oleosa, cataplasmata ex emollientibus parata, item emplastra blandiora laudat.

§. 18. *Cartesiani* ad curationem *Manuum Fissurarum* pro voto obtinendam, operæ præmium ducunt, ut fibræ rigidiores siccæ emolliantur & humectentur, atque quod salis acidi acuti in succis istis cumulatæ est, hebetetur & corrigatur, quo consolidatio partium secundarum faciliè subsequatur. Particulas igitur acutas acidofalsas reliquis intentionibus adversas domant remediis porosis & volatilibus, spiritu scilicet vini camphorato, aq. calc. viv. dulci, vel linimento ex oleo lini & terr. vitrioli dulc. vel Fibras rigidiores tum emolliunt pinguioribus, acungis animalium, oleo ovarum, lumbricor. momordica. Mitigatis particulis acutioribus, & fibris emollitis, consolidationem haud difficulter consecuturam esse confidunt, aut ulceribus profundioribus adhuc manus occupantibus oleum myrrhæ, vel balsamum de Capai-va, vel alium appropriatum imponunt, & cavitatis fissurarum manus oppletionem, sicque ipsam consolidationem, vel unguento Diapompholygos, vel emplastro gryseo, stiptico aut Diaplasma penitus perficiunt.

Ad corrigendas particulas falsas & acutas in *Sironibus*, & necandis vermibus, medicamentis utuntur porosis & alcalibus amaris permixtis, à quibus non duntaxat particula falsæ & acutæ pustulas producentes absorbentur, sed etiam vermes necantur, commendant ergo præ aliis spiritum vini

*Calli.*

*Cartesiani  
notæ cu-  
ratio Ma-  
nuum Fis-  
surarum.*

*Sironum.*

viu aloeticum & myrratum, quo pustulæ sunt illinendæ, vellinimentum quod parant ex colocynthide, aloe, hellebor, alb. Mercurialia quoque hic magnificiunt, & ex pinguedine & mercur. dulc. unguentum paratum pustulis istis illinendum, magnificiunt.

Calli.

In Manuum Callo varia emollientia commendant balnea, ac fotus, item immersiones in oleum lini; ex spermate Ceti parant ceratum diuque Callo imponunt, vix tamen remedium hic dari approbatissimum, existimant.

Nostra  
methodus  
curandi  
Manuum  
Fissuras.

§. 19. Ea quæ in curandis Manuum Fissuris Cartesianis tribuimus, etiam nostra facimus, eò enim operam impendimus, ut fibræ manuum rigidiores emolliantur, quod obtinere possumus per mucilaginosam, tum per porosam, particulas angulatas absorbentia, hinc sequens linimentum solenne est, quod paratur ex Sevo Cervino, Tutia, Camphora, Sale Saturni, Oleo ovorum. Novimus aliud parare ex Talco & magisterio Marchasitz, quod egregium est. Sevum hircinum familiarissimum remedium est contra Fissuras manuum, imprimis à frigore contractas. Nostræ Lavatrices in Fissuris manuum ab aqua saponaria productis, uti solent cerevisia calida, in qua vel butyrum, vel sevum hircinum fuerit solutum, quæ lavare solent manus Fissuris de scædatis. Ex amygdalis, Benzoinis, Camphoratis, aliisque parare solemus massam instar saponis, qua manus lavantur, item non contemnendum est unguentum de sevo hircino Myrsi, vel Emplastr. de carne bubula.

M.

Sirones.

Quod curationem Sironum attinet, quæ nostro iudicio curantur vermiculorum vel evulsione, vel enecatione, loci affecti ablutione, ac inunctione, sæpè hoc in casu sufficit spiritus matricalis, cuius solius usu vermiculi facillè enecantur, & simul pustulæ pruriginosæ sanantur. Vel abluantur sequenti vel simili decocto.

℞. Decoct. quercus ʒ vi.

pulv. aloes ʒ ii.

alminis.

myrrh. aa. ʒ i.

Succ. absynth. expr. ʒ ʒ.

M.

Aqua Theriacalis, cum farina lupinorum, instar epithematis applicata convenit, omnia amara, ut fel animalium, succus flor. persic. acaciar. lapath. nuc. jugland. tanacet. absynthiaca, aloetica, myrrhata: Item Mercurialia, laudamus imprimis cum Helmontio aquam communem cum Mercurio vulgi bullitam. Omnia ea usurpari possunt, quæ in Pthiriasi conducunt, eodem enim serè modo hic affectus curari potest. Aliquando nec Amara nec Mercurialia vermes pellere & enecare solent, sed potius contra communem methodum piperis & mellis majorem enecandi vim habuisse, in Praxi nostra observavimus, pipere enim muscæ aliæque insecta enecantur, quidni etiam vermes. Sit ergò formula:

℞. Aq. hyperic. ʒ vi.

mell. commun. ʒ ʒ.

pulv. piperis ʒ i.

M. d. pro eluendis Sironibus.

Vel:

℞. Summ. absynth.

Tanacul. aa. M ʒ.

myrrh. ʒ i.

croci opt. ʒ ʒ.

Coc. inf. q. vini Gallic. ut colatura fiat ad ʒ x. cum sponsia Sironibus applicanda. Si quis Mercurialia amet, sequens procedit:

℞. Axung. porci ʒ i.

Argent. vivi ʒ i.

Aq. fort. ʒ ʒ.

M. f. linimentum flavum.

Sequentia verò prius usurpanda sunt, antequam ad Mercurialia accedamus:

℞. Summ. absynth. M ʒ.

myrrh.

aloer aa. ʒ i.

sart. alb. ʒ ʒ.

sulph. viv. ʒ ii.

M. &c

*M.* & detur usui, coq. in f. q.  
vin. Gallic. ad 3xii. quibus add.

*Spir. sal. armoniaci* 3i.  
*camph.* 3ii.

*M.*

Vel:

*R. Spir. matric. 3i.*

*extr. absynth.*

*gentian.*

*angel. aa. 3ß.*

*ol. lign. sancti. 3i.*

*myrrh.*

*aloeraa. 3ii.*

*camph. 3i.*

*Spir. sal. armoniaci* 3iß.

*M.* ad eludendos Sirones.

Ectum utplurimum hifce in hominibus Sironibus vexatis adfint sanguis & succi tenaces ac viscidum acidi, inde ad ova excludenda apti, prout quotidie videmus in aceto aliis, que vinis acceffentibus & tenacibus factis ejusmodi vermiculos, quod etiam obfervatur circa carnem, cafeum, &c. itidem facili Marte ex lymphâ acidâ viscidâ quasi ad putredinem tendente, cum ovulis tamen imprægnata, ad cutem delata, pediculos generari posse haud dubitamus. Quare & interna remedia in Sironibus suademus ad viscidos acidosque succos corrigendos, & sanguinis massam emendandam, in quem finem proderit decoctum lignorum ex Sassafras, Guaiac. rad. gentian. angel. bacc. lauri, herb. centaur. cochl. sale tart. Infus. vel in vino Gallic. vel cerevis. vel in sero lactis coctum, ad 3xxx. addit. oxymel squillit. 3i. bibat æger pro habitu. Interponat etiam seq. essent. à 3ß. ad 3j. in vino Hispanico, vel aqua mulsa assumendam.

*R. Elix. viæ 3ii.*

*extr. absynth. 3i.*

*R. coralorum 3i.*

*ol. Sassafras gut. vii.*

*Aurantior. gut. v.*

*M. D. usui.*

Ad Mercurialia quoque interdum accedendum, & vespertî pro re nata seq. assumendæ sunt pilulæ:

*R. Resin. Guaiac. 3ß.*

*Gumm. ammon. gr. vi.*

*Mor. dulc. gr. v.*

*ol. Guaiac. q. s. f.*

*Pilulæ.*

Omnia hic conveniunt, quæ vulgò dicuntur putredini resistentia, ut sunt omnia myrrhata, Antimoniatâ, aloetica, volatilia quæcunque, spiritus matricalis internus, sal volatile oleosum, spirit. volat. cum ol. Tanacetii, vel cort. aurant. vel myrrhatum quo egregium præstabis effectum. Essent. cent. min. absynth. cort. autant. flor. persic. Nec non aliquando cum mercur. dulci, pulvere Jalappæ, sale absynthii instituat purgatio, & ovula ista ex primis viis eliminanda.

Optimè cura succedit, si statim quando se exhibent Sirones, effodiantur, sic fœmina ista cujus mentionem fecimus superius; tali modo à quatuor mille Sironibus liberata fuit, immunique ab iis semper vixit.

In Callo manuum eò respiciendum, ut tubuli iterum ampliuntur, ac flexiles reddantur, ut succum nutritium ac liquorem lubricantem majori copia recipere ac continere queant, in quem finem præter interna absorbentia, volatilia succos attenuantia, & sic pressionem succorum adjuvantia, & per consequens canaliculos amphantia, ut sunt spir. C. C. volat. oleos. spir. cephal. &c. conducent, & externa varia Topica emollientia ac resolutiva cataplasmata ex aromaticis, fl. chamomill. sem. fenigræc. cum lacte coct. & sæpius applicat. vel callos cum spir. vin. camphor. crocat. vel spir. matricali fricetur, vel iis imbuta lintea imponantur, vel gumm. ammoniac. in spir. vin. solut. & iterum inspissat. applicetur Callo. Balnea ac fatus seu immersiones manuum non negligenda sunt ex emollientibus parata. Spermatæ ceti fuso & liquefacto linteam intrudatur & applicetur callo manuum, sic quoque laudatur succus sempervivi vel Tabaci Callis impositus, hinc emolliuntur Calli ut postmodum abscindi possint. Sed diutius his immorari non operæ pretium duximus, quia rarissime

*Callum.*

*Me*



Medici vel Chirurgi in his consulantur aëgris.

## CAPUT II.

*De Digitorum Coalitu, Digito Sexto, & Paronychia.*

## §. I.

**E**Xtremis etiam Articulis insidiat in tantum struuntur, nobiliorum ut partium infelicitatem non superent, maxime tamen adqueant. Non dicam jam de cunctis Articulorum Adfectibus. Suntu nobis Digitorum tormina, quis enim non cum terrore aspiciat Coalitum Digitorum, vel non admiretur ac stupeat *Digitum sextum*, quis *Paronychie* truculenta ac periculosissima symptomata diu perferre potest? Ut ipsi hi Affectus & in Scriptis Medicorum, & in foro Practico minus obuii, ejus sub tyrannide vel mæsti, vel gembundi, tremebundi ac in *Paronychia* furibundi aliquando cheu! apparent.

*Coalitus Digitorum* dicitur & ipsorum Coalitientia, Græcis *ὑπόφυσις*, est enim nihil aliud quam unio & compages duorum digitorum in utero matris facta.

*Sextus Digitus* etiam fit in claustris Matris, quando scilicet infans in lucem prodeat sex Digitus instructus, vel in una vel utraque manu. Memini etiam Sacer Codex 2. Sam. 21. v. 20. Viri excelsi, qui sex in manibus pedibusque Digitos habebat. Totidem instructam Neostadii ad Orlam Archi-Diaconi filiam vidit D. Ioh. Petrus Pruckelius, testant. Eph. Germ. Ann 9. & 10. Obs. 8. Sex sæpè, septem verò Digitos in utraque manu vidi semel Limburgi ad Lhanam.

*Digitus Sextus* *Paronychia* dicitur à Græco *παρὰ* & *ὄνυξ*, i. e. *prope unguem*, quia hic Affectus in summitate alicujus Digiti, lateribusque unguis reperi-

tur, & est Abscessus seu fissura cutis circa radicem unguium. Nonnullis imprimis Latinis *Reduvia* dicitur, alii *reduvium*, item *redubiam* appellant: alii verò *Reduviam* alium dicunt affectum, *pterygium* vocantes. Panaritium etiam vocatur ab aliis. *Paracelsus lib. de Apostem. c. 17. p. 439.* affectum hunc etiam *Passam* nuncupat, hoc est, distentum, à pæto vel pando, quia extremitates digitorum distendit. *Or fractum* à quibusdam nominatur, quia si non rectè curatur, affectus os corrumpit & perdit. Unguis juncturam Hispani Panarizo, Itali Panaricio hunc affectum dicunt. Gallis verò dicitur *Panaris*, le ver en doigt, Onglee, i. e. Unguicatio. Belgis *der Nydnagel*, seu unguis invidiosus, nobis Germanis audit *der Wurm*, à dolore mortificativo vermis ad instar rodente. Aliis vocatur *das mittel*, quasi mediale, meditullium enim digiti infestat. Pariter ob genuini nominis ignorantiam, partim ob vulgi creduli imaginationes simpliciter *das Vugenante*, *das hofe ding* cognominatur.

Discerni tamen merentur, quod affectus ille sit levis, qui externam solummodò cutim affligit, ex. gr. *Reduvia*, inde *Plutarchus lib. de inutil. pudor.* risu prosequitur hepate laborantem, quod à Medico remedia ad *Reduvium* peteret; unde etiam Proverbium enatum, *Reduviam curare*, i. e. rem levem: de hoc tamen impræsentiarum animus non est agere. Propriè verò dicta *Paronychia* periculi dolorisque plena, interiores Digitorum partes corrodens *Panaritium Arabum* salutatur, & hunc affectum hoc loco enodandum sumptimus.

Describi potest hic affectus, quod sit tumor in extremitatibus Digitorum dolorificus, cum periculosissimis non rarò symptomatibus, à stagnatione succorum acrim, circa penosium, eorundemque è tubulis suis effluxu productus. Extuberantia equidem in initio tantum levis est extremis in

*Descriptio Paronychia.*

in partibus Digitorum, neglecto autem morbo tota manus imò brachium ipsum intumescere consuevit. Sunt qui hunc affectum modò per abscessum, seu apostema, modò per inflammationem, modò per ulcus definiunt, cum nonnunquam vel inflammatione, vel abscessus intercurrat, & ulcus sepe producat. Sed nostro iudicio nihil interest per quod definias, modò causam & curationem bene noveris.

*Differentia Paronychia.* *Differentias* quòd attinet; Paronychia alia est superficialis alia profunda, illa cum exiguo dolore extremas tantummodo partes,

hæc verò nervos, periostium, fibrillas tendinosas, & ipsa ossa immatissimis excruciat doloribus. Paronychia à pterygio differre dicitur, quod illa plerumque abscessus sit circa unguium radices cogens, hoc verò carnis saluatur incrementum, partem tantum operiens, ex Paronychia aliaque causa proveniens. Ratione Subjecti alia extremam solum cutem affigit, ut Reduviz, alia verò interiores partes, ut dura matris processum, periostium scilicet & os ipsum clandestino modo afficit: alia insuper in manuum, in pedum digitis reperitur juxta *Theophr.* *Paracelsum de Myster. Verm. c. IX.* alia anterioris, medii alia, in tertio alia reclinat digito; veram ac genuinam propè unguem, spuriam verò juxta reliquas partes invenire licebit, alia in latere unguis, alia in dorso digiti, alia in ventre ejusdem existit.

*Part. affe. Ita.* §. 2. Continué *Cornelius Celsus l. 4. de re Medica c. 1. p. 63.* inquit, facilis omnium morbi curationeque in notitiam venient, si prius eorum sedes ostendero, quibus Subjecti acceuratæ notitiæ necessitat. m. clarè admodum posteritati reliquit. Sunt ergo Digiti, de quibus hic agimus, qui constant plurimis canaliculis nerveis, tendinosis, membranosis seu periostio, venosis, arteriosis, lymphaticis, ossis, &c. hinc iisdem externis morbis obnoxii sunt quàm aliz partes externæ.

Subjectum verò Principale Paronychia dici potest Periostium, (aliquando & ipsum os;) Periostium cum membrana sit tenuissima, & nervea, faciliè patet quàm exquisitissimè sentiat. Minus Principale seu adæquatum, ut cum Scholis loquat, sunt digiti manuum & pedum, eorumque maximè extrema cum annexis partibus, quæ in consensum trahuntur, ut sunt cuticula, cutis, carnosa progenies, venæ, arteriæ, glandulæ & tubuli ad vitam & nutritionem facti, imprimis nervi ad sensum destinati; imò ipsa ossa non sunt à læsione libera, quia non raro corrosionem & cariem ob hanc ipsam causam patiuntur. Experientia constat pollicem præsertim huic malo subjaci, seu quod major sit, seu quod præ reliquis injuriis externis & laboribus sit expositus, præcipuè cum ipse singulorum reliquorum quasi minister & adjutor existat.

§. 3. Nunc paucis Digitorum Affectuum *Diagnosin* perspiciamus. *Coallitur digitorum*, quando scilicet factus in lucem prodit, digitos alterutrus vel utriusque manûs mutuo conjunctos & unitos habens, ita ut unicam partem constituere videantur, sufficienter dignoscitur, & oculis nostris percipitur. Sic infantis alicujus, cætera sanctissimi, digitus dextræ manus annularis & minimus, itemque pollex & index ope ligamenti coaluerunt, hoc modo, ut pollex minor justo indicem annexum, sicut arcum funis incurvat, ad se traheret, accreta in medio eorum carnis parte, velut novi pollicis rudimento: in sinistra quoque manu pari ratione uniebantur digitus minimus & huic proximus, interjecta ad superiorem articulationem etiam caruncula exigua: ceu testantur *Decur. Eph. Germ. Ann. 6. Obs. 58.*

*Digitus sextus*, cum factus in lucem prodit, in sensus nostros incurrit, hinc non necessarium ducimus longiorem de hoc affectu proponere *Diagnosin*.

Signa sequentia & imminens & præ-

*Diagnosin digitorum coalitus.*

*Digitus sextus.*

*Paronychia.*

& presentem Paronychiam produnt. Imminentem enim indicat dolor circa radices Unguium exiguus, levis & adhuc tolerabilis: presentem verò indicant dolor exquisitissimus, seu cruciatus incredibiles, tumoris aequè ac ruboris presentia, totus enim digitus maximè tumidus est, ut quater crassitiem ordinariam superet; pulsatio adest vehemens, quæ accidentia ob consensum nervorum per totum sæpe brachium extenduntur, accedunt vigilie, deliria, quæ dependent ab inflammatione periostii. Appetitus est prostratus, lipothymia, inquietudines percipiuntur à Chirurgis, si dolor non cessat, & remedia inconcinna applicantur, sæpè Gangræna ac Sphacelus aliaque graviora accedunt symptomata.

*Ætiologia secundum Galenicum digiti coaliti.*

§. 4. Causam horum affectuum, & quidem primò *Digiti Coalitus*, ipsi *Galenici* statuunt, digitos vel in Utero Matris protinus, vel propter communem exulcerationem coherere, & inde deducunt causam à vi plastica. A qua causa quoque derivant.

*Digiti sexti & Paronychia.*

*Sextum digitum* in Utero ob errorem vis plasticæ productum: adnasci enim dicunt digitos, quandoque prope magnos digitos, quandoque juxta parvos, raro autem circa alios digitos visos esse statuunt. Qui verò ita agnoscantur, partim per totum carnosum sunt, partim etiam ossa in se habent, quandoque etiam ungues qui ossa habent partim ab articulo exortum habent, in commissura ad articulum cum altero digito communicantes: partim ab internodio enati sunt: quiaque ab internodio siue spatio interarticulos enati sunt, penitus immobiles sunt, reliqui quandoque moventur. Causam immediatam seu proximam *Paronychii*, dicunt esse *Stasis* seu fluxum humorum factum jam & consistentem, mediata proximioris causæ titulum sibi vindicat influxum faciens & irruens humor calidus, biliosus & acris, seu sanguis non quidem floridus sed humoribus tenuibus, venenatis ac malignis inquinatus, vel pituita con-

creta putrescens & corrosiva, vel tenuissimus biliosus sanguis. Alii ex ipsorum classe à sanguine adusto & atrabilario deducunt causam hujus affectus. Causam quoque ejus aliquando esse dicunt ab ossis ipsius fractura, qua ossis frustulum partibus nervosis & sensibilibus infixitur. Peccat etiam juxta ipsos sanguis quoad essendi modum, tum quantitate, si plus ad partem hanc affluit quàm à Dextra Natura ipsi fuit assignatum, si extravasetur, quantillum etiam illud sit, & hinc ob prohibitam reassumptionem stagnet & corrumpatur. Hinc aperture facta, macula una vel altera rubicundior sæpè occurrit, seu causa continens omnis mali. Consideranda volunt hoc in affectu, membrum mandans, recipiens, vias, modum, & partem mittentem. Ipsi totam pro subiecto causæ agnoscunt massam sanguineam, concurrunt etiam viscera cœlioni & sanguificationi, Hepar imprimis aliaque, dum certa quædam ob impedimenta munia naturalia ritè atque decenter obire non valentia: inde sanguis bile, acrisque imprægnatur humoribus, quæ infufo auspicio parti affectæ assignantur. Recipiens pars sunt digiti manuum & pedum totius extrema, & adeò justo debiliores & remotiores, hinc eo locorum vitiosam sibi que valde inimicam materiam ablegare consuevit ridicula Natura. Vix ipsis sunt venæ & arteriæ hic desinentes.

§. 5. Theophrastus Paracelsus *Coalitum digitorum* contingere ait ab inæqualitate Spermatidis, & quod Natura in liquore vitæ non sit plane perfecta, ut plurimum autem, quod sperma, ex quo exitus hic Uteri debet, aut defectu aut excessu peccet, unde in superfluum transeat additamentum, quod digitos in Utero matris coherere faciat, in quo Natura totum hoc vitium putat attribuendum.

*Sextum* verò digitum fieri itidem putat ab inæqualitate feminis, quod

*Paracelsi opinio de causa digiti coaliti.*

*Digiti sexti.*

quod tamen solummodo excessu peccat, unde in sperfluum transeat additamentum, quod *sextum* efformet *digitum*, & itidem hoc vitium aberranti adscribit Naturæ.

*Panacitii.* Author noster de *Panacitio* differens, in corporibus nostris duplicem putrefactionis ac corruptionis constituit speciem, unam in humoribus naturalibus, in mineralibus alteram, tandemque concludit, affectum hunc pro vera matre habere humores minerales, quia eo ipso addit rationem, quod in radicibus solum ad ungues locum habet, ibi enim est radix salis natri; vel in eo loco, per quem transmigat. Cum in unguum radicibus dolor, ustio, tumor & inflammatio tanquam ignis sævitent & corrosio vermium instar panacitium esse dixeris. Sic quoque Crollius, & quamplures alii cum Paracelso ridiculè admodum sacra vulgi simplicitate persuasi, vermiem semper in medio pustulæ latentem nigello capite præditum adstunt. Plures eorum hypothesibus innixi etiam idem propugnando microscopii fide innixi mira sibi imaginantur.

*Helmontii*  
sententia  
de causa  
*Digitorum*  
con-  
liens.  
*Digitus*  
*Sexti* &  
*Panacra-*  
*tii.*

*S. G. Helmontius* causam *Coalitum* *digitum*, ut & *sexti* *digitum* ex vitiosa conformatione esse credit, aut ex spermate in Utero ad fetum formandum nimio effuso.

*Panacitium* non esse affluum cruoris Author existimat, vel defluxum è capite aut Jecinore, eo missum per ambages viarum intellectui impossibiles: Sed esse laticem acidum tyrannidem suam prope ungues in digitum exercens: Inquit enim Helmontius, ac licet incautos sensus decipiat, videanturque sentire defluxum supernè, sensuum tamen sunt fallacia indicia, prout dolente dente in totum capitis latus depluere videtur augmentum cause dolenti. Non secus atque ad dolorem Panacitii, glans sub axilla apparet. Topico enim remedio odontalgia abir, vel eradico cessat, & glans evanescit, ubi digitus dolore levatur.

*S. 7. Villisus* arbitrat, *Digitum* in Utero materno coalescere, quando scilicet factus manuum altera ab aliqua parte ipsi superimposita, comprimitur, digitique sibi invicem propius adjunguntur, & mutua illa, quam inter se patiuntur, contractione, mollem cuticulæ ac cutis solvunt texturam: idem contingere quoque autumat, cum talis accidit in dictis partibus continui solutio ab humore acri & corrodeute in illis reside: papillæ enim carne tegumentis suis tunc exuta, & à liquore nutritio perpetim adveniente distensa, ac elongata, versus oppositum digitum tendunt, ejusque interstitiis implantata & adnascens, atque à subcrescentibus cute & cuticula contestæ digitos mutua connexione colligant.

*Digitus*  
*Sexti.*

*Sextum* *Digitum* formari censet à materia seminali, conceptionis tempore copiosius aggesta eo in loco in quo digitus statuminari debent, & à succo spirituosiore in semine contento, & plastica viduato in digitum viciniore, cujus compositioni tota ista materia distincta erat, consimilem, efformata: minor tamen legitimo digito contingit superfluum ille, quia supervacanea tantum illa materiz seminalis portuicula illi efformando impeditur. Credit etiam istud evenire ob perceptum à prægnante muliere primis conceptionis temporibus *Sextum* *Digitum*, talis enim character spiritibus animalibus matris impressus, & in sensorium commune ipsius delatus, ab iisdem in factus sensorium commune devehitur, ejusque spiritibus animalibus communicetur, qui tali imagine imbuti similem digitum in foetu excitant.

*Paronychia*, juxta Villisii placitum, oboritur ex humore seroso summe acri & corrodeute, aqua fortè simili, nitrosis ac ardentibus particulis infecto, in periossium vicinasque partes nerveas exsultante & circumposita vasa sanguifera exedente atque aperiente. Sanguis enim è vasis suis delapsus, & in parte in quam

*Parony-*  
*chia.*

excit-

excidit stagnans, mora corrumpitur & putrescit, ac in pus convertitur, tumoremque *Paronychiæ* nomine producit.

*Sylvi de pinia de causa di-* §. 8. *Sylvius Digitorum Coalitum* ac *Sextum* *Digitum* esse vitia à primo ortu & connata, vel à matris forti imaginatione, vel terrore, vel alio modo à superfluo semine producta, statuit.

*Paronychia.* Author noster succi Pancreatici defensor, illum succum falsum, acrem ceu inquinantem massam sanguineam, ac per consequens talem tumorem *Paronychiæ* nomine insignitum inducentem accusat.

*Catopsia-* §. 9. *Cartesiani Digitorum Coalitum*, vel digitorum accretioni in Utero, vel extra cum Ulceribus male curatis, succo nutritio glutinoso existenti contingenti accensent, unde *Digitum unum* concreverunt.

*Digitum sexti.* *Digitum Sextum* itidem in Utero matris contingere ajunt, vel à matris forti imaginatione, vel terrore, materiam seminalem non rite mediantibus spiritibus animalibus dispensante.

*Panaritium.* *Panaritium*, secundum *Cartesianorum* sententiam, producitur ex succorum quorumvis particulis acidiis pungentibus, scindentibusque, in periostium vicinasque digitorum partes nerveas & membranaceas imo osses effusis, ibidemque vasa omnia tendinosas ac nerveas exedentibus atque corrodentibus, sicque *Ulcus Paronychiæ* vel *Panaritii* nomine insignitum producentibus.

*Nossa causa Digitorum coalitus.* §. 10. Ad hoc, nostro iudicio, miseranda est hominis conditio, ut & ante exitum ab utero materno sexcentis calamitatibus obnoxius sit, innumerisque affligatur affectibus, priusquam communi potiaris aura; si autem affectus vel illi communicantur à materno quo sustentatur sanguine, matre scilicet morbo quodam detenta, vel à præpostero quodam animi corporisque parentibus doloris potius quam gaudii à primo ortu creantes, vel ob mancas quasdam partes aut superfluas, vel

ob easdem male efformatas ac alienum situm obtinentes, & quoniam *digitum* quamplurimis usibus sint necessarii, rectaque eorum dispositio sit maxime requisita, valde dolenda est eorum fors qui in lucem eduntur cum iis vel male efformatis aut prave dispositis: tales sunt ii, quorum *Digitum unum coaliscunt* mutuisque vinculis sunt invicem coniuncti. Factus autem in Utero adhuc hospitantis genuinus situs vel ex matris casu, saltu, ictu, vel eiusdem vehementiori animi pathemate, imaginatione scilicet perversa invertitur, illiusque manuum alterutra vel utraq; hoc pacto graviorei cuidam corporis parti supponitur, & ab illa premitur. *Digitum* ergo sibi invicem superimpositi, se invicem confricant, mollesque ad huc cutem tenioresque in sculos hac ratione dilacerant. *Fibrae* itaque dissilisse continuo nutrimenti appulsu excreverunt & e surgunt, quædamque ex iis in oppositam partem, seu in adversum *digitum* detestuntur, & in eundem inferuntur, ubi cum propriis *digitum* fibris intricatæ, iisque accretionis ope artius colligatæ, validiorem efficiunt digitorum *Coalitum*, principii cuiusnulla deinceps animadvertuntur vestigia, cute loco ferruginato superextensa. *Coalitum Digitorum* ex matris anserum vescendorum appetitu frustrato enatum (horum enim ferè pedes connectio hac digitorum æmulabatur,) esse, *Ephemerides Decur. Ann. 6.* testantur.

Quantum vis imaginationis valeat in prægnantibus, & sic sæpè sextum à matre aliquando lignari, exstat historia in *Ephem. Germ. Ann. 6. & 7. Obs. 118.* ubi viri cuiusdam uxor prægnans quinto mense accepit dono caneros egregia magnitudine, illos admirantis & manu contrectantis *digitum* minimum unus chela comprimit, ita ut manui adhereret: illa perterrita quidem canerum tamen manu excussit, nil amplius de illo sollicita. Quid sit? iusto tempore filium parit, qui in utraq; manu *digitum* minimum habet.

*Digitum sexti.*



habebat duplicem, unum debito loco positum, alterum ab illius articulo infimo dependentem, in sinistra quidem manu magis adhaerentem, in dextra verò planè pendulum. In pede autem dextro digitus minimus uterque articulo suo infertur, sed carne & cute ad supremum apicem usque sibi adhærebant, ut ferè chelyn cancerinam formarent. Sic etiam vis plastica in manu dextra geminum formavit pollicem in filio Limburgensi, uterque enim omnes partes & articulos ipsum etiam unguiculum habuit, quod & testantur *Ephem. Decur. Ann. 6. Obs. 88.* ut ergò optimè intelligatur, quomodo hæc contingant, paulum dilucidius ea explicaturi sumus. Jam plures clarissimi Anatomici non solum fœtum ex ovo formari probarunt, sed modum quo partes omnes in eo fabrefiunt, demonstrarunt. Superflua verò quandoque in fœtu progignuntur partes, quæ non solum inter inutiles referuntur, sed etiam in deformium & incommodarum censuræ ponuntur; spiritus seminales fibras, quarum contextus embryonem facit, & ex quibus universæ corporis partes constitui debent, subingressi, eas penetrant, transeunt & extendunt. Si enim iidem vel robustiores fuerint, vel copiosiores ad articulum digiti cuiusdam, cuius textura laxior molliorque repariatur, delati fuerint, virtute qua pollent fibras quasdam, ex iis quas occupant, & in quibus abundantiores inhabitant, sublevant, & ab aliarum fasciculo separant: quum verò fibræ primatiæ, qua donatæ sunt in prima formatione, dispositionem non exuant, earumque numerus compositus sit rum ex iis ex quibus constitui debent vasa sanguinea, & lymphatica: inde fit ut ex ipsarum connexionem alter exurgat digitus illi similis, cuius est appendix; quo tamen minor esse videtur, quoniam potior fibrarum pars spirituum seminalium impetui obstitit, minimaque ab ipsis abstepta fuit. Istud etiam evenire potest, cu-

dictum, si gravis mulier fortuito ac cum terrore, vel commiseratione hominem sextum digitum habentem intueatur, tunc enim in retina Sexti digiti forma depicta, spiritus animales illius occasione certo modo moventur, ut ad Uterum delati, & ad ovum attingentes spiritus seminales, quibus cum conjunguntur, pari motu agant, eosque in eam impellant partem, in qua efformari debet digitus illi similis, cuius ipsi imaginem susceperunt; quod eò facilius accidit, quò partes eximix adhuc sunt mollioræ, cunctis impressionibus excipiendis sunt dispositæ.

Immediata seu proxima causa *Paronychiæ*, me iudice, est obstructio inflammatoria tubulorum digitorum à succis falso-acribus facta, qui succi acriores facti effluunt, sique periosium distendunt, lacerant, talemque dolorem vehementissimum cum reliquis symptomatibus produciunt, sciant enim succi totius corporis in ejusmodi ægro particulis salinis acribus corrosivis, insigni igitur acrimonia massa hæc maritata, ad digitum quandam delata, facili negotio ruptionem tubulorum, ac sic productionem ejusmodi tumoris efficere potens est. Subsistens hic extra sphæram suam materia magna activitate ac fermentatione ferociam suam exercet, & in acerrimam malignam seu quasi venenatam non raro degenerat. Remotè suum symbolum addere possunt corpora cacochymica, quæ facillimè Paronychia corripuntur.

Aer frigidus & nimis calidus affectui huic fores aperire possunt, & imprimis ab inæqualitate aeris subitanea ut quando ex aere frigido membra rigida statim loco calido admoventur, vel viceversa, cum motu & labore calientia extrema a qua frigida immerguntur, oriri malum sæpius observavimus. Cibis quoque qualitate peccans, acris salis, acidus ac viscidus hoc malum producere potest, par ratio est potus, si vina acida, etiam spiritus vini alique potulentia fortiora sangu-

*Paronychia.*



guini phlogosin inducentia, & partes sulphureas & acres inferentia, peregrina copiosius hauriantur, ut & aquæ frigidæ nimia ingurgitatio, qua succi nostri facile coagulantur. Vigilæ medioeritatis limites excedentes suppetias ferunt, excreta & retenta, sudor impræmis prohibitus &c. suum addunt Symbolum.

Ita etiam contusiones, distorsiones, violentæ tensiones, festuæ digito intrusæ, puncturæ &c. infelicem hunc factum non raro excludunt. *Simon Pauli loc. cit.* Observationem sequentem domesticam communicavit: Observare, inquit, mihi visus, vel rarerent vel nunquam Paronychia ab internis causis obfidere digitos, nisi malorum morum morbi, ut sunt malignæ & petechiales febres diuturnæ, teriti, non ut par erat, per crisin desinentes, itemque variolæ, & morbilli præcesserint: maximè ubi error vel ab ægro vel adstantibus in iis committitur.

Jam dum hæc scribo puero 6 annorum Medicinam facio, cujus digitus spina ventosa laborat, panaritio non multum ab simili, nisi quod caro magis spongiosa existat. Spina enim ventosa plerumque infans afficit, præsertim circa articulos, cum tumore, livore, & Ulcere aliquando partium mollium ac carnosarum, quæ non duntaxat ab acido fixo & lentesciente lymphæ exeduntur, sed etiam ipsum os subiectum, quod focus hujus mali plerumque esse videtur, cariosum & nigrum reddit, hinc non male *ein Deinfresser* dicitur: Apostema quoque ossis est, seu lentus ossis & adjacentium partium Sphacelus, ab acido fixo & maligno fermento intra ossis substantiam, aliquando ipsis in Uteri cunabulis matris primitus congesto, productus. Si euti enim fermentum variolosum intra tubulos partium carnosarum à lacte quibus infans nutritur, & ex quo etiam formatur, in ipso Utero colligitur, & postmodum occasione novi & insoliti ætheris

cum aere, ventis, vino aliisque advehi in ætium crumpit; ita hoc fermentum in ossium uno vel altero tubulo ab eodem lacte corrupto generatur, & mora, alimentis, novisque allabentibus succis acius & detrius redditur, donec focum suum perfodiat, os cæterasque partes exeat, lympham inficiat, & malignum hunc producat tumorem. In ære quoque latet aliquid, quod fermentum latens in apicem deducat: sic anno decrepito 1688. *Paronychia* observavimus *Epidemicam*, plures enim infestavit, & plus quam centum hæc in civitate notavimus Panaritio affectos.

§. 11. De *Prognosi* nunc aliquid addamus, ante omnia asterisco hic notandum est, in *Coalitu Digitorum*, ut & *Digitis Sextis* curam esse dolorificam, & post sectionem sæpè Symptomata Vulneribus solennia obvenire solent, ut sunt hæmorrhagia, tumor, inflammatio, aliquando à medicamentis incautè applicatis ipsa Gangræna ac Sphacelus accidere potest.

Si adnatus Digitus fuerit parvus, & sine ossibus quasi pediculo appendens, curatio facilior est, quam si sua ossicula habeat.

*Prognosis Paronychiæ* quod concernit, licet ille affectus in principio levi cum dolore partem affictam occupet, adeo ut sæpè susque deque habeatur, nihil minus tam alius paulò si irreplevit, tristissimum eventum sortitus est, quoniam nervosus invadit partes, Gangræna & Sphacelus sæpius præsto est, hinc facili morte accedente agrotantium supina negligentia, quosdam mortem sibi accelerasse Practicorum observationes testantur, & *Mercurialis* Autor est, se vidisse interdum aliquos de vita periclitatos, imò sæpè ex dolore mortuos est æger observante Barbette, & Blankardo. Nuper vidimus Chirurgum Castrensem nostrum Paronychia periculose laborantem, cum Gangræna fabri, & deliquis animi instantibus, qui tamen adhibitis con-

*Prognosis Digitorum Coalitus & Digitis Sextis*

*Paronychia*

gruis remediis optimè convaluit. Vulnere lethalia Digitorum & notavit Celeberrimus *Bartholinus Hist. Anat. c. 4. Observ. 89.* Dum verò malum adhuc quasi in cunis est, & erudita accedit manus, faciles in promittendo esse possumus. Quomateria stagnans ab osse & petiostio remotior est, eo faciliorem spondet curam, & vicerversa, quo magis conspicuus est tumor, eo melior, teste *Hipp. 5. aph. 65.* Extremam occupans partem periculosior est quàm 2. vel 3. digitorum partem. Si succi sunt dulces ac mites in corpore ægrorum, affectus faciliè terminatur, sin verò corrosivi ac acerrimi existunt, ossis articuli extremi, imò totius digiti corruptio, & pro re nata vitæ periculum metuendum. Quo enim fervidior, & malignior seu acrior succus, eo etiam symptomata graviora sunt.

Modus eventus unicus esse solet, ad saluem terminatur, si succi corrigantur ac fluidiores reddantur, ut affluere ac resiliere possint. *Discussione* quoque ad extra resoluta in halitus, & exspirantibus particulis acrioribus; vel ad intra si recipiatur iterum in vasa aliisque modis difflectur, quæ terminatio optima est, & ex eo patescit, si membrum se ipso fiat levius, calor, dolor & pulsatio cessent. Vel suppuratione, maturata materia ut dicunt, adeoque per incisionem purisque extractionem. Ad sinistram verò eventum & mortem quandoque finitur corruptione partis & totali abscissione tubulorum petiostii, &c. Unde non tantum actio partis parit, sed & accidentibus, febre, deliriis ac convulsionibus ipsa mors sequitur. Malum denique est si induretur, & caro fiat spongiosa vel nigra, sæpe ultia menssem cura durat.

nis digitorum morbis, & nostro iudicio, non contemnenda est. Nos ergo æquè in coalitu digitorum, imprimis verò in Paronychia violenta aerem quemcumvis, præsertim verò frigidum arcendum esse iubemus, cibis quoque sit euechymus & boni succi, vitentur seu dictum, alimenta acida, salsa, ac acria quævis. Potus esto moderatus, cerevisia benè cocta & fermentata, hinc laudem meretur Cerevisia Namburgensis ac Brunsvicensis, hac in vicinia Grebensteinentis; acidorum etiam imprimis vini acidi usus immoderatus cane & angue pejus fugiendus est, concedi potest vini Galli vel Hispanici moderatus usus, nunquam verò intermitendus est potus calidus Theæ vel Copheæ, vel alius herbæ vulnerariz.

Somnum largiorem in hisce Digitorum morbis concedimus, Vigiliis verò nimias improbamus, his enim succus nervus vel spiritus animale tantum acriores redduntur, qui ita facti Paronychiæ magnum damnum inferre possunt. Motus & quies mediocritatis non transcedant limites, præstat tamen quiete blanda malo inducias procurare, quàm motu intempestivo id irritare, licet ipse dolor præsertim in Paronychia sat atrox. hanc sapissimè excutiat.

Alvi lubricitas semper proficua, hinc proderit vel enema, vel crem. tartar. vel per se vel cum oleo amygdalar. mixt. vel passul. vel pruna laxativa &c. Venus medulliforba, variorumque affectuum mater feracissima, præsertim illicita & cum scortis instituta, maximopere vitanda.

Anini affectus temperandi sunt, & ubi vel levissima commotio percipitur, confestim ejusmodi ignis, ut cum *Quercetano* loquar, aqua continentia à ratione sublimata & clembicata, extinguendus est. Vitentur ergo ira, meoror, curæ, & plura alia vehementiora animi pathemata, animus è contrâ sit placatus.

*Dieta.*

§. 12. Cum plerique, qui de Digitorum Affectibus imprimis de Paronychiæ curatione quicquam æternitati consecraverunt, dictandi rationem commendunt, quos inter Chirurgorum non postremus *Lacubus Ryff*: vel hinc hac in exter-

*Curatio* 5. 13. Hisce præmissis ipsam cura-  
*Pharma-* tionem Pharmaceutico-Chirurgicam  
*centico-* aggredimur, quam *Galenici* in Coa-  
*Chirurgi-* litu Digitorum instituunt sequenti  
*ca sicutu-* modo : primò digitos coherentes  
*dum Ga-* scalpello diducunt, dein separatim  
*lenicos in* utrumque non pingui emplastro  
*Digitorū* circumdant, ita per se uterque sa-  
*Coalitu.* nescit. Si verò sit Ulcus in digi-  
 to, posteaque malè indurta cicatrix  
 curvum eum reddit, primùm ma-  
 lagina tentant. Dein si id nihil pro-  
 dest, vident, nervine id vitium,  
 an cutis sit. Si nervi est, non at-  
 tingunt, & tanquam incurabile re-  
 linquunt, si cutis, totam cicatricem  
 excidunt, quæ verò callosa effi-  
 cit, ut extendi digitum non patia-  
 tur tum rectum, sic ad novam ci-  
 catricem perducunt.

*In Digno*  
*Sexto.*

Sextum verò digitum non aliter  
 curandum esse ajunt quàm super-  
 fluum ferro abscindere, vel si nihil  
 obest, relinquere. Carnosorum  
 verò digitorum facilem esse ampu-  
 tationem, scalpello enim abscin-  
 dunt : eorum verò qui ab articulo  
 exortum habent, difficilorem esse  
 aggressionem dicunt : at eorum qui  
 ab internodio enati sunt, carnem  
 primùm in circulum ad os usque re-  
 secant, ipsum verò os excisorio  
 Scalpro dissecant, aut ferra ampu-  
 tant, dein in curatione radunt ipsa,  
 & cicatrice obducunt, quemadmo-  
 dum in Vulneribus ossium.

*In Paro-*  
*nychia.*

*Galenici* etiam in *Paronychia* suam  
 medendi methodum propinant, qui  
 juxta ipsos gaudet tribus indicatio-  
 nibus, curatoria, præservatoria &  
 denique vitali. Hisce igitur indi-  
 cationibus manus auxiliatrices sup-  
 peditant ex tribus usitatis fontibus  
 Chirurgico Pharmaceutico, ac  
 Dietetico. Ex fonte Chirurgico  
 depromunt venæsectionem, adden-  
 tes hanc rationem, quod V. S. bal-  
 samum vitæ a furibunda bilis efflu-  
 vescentia accensum refrigeret, insi-  
 mulque febrillis caloris focum de-  
 struat. Astrologi veteres suadent,  
 ut ea hora sanguis mittatur, qua  
 Horoscopus signo gaudet idoneo,  
 Dominusque ascendentiis, & lun.  
 in IV. & VIII. domo saturn. con-

spiciuntur, neque ullum cum Do-  
 mino V. II. ceu mortis domus aspe-  
 ctum habent. Commendant ali-  
 quando ceu vicarias cucurbitulas :  
 Frictiones quoque, Sinapismos &  
 vesicatoria inhiunt.

Ex Pharmaceutico fonte depromunt purgantia modo Elestuaria, modo Apozemata, ex rad. acetos. cichor. fumar. fl. borrag. bugloss. tamarind. uv. pass. sol. Senn. Alex. Rhabarb. prun. damascen. parat. & in sero lactis coct. add. Syr. de cichor. c. Rhabarb. 3i. Vomitoria quoque ad biliosorum humorum Saburram a viam affectantem, felici-  
 ciori successu ex corporibus elimi-  
 nandam, viribus adhuc robustis, concedunt, in quem finem com-  
 mendant Elest. Diasori F. Dein alterantia his subjungunt, quæ in  
 genere humorum calorem & fer-  
 vorem ceu causam morbosicam cor-  
 rigere, & visceribus fomitem sub-  
 ministrantibus succurrere apta na-  
 ta sunt. Si hepar in segregatione  
 officium suum non ritè faciat,  
 aperientia, si Uterus in culpa si-  
 mul sit in sexu scemineo hysterica,  
 & sic porrò alia quoque op-  
 ponunt.

Inter Topica externa *Galenici* re-  
 spiciunt tum humorem influentem,  
 qui divertendus est, tum eum,  
 qui jam influxit, hinc pro tempo-  
 ris diversitate Topica variant, &  
 commendant ab initio *Repellentia*  
 tum acida, tum aquea, & terrea  
 frigida, sive adstringent simul, si-  
 ve refrigerent, hinc suadent sub-  
 mersionem digiti *Paronychia* affecti  
 in aquam frigidam, vel acetum,  
 vel applicant succum solani, portu-  
 lacæ, & sæpe cum oleo rosarum  
 miscent, ex compositis laudant un-  
 gu. refrigerans *Galenii*, ungu. de ly-  
 thargyrio, Empl. album Camph. &  
 imprimis ex succis herbarum re-  
 frigerantium, solan. hyosciam. pa-  
 rat.

Defensiva etiam partibus vicinis,  
 seu manui ipsi applicanda esse ju-  
 bent, commendantque varia Em-  
 plastra Defensiva, præsertim se-  
 quens :

R. Acet. Saturniſat. ʒ ii.

alb. ov. N. ii.

mucilag. ſem. pſyll. cum aq.

ſolan. extraſt. ʒ ʒ.

Camphor. gr. vi.

M. f. l. a. Emplaſtrum.

Vel imponunt *Epiſthema de Marmor.*carul. *Schenck.* ʒ iii.

Ol. Camph. gr. vi.

M.

Post hæc ad Digerentia & Paregorica accedunt, quæ sunt tenuium partium, exſiccant & ſolvunt calorem nativum partis, vel per ſe adhibita, vel cum leniter repellentibus prout uſus poſtulat accuratè permixta. Imprimis omni ſeculorum memoria à Dioſcoride, Galeno aliſque laudatiſſima ad hunc affectum fuit herba, ob hoc ipſum adepta nomen Paronychiæ, ſed quaſi invideretur tantum remedium, diſſenſus tot Auctorum, quæ & qualiſea ſit, dubium reddidit. Ut enim alios plures taceamus Auctorum hypothefes, à *Matthiolo* Celeberrimo Botanico pro ea exhibetur *Adianthum* & *Paronychia* altera, à *Dodonæo* *Paronychia* alſine folia, & altera minor crenata rutaceo, à *Lonicere*, *Myſſ*, *Gajnero*, *Lunaria Italica*, ab hoc etiam *Lunaria arthritica*, cui contra *Matthiolum* utrique potiùs folia pepſii attribuit. *Glandorp*ius & *Simon Pauli* interim alſine foliam *Dodonæi* & *Lobbelii* ab experientia commendant. Quam verò licet dirimendam ſequimur Botanici. Veteres ad Paronychias incipientes, priuſquam ſuppurentur, ſive in manuum ſive pedum digitis fuerint, linam ex aqua frigida imbutam imponunt, aut per linteolum ex aqua expreſſ. in aſſiduè refrigerant. Thuſ quoque & gallum cum melle trita ſimul aut ſcorſim imponentes, folia myrti trita inſpergentes, aut cerarum myrreum imponentes, aut ſordes aurium aſſiduè illinentes Paronychiam ſuavunt. At ſi fuerint inflammata, panem aqua madefactum cum roſaceo adhibent, vel olivæ folia tenera imponunt, Cadmiæ tritam inſpergunt, carnem verò undique ab ungue ſeparant, linimen-

tis convulſivis è linteo interpoſitis, & probè adhibita Medicamenta alligant. Spodium quoque ſimili modo applicant. Ad Paronychias exulceratas alio modo incedunt & opponunt ſeq.

R. *Æruginis.**ſpuma argenti* aa. ʒ ʒ.*Sarcocollæ* ʒ i.

Terunt & largè inſpergunt, aut fatinam ervi adhibent. Carnem quoque ſeparantes, linteum ex vino expreſſum, itemque ſpongiam vino imbutam apponunt, at vero depaſcendo jam proſperpentes ſiſtunt, aut pigmento uſlo trito ubertim inſperſo, & linteo cum vino madefacto ſuperimpoſito. Alii *Sandaracham* & auripigmentum, aquis portionibus ſimul trita adhibent, & ſi cicatricem induſturi ſunt, *Tereb. liquida* applicant. Quòd ſi ſuppurata fuerint Paronychiæ, primùm ipſas petforantes humorem exprimunt, & deinde lenticulam cum melle imponunt, aut roſas virides, aut ſiccas aqua madefactas tritas adhibent. Sunt qui ſtatim ab initio ad incisionem mali tranſeunt, qua facta, mundificantibus & detergentibus benignioribus utuntur, quod ſi ſordities major conjuncta ſit, cum ung. digeſtivo miſcent *Ægyptiac.* *Apoſtol.* Alumn. uſt. &c. Proſpiciunt etiam *Catieri* oſſium.

§. 14. *Paracellſus Bombaſt.* ab *Hobenheim* dictus in curando Coalitu Digitorum, aliam non novit curationem, quàm instrumento cum ſeparare, & dein curare ut Vuluſ. Sic quæque *Digitum Sextum* tollere non valet quàm per ſectionem ferro ſeu Scalpello inſtitutam.

*Panaritii* verò curam per naturalia fieri aſſerit, ſicut ſunt ſperniolum & anodyna, cum ex corio ſacculus digito conſtrictus aptuſque ſperniolo ter vel quater madefactus induitur. Etiam externis putrefactis curam peragi poſſe contendit, ut porcorum ſtercore cum aceto decocto ſuperpoſitoque. Auctor noſter lumbricos vivos imponere jubet.

§. 15. *Helmontius* in Curatione Coalitus Digitorum, & *Sexti Digiti*, cum *tiana cura* Pa-

*Secundum*  
*Paracellſum*  
*curationis*  
*Digitorum*  
*Coalitus*  
*&*  
*Digitum*  
*Sextum*

*Panaritii*

*Helmontius*  
*tiana cura*  
*Pa-*

In Digito-  
rum coa-  
litione, Di-  
gito Sexto  
& Pana-  
rictio.

Paracelsus convenit & scalpello vel coacta separanda, vel scalpello superflua membra abscindenda esse vult. In Panarictio Talpæ cruorem pellemque recentem digito circumductam una nocte illud mortificari promittit. Idem præstare scribit sanguinem vesperilionis. Vel juxta ipsum lumbricus terrestris vivus imponatur, donec moriatur. Allium quoque cum fæce calculosa Matularum contusum & mistum applicat.

Villisi  
modus cu-  
randi Di-  
gitorum  
coalitum.  
Digitorum  
Sextum.

§. 16. Villisus Digitorum Coalitum maturè ferro separat, & deinceps vulnera illis illata balsamo Sulphuris aut Peruviano conglutinat, curatque.

Digitorum Sextum vel filo sericeo, vel filamento radicis Thymellæ in radices ligat, & ejus casum expectat.

Parony-  
chiæ.

Digito Paronychia afflicto opitulatur liquore lumbricorum in clibano facto, spiritu lumbricorum, balsamo Sulphuris, linimento ex fœdibus aurium cum saccharo saturius admittit. & pauc. oleo avell. express. facto. Jubet etiam digitorum sterquilinio intrudi, vel linteum sterquilinio humectatum calidè digito applicari.

Sylvius  
ratio Coa-  
litionis Di-  
gitorum,  
& Digiti  
Sexti.

§. 17. Sylvius æquè in Coalitione Digitorum quam in Sexto Digito ferurum commendat, & dein exinde facta vulnera ad ipsius mentem traumaticis curanda esse præcipit.

In Paronychia commendat salia volatilia quæcunque, internè sumpta æquè ac externè applicata. Omnia enim quæ acre acidum absorbent ac emendant egregia esse scribit.

Cartesius  
ratio mo-  
di curæ  
di Digito-  
rum Coa-  
litionis.

§. 18. Cartesius Digitorum Coalitionem ut rite curent, ad ipsas respiciunt causas, Digitorum accretionem separando cultello, & prohibendo ne denuò accrescant, quæ in operatione eodem modo ac Nos, procedere solent.

Digitorum  
Sextum.

Digitorum Sextum anabrochismo vel ferro cum reliquis Authoribus tollunt, dein curant instar alius Vulneris.

Parony-  
chiæ.

In Paronychia præter sudorifera ex antimonio diaphoretico, oculis

cane, myrrha, Tinctura antimoni, bezoard. etiam sal. volatilia oleosa exibent: item digitorum affectum usque ad nos secundum longitudinem cultro secant, & dein sequenti lavamento eluunt digitorum apertum & vulneratum:

R. Spir. vin. Camph. ʒii.

Tberiac. veter. ʒii.

mell. chelidon. ʒi.

M.

Imponunt quoque Cataplasma emolliens cum Emplastro quodam defensivo.

Alii eorum illinunt digitorum ol. sulphuris, vel imponunt ol. calido, vel immittunt ad imitationem Riverii in aurem felis. Alii digito vermes vel lumbricos vivos applicant. Nonnulli Moxam inustam magnificiunt. Item ex asa fœtida, alio & albumine ovorum unguentum parant illinuntque.

Inflammatione simul existente intensiore, non propediem vulnus consolidant, sed potius apertum servant, & quidem per globulum impositum, ut ex melle Chelidon. confectum. Apparentibus ossium festucis, eas ab ossibus separant eximuntque, corruptumque excindunt. Ad consolidandum Ulcus sequens magni pendunt.

R. Ung. Apostol.

Basilic. aa. ʒvi.

mell.

terebinth. aa. ʒi.

myrrh.

aloes

thuris aa. ʒi.

M.

§. 19. Nostro Consilio Digitorum Coalitum cura à ferro tantum eoque à prudenti Artifice administrato, sequenti modo expectari potest. Cum unionis hujus inconvenientis vinculum sit tenue, nec multis vasibus sanguineis majoribus aut tendinibus intermixtum, aut sola cute contextum, sit, facilè cura succedit. Hoc in casu uno ictus, acuta forfice incidit potest cutis carnosæ partes integerrimas excisis utrobique superfluis digitorum novorum quasi sudamentis; non opus hic est ligno triā-

Notandum  
in Di-  
gitorum  
Coalitione.

gulari, ad imitationem *Plateri Mantiss. Obs.* 43. nec scalpello, quo uti solet *Hieronimus ab Aquapendente Part. 2. Chir. c. 101. Obs.* 43. Hic tamen asterisco notandum venit monitum *Celeberr. Ronhys. Obs.* 10. p. 41. quod deligentur digiti in novam cohesionem proni, quod optimè institutis ligaturis ac Medicamentis idoneis faciliè præcaveri potest. Sic quoque cura Coalitus Digitorum feliciter cessit, testantibus *Ephem. nostr. Decur. Ann. 6. Obs.* 58.

In Digno  
Sexto.

*Sexti Digni Cura*, me arbitro, in ejus ablatione consistit, & optimè perficitur abscissione cum ferro, novacula scilicet, ligatura prius instituta, & hoc potest fieri in infantibus. Legimus enim in *Ephem. German. Ann. 6. & 7. Obs.* 118. Cum infans tertiam septimanam tantum complevisset, ligatura prius instituta digitum firmius adhærentem novacula absciderunt Chirurgi, mox altera die absque ligatura alium adhuc digitum amputarunt, quod sine magno dolore & sanguinis profusione factum, & vulnera faciliè sanata sunt, ita ut vix vestigium relictum fuerit, Confer *Cl. Riedlini Obs.* p. m. 187. Sunt qui exemplo *Plateri test. Ob.* 42. *Mantiss.* à resectione abstinent usque infantes adulescentes facti sunt, sed non videmus ob quam rationem id omitti debeat, cum digitus tantum quasi petiolo pendeat, & exiguus sit, is instituto Anabrochismo faciliè curari potest h. e. ligatura cum filo sericeo instituta; hinc enim digitus superfluus marcescat & decidit, postmodum facili negotio Medicamentis congruis penitus sanari potest. In adultioribus verò Digitus Sextus commodè cum ferro, quod Germani *ein Meißel* dicunt, extirpari potest.

In Paronychia.

*Paronychia* notitia in superioribus abundè detecta, reddit nunc Medicamentorum inventionem. Curatio ex Pharmacæ fonte *Paronychia* conducens institui debet, scilicet stagnantes aciores corrosivi in Digno affecto subsistentes suc-

ci corrigantur ac emendentur, inter quæ absorbentia & sudorifera aliis palmam præripiunt, ab initio verò morbi concedimus Lenientia tartarea aliisque solutiva ad aëres seculentias in primis viis latentes eliminandas, ne lege circulationis ad partem affectam deveniant, purgantia verò omnia quæ ad sanguinem transeunt, & ibidem tyrannidem suam exercent, hic ac ubique exulare jubemus, uti & vomitoria, & diuretica aciora, mitiora tamen aliquando usum inveniunt.

Sudorifera ergo, & absorbentia hic sola sufficiunt pro re nata anodynis maritata, quæ enim acrimoniam succorum corrigunt, subsistentes & coagulatos succos resolvunt, & per sua vasa iterum reflueri faciunt, ut sunt omnia bezoartica viperina, antimonialia, imprimis *R* nostra antimonii. Sunt in juniorum Medicorum gratiam formulæ nonnullæ.

*R. Antimonii diaphoræ. ʒi.*

*Sal. C.C. volat. gr. v.*

*M.F. pulvis.*

*R. Aq. scabios.*

*ʒi. sambuc.*

*card. bened. ʒi ʒ.*

*R Antimonii nostr. descript. ʒi.*

*Essent. lignor. ʒii.*

*Syr. fumar. ʒvi.*

*M. D. Cochleatim.*

*R. Malvas. Sambuc.*

*Spir. tart. rectif. ʒa. ʒi.*

*Vinoli mart. gr. vi.*

*Essent. lignorum ʒi.*

*M. dentur guttæ 50.*

Decocta lignorum, item omnia salia volatila. *C.C. viperar. herb. Paronychiæ*, item omnia nervina, quæ alias in doloribus & irritatione nervosorum ac membranarum fibrarum proficiua usus monstravit, quibus omnibus palmam præripiunt *Cinnab. ver. gr. Cinnab. nativ. Ungar. Sol. antim. Panacea Hartmann. Pulv. spasmod. nostr. descr. specificum Cephal. Michaelis & alia sulphure Solari pollentia, Essent. lumbrie. terr. succinata, imprimis spiritus noster matricalis internus, oleum balsam. Ind. nigr. Balsam. nervin. quæ quan-*

tum



tum possint in solando hoc ardore & dolore, illis nosse datum est, quibus & selectior & accurata praxis obigit.

Anodyna utpote Symptomati quæ ac acrimoniz succorum urgenti debita, circa horam somni commodè interponi & propinari queunt, ut sunt papaveracea, imprimis Theriaca celestis nostra reformata Cassellana, singulari modo non ita pridem parata, Anodynum nostrum Solare, vel laudan. opiat. Theriaca Andr. item laudanum Langelotti, cydoniat. Hoffmanni vel simplex, Essent. anodyna Zvulferi, Tinctura Nepenthes nostra, vel liquor opii, vel Sydenhamii Essent. sc. anodyn. cum vino Malvat. parata, quæ opiata simul acrimoniam succorum corrigunt, hinc ea in omnibus ulceribus ium externis tum internis magni æstuantur, legitima verò dosi exhibita, sed quis omnes descriptiones recensere? Suntu formulæ nonnullæ apprimè in dolore Paronychiæ maxime conducibiles.

*R. Spir. lumbric. volat. lignorum matricarizaa. ʒi.*

*R. anodyna. ʒß.*

*M. D. guttatim.*

*Vel:*

*R. pulv. spasm. ʒß. anodyna. A. S. gr. ii. elæosacch. cinamoni. gr. iii.*

*M. f. pulvis pro dosi velperi ex. hibendus.*

*Vel:*

*R. Essent. succin. tartaris.*

*R. Corallor. cum cera parat.*

*vel mensuræ celestis aa.*

*ʒß.*

*Essent. opii liquid. gt. vi.*

*M.*

*Vel in forma boli.*

*R. Confect. de hyacinth. ʒi.*

*laudan. opiat. sol. gr. ii.*

*sacch. q. s.*

*M. f. bolus, pro una dosi assumentus. Dictis jam internis generosis remediis Externa Topica semper sunt interponenda, quæ sæpè apud vulgum sola sufficiunt. Succî enim*

*in digitis stagnantes ac jam evasati & viscidi, hinc ad resluendum in sua vasa inepti facti, resolvendique sunt. Hinc exulente omnia repellentia tum acida tum aquæ & terrea frigida, sive adstringant simul sive sine obstructione, ut dicunt, refrigerent, hinc angue pejus fugienda est, quam commendant nonnulli, submersio digiti in aquam frigidam vel acetum. Sed hic potius conveniunt calidissima remedia, quæ te nunquam effectu frustabuntur, in Pararitio seq. methodo insistimus, præmissis internis absorbentibus volatilibus oleosis aliisque sudoriferis superius dictis, seq. cum carptis linteis imponere soleo.*

*R. Elix. vite n. d. ʒi.*

*Spir. sal. arm. arom. ʒß.*

*ol. fabin. gt. v.*

*camphor. gr. ii.*

*M.*

*Vel sequens simul epithema calidè applicare iubemus, & ita plures feliciter curatos vidimus.*

*R. aq. flor. sambuc. ʒii.*

*Spir. vini camph. ʒi.*

*f. sambuc. ʒß.*

*M.*

*Vel sola lintea sequenti liquore madefacta, Inflammationi Paronychiæ circumponere solemus:*

*R. Spir. lumbr. ʒß.*

*Sal. arm. calc. viv. par. ʒiß.*

*Vel:*

*R. Elix. vite ʒii.*

*Ol. sabina ʒß.*

*Camphor. gr. vi.*

*M.*

*Sufficit quoque sal volat. ol. vel bals. Peruvian. externè tepidè applicand. Vel in forma Cataplasmatissq. modo:*

*R. Herb. scord.*

*ruta*

*paronychia*

*f. chamomilla*

*melilot.*

*farin. lini*

*sanigræ.*

*bac. lauri.*

*Coq. in vin. Gallic. vel lact. & calidè Digito affecto applicetur sæpius. Vel*

spir. vini camph. crocat. cum 'Rca-  
storei vel balsamo arthritico exter-  
nè imponi potest. Communis-  
simum remedium dicitur, ut di-  
gitus Panaritio laborans in panem  
similagineum calidum, quantum  
patiens perferre potest, ponatur, sic  
*Riverius Cent. 4. Obs. 19. & 63.* vidit  
mulierem quandam Paronychia la-  
borantem, cum immisisset Digi-  
tum in aurem felis, intra horæ  
quadrantem sanatam, Lumbrici vi-  
vi Paronychiæ impositi sæpè ad ex-  
perientiam aliorum votis responde-  
bant. Hinc *Iulius Casar Baricellus*,  
Ego, inquit, profectò certissimum  
experimentum comprobavi, lumbricos  
vivos super Panaritium alliga-  
tos præsertim in principio mirabili-  
ter apostema compescere & sanare,  
ut vix diei spatium affectus pertran-  
seat: Consentit *Keyler. Process. Chym.*  
*LXIV. Croll. de sign.* In levi quidem  
Panaritio hoc semel contigisse credi-  
mus, in fortiori verò negamus, hic  
enim generosioribus opus est reme-  
diis. Inter Emplastra vix melius da-  
tur quàm nostrum de Labdano, add.  
pulv. lumbric. terrestr. ʒi. Theriac.  
ʒi. vel:

*ʒi. Ol. mastich.*

*lumbrie. aa. ʒß.*

*Antimonii depurat. ʒi.*

*tutia ppt. ʒiii.*

*cera alb. Venet.*

*Gumm. Labdan. depurat. aa.*

*ʒß.*

*M. f. l. a. Ceratum.*

Sed sæpè egregia hæc remedia fru-  
strà adhiberi solent, quin ullum  
inde resulter commodum, unde sæ-  
pè ad ferrum transcendendum est, im-  
primis si profundius malum radica-  
tum est, & caries ossium observa-  
tur. Hinc *Hildanus*, *Bayer*, *Pa-  
raus* alique statim ad sectionem  
confugiunt, qua nihil quicquam  
agrotantes magis sublevare dicunt.  
Materia verò altius si penetrat digi-  
tum, tunc per aliquot dierum spa-  
tium adhibitis suppurantibus inci-  
sionem quidem differendam cen-  
sent, sectionem tamen instituere so-  
lent eum rasorio lateraliter ab ungue  
usque ad os, à summitate digiti ad

juncturam exclusivè, quamvis au-  
tem incisio hæc statim ab initio, non  
expectata maturatione, aut notabi-  
li tumore, vel inflammatione, se-  
cundum longitudinem à quamplu-  
rimis commendetur, eam tamen  
Nos instituendam nisi summa ur-  
geat necessitas non permittimus  
quid enim proderit tubulos in-  
tegros ita discindere? Si verò adfue-  
rit caro emortua, ut sæpè accidit,  
hæc ferro abscindi debet, caustica  
verò sine carne emortua existente  
potius fugere consultius est, plures  
enim malè statim ab initio, uti so-  
lent Mercurio præcipitato vel subli-  
mato, cavendum enim est ne ten-  
dinosis fibris vitium altius affrice-  
tur, ossis denique caries non negli-  
genda est, quæ & aliorum & nostra  
observatione sæpius in ossibus Digi-  
torum observata est. Eam autem  
adesse, doloris pungitivi perseveran-  
tia ac continuitas, hyperfarcosis  
declaratæ possunt, plurima enim  
mihi reservo frustula ossiculorum  
cariosorum à digitis in Panaritio  
discissa: quomodo verò Caries cu-  
randa, peculiari jam indigitavimus  
Capite, quo lectorem remittimus.

Si verò adfuerit *Spina ventosa* in  
Digito, ut sæpè fieri solet, non  
cum ignavis Chirurgis ad oxycero-  
cum aut silepticum, vel alia astringe-  
ntia imprudentius confugiendum  
est, sed hoc in passu conducet se-  
ctio quæ ad formam crucis institu-  
enda, usque ad os ipsum Dignit as-  
secti, quod dein vel scalpendum, aut  
urendum aut excindendum. Vul-  
nus dein mote solito consolidan-  
dum, & hic egregium est notissi-  
mum *Emplastrum Norimbergense*,  
cujus vera descriptio est sequens.

*ʒi. Minii subtil. pulv. ʒ viii.*

*ol. rosar. colt. ʒ xii.*

*Camphora ol. ros. dissolut.*

*ʒ ii.*

*Fiat l. a. Emplastrum.*

Internè hoc in casu non negligenda sunt (superius jam commendata)  
sudorifera, imprimis bezoaricum  
Mineral. Joviale ac Martiale, 'R.  
antimonii nostr. & Tartarizata.  
Omnia Viperina etiam hic profunde  
ipsæ

ipſæ enim viperæ in brodiocarnium decoctæ & brodia aſſumta. Vel pulvis anglicus vel alia gelatina viperina, item vinum viperinum maxime proſunt: pilulæ quoque Mercuriales hoc in affectu magnipenduntur.

Externè ſpir. vini Camph. vel Elix. vit. vel R ſol. cum ſpir. ſal. parat. Euphorb. cum melle & ſpiritu vini Camph. proderit, Empl. Vigon. cum quadruplo Mercurii; quod ſi malum contumax hæc omnia eludat præſidia generoſa, præſentiſſimum erit remedium cauterium actuale, vel amputatio, de quibus omnibus Conſule Severinum & Iacobum van Mækeren.

dedecorantia vitia, quo & pertinet ipſorum *Calloſitas* duritiæ ſe prodens. Poſtremo & Ungues ſi interdum *permutato* huc illucque inclinant, ac mobiles facti ſæpe diu antequam *decidant*, ſic hærent & deformitatem inferunt, quandoque etiam planè decidunt. *Reduvie* quoque dici poſſunt iſte pelliculæ, quæ in digito circa radicem Unguis proſtant. Qui Affectus omnes abſque *Definitione* aut *Deſcriptione* ſufficienter intelliguntur, hinc non neceſſarium duximus illam apponere, ſed feſtinamus ad *Partem affectam*.

§. 2. *Partem affectam* quod concernit, ſunt *Ungues*, qui dicuntur partes ſolidæ, mediz ferè inter oſſa & cartilagineſ, in digitorum extremitatibus, quibus numero & magnitudine reſpondent, occurrentes planæ, ſiccæ, læves, albæ ſeu corneæ, ad maiorem digitorum fortitudinem & meliorem operationem facientes. Ungues, noſtro iudicio, ſubſtantiæ ſunt cartilagineæ, membrana ſenſili intus teſtè, externè digitorum loco ſuperiore claudunt moderate, molles, flexiles, denſi, coloris ex albo rubicundi vinculo circa radices, quas vaſa accedunt, firmati, ad id ut velamentum ſint atque apprehenſionem faciant. Ordinario Ungues albescunt, *Æthiopi*bus verò nigrisque brutis magis nigricant. Externè Ungues ſunt convexi, internè verò concavi. Sunt nihil aliud, quàm fibræ tendinoſæ invicem concretæ, ſi enim ope miſcroſcopii conſpiciuntur, ex plurimis filamentis & canaliculis eos eſſe conſtato diceres. *Cl. D. Blankardus* ex pilis invicem concretis Ungues eſſe compoſitos exiſtimat. Conter prælaudati *D. Blankardi Anatomiam Reformat. Capite de Unguibus*.

§. 3. *Diagnosin* Unguium affectum quod ſpectat, ii per ſe ſufficienter dignoſcuntur, quilm oculis percipiuntur, & in ſenſu noſtros, incurrant, hinc amplam *Diagnosin* hic formare non operæ præ-

Casus.

Partes affectæ.

## CAPUT III.

*De Unguium Inæqualitate, Craſſitie, Rugoſitate, Scabritie, Coloris mutatione, Curvatura, Fiſſura, Caſu.*

## §. 1.

**U**ngues ſi gibboſi & rugoſi ſint, maximam inferunt deformitatem in manibus, ſic quoque deformes ſunt Unguium omnium ſolutæ continuitates, eoque magis ſi in manibus, cùm ſemper oculis pateant, hæc vitia exiſtant, inter quæ frequentior eſt *Inæqualitas* & *Scabrities* *Unguium*, perſeverans in quibusdam deformitas, eoque maior, ſi ſimul illi craſſeant, & ſic *Craſſi* dicuntur; vel color ipſorum mutetur, & vel *livent*, vel etiam *nigricent*, vel *maculas plures albiſſimas* accipiant vel *incurvantur*. Huc & pertinent *Fiſſuræ* Unguium, ſi nimium in longum fiſſi ſunt, vel quod ſæpiſſimè contingit, ſi pertransverſum diviſi, & veluti in duas laminas diſſecti exiſtunt. Ex quibus vitiis quædam aliorum morborum ut *Ploræ*, *Elephantiaſis* ac *Luis Venereæ* comites ſunt, exterisque copulantur, aliis verò ſunt tanquam

*Unguium Inæqualitas & Craſſities, Rugoſitas ac Scabrities, Coloris mutatio, Curvatura & Fiſſura.*

*Diagnosin Unguium affectum.*

pretium duximus, sed iis studio neglectis, ad eorundem causas explicandas statim nos accingemus, ne inutiliter tempus teramus.

*Ætiologia  
secundum  
Galenici  
Inquali-  
tatis un-  
guium.*

§. 4. Veteres & ex illis maxime Galenici, Unguium Inæqualitatem originem ducere ajunt ab humoribus vitiosis & excrementis non bene dispensatis, & inæqualem nutritionem prebentibus. Sic quoque Crassitiem Rugositatemque Unguium deducunt ab humorum crassiorum in Ungues se insinuantium copia, tum etiam à topicis refrigerantibus, aut actu frigidis sæpe applicatis, quæ Ungues crassiores reddunt vel rugosiores.

*Unguium  
Scabritiei.*

Unguium Scabritiem derivant à succo, melancholico seu attrabiliario, coloris verò in album mutationem ab humoribus crassis & imprimis pituita spissiore. Unguibus per frustula impactis, deducunt.

*Curvaturam,  
Fissuram  
& Casum.*

Curvaturam ac Fissuram, ut & causam Unguium, vel à materia quadam sicca unguis ita depravante, vel à causa violenta, vel ex aliqua offensa, contusione fortiori Unguium Casum inducente, provenire ajunt.

*Paracelsi  
opinio de  
causis un-  
guium In-  
æqualita-  
tis, Crassi-  
tatis, Rugo-  
sitis ac  
Scabritiei.*

§. 5. Ex Paracelsi Principiis Unguium Inæqualitas ac Crassities causam agnoscit ipsam materiam, sive sal cum Mercurio primo resolutum, & in Ungues majori copia influens; & si simul cum Sulphure inspissetur & coaguletur Rugositas etiam & Scabrities produci-  
tur.

*Unguium  
Coloris  
mutatio-  
nis.*

Unguium Coloris mutatio in albißimas maculas, juxta ipsum, oritur à separatione spiritus salis; cum Mercurio à sulphure, sal enim subtile fluidius sese ex consortio sulphuris eripiens, & cum Mercurio resolutum subter Unguem se diffundit, & rubedinem sulphuris exstinguit, capropter Unguis peregrinum, vel induit colorem, vel maculas albas ipsis imprimis Unguibus.

*Unguium  
Curvaturam  
& Fissuram.*

Curvaturam & Fissuram Unguium ex sale Unguis vel sanguinis fieri contendit, ex quo sale Fissuram

istæ sicca unguium oboriuntur. Casum Unguium itidem esse statuit ex sale caustico ab ulcere, vel contusione productum.

*Casus.*

§. 6. Helmontii juxta Fundamenta in hoc differt digestio unguis à digestionem aliarum partium: quod hæc fiat in culinis sibi internis, illa verò in culina radici illorum continguis. Inæqualitas ergo & Crassities unguium, juxta ipsum, oritur à succis mucilaginosi cum latice ad unguis delatis, atque ibidem inspissatis, qui cum arcte adherant, nec se tam facile ab unguibus potantur divelli, ejus vel inæqualitatem faciunt, vel ejus substantiam augent & crassiorem reddunt.

*Helmontii  
sententia,  
de causis  
unguium  
inæquali-  
tatis &  
Crassities.*

Rugositatem verò ac Scabritiem Unguium itidem deducit à latice sale multo reſecto, & sic ad unguis delato.

*Rugosita-  
tis ac Scab-  
rities.*

Coloris Unguium mutationem derivat Author ex proximo venarum nutrimento, ad unguis delato, & diversas maculas imprimis verò à latice effuso, albas producente.

*Coloris  
mutatio-  
nis.*

Curvaturam ac Unguium Fissuram excitari ait à latice sal quoddam asperum sibi copulante, quod unguis dirumpit, quoque illis facpius ab externo aere communicatur.

*Curvaturam  
Fissuram.*

Casum verò Unguium vel oriri credit à latice corrosivo radices unguium non tantum corrodente, sed planè exedente, hinc eos necessariò excidi debere haud dubitat.

*Casus.*

Porrum provenite ex acri liquore, qui nutrimentum radicum esse debet unguium, scribit, norat etiam, ubi porrus, non longedistant unguis: itaque radices earum in exerescentiam abeunt, quæ porros efficit. Cum in digitis pedum aut manuum porri nascuntur, quibus tactus dolorem infert, ac indies magis excreſcunt, in avellanæ nucleis medietatem porros fore dixerit. Ultimò simul cum carne crescent in unguium duriorem, & cum per corrosivas aquas re-  
in-

*Porri.*

incisionem aperti fuerint, in Elephantiz principium ineidunt incisionesque majores efficiuntur.

*Iuxta Villisii* 5. 7. *Vnguium Inaequalitar* ex Villisii mente, fit ex crassioribus causa Inaequalitioribusque succi nutritii particulis, quae ob molem in certis *unguium* tubulorum, ex quibus constant ungues, angustioribus locis retentae atque aggestae, coacervatione sua quasdam producunt in unguibusexuberationes, quae ipsos *inaequales* efficiunt.

*Crassissimi ac Rugosissimi* 6. *Crassitem Vnguium* emergere statuit, quando particulae istae paulo minus crassae, sed viscidis involutae, universos unguium tubulos, totumque illorum canalem opplent; ipsisque inhaerentes eos extendunt, & elewant, unguemque crassum reddunt. Si vero quidam tantummodo tubuli à crassiore viscidiorumque humore inferantur, reliqui vero liberi subsistant, *rugosus* fieri *ungues* statuit, tubulis obstructis liberis superantibus.

*Scabritiei* 7. *Scabros* devenire *Ungues* asserit à salibus liquori alibili viscidiori permixtis, quae cum liberè per unguium tubulos iter facere nequeant, aculeos suos eorum poris infigunt; qui in superficie promittentes ejus *Scabritiem* edunt.

*Coloris mutationis* 8. *Color Vnguium*, juxta ejus sententiam, mutatur à sanguine in aliqua eorum parte remorante, & stagnante, vel ob vasa suppositae carnis à quodam instrumento gravi & contundente compressa & angustata, vel ob ipsum sanguinem à particulis quibusdam acidis congelatum, & in iisdem vasis retentum.

*Fissuram* 9. *Vnguium Fissuras* deducit Author à salibus acrioribus in succo nutritio luxuriantibus; quae validis, quibus gaudent, spiculis unguium tubulos dividunt ac dissecant, pluresque eorum disperdentes Fissuras in ungue excavant.

*Casus* 10. *Ungues excidere* contendit, quando scilicet genio suo defraudantur, requisitumque succi alibilis subsidio privantur, quod accidit vel ab obstructis vasis, liquorem ipsis nutri-

endis dicatum deferentibus, vel ab iisdem cum fibris nerveis, per quas in ungues accedunt spiritus animales, à quodam humore corrosivo instar aquae fortis exesis, vel tandem ab iisdem furculis nerveis obturatis, spirituumque influxum unguibus denegantibus; quae de causa succus nutritioni partis destinatus nequaquam actuatus, in ejus alimoniā nullatenus cedit. Non reparato ergo detrimento à continua evaporatione dilatantur pori, qui papillis ex suppositis partibus protuberantes excipiunt, & ungues hisce sustentaculis orbat, à vicinis partibus separantur, ac tandem decidunt: hoc etiam contingere contendit ab exesis papillis, quae unguium poris inosculantur, vel à pure, vel ab alio humore acri & erodente.

6. 8. *Sylvius Vnguium Inaequalitatis & Crassitiei causam* deducit à pituita viscida, cum sanguine per arteriolas unguium humori nutritio affusa, quae dum unguium tubulis arctius adharet, & cum tempore induratur, ungues *crassiores & inaequales* reddit.

*Rugositatem ac Scabritiem* deducit à salibus lixi viscosi sanguini & succo nutritio commixtis, una cum viscidiorè pituita, & in unguibus subsistentibus, eosque rugosos ac scabros reddentibus.

Sic quoque *Coloris mutationem* à sanguine circa ungues stagnante, unguis vel pituita commorante provenire contendit.

*Curvaturam ac Fissuras Unguium* à salibus acrioribus in sanguine luxuriantibus & ad ungues delatis, quae dividendo ac dissecando Fissuras producunt, incurvando & distendendo Curvaturam excitant.

*Casum* verò *Vnguium fieri* contendit, quando radices ipsorum corroduntur, vel ab acidis vel acerbis humoribus, sive in massa sanguinea praesistentibus, sive ab ulcere, vulnere ac contusione, productis.

9. *Cartesiani causam Vnguium* Cartesiani.



*norum opi-* Inaequalitatis & Crassitudinis imputant  
*nio de cau-* variis particulis terrestribus succi  
*sis ungui-* nutritii glutinosis commixtis, sese  
*um Ina-* fibris illis unguis constituentibus  
*qualita-* infertentibus & quiescentibus, quo  
*tij.* pactis fibris illis arctius adherentes,  
 illorum inmutant texturam accom-  
 pagam, ut inaequales & crassiores  
 reddantur unguis.

*Rugosita-* Unguium Rugositatis ac Scabritudinis  
*tis.* causas dicunt esse particulas acutas  
 & falsas, vel cum succo chylosiore,  
 ex sanguine per arteriolas, vel  
 cum lymphâ per canaliculos lym-  
 phaticos unguibus illatas, quarum  
 figure minime respondeant poris &  
 interstitiis fibrillarum eorum, pro-  
 inde pori à particulis istis peruer-  
 tuntur, & unguibus Scabritiem &  
 Rugositatem inferunt, imprimis si  
 deficiat liquor lubricans adeo ne-  
 cessarius.

*Coloris* Unguium Coloris mutationis causam  
*mutatio-* dicunt esse particulas succi nutritii  
*nis.* vel crassiores unguibus illatas, quae  
 radios solares vel impediunt in eorum  
 progressu vel eos deficiunt, vel  
 quandoque facile permittunt,  
 hinc enim unguis vel livent, vel  
 nigrescunt, vel albescent.

*Curvatu-* Unguium verò Curvatura vel Fis-  
*ra vel* sura à particulis austeris, & mul-  
*Fissura.* tis angulis aut hamulis praeditis ad  
 unguis delatis, ibidemque haren-  
 tibus, ad mentem Cassianorum  
 inducuntur, unde unguis indurati  
 non tigridi curvaturam faciunt, & si  
 simul particulae hae rigidae discin-  
 dant unguium tubulos, Fissurae eorum  
 oboriuntur.

*Casus.* Unguium autem Casum deducunt  
 à succorum unguis irrorantiam  
 particulis acrioribus seindentibus  
 ac erodentibus, radices unguis  
 devorantibus, & ita eos planè tol-  
 lentibus.

*Nostri* § 10. Jam demum & nostram de  
*iudicium* causis Unguium morborum profe-  
*de causa* ramus sententiam: Ungues, ceu di-  
*unguibus* ximus, variis affliguntur affectibus,  
*Inaquali-* tum à proptia structura, tum à pec-  
*tatis.* culari succorum dispositione, tum  
 à causarum externarum inelemtia  
 enatis; quum enim tubuli ex qui-  
 bus contexti sunt unguis, arctè in-

vicem sint connexi strictioribusque  
 polleant canaliculis, tenuiores tan-  
 tum admittunt succi nutritii parti-  
 culas. Si verò in sanguine conti-  
 neantur crassae, tertextae, viscidaeque  
 particulae, quaedamque ex iis cum  
 sanguine ad unguis deportatae sese  
 in eorum tubulos insinuant, tubuli  
 ii, qui tales exceperunt particulas  
 ab illis infertuntur, & à novis  
 continuè advenientibus attolluntur  
 ac extumescunt. Sed quum crassio-  
 res sint istae particulae, quam ut om-  
 nes fibras subire valeant, & ad fi-  
 nem usque earum quas sunt subin-  
 gressae pervenire possunt, contin-  
 git ut *Ungues* in certis locis pro-  
 mincant, in aliis verò *aequaliter* re-  
 maneant.

Cum verò sanguis superius di-  
 citis particulis, nimisque crassis,  
 pauciorique visciditate involutis  
 scateat, eaeque abundantes ad un-  
 guis appellant universos, vel saltem  
 plerosque eorum tubulos complent  
 & extendunt, & in ipsis novo af-  
 fluxu coactervata Unguem *crassio-*  
*rem* reddunt, molemque illius *adau-*  
*gent.*

*Ungues* quando *rugosi* apparent, *Rugosita-*  
*tis.* quod tum fit, quam scilicet propo-  
 sitae jam particulae fibras eorum ali-  
 quales ab origine ad finem usque  
 complent, dum verò aliae pristina  
 truntur libertate: quum, verò hae  
 constituent interstitia, à quibus il-  
 lae ab invicem separantur, effor-  
 mantur hac ratione sulci seu ru-  
 gae, à quibus unguis *rugosi* dicun-  
 tur.

Copiosae interdum adsunt in san-  
 guine salinae particulae pluribus pre-  
 ditae angulis, à quadam terre-  
 stritate admixta parum per obtusis, quae  
 per circulationem ad unguis dela-  
 tae, illorum tubulos subintrant,  
 in iisque ob disproportionatam fi-  
 guram remorari coguntur; sed quum  
 perpetuo agitentur motu, penitus  
 in tubulos sese insinuant, spiculaeque  
 sua fibrarum patiensibus insurgunt,  
 quae continua actione sua tandem  
 ad externam superficiem perveniunt,  
 quam densio suo ordine scabram fa-  
 ciunt; illam verò non findunt ob-  
 tusus,



tufis, ut jam dictum, earum acuminibus ab adjuncta terra.

*Celeris mutatio- nis.* Fibrae unguium contextum componententes sunt ex nervearum genere, coloreque albo idè donatæ, sed à sanguine ipsas perpetuo affluxu irrorante rubro induuntur colore, facta autem levi quadam in vasis sanguiferis unguem perreptantibus obstruptione, statim apparet innatus unguium color eo in loco, quem sanguis non inundat; diu tamen non perdurant similes obstruptiones, brevique evanescit color iste albus; sanguis siquidem continuato suo motu, spirituumque animalium subsidio adjutus, oppositos sibi obices tollit, pristinoque tramite pergit iter suum, quod antea per anastomoses inter vasa congenera communes fecerat.

*Curvatur- ta unguium.* Crassæ succi nutritii particulae, quæ unguium fibras subeunt, aliquando tantæ sunt molis, limine ferè hæteant, earumque principia impleant: & cum salinas easque acuminatas quasdam possideant, fibras in origine vellicant; hæ verò sic irritatæ versus principia contrahuntur, & finem vi elastica adhuc gaudentem versus eundem terminum retrahunt, unguemque sic *inverunt incurvantque*.

*Unguium fissura.* Particulæ salinæ copiosè in sanguine ac succis nostris existentes, si duris rigidisque polleant spiculis, quæ nullo phlegmate, nullave terra hebetentur, fibras in quas protruduntur discindunt ac dilacerant, atque ab invicem *dividunt fissuræque* in unguibus progignunt.

*Unguium casus.* Vngues interdum decidere conspicimus, quod à plurimis causis tum internis tum externis evenire potest; quæ scilicet unguium fibras necessaria orbant alimonia, vel earum commercium tum cum fibris nerveis, tum cum partibus vicinis, quibus sunt alligatæ, interrumpunt: internæ sunt, v. gr. obstruptiones pertinaces, quæ sunt in unguium tubulis à quibus præpeditur influxus spirituum animalium, succique alimentatii, unde

senim emarcescunt fibræ, interstitiisque quibus inosculantur musculorum fibræ, quarum ope fiebat cum musculis commercium, dilatatis, hæ juris sui fiunt, unguesque dimittunt, qui nullis adminiculis sustentati excidunt: nonnunquam verò acres atque lixiviosæ quædam particulæ tenuiores, in aliis tamen supradictis casibus in fibris cespitantes, eas senfim ac sine sensu erodunt ac dissecant, atque ab aliis quibuscum conjunctæ erant dividunt ac separant, obstruptionesque mora sua producentes, commodum sanguinis spirituum commeatum præpediunt, & sic *Unguium Casum* inferunt. Earundem sunt virium Ulcera & Abscessus in partibus unguibus subiectis facta. Causæ externæ, quales sunt contusio, vulnus &c. simili modo ac prædictæ unguium casum inducunt.

Causæ Unguium Reduviæ sunt *Reduvia.* particulae actiores ad carnem & radices unguium delatæ, itidem cuticulam & eutem discindentes, ac eju-modi Reduviæ excitantes.

§. 11. *Prognosis* quod attinet: *Prognosis.* Omnes hi affectus unguium vix periculum, sed potius delectationem manibus inferunt, sunt etiam aliquando difficillimi curatu hi affectus. Sic unguium crassities nimia, si non duntaxat in illis qui jam sunt, ast etiam in succrescentibus similiter se offert, corrigi nequit, cum, etiam quid ab illis deradatur, rursus in aliis, qui recrescunt, vitium hoc redeat. Sed hi affectus unguium non plane negligendi sunt, quia constant ex fibrillis & filamentis nerveis, & faciliè ex eorum irritatione spasmus, convulsio ac mors oriri potest, ceu patet ex *Ephem. Germ.* ubi ex improvida sectione unguium mors secuta est.

Puncta & maculae albae in unguibus apparentes non pro vitiosis, sed potius pro vitæ longævæ indicibus habentur, in juvenibus

bus laudantur, in senibus spem vitæ longioris faciunt, ceu vulgus loquitur.

*Cura Dietica Unguim affectuum.*

§. 12. *Dieta* nec in minimis ac vilissimis morbis contemnenda est, sic & ea nec negligenda venit in affectibus unguum externis, quia à succo nutritio ex cibis & potu parato hi affectus oboriri solent, & cum ut plurimum hi affectus, ceu in causa diximus, à stagnatione coagulationeque succorum, imprimis succi nutriti producantur necessario eò respiciendum est, ut stagnatio ac coagulatio aquæ observata congrua *Dietâ*, quâ applicatis remediis impediatur. Aer ergo eligatur purus, temperatus, fugatur frigus angue pejus, cibi eligantur boni succi lactescents, ut inde optimus emerget succus nutritius, ab omni terrestreitate ac visciditate alienus, vitentur cibi acidi, salii, saccharati, muria conditi, gaudeant potius copia salis volatilis. Potus sit cerevisia benè fermentata, ac herbis vel radicibus aromaticis, sal. volatili abundantibus maritata, & vinum Gallicum interponatur, vel sit potus calidus Thez vel Caffè; fugiantur vina acida, aliaque refrigerantia, succos, imprimis nutritium tantum coagulantia. In hisce casibus imprimis munditiei studendum est, ne manus cum digitis ac eorum unguibus rebus sordidis multum applicentur, vel diutius aquæ frigidae immergantur. Reliqua sunt pro re nata observanda.

*Cura secundum Galenicum Unguim inaequalitate & Crassitie.*

§. 13. Ordine nunc devolvimur ad curationem *Pharmaceuticam* & *Chirurgicam* quam Veteres *Galenici* in Unguim *Inaequalitate* & *Crassitie* instituunt evacuando prius humorem superfluum, pituitosum scilicet; dein à *Topica* transeunt inter quæ humorem crassum attenuantia maxime laudant, adipem ovillum emollitum, & super lintheum extensum adhibent, ac tertio die solvunt, & si mollem unguem reppererunt, deradunt & eundem rursus imponunt, & tertia

die solum similiter deradunt, atque hoc tamdiu faciunt donec ungues glabri & aequales ac tenues fiant. Alii thus tritum cum adipe ovillo excipiunt, ac eodem modo untuntur. Alii alumen scissum asserino adipe mixtum usurpant pari modo. Nonnulli ex ejus usu successum sentiunt, *Mastichen* Chiam in aquam ferventem coniectam ac emollitam ungui imponunt ac obligant, & tertia die solvunt & derafo ungue iterum imponunt, atque hoc faciunt usque ad perfectam restitutionem.

In *Rugositate* & *Scabritie* Unguim Hordei farinam cum Pice ac emplastri formam coquunt ac imponunt, si hæc non juvant ad fortiora accedunt, quæ efficiunt ut ungues ita deturpati decendant, & novi meliores recrecant, in quem finem sequentia laudant. Auripigmentum colore aureo, & sandaracham aquis portionibus probe terunt, terebinthinam ad emplastri formam excipiunt & imponunt, ubi prius per unum atque alterum diem farinam hordeaceam cum aceto & silvestris cucumeris radice tritam adhibuerint. Item calcem vivam cum oleo, aut mastichen cum opobalsamo imponunt.

In *Coloris mutatione* Unguim rationem commendant Veteres, dein varia excoioratoria ex cantharidibus, sulphure vivo, chalcitide, nausturtio, sinapi, nigella, atramentario sutorio, &c. parata applicant.

In *Curvatura* & *Fissuris* unguum plurimum hic conferre ajunt pulmentum avenaceum, cum pulvere radicis altheæ in aq. in cataplasmatas formam coctum. Ungues incurvatos vitro pritis terendos esse ajunt, dein adipe ovi sæpius emolliendos. In *Fissuris* vel *Scissuris* commendant aquam folior. cynogloss. quam linguam canis vocant, sæpius applicatam.

Ad *motus unguis* ex aliqua offensa, caricas cum melle tritas mitigare dicunt. Quod si dimidium unguis exciderit, nitrum aut saltem

*Rugositate Scabritie.*

*Coloris mutationis.*

*Curvatura.*

*Casu unguim.*

cum pari fellis vitulini mensura mixtum, adhibent, sanantque.

Ad *contusos Vngues Myrti & mali Punice* folia tenera imponunt, aut felle tauri evacuato, in ipsam fellis vesicam unguem indunt, ac sinunt, donec perfecte sanetur. Vel saliosile cum aqua & oleo tritum illinunt.

Ad *suberuentos Vngues*, picem siccam liquefactam, & cum farina mixtam apponunt. Aliquando suberuentatum unguem in medio perforant, ac cruorem effusum exprimunt.

Ad *reparandos Vngues* commendat sequens:

*R. Myrrh. ʒi.*

*alum. sciss. ʒ. ʒ.*

*panis hordeacei succ. ʒi.*

Excip. melle & imponunt.

Laudant quoque ad ungues agrè orientes, Betæ agrestis semen cum aceto tritum ac impositum, vel polium, cum adipe vitulino & terebenthina tritum adhibent.

*Paracelsi cura in unguinum Inaequalitate & Crassitie.*

*S. 14. Paracelsus* in Unguim Inaequalitate & Crassitie uti solet resolutivibus, ut nimirum coagulatum illud ex sale & Mercurio cum Sulphure ritè dissolvatur, in quæm finem commendat lapidem calaminarum, gummi Arabicum, aliaque commendat.

*In Rugositate & Scabritie.*

In Rugositate & Unguim Scabritie laudat vapores, qui ascendunt instar fatus ex radice urticae minoris, vel sequens laudat:

*R. Farina hordei,*

*filiginis aa. ʒi.*

*Pirolæ,*

*Aprimoniae*

*Centaureæ,*

*Prunellæ aa. ʒ. ʒ.*

Aqua puræ quantum sufficit pro decoctione. Aut illinit sequens:

*R. Ol. ex Juniperi ʒi.*

*de spica ʒii.*

*lateris ʒ vii.*

Fiat Mixtura.

Ungantur Ungues hoc unguento.

In Coloxie Vnguium mutatione commendat Tincturam lapidis scissi, vel sequens:

*R. Camphoræ ʒ. ʒ.*

*Sigilli Salomonis ʒii.*

destillat, postmodum linteo hac madefacto parum inungit lavatque Ungues.

*Curvatura ac Vnguium Scissura* - la Curvatura cura, juxta ipsum, fieri debet itra. seq. modo.

*R. Rad. urticae minoris ʒvi.*

*Raponica ʒiii.*

*consolidæ regalis ʒi. ʒ.*

Aquæ puræ q. s. est pro Decoctione.

In Decoctione superpone Ungues, & olla sit optimè cooperta, ut vapor ungues melius tangat, hoc fac singulis diebus quater aut quinques, postea purgabis sanguinem, uti sequitur.

*R. Gamandreae,*

*cichorea aa. q. v.*

bulliant in optimo vino. Hanc potionem dicit rectificare sanguinem. Vel in forma unguenti sequens applicetur.

*R. Petrolei,*

*Axungiae sili.*

*cervi,*

*taxiaa. ʒ. ʒ.*

M. f. Unguentum super carbones manè & serò illine.

In Casu Vnguium omnia ea approbat, quæ extrinseca accidentaliter avertunt, laudibus extollit oleum quercinum circa radices unguim illitum, vel axungiam catti, vel oleum de coste, de granatis, & quæcunque alia, quæ modicè astringunt, applicat quoque hoc in casu realgar & talcum.

In Porro ab incisionibus & corrosivis aquis abstinere, & seq. commendat.

*R. Oleum ex bacis Juniperi.*

*Bosoniae, Agarici aa. ʒi.*

*fellis bovis q. s. pro unguento.*

Unde dies & noctes linteolo, quo magistriveris eo melius efficiuntur nigri siccanturque post oppodeltoch ad 4. vel 5. septimanas utere.

Vel:

*R. Realgaris ʒi.*

*Olei vitell. ovor. ʒ. ʒ.*

*calcis exstincti. q. s. pro unguento.*

*S. 15. Hæmontium ad Inaequalitatem & Cras-*

*In Coloris mutatione.*

*Helmen-  
ti curatio  
unguium  
Inquali-  
tatis  
Crassitie,  
Rugositatis  
ac Scabi-  
ritie.*

*Vnguium  
Coloris  
mutatio-  
nis.*

*Curvatu-  
ra Fissu-  
rarum.*

*Casus.*

*V Villisii*

*Cura in  
unguium  
Inquali-  
tate, Cras-  
sitie, Ru-  
gositate ac  
Scabritie.*

& *Crassitiem*, ut & *Rugositatem* & *Scabritiem* Unguium corrigendam eo intendit, ut spissior ista accretio resolvatur, & alliciatum latex purior ad ungues, in quem finem commendat tanquam atcanum axungiam muris, sæpius unguibus illincendam.

In *Vnguium Coloris mutatione* omnia ea commendat, quæ laticem purificant, & interius mucaginem abluunt, & sic ungues nitidos reddunt; in quem finem commendat interna sudorifera, externè verò fel leporis. Si verò à sugillatione fuerit, laudat ea quæ in hoc affectu jam detexitus.

*Curvaturam, Fissuras & Casum* iisdem curat remediis ac prædicti Authores fecerunt.

§. 16. *V Villisii* in omnibus suprà descriptis affectibus exhibet medicamenta, quæ succo nutritio fluidiori, volatiliori, & dulciori reddendo conveniunt. Quoad externa verò ea ipsorum singulis juxta variam liquoris Diathesis affectusque naturam administrat.

*Inaqualitatem, Crassitiem, Scabritiem & Rugositatem* sanat Empl. de cera, pice aut resina, vel etiam mastiche imposito; ut prioribus decrefcentibus novi aequalibres succedant. Si fortioribus sint detrahendi, folia ranunculi applicata approbat, uti & arsenicum ceræ admixtum.

*Quum Coloris mutatio* in hoc casu à sugillatione fiat, Author medicamenta sanguini dissolvendo appropriata præferibit, qualia sunt catapl. ex farina fabarum, fœnigræci, pulv. cymon. croc. vel catapl. ex melle, nucl. nuc. & sale, item oleum costum raditis bryonia, & unguentum de Alabastro.

*Curvaturam Vnguium* corrigit Emplastris emollientibus, qualia sunt Empl. Diachyl. de mucilag. &c.

*Fissuris Vnguium* medetur Emplastro ex colophonia, terebinthina & thure.

*Ars Medica in Casu Vnguium* nullum auxilium asserre novit, radix

enim Unguis absumta nullis remediis reparari potest, novusque est expectandus, qui ex radice in carne contexta repullulet.

§. 17. *Sylvius* ad curandam *Inaqualitatem ac Crassitiem Vnguium* in eo occupatus est, ut humor peccans ac viscidus corrigatur medicamentis incidentibus & attenuantibus, seu sale volatili præditum internis, tum externis. Et si simul copia peccent hi humores, evacuentur per phlegmagoga tum communia, tum maximè Chymica, Mercurium potissimum dulcem. Externè verò commendat spiritum vini cum oleo aromatico, vel balsamo sulphuris, inartatum, sæpius *Vnguib* applicatum.

*Rugositatem Vnguium ac Scabritiem*, item *Coloris commutationem* quod spectat in curatione cum aliis consentit.

*Curvaturam & Fissuras Vnguium* curat ungues à siccitate rigidos emollientibus, ut unguento Dialtheæ, axungia caponis, & id genus aliis remediis.

In *Casu Vnguium* cura Author cum *V Villisii* consentit.

§. 18. *Cartesiani* ad *Inaqualitatem & Crassitiem Vnguium* varia deserventia, resolventiaque adeoque ab ipsa quiete ad motum excitantia adhibent, ut sunt spiritus vini, calcis viv. sal. armoniaci, sed cum hæc vix sufficiant, ad cultrum accedunt, ut Vngues tamdiu rodantur, donec æquales & tenues reddantur.

In *Rugositate ac Scabritie* commendant medicamenta aliquantum pinguis, quibus anguli haberentur, & rigiditas unguum cornuum flectatur, ut sunt butyrum regens, lardumque ungu. Dialth. &c.

*Curvaturam ac Fissuras Vnguium* corrigit medicamentis particulis habentibus teretes, lubricas, vim angulorum eludentes, quæ fibris unguum irrepentes, & Fissuras replentes, efficiunt, ut vis illa angulorum scindentium valde minuatur, & benigniores particulæ succi nutritii admittantur, fibras denud.

*Sylvius cura in unguum Inaqualitate ac Crassitie.*

*In Rugositate, Scabritie ac Coloris mutatione.*

*In Curvatura ac Fissuris.*

*In Casu.*

*Cartesiani notum rationem curationis Vnguium Inaqualitatem & Crassitiem.*

*In Coloris mutatione.*

*In Curvatura.*

*In Casu.*

nudò glutinantes , quod præstant omnia Medicamenta mucilaginosà , & blandiora ramosa , particulas acutas inviscantia & hebetantia , imprimis linimentum ex butyro recenti insulso , cum creta & camphora , vel unguentum aureum .

In *Vnguium Casu* commendant eadem & alia in ulceribus ipsis solemnna , ex Saturno , Tutia , &c. parata , spir. vin. camphor. aliaque remedia acidum absorbentia , mitigantia & hebetantia , alibi jam dicta , & interius adhuc dicenda , adhibent .

*Cura In-*  
*æqualita-*  
*tis ungu-*  
*is secundum*  
*Nostram*  
*methodum .*

*§. 19. Quoad Nostram* sententiam , cura in *Vnguium Inæqualitate* consistit in eo , ut emolliantur & dein abradantur , ad emolliationem varii forus , cataplasmata , unguenta , olea , succi , &c. applicari possunt : Emplastrum ex cera , resina , mastiche , & succo heder. arboreæ egregium erit , nec Empl. nostrum de Thea & spermat. ceti , vel de Labdan. contemnenda sunt . Si hæc medicamentis & rasioni non cedant , ad fortiora accedendum est , & quidem corrosivis , ut sic prioribus decreviscentibus novi æquales succedant ungues , in quem finem conducet aqua nostra corrosiva Mercurialis , qua sola impoſita statim decidit unguis . Sed semper durante cura unguis ab aere muniatur , facilius enim tunc recrescunt . Rarum est quod nuper in filio 12. annorum Illustri alicujus Baronis observavi , cui unguis non crescebat , sed succus nutritivus unguibus destinatus ad partem carneam transit , & ibidem tumorem instar clavi producit .

*Crasstiei*  
*unguium .*

Vix *Crasstiei Vnguium* aliis remedijs curari potest , quàm abrasione æpius culleſſo instituta , vel illinantur elix. vitæ noſt. d. vel spir. matric. vel aq. Regia. Vngar. tunc facile recrescere solent ungues , & vix impediri potest , ne iterum incrascescant ungues , alluente sc. novo succo nutritio .

Ad *Crasstiem* hanc *Vnguium* im-

*Tomus II.*

pediendam commendamus etiam varia Emplastra , imprimis istud quod solemus parare ex cera , pice , thure , mastiche , succo anagallidis , quod continuò super unguem gestandum est , vel Empl. Cinnabarinum nostrum .

*Vngues Scabri* vel *Fissi* vix redintegari aut æquales fieri possunt , sed procreſcentes tandem cadunt , quod ut melius fiat , neque alii similes succedant , sequentibus uti solemus , vel si adhuc subsistunt , ut auferantur , applicari solemus Empl. de Labdano , vel applicetur cera cum mastiche liquefacta , vel spir. matricalis , vel fiat cerat. ex colophon. terebinth. addito sulphure , camphora , & ſale armoniaci. Empl. Vigon. cum quadruplo Mercurii . Inter fortiora Vngues scabros detrahentia commendantur varia medicamenta caustica impoſita , quibus tamen cautè incedendum esse . Author ero , ne tubulos illos fibrosos nimis irritet & discindas : sic quidam Empiricus oleo antimonii unguet tollere conatus est , inde verò puero 12. annorum pessima symptomata acciderunt , caput dolebat & lachrymæ continuò involuntariè ex oculis effluebant .

Si ungues *liveant* ob pallorem corporis , vel si maculam nigram continent ob fugillationem sub ipsis factam , cum hi colores non in ipsis , sed in substrata carne existant , & per ipsos pellucidos tantum transparent , non alia cura , quàm in pallore æ fugillatione revelata fuit , his quocunque assignanda est , quòd si ungues *nigri* existant , prout apud *Bartholinum* in *Art. Hæm. T. 1. p. 64.* exemplum extat , nulla superest cura æthiopicis . Quod puncta vel maculas unguum albas attinget , cum longægaviratem hominibus portendant , & jam præjudicijs his occupati homines sint , potiùs intactæ relinquendæ , quàm attingendæ sunt , cum Medicus in vi tali morbo artem suam sapiùs prostituere cogatur . De quibus , ut & de

*Vnguium*  
*Scabris*  
*& Fissu-*  
*ra .*

*Vnguium*  
*Coloris*  
*mutatio-*  
*nis .*

Hh Den-

Dentium sera regeneratione vide *Helmontium*, qui nugas has innanes optimis instructis rationibus & experimentis rejecit, non decet enim rationale Medicum hisce aliisque præconceptis opinionibus fidem adhibere.

*CHIRURGIA NUNGUINUM.* Quod si experimentum Celeberr. *Boyle & Papini*, Profess. Marburgensis, ad ossa mollia reddenda institui possit in vivis hominibus, in Medicina egregium præstaret usum, imprimis etiam ad ungues emolliendos & planandos, sed cum hoc non possit fieri, ad Medicamenta accedere cogimur, commendamus etiam hic varios foros, limenta ac Emplastra, nec contemnimus spirituosam ungibus sæpius apposita, huc facit præ aliis spiritus Matricalis, Terebinthinæ, vel Empl. Diachyl. de mucilaginis, de Thea, de Labdano, de Cinnabati, vel etiam Norimbergense, unguis etiam diu in lacte in quo flores chamomilæ & inehlori cocti erant, detineatur, qui foros diu continuandus est, vel decocto malvæ fovendus, vel pro re nata aliquomodo radendus est; si malum fuerit ab Elephantiasi nullam admittit curam.

*Casus.* *Casus* Unguinum cura in eo consistit, ut Medicus bene advertat, à qua causa casus fuerit productus, si est ab ulcere, illud prius, ritè curandum est balsamicis ac spirituosus, in quem finem præ aliis balsamum nostrum divinum commendamus; si verò casus oboriatur à particulis acerbis corrosivis, succo nutritio permixtis, sanguis ac succus nutritius prius ab ipsis liberandus est, per decocta & Essentias lignorum, Antimonii, aliaque sudorifera balsamica, Elix. antiscorbut. nostr. spir. matric. Si à Lue Venerea malum ad Mercurialia sæpe transcendunt est, ut corrigatur istud acidum-acre, in Lue hac ubicunque abundans: ritè conducunt sal vel spiritus Guajacæ, Sassafras, Sarsaparill. decocta lignorum, essent. Antimonii, & sexcenta alia alibi dicta. Deciden-

tiam unguum, si necesse est, acceleramus scalpello, cum molliter separando, atque emplastr. de ammon. bdellio aut galbano imponendo. Ungue sublato, quo novus citius succrescat, digitale ex cera virginea, sæpe renovandum imponatur.

*Reduvia* primò diligenter amputentur, dein detineantur digitum in vino adstringenti, in quo bullierit cupressus, & parum aluminis, nam hujusmodi ablutio ita constringit, ut postea non facile renascantur pelliculæ istæ *Reduvix*, quoque nomine insignitæ.

*Reduvia Cura.*

## C A P U T IV.

*De Morbis Tibiarum, Roseolis nempe Saltantibus, Zostere, & Thymo.*

§. I.

*Roseola Saltantis.* **A**ffectus Manuum Pedumque persequentes, reperimus affectum, qui percrebuit, & cui *Roseola Saltantis* nomen imposuerunt Majores nostri, quæ est pustula subrubra, foeculenta, & recondit tuberculum, quod tactu fabæ vel lupini magnitudinem ac formam repræsentat, dolore se declarans, sæpe & ulceratam pustulam comitem habet. Roseolæ dicuntur, quod rosarum formam & colorem præ se ferunt, vel quod rosidas quasdam inspersiones repræsentant. Dicuntur autem Saltantes, seu Salturiciæ, quod Tibias privatis occupare consuevit, per dolorem faciant ut stantes & iis vexari homines sistant, i.e. tibiis alternè sublati aut terra pressis crebro agitentur. Saltantes hæ pustulæ indefinitis ac incertis sedibus inhaerescunt, vagisque excipiuntur locis.

Alter Tibiarum affectus *Zostere* *Zostere* dictus, aliis vocantur *Zona*, & habetur pro Herpetis specie, quæ occu-



occupat Tibiam, & illam quidem regionem, ubi homines Zona se cingere solent, unde & aliis *Circinus* appellatur, vocatur & *Λαρόν*, *Halmonito* aliisque *Zinzilla* dicitur: Flandri & Batavi vocant *den roden Vmloop*, Germanis dici potest, *der feurige Vmblauß*.

Rarissimus est hic affectus, ex Veteribus enim præter *Scribonium*, *Apuleium*, *Marcellum*, & *Plinium* nemo ejus meminit. *Iob. Langius* *Epist. Med. l. 1. Epist. 32.* Sub alterius ejusdem erysipelatis, & quidem perniciosi specie, quæ à Cingulo *Λαρόν* appellatur, eundem quoque depingit & binis exemplis demonstrat. Affectus ergo hic meritò vel ad *Herpetem* vel *Erysipelas* referri potest, quia unus idemque est affectus, utriusque eadem essentia, unaque causa, unaque curandi ratio, discrimen in eo tantum consistere videtur, quod *Erysipelas* in uno loco plerumque persistat, in volatica autem seu *Zona* rubor priorem locum sæpe deserit, ulterius tamen progreditur, locaque vicina invadit. Li- quor quoque *Zonæ* est acrior ac subtilior, tubulosque subtilissimos occupat, quàm fieri solet in *Herpete* & *Erysipelate*.

*Thymus.*

*Thymus*, aliis est verrucæ species, Veteribus verò tumor parvus, asper, subruber & oblongus, qui si abscindatur major effunditur sanguinis copia, quàm pro magnitudine tuberculi, & non solum in ano extuberat sed & inter coxas. Nomen autem habuit à summitate vel cacumini *Thymi* herbæ. Porro cum multum increvit *Thymus*, in *verruca* abit, ficosas eminentias Veteres appellant, quarum duas effedicunt, malignas, & malignitatis expertes; *Thymium* verò hic tractamus, qui Tibiam occupat.

*Diff. ven-  
ia Roseo-  
larum  
Salran-  
nium.*

Sunt qui *Roseolas Saltantes* cum *Pernionibus* confundunt, non ergò sunt *Chymethila* Græcorum aut *Perniones* Latinorum. Nec sunt *Terminthi Goleni*, *Roseolæ* enim sunt pustulæ latæ potius quàm

phyma ac tuberculum. *Terminthi* verò phymata sunt ac tubercula elata supra cutem, & rotunda non lata, & fusa, suntque supernè pustulata. *Roseolæ* noctui imprimis molestissimæ sunt, quod de *Terminthis* non observatur. Hinc sunt qui existimant, *Hipp. lib. 6. epid. comm. 2. Sect. 20.* per hæc indicasse *Roseolas Saltantes*: *Lata pustula non admodum pruriginosa quales Simon hyeme habebat, qui cum ad ignem innungeretur, aut calida lavaretur, invabatur, vomitus non invabant, puto si quis calida fomenta adhibuisset, utilitatem percipiturum.* *Roseolæ* sunt vel lenes, breviores, & curatu faciliores, quæ per se ipsas discedunt appropinquante vere, quæ hyeme fuerunt ortæ, aliæ verò sunt superiores dictæ, quæ manuum articulos, & internodia afficere consuetæ sunt pruriginosæ, ac de uno in alios digitos, deque sinistra in dextram manum vagæ, in *metacondylis* verò natæ ad extremum discessum ungues ab radicibus plerumque divellunt, proprietates nempe, quæ in alteris non percipiuntur. Affectus *Roseolæ* dictæ cum plerisque vitiis extimi corporis conveniunt, similis enim est *Terminthis*, latiss *Exanthematis*, *Esseris*, *Benat* nostris, sic & *Syphilia* tubercula sunt *Inflammatoria*, nocturne perdolentia, quæ manus pedesque & eminentes omnes corporis partes occupare solent, ad quæ accedunt maximè *Roseolæ*, accedit & *Podagricos* quædam fors, quæ jam dictas *Roseolas*, per exfuscitatos manibus pedibusque nodulos rubeolas, & afflictales æmulantur, sed *Roseolæ* non articulos tantum, sed & mediam Tibiam occupant, quæ etiam ut plurimum pueris, & maximè puellis contingunt, nec non feminis junioribus, præsertim iis quibus menses non ritè fluunt. Si grandioribus id eveniat, apparente quidem imagine *Roseolarum*, non tamen erunt veræ *Roseolæ*, plurimum

Hh 2 enim

enim Syphilidos, & hoc germen, verrucosam simul, & impetiginosam vitii formam referens, quam ex deleteria sua causa sedulus indagator facile deprehendet.

*Pars aff. scia.* §. 2. *Pars* horum morborum affecta uplurimum est Tibia, & varii sunt liquores per hanc circumstantes, Græcis dicitur Tibia *αἷμα*, est tota cruris inter talum & genu in interiori parte sita, cujus Tibiæ pars anterior tenuis & carnis fere expers *Ocrea* vocatur, posterior verò carnosa pars *Sura* appellatur. Roseolæ crura Tibiasque potissimum affligunt, Zoster verò Tibias non tantum, sed imprimis Zonam, seu eum locum ubi Cingulum in Tibia gestare solemus, unde & nomen habet, occupat: sic etiam aliaquando femora ad genua usque, brachium, & manus aliaque corporis loca sub alio tamen titulo afflicte solet. *Thymus* hic etiam Tibiam tantum occupat, cum aliis etiam alia possideat loca.

*Roseolarum Saltantium Diagnos.* §. 3. Nunc pergitur ad horum affectum *Diagnosin*, & quidem primò *Roseolarum*, quarum non una est apud omnes Practicos facies, sunt qui putant esse macularum modo cutem Tibiarum supremam lambentes, & efflorescentes, iterumque evanescentes. Ad Suppurationem, me iudice, aliquando perveniunt Roseolæ. Signum Pathognomicum habetur, quòd noctu invadant & exasperentur. Insolens quoque & singularis apparet forma tumoris, qui Roseolarum Saltantium promeritus est nomen, est tumor intra sua limina, non verò ut alii extra, circa septa sua latiusculum, sed uniforme latet tuberculum, quin potius tubercula plurima simul coacervata, singula suis latebris involuta, ob id autem quod unitate contenta non sint, ob id ipsum à Veteribus Roseolæ numero plurium sunt nominatæ, singula pressulam referunt rotunditatem, adeò ut apprimè fabis *Cornelius*, & alii Lupinis æqui-

pararint, visentur in inspectione radii quidam ex albo rubescentes, quas sanguineas fibras dixeris, per cutem translucentes, & maxime alterantur, luculenterque turgescunt, ubi per noctem dolor simul incurrat. Roseolæ hæc ut plurimum ad hyberna tempora facile erumpunt, & iis Scorbutici ac Cacochymici sæpius afficiuntur.

*Zoster* cognoscitur ex eo, si cutis fuerit exasperata instar Herpetis, in ea regione media Tibiæ, ad quam homines Zona se cingere solent.

*Thymus* autem cognoscitur ex extuberantia in Tibia oborta, Thymi florem referente & figura morum.

§. 4. *Galenici Roseolarum Saltantium causas* varias enumerant, & quidem ante omnia è quatuor humoribus cunctis, quorum vitio morbus emergat, maxime verò à sanguine vitioso abundante deducunt causam, quod hi affectus plurimum in calidis atque humidis ætatibus, habitibus, &c. visatur, quæ maxime ad sanguineam exuperantiam accedunt. Post sanguinem, esse quoque aliquando pituitam in causa, statuunt, quæ non difficile congeritur in sceminis & albidis corporibus. At neque rejiciunt bilem, quæ vellicatum aliquem, & acrimoniam præ se ferat, quia ob pruriginem, & dolorem saltare faciunt homines Roseolæ. Multò verò maxime derivant à melancholica portione, præsertim aliqua parte retorrida, cujus & malignus mos, & fuscus color, & pertinacia sæpe observantur. Itaque nullum excludunt vitiosum humorem, sed omnes aut plures confluere ajunt, sæpè, & sanguini nonnihil viscidæ pituitæ vel ichoris admixtum esse contendunt. Evidentiores ipsæ causæ sunt hujus morbi, æres, aquæ & loci, maxime cum ad frigidam ac humidam exuperantiam exorbitent. Hunc ergo affectum populis dicunt esse Eademum, potissimum

*Zoster.*

*Thymi.*

*Galenici  
rum opi-  
nis de  
causa  
Roseola-  
rum Salt-  
antium.*

simum verò Neapoli frequentem, propter loci situm & victum inordinatum, & quia Lues Venerea seu Neapolitana solennis esse solet, & quasi initia sua ibidem petiit. Inter causas remotiores etiam referunt suppressionem superfluorum, unde feminis morbum hunc esse solennem, contendunt.

Modum generationis Roseolarum quod attinet, earum pustularum in aperto corporis generationem aperit *Galenus ipse ad libr. 6. Epidem. text. 30.* dicens: Eggerminant pustulæ natura corporis altiores sedes repugnante, ut nonnunquam per excretionem, ita & per depositionem ad cutaneas partes, subtiliores siquidem, dilutioresque succos extenuans natura discutit; crassioribus autem cuti, sed potius pelliculæ, quæ epidermis vocatur, utpote densiori in hærescentibus pustule exoriuntur, idque magis incidit, his qui densiore ac duriore cute sunt, difficilis est enim per ipsam pinguiorum tenaciorumque succorum transitus.

*Zona seu Zosteres:*

*Zonam* seu *Zosterem Galenici* communiter bilem flavam in partem iliam Tibiæ, ubi *Zona* se cingere solent homines, effusam accusant, remotiores verò omnia ea dicunt causas, quæ bilem augere possunt.

*Thymi.*

*Thymum* verò dicunt esse à pituita viscida, aliquando cum melancholico humore commixta, & ad Tibiam delato, ibidemque ejusmodi tumorem producentem.

*Paracelsi sententia de causa Roseolarum Saltantium.*

§. 5. *Paracelsus* Roseolas Saltantes ex sale minerali deducit, & quidem in loco Tibiæ cumulo, ubi ejus centrum figitur, ibidemque pruritus & dolorem excitat, & sæpè materiam peccantem esse sal aluminatum ab aeris elementis extra suum chaos expulsam ad cutem secundum aëreorum expulsiuorum operationem.

*Zosterem* verò esse consumptum sel vitriolatum, hoc primum in rubedinem & corrosionem, aliquando in ulcerationem transit,

*Tomus II.*

locus ejus esse dicitur inter genua & calces circumcirca crus, ibidem enim juxta ipsum est Morbus Mercurialis. Notata etiam quamvis vitriolatum sal Morbum efficiat, est tamen ipsa minera Mercurialis tantum à qua proprium recessit balsamum, & liquor salis, ejusque species pro quantitate recessus demonstrantur.

*Thymum* à sale stiptico in Tibia succum nutritium coagulante esse contendit.

§. 6. *Helmontius* causam *Roseolarum Saltantium* in acido consistere, ait, cum latice ad Tibiam delato, ibidemque tyrannidem suam exercente.

*Helmontii opinio de causa Roseolarum Saltantium.*

*Zonam* verò seu *Zosterem* ex ira Archæi esse contendit, & simile esse Apostema igneum, circa Tibiam, ubi homines cingulo se muniunt, contendit.

*Thymum* verò esse pustulam pruriginosam ex latice incrassato, & circa Tibiam stagnante.

*Thymi.*

§. 7. *Villifus* Roseolas Saltantes deducit à liquore acido-salfo, & à sanguine permixtis: sanguis enim in parte remorans à succo nerveo in carnem protuberantem commutatur: serum verò superiora petens, & ob visciditatem evaporationi inhabile existens, in cutis poris aggeritur, ibique stagnans corrumpitur, ac putrescit.

*Villifii ratio de causa Roseolarum.*

*Zosterem* derivat à sale abundantiore atque fixiori, qui per arterias ad glandulas militares cum sanguine appellens, & per eas ab ipso separatus, in angustioribus cutis poris illa in regione Tibiæ, in qua cingimur, colligitur, atque coacervatur, & aggerie sua pustulas in superficie excitat.

*Zona.*

*Thymum* procreari censet à copiosiori succo alibili sanguinem admixtum habente, & in quadam Tibiæ parte ad eum excipiendum disposita aggesto, ibidemque à succo nerveo in carnem istam superfluam effusam.

*Thymi.*

§. 8. *Sylvius* in *Roseolis Saltantibus*

H h 3

*Sylviop.* *tibus* accusat acidum acie pustulam in Tibia excitans. In Zona verò accusat solam bilem sine sanguine in partem illam in qua cingulo se cingunt homines effusam & eruptam, illamque acrimonia sua vexantem & malè afficientem, unde ex consuetudine dolor excitatur.

*Thymi.* In Thymo accusat acidam pituitam in Tibia tuberculum excitantem.

*Cartesiano* §. 9. *Cartesiani* *Roseolarum* *Saltantium* causam deducunt à partibus acutis & oblongis seu salis, vel cum succo chyloso ex sanguine per arteriolas, vel cum lymphæ per ramulos lymphaticos Tibiæ tubulis illatis, quarum figuræ minime respondeant poris & interstitiis fibrillarum ejus: proinde pori à particulis istis pervertantur, & fibrillæ nimis distendantur, unde pustulæ in Tibia emergant, & dolorem maximum inferant, spiculis suis acutis membranas vellendo.

*Zosteris.* *Zosterem* seu *Zonam* derivant à succo quodam multis particulas angularibus imbuto, sive acido glandulas cutaneas, circa eam solam partem, qua Zonam gestare solemus, obstruente, easdemque in tubercula quædam distendente, Zonam oriri volunt.

*Thymi.* *Thymum* verò *Cartesiani* produci volunt, quando particulæ istæ acutæ à crassioribus obtusangulis, quibus succus nutritivus simul scatet, adhuc in Tibiæ parte detinentur & opprimuntur, quæ tamen temporis tractu ab acutioribus artodi, attenuari, siveque vinci & pari modo acui possunt.

*Nostrum* §. 10. Perceptis ita sufficienter aliorum iudiciis, jam demum & nostrum de affectuum horum causis liberum dabimus iudicium. *Roseolarum* igitur *Saltantium* causam dicimus esse acidum succos per rubulos Tibiæ circulares coagulans, relicto tuberculo magnitudine fabæ vel lupini, maximum dolorem inferens, succorum enim particulæ salinæ pessimè figuratæ, per tubulos Ti-

biz transire nequeunt, quia hæc per motum ex massa sanguinea vel lymphatica segregata, duntaxat densius agglomerantur, ut circa tubulos Tibiæ stagent, & hæc *Roseolarum* *Saltantes* inferant.

*Zosteres* verò aut *Zonæ* causam itidem deducimus ab obstructione tubulorum, si enim Tibiæ tubulorum obstructioni interdum glandulæ miliares minutissimæ, quibus cutis maxima ex parte contextitur, obstruantur, & succus, circa eam partem Tibiæ, qua cingulo cingimur, stagnans & evasatus, mediante acido & alcali incalcescat, nonnihil eleventur, tubercula minima, seu pustulæ cum rubore partis efficiant, quæ etiam ob jam dictam effervescentiam inter alcali & acidum multum pruriunt, inde instar Herpetis species *Zostere* seu *Zona* oboritur.

*Thymum* quoque esse ab acido viscido ac coagulante, & sæpè in sanguine in Tibiæ tubulis coagulato, vel succo nutritio non ritè assimilato, & speciem floris Thymi exhibente.

§. 11. Et hæc de causis sufficiant: haurienda jam *Præfagia*. *Roseolæ* neminem ad interitum periculæ perducit, si Hipp. fides adhibenda 1. Epid. Sect. 2. aïens, nocturna non admodum lethalis, verum longa. Sed tamen in Arthritim & membrorum languores sæpè finivisse, observantur Veteres, qui itidem notarunt, in ulcus etiam sæpè transmigrasse latam hanc pustulam, fomentis acerbis & salis incautè foram: sunt autem morbi more cum obfesso corpore semper longè. Sed cum hic affectus rarissimè hisce in locis occurrat capropter non operæ prætiùm duximus ampliorum prognosin proponere.

*Zona* seu *Zostere* est affectus non negligendus, sæpè enim in exulcerationem transit curatu difficilem, & omnis prognosis Herpetis & Erysipelatis huc applicari potest.

De Zona.

De Thymo.

Prognosis  
Roseolarum  
Saltantium.

Zona.

Thy-

*Thymi.* *Thymus* faciliè ob acidum, quod haud ratò nimis corrosivum ob stagnationem reddi solet, in Cancrum transit.

*Diat.*  
*in Rosco.* §. 12. *Diatam* quod spectat, in his *Tibiæ* affectibus ante omnia cò respiciendum est, ut aer eligatur calido-temperatus, in iis enim locis ubi minimus est solis lucisque collustratus, & in ea ratione in qua etiam pluviosa nimum est anni pars, & sæpè austrina constitutio, hinc Affectus; Roscolæ Saltantes dicuntur esse Neapolitanis solennes, prout testatur M. A. SEVERINUS, in qua urbe propter cellitudinem adificiorum, quæ se proximè, id est, pauca loci interapedine spectant nulla Solis adest collustratio. Quibus causis accedit & victus crassus, ex carne bubula & suilla, ex omni brassicæ genere, & ex salis cibis acidisque, ac piscibus quibus abutuntur incolæ. Eligatur ergò victus euchymus & euceptus, lacteus & dulcis, qui optimum in se continet succum nutritium, vitentur carnes & pisces minus bonæ notæ, omnia nimis salia, acris, saccharata, acida. Omnes fructus horatii, legumina quaque, fugienda. Item brassica capitata more Germanorum sale condita, quæ maximè est noxia, quamvis plures est ignorantia ea delectantur, & ob purgationem quam excitat, amant, sed falluntur & sæpe inde magnas corporis sui luunt pænas. Cerevisia non defæcata, item omnis potus glacie refrigeratus per quam noxiis exsistit, è contra potus calidus Theæ vel Cassiæ egregius & perquam utilis est, si simul reliqua potulenta non assumentur nimis frigida, si enim à potu Theæ solamen expectare quis velit, omni potui frigido renunciare debet, alias plus noxæ, quàm emolumenti experietur. Somnus & vigilæ sint moderata. Motus sit corporis conveniens, nocet verò quies & otium, inde enim fiunt cruditates, obstructions, cacoethiæ, cacoehyliæ, & foecetur

cacoethia. Alvus & menses infeminis consuetò ordini respondeant.

Animi affectus immoderati omnes abigendi, maximè enim nocent Venus, Ira, Bacchus, mæror, sollicitudines.

§. 13. Veteres *Galenici* præsertim *Galenicorum curam* sequenti aggreduuntur apparatu. *in Rosco.*  
Primò *Diatam* præscribunt consiliis *Salisatibus*, gruam, dein corpus evacuant purgatione, per quam delinquentem humorum qualitatem expugnant, & *venæsectione* cujus ope plenitudinem exhauriunt, quam tamen plures non admittunt, qui causam Roscolarum magis in pituita & humore melancholico ponunt. Si mas sit, è brachio vel manu sanguinem detrahendum esse volunt, si verò femina è pede. Inter Cathartica eligunt phlegmagoga & melanagoga, ex his autem præcipuè laudant mel rosarum solutivum, & Serapium de polypodio, confessionem Catholicam *Arnoldi & Regis Hammech*, quæ pro virium, habitus, atatis & regionis modo plus, aut minus commisceant & offerunt Serapiis præparantibus ad hæc ordinatis è cortice citri, & è succo fumariz cum aqua mellisæ vel buglossæ. Post hæc viscera corroborant, in quem finem exhibent tanquam specificum genistæ flores saccharo condita, sunt autem & qui decoctum lenticulæ cum melle dicant satis benè fecisse. Plurima verò pars polypodium prædicant, optimè juvare, quod humores crassos lentosque terget, digerit, siccet, bilem atram, & pituitam vel crassam, vel lentam purgat etiam à juncturis, hinc & Sennam exoticam minoris non faciunt. In attemperandi facultate primum assertur centaaurium majus à divino *Chirone* primo quidem Chirurgiæ, at non secundo Pharmaciz Magistro inventum. Magni quoque ab ipsis in Roscolis existimatur *Smilax*, rubus nempe Indorum viticulosus. Ex  
Hh 4. qui-

quibus Medicamentis composi-  
tum unum & alterum parant, ex.  
gr.

*Bz. Centaur. ʒiij.*

*polypod. ʒij.*

*fenn. ʒi.*

*Coq. in Hyi. aq. uæ commun.*

Colat. detur, quale potus  
genus per tres vel quatuor heb-  
domadas hauriendum esse dicunt.  
Vel sequentem exhibent Sera-  
pium, ex anguibz cervinis pa-  
ratum,

*Bz. Anguem cervinum eta-*  
*te media ac bene ha-*  
*bito corpore in ar-*  
*cula ligneola, quæ*  
*furfure ac salem re-*  
*ceperit, aliquandiu*  
*conclusum, capite*  
*& cauda podice te-*  
*nus exsectis, exco-*  
*riatum & exentera-*  
*tum in multas par-*  
*tes concide, & coq.*  
*in aqua fontana, quan-*  
*ta suffecerit cum his*  
*simplicibus medica-*  
*mentis.*

*Bz. Radicis Centuarii maioris*  
*vulgo.*

*rhapontici succosi in*  
*saleolas præse-*  
*cti ʒ. iij.*

*Smilacis asperæ con-*  
*tusarum ʒiij.*  
*polypodii quercini*  
*ʒij.*

*buglossi,*

*endivie,*

*cichorei,*

*graminis,*

*asparagorum,*

*adanthi,*

*asplen. aa. Mj.*

*rad. glycyrrhizæ ʒiij.*

*eupatorii,*

*chamædrii,*

*scabiosæ,*

*rad. pimpinellæ,*

*coronopi,*

*phyllitidis.*

*hepaticæ,*

*betonicæ,*

*melissæ aa. Mj.*

*plantaginis Mij.*

*hordei Pij.*

*uvarum exacinarum*

*ʒß.*

*fol. fenn. or. ʒi.*

Ferveant omnia simul ordine  
competenti, & succi colatura  
cum saccharo albo condiantur mo-  
do & consistentia Syrupi, qui con-  
clarescat ovi albumine despumato  
S. A. Dosis ab unciiis ʒiij. ad unc.  
ʒvj.

Post hæc ad *Topica* transeunt &  
ad pustulas has exsiccandas varia  
commendant exsiccantia sine mor-  
tificatione tamen, ut sunt Silphii  
succus aqua solutus, aut cicuta  
trita & inspersa. Vel apium cum  
polenta tritum & illitum laudant,  
item brassicæ folia trita & imposi-  
ta, vel alterci folia ex melle tri-  
ta & applicata. Solanum per se,  
& cum cicuta viridi, aut olivæ  
foliis cum aqua coctis usurpant  
alii, & uvas passas ademptis aci-  
nis tritas admiscunt, easque sple-  
nio illitas imponunt, adiantum  
quoque ex melle tritum adiciunt.  
Alii addunt argenti spumam &  
sulphur ignem non expertum,  
pari portione cum aceto applici-  
tum; alii myrtum in levotem red-  
ductum sordium illinitione cum  
oleo & vino æstimate. Alii her-  
bam quoque sanguinali, vel vi-  
ride coriandrum præ aliis com-  
mendant, sic & juxta eodem ul-  
cera ex pustulis facta tollit spuma  
argenti cum semine fenigræci mi-  
sta, sic ut his invicem rosa, ac  
que intybi succus adjiciatur, do-  
nec mellis crassitudo fiat. Ex Ju-  
nioribus Veterum sunt, qui com-  
mendant cataplasma ex hyosciami  
foliis contusis, cum melle mistis,  
atque ex brassica, apio, & hordei  
farina concorporatis, vel ex co-  
riandro viridi cum cymis oleo co-  
ctis. Alii ad Roseolas vel porcinum  
aut bovinum adhibent, hordei fa-  
rina, vel crassiore item aliqua ma-  
teria, quæ consentiat, exceptum,  
interim ad 9. dies oblato planta-  
ginis succo. Sed omnia medica-  
menta hæc superare ajunt Chi-  
rur-



turgicum experimentum, quod est Scarificatio, tūm ad ipsas Roseo-  
las, tūm ad tibiariam anteriorem  
faciem, semel aut amplius phlebo-  
thomo facta, non alia ferme ratio-  
ne, quā quz à *Prospero Alpino* de  
Medicina Ægyptiorum de Scarifi-  
catione vulgata est, à Barbaris ple-  
risque nationibus & Asiaticis exer-  
cita, qua Scarificatione, experien-  
tia comprobata, in Roseolis his Sal-  
tantibus nullum excellentius ac  
præstantius esse scribit *M. A. Se-  
verinus*.

In Zona. Ad Zonam seu Zosterem Veteres  
*Galenici* instituunt purgationes, &  
V. S. dein ad Hepar confortantia  
accedunt, omniaque ea, quz in  
Herpete, cum hujus speciem esse  
dicunt, conveniunt, hic quoque  
conducere ajunt. Inter externa  
Topica referunt cicutam viridem  
benè tritam & impositam, item  
sequens Medicamentum:

*R. Cerasse ℥x.*  
*aluminis fissi ℥i℥.*  
*Croci ℥i.*  
*Thuris ℥℥.*  
*acacie ℥i.*  
*diphrygis ℥℥.*  
*opti ℥i.*

Ex aqua teritur, & quū opus est  
ex eadem dilutum perungitur.

Vel:

*R. Galla,*  
*aluminis rotund.*  
*chalcitidis,*  
*crete sutorie aa. ℥ii.*  
*myri,*  
*cortic. malorum,*  
*acacie aa. ℥iii.*  
*calcis vitæ ℥xvi.*

Mali cortex in aceti sextario  
uno decoquitur, donec madida fi-  
at, deinde teritur acacia aceto co-  
dem, macerata nocte & die admi-  
sctetur, & unā teritur, postea  
cætera adjiciuntur, & fiunt  
pastilli, quū opus est dilu-  
untur aqua. Ad utrumque autem  
genus vitii, mirificè medica-  
mentum Andronicum facere di-  
cunt.

*Thymi* curationem in ejus abla-  
tione consistere ajunt, in quem  
finem commendani Pharmacæ con-  
sumentia ac resiccantia Thymos,  
quz sunt ea quz communiter  
curant etiam reliquis verruccas,  
ex. gr.

*R. Aluminis fissi,*  
*atramenti sutorii ℥ss,*  
*glutinis aa. ℥i.*  
*Squame æris ℥vi.*

Trita glutine excipiunt, & cum  
aceto prædissoluto illinunt.

Vel:

*R. Squame æris ℥i.*  
*Sandarache ℥ii.*  
*auripigmenti ℥i.*  
*aluminis fissi ℥ii.*

Terunt omnia & cum rosaceo, &  
ad strigementitiam crassitudinem re-  
ducta largè illinunt, & rasuram  
linteoli imponunt, atque bis sin-  
gulis diebus curant & aceto diluta  
illinunt. Pastillum Arete dictum  
magni æstimant, item elaterium.  
Ubi medicamenta frustra adhi-  
bentur, accedunt ad ferrum, &  
volsella radicibus excidunt Thy-  
mos, & post sectionem, quū  
magni fuerint, multi ustionem ad-  
hibent ad sanguinem sistendum,  
& regenerationem posterum  
prohibendam. Adhibita igitur  
ustione, curationem decernunt  
ad peritiam; primum videlicet  
ea, quz crustas amovere possunt,  
applicant, deinde accedunt ad re-  
purgatoria, postea resiccatoria.  
Crustas autem in talibus remove-  
re posse dicunt lac & mel per li-  
namenta adhibita. Quod si scal-  
pello solum excisi fuerint Thy-  
mi, post excisionem siccum san-  
guinem sistens adhibent, & reli-  
quum curationis ductum resican-  
tem.

§. 14. *Paracelsus* in Roseolis Sal-  
tantibus mundativum aeris sequens  
commendat:

*R. Succo cichoreæ,*  
*Gamandree aa. ℥i.*  
*Succo capillorum Veneris.*  
*℥ss.*  
*Manne ℥ii.*  
*Liquoris quinioli ℥i.*

Fiat

so Tymo.

*Paracelsus*  
*cura in*  
*Roseolis*  
*saltantibus.*

Fiat Mixture & destillatio per alembicum, usque ad oleitatem. Dosis à ℥i. usque ad tres.

Sequens quoque mucilaginosum remedium applicari vult:

℞. Liguoris de mumia,

de massice,

de capbura aa. ℥ss.

Mucilag. de Panugræco,

de psyllio,

de citonit aa. q. f.

F. l. a. instar Cerati.

Vel:

℞. Realgaris crystallin. ℥i.

Olei ardentis ℥ii.

cerusse ℥ii.

M. f. Vnguentum. Circumpo-  
natur Sironibus. Sal-  
tantibus.

Vel:

℞. Olei lini ℥ss.

avis viridis,

cera ad quartam.

F. Ceratum,  
cui superaddantur

Bdellii colati ℥i.

Liga secundum artem.

In Zona. In Zona vel Zostere commendat  
præ aliis Spermiolum.

℞. Spermaticis cœi,

ranatum.

Cherese folii,

Iuniperi aa. ℥i.

Fiat destillatio in Sole.

Vel:

℞. Glutinis aquatici ℥ii.

Destillantur in aquam, cui finus  
mineralium imponatur, & bulliant  
simul per horam, aut donec in  
formam pulchram reducantur, ad-  
de.

Capbura ℥i.

Fiat Unguentum, quo cum ligetur  
crus terno quoque die semel per tres  
septimanas continuando. Postea  
sepius ablundo mundetur aqua  
solorum querci, vel aqua sal-  
sa.

In Thymo. Thymum verò curari asserit per  
corrosivum dulces:

℞. Olei laterini ℥i.

de Iuniper. ℥ss.

ex myrrha ℥i.

Misceantur.

Vel:

℞. Olei laterini ℥i.

Aque aluminosæ ℥ss.

viriditatis salis ad pondus  
omnium.

Fiat Mixture.

§. 15. Helmontius in Roseolis Sal-  
tantibus acidum peccans per saponaria & lixivialia corrigit, sicque af-  
fectum hunc curat, omniaque quæ  
laudent in strumis, hic convenire  
dicat.

Zonam verò seu Zosterem sanari ait  
aqua vitæ, vel sanguine leporis,  
odore enim lintei leporino cruore  
tincti & siccam applicati curati  
contendit, sic quoque stercus hu-  
manum calidè applicari vult, quod  
una nocte sæpè omne acidum extra-  
hit & necat, ut vix amplius deinceps  
redeat.

In Thymo Talpa cruorem, item  
sanguinem vespertilionis illinendum  
esse existimat.

§. 16. Villifus ad Roscolarum  
Saltantium curam se accingens. corpus  
statim expurgat, medicamenta-  
que sanguinem purificantia propi-  
nat. Deinde verò parti illinit un-  
guentum ex floribus Sulphuris, bu-  
tyr. zinzib. pulv. paratum, cum  
paucis præcipitat. rubr. vel unguent.  
Ægyptiac. admixto.

In Zostere mitia quædam Diapho-  
retica administrat, partique inun-  
git linimentum ex unguento ros-  
lor. Sulphur, & succ. citri compo-  
situm, cui si libuerit addi potest  
Mercurius sublimatus dulcis ad gra-  
na aliquot.

Thymum curare tentat Auctor ea  
propinando medicamina, quæ li-  
quori nutritio fluiditatem concilia-  
nt, illumque discutit applicatione  
gumm. ammoniaci, galbani, aut  
Emplast. de meliloto.

§. 17. Sylvius in Roseolis Saltan-  
tibus commendat ad sanguinem &  
acidum acre corrigendum decocta  
lignorum, item salia volatilia ex  
animalium partibus parata. Exter-  
nè laudat sal volatile cupri tinctura  
imbutum, quo quascunque pustu-  
las scædas & plane malignas feliciter  
curare solet, vel abluit decocto Gua-  
jac

Helmon-  
tiana cu-  
ra in Ro-  
seolis Sal-  
tantibus.

In Thymo

V Villifus  
cura in  
Roseolis  
Saltanti-  
bus.

In Zostere

In Thymo

Sylvii cu-  
ra in Ro-  
seolis Sal-  
tantibus.

jaci & ceterorum Aromaticorum potentium.

*In Zona.* In Zona verò magnificat lactis cremorem cum creta mixtum, vel aquam calcis vivæ, cum Mercurio dulci decoctam, appositam, item aquam sambuci externè applicatam. Internè sudorifera blanda propinat.

*In Thymo.* In Thymi curatione externè laudat Author gummi Bdellium, Galbanum, Ammoniacum, nec non thus, myrrham, &c. Emplastri forma applicata.

§. 18. *Cartesiani* ad corrigendas particulas falsas & acutas in *Roseolis Saltantibus*, medicamentis uti solent porosis & alcalicis, à quibus priores facili marte possint absorberi, & fibrillæ cutis in Tibia distentæ in statum pristinum reponi, ut sunt oculi caner., nat. perlar. C. C. f. foc. pp. sal. saturni. Abstergentibus quoque amaris abluunt, & iterum consolidant.

*In Zona.* In *Zostere* sive *Zona* lympham in glandulis contentam corruptam corrigunt, particulas angulares pungentes & rodentes abigendis internis itidem sudoriferis, & antimonio potissimum & lignis paratis, quibus succus iste circa Tibiæ cingulum attenuatur, & obstructio glandularum cutanearum Tibiæ solvitur. Locum affectum ubi Zona cingitur, abluunt vel aqua Mercurialia vel decoctis lignorum, aut lixivio ex cineribus quercus, vel sequens illinunt unguentum:

*R. Vngu. ros. ʒi.*  
*f. sacch. saturni ʒʒ.*  
*ol. sambuc. ʒii.*  
*cinnab. nat. ʒi.*  
*antimonii Diaph. ʒi.*  
*M. f. unguentum.*

*In Thymo.* Dum Thymus existit, resolutionem & dissolutionem duri crassique illius succi instituunt, adhibitis topicis gummosis, ex ammoniaco videlicet paratis & galbano cocto, vel etiam pro re nata ad sectionem accedunt.

§. 19. Nos in Curatione *Roseolarum Saltantium*, tali ordine progredimur, internè sudorifera laudamus subtilia, poros cutaneos citò deobstruentia, lympham spissiorē resolventia, & attenuantia, nec non particulas angulares acutas, sive sales acidos acres mitigantia, inter quæ palmam aliis præripiunt spirit. matric. camp. spiritus volat. oleos. electuarium Diascord. rob. sambuci. Cinnabar. Antimonii, sal. volat. C. C. vipetar. Pustulas aliquando aperire jubemus, & aqua theriacali cum Diascordio permixta abluimus, tum unguento aureo, vel linimento oleo hyperic. nostro, calce viva & Camphora sanamus.

In *Zona* vel *Zostere* curanda commendamus blandiora & lenia Diaphoretica ex decoctis rad. Chinæ, santal. citr. Sarsaparill. rob. sambuc. Essent. antimonii spirit. matric. &c. Externè verò commendamus varia mundificantia lavamenta, ex.gr.

*R. Decoct. cal. vivæ. ʒ. vi.*  
*extr. absynth. ʒiij.*  
*myrrh. ʒ. v.*  
*Camph. ʒii.*

*M.*

Vel:

*R. Vngu. rosar. ʒi.*  
*sal. saturni ʒi.*  
*ocul. cancr. ʒii.*  
*flor. sulph. ʒʒ.*  
*Sal. armoniaci ʒʒ.*

*M.*

Vel pulveres aspergendi sunt ex cerussa, lap. calaminar. ocul. cancr. sal. saturn. cret. Cinnab. &c. Omniaque illa quæ describi solent in Affectu Herpete dicto, cum tantum loco differant hi affectus.

*Thymi* Curationem quod attineat, cum exsicccandum esse vel medicamentis fortioribus, ut spiritu matricali cum sale saturni, lap. calaminar. Cinnabar. vel aqua Mercuriali, vel balsamo nostro divino, quod hoc in casu generosum est remedium: vel conducet unguent. ex chalcit. pulv. sandarach. alum. ust. terr. Hassiac. succ.

gra.

*Nostri  
methodus  
curandi  
Roseolas  
Saltan-  
tes.*

*Zonam;*

*Tymum;*

granat. cum melle appositus. Medicamentis nihil proficientibus, ad ferrum accedendum est, si anabrochismus institui nequit, vel unguentum Ægyptiacum imponendum, donec decidat Thymus; vel ferro candente leviter & successivè cum tangere ac comburere solemus.

## CAPUT V.

*De Pedis Distorsione, Pernionibus, Clavo, Vngue hallucis sub carne se desoliente, Fatore pedum, ac Dolo in Palma ac Calce pedum.*

## §. 1.

**N**unc, DEO T. O. M. duce pervenimus ad ultimum Nostræ Encyclopædiæ Chirurgicæ Rationalis Caput, & quidem ad *peder* eorumque *Calcem*, quorum affectus etiam more solito tractabimus, ut nihil ampliùs nobis restet enodandum.

*Pedis Distorsio.* *Pedis ergo Distorsio* nobis est, quando ipse pes ex articulo suo elapsus, vel vi protrusus fuerit à causa ut plurimum violenta vel interna, vel externa, vel in utero matris producta.

*Descriptio Pernionum.* *Pernio*, aliis Chimelton, Germanis dicitur *die Froschbeulen der Frost* à Veteribus, imprimis Galeno describitur, quod sit mortificatio partium imprimis pedum à nive facta. Alii definiunt Pernionem, quod nempe sit soluta continuitas aut fissura, vel in detrimentum manuum & pedum hyverno tempore à summis algoribus, producta.

Nos verò Perniones describere solemus, quod sint tumores inflammatorii, nunc cum nunc sine exulceratione, à summo frigore in manuum & pedum utpluri-

mum extremitatibus aliisque oborti.

*Clavus* Germanis dicitur *Aelsteraug*, oder *Huner-aug* & quidem à forma oculus gallinaceus. Clavus etiam appellatur, quia inistat clavi cuti infixus est, qui est verrucæ species, & non tam tuberculum, quam callosa est substantia, ad periosia usque penetrans, præsertim ad digitos, & in plantis pedum ex calcei pressu & intertrigine accita: interdum dolore sponte feriens, semper verò ingredienti molesta, à succo crassiori stagnante coagulato ac inspissato ut plurimum nerveo, & periosium pungente exortus.

*Unguis hallucis sub carne se desolientis* est nihil aliud, quam quando Unguis se carni hallucis inferat, sub carne & continuum solvit, ob carnis nimiam excrecentiam, & succi alibilis copiam proveniens.

*Fator pedum* est ex ipsorum poris expirans odor teter & hircum olens, à miasmatis putridis obortus.

Præ reliquis partibus *Peder* sæpiùs dolore affici, arthritici haud interrogati testantur, adeo enim illis familiaris est hic dolor, ut & aliis nomen præripuisse videatur, nec enim facile quis dolorem Pedum ad Arthritidem non pertinentem, sub nomine Podagræ delineatum reperiet, de quo dolore Podagricò nunc nobis sermo non est, sed de eo, qui vel in palma, vel in calce Pedum contingit, qualem sæpius in praxi nostra plurium annorum inter mille ægros observavimus: talem dolorem calcis vehementissimum in ipsa Pedum calce, applicatione Cauterii potentialis sanatum notavit *Guilhelmus Fabricius Hildanus*, Cent. 3. *Obs. Chirurg. 98. p. 282.* Sic quoque *Jacobus Hollerius* recenset in *Comment. ad aph. 93. s. 4.* cuidam plantam Pedis ita incaluisse, ut eidem comburi pars videretur. Quem dolorem & calorem in plantis Pedum Hædici plerumque sentiunt experientque.

§. 2. *Subiectum* seu *Pars affecta* *Pars affl.* Distorsionis Pedis est *Pes* cum suo articulo.

articulo. Pernionum verò sunt partes extremæ & à corde remotiores, quæ plerumque aeris injuriis magis expositæ minusque calidæ sunt, ut *Pedes*, manus, imprimis eorum digiti, aliquando etiam aures, apex nasi, labia, Penis. cujus exemplum novimus &c. Ast non tantum harum partium cuticula, & quod substratum est reticulare corpus, inter cujus foraminula crebriora, microscopii ope conspicua sunt sudoris hæc vascula, patitur, sed & tota substantia fibrosa, præsertim quæ propriè Cutis nomen meretur, ex arteriarum, venarum nervosarum, ac tendinosarum fibrarum extremitatibus contexta, cum pyramidalibus papillis, ipsis nervis continuis, & cum sudoris vasculis ad Cuticulam exsurgentibus afficitur, quam Cutem Celeberrimus Anatomicus *Dr. Bohn.* sub fasciculo fibroso ingeniosè satis depingit.

*Diagnos.* §. 3. *Signis*, pro dignoscendis his affectibus Pedum, adeò multis opus non est, sunt enim per se satis noti, hi affectus, suæque deformitate cuius se intuenti de facili manifestant, imprimis *Distorsio pedis*, quare pauca tantum hic addidisse sufficiet.

*Pedis Distorsio.* Distorsio pedis incurrit in sensus, cum pes vel extrà vel intra distortus est, & malum sæpè est à nativitate, vel ab alia causa violenta externa, tunc dolor est circa juncturam intensus, & gressum impedit.

*Pernionum.* *Pernionum Signa Diagnostica* sunt pars affectus tumor inflammatorius, cum rubore & dolore, aliquando pruriginoso aliquando dolorifico, non intenso tamen, aliquando Perniones exulcerantur, & senies ichorosa effluit. Durante gelu & existente Cælo clariore, non adeò facillè inflammantur, quàm cum gelu mitescere, ac cælum pluviosum vel nive repletum redditur.

*Clavi.* *Clavi* facili Marte cognoscuntur ex tuberculis duris profundis in digitis vel ad latus Pedis latentibus, & patent ex relatione ægri, imprimis si præcesserit fortis calcei nimis

angusti pressio. Patet etiam clavus inde, quòd centrum quodam velut foramen habeat, forma sit rotunda, & instar clavi fixus.

Unguis hallucis sub carne sepe detodiens culibet aspicienti in conspectum se tradit, cum nempe hallucis Unguis cum dolore maximo, & sæpè inflammatione intensa, se carni protuberanti insinuet, tubulosque ac fibrillas dilaceret.

*Fator pedum* facillè nanibus percipitur, qui sæpè adeò est pertinax, ut etiam adstantes cum tolerare nequeant: restantibus enim *Ass. Hass. Volum. 3. Obs. 19.* Fœmina quadam adeò bominabilem spirat pedum factorem, ut nemo eam ferre possit, nisi cum benè odoratis sopiret. Affectus hic sapissimè occurrit in iis qui pedes suos negligenter muniunt linamentis ac soccis.

*Planta & Calcis pedis dolor* innotescit ex relatione ægri. Hæstici utplurimum de dolore urente plantarum Pedum conqueruntur: sic non ita pridem duobus Paralyticis Medicinam feci, qui maxime de dolore plantarum pedum conquæsti sunt, ac præ dolore stare non poterant. Nunc quoque cum hæc scribimus, sub cura nostra versatur scemina quadam sexagenaria, quæ talem vehementem dolorem in plantis pedum habuit, ut ab initio per totos pedes discurrere coacta fuerit, dein dolor adeò urens factus fuit, ut vix pedes amplius præ dolore plantarum movere valuerit.

§. 4. *Atiologiam* pedum affectuum nunc instituturi, aliorum opinionem, more solito, nostræ præmittemus. Agmen autem ducent *Galenici*, pedis *Distorsionis* causam adscribentes vitiosæ in Utero formationi, vel convulsioni, vel catarrho, articuli ligamenta relaxanti: utplurimum verò dicunt *Distorsionem* hanc fieri vel à causa violenta, lapsu, ictu, vel pedem distortendo, vel quorumvis modo, ex articulo suo removendo.

*Pernionū.*

*Pernionum* causa juxta ipsos est frigus, quod dolorem excitat, & partem adstringendo debilitat, unde causa antecedens est sanguis, qui illuc fluit, & dum in parte continetur, ob prohibitam à frigore condensante distillationem, putrescit, partemque inflamat primò, dein exulcerat.

*Clavi.*

*Clavum* Veteres dicunt tumorem rotundum, album, clavi capiti as- similem, circa omnes corporis par- tes consistentem, maximè tamen in plantis ac digitis pedum; quem oriri statuunt ab humore pituitoso & melancholico, mediante pressu calcei, attritu, intertrigine, labo- re, &c.

*Vnguis sub carne se defodit.*

*Hallucis Vnguis sub carne se defodit.* causam dicunt esse ipsum Unguem se in carnem nimis prope Unguem exuberantem defodien- tem, & continuum solven- tem.

*Calcis po- dis dolo- ris.*

*Calcem* dolore affici ajunt ab uni- tatem solventibus, vel fluxione acriori ad plantas & calcem fa- cta.

*Paracelsi opinio de causa pe- dis.*

§. 5. *Paracelsus Distorsionem pedis* contingere statuit vel abortu, vel à motu quodam violento per ictum, lapsum aut ingressum præcipienter factum, à quibus omnibus faciliè pedem ex articulo suo elabi posse, contendit.

*Pernionū.*

*Pernionum seu membrorum conge- latorum* causam esse gelu inquit, à quo membrum aliquod prorsus ri- gidum fit, ab eoque vita separatur, ut, ubi Tibia congelatur, vita moritur in ea, separatique necessum est à vivo, quod mortuum existit, à superiore parte genu videlicet. Ista congelatio priusquam emoriatur membrum, ejus est vehemens in- dormitio, postquam à vita sua de- cidit. Et non alias ac ignis mem- brum aliquod superat ac vincit, fri- gus idipsum etiam efficit. Item pro- ut aqua fervens etiam ignis ingenti frigore congelatur ac exstinguitur, non secus & naturalis calor, quum arripitur ab illo. Exstinguitur ita- que primò calor, & postmodum gelu vincitur. Nam, cum mem-

brum suo calore privatum est, ei nunquam restitui potest. Cum hoc incipit congelari, calor à carne primò recedit, ob suæ humiditatis congelationem, postmodum à ner- vis, & postremò quidem à medullis ossium. Quapropter evenire solet, ut caro frustatim decidat, alia non corrupta, quod istam naturam vehe- menter defenderit. Quandoque me- dullæ moriuntur, unde postmo- dum nulla sanitas vera succedere potest.

*Clavum Paracelsus Porrum* di- cit, quem provenire ait ex avio li- quore, qui nutrimentum esse debet Unguuium. Ubi Porrus non longè distant Ungues, itaque radices eo- rum in excrecentiam transcut, quæ porros efficit.

Quod *Vnguis Hallucis sub carne se defodiat*, accidere ait ex eodem li- quore nutritio Unguuium in nimia copia ad Ungues delato, & dein carnis excrecentia nimia.

*Factorem pedum* ac calida natura, & pravis fuliginosis effumationibus è pedibus exhalantibus provenire ar- guit.

*Plantæ ac calcis dolorem* à Mercurio exoriri docet.

§. 6. *Helmontius Distorsionis pe- dum* ortum eundem agnoscit, quem reliqui Authores, nimirum disloca- tionem ex articulo suo, ipse enim Author emerturus villam, obambula- bat cum insigni appetitu, tum for- tuitò distortit pedem, lapsus est, rigor statim obvenit cum nausea, vomitu & suffocato edendi priore appetitu, mox verò distortum pe- dem, ac semi-dislocatum reposuit, atque eodem instanti redditus ipsi est pristinus appetitus, cessataque est nausea. Juxta ipsum, officium stomachi erat apertum, tam in ap- petitu quàm nausea. Pylorum verò clausum habuit in appetitu, & mox in nausea apertum, tam in appetitu quàm nausea.

*Pernionum causam* esse frigus sta- tuit Author, frigus enim, juxta ipsum, tollit sensum tactus conglaciando & abigendo vires introrsum. *Perniones Ulceribus* forantur, tam-

*Clavi.**Vnguis hallucis sub carne se defodit.*  
*Exterioris pedum.**Plantæ ac calcis dolo- ris.*  
*Helmontii sententia de causa pedis Dis- torsionis.**Pernionū.*

quam



quam si igne ambugi : qui tamen sapè ante vel post hyemem obveniunt iis qui tota hyeme in hypocaustis nullum sentire frigus.

**Clavi.** *Clavum* verò dicit esse à latice coagulato & aberrante.

**Vnguis hallucis.** *Vnguis hallucis* sub carne se defodiens causam deducit ab excresecientia sanguinis in Halluce oborta.

**Factoris ac doloris calcis pedum.** *Factor pedum* esse à putredine vel fermento fradico è plantis pedum producto, ut & *dolor plantarum ac calcis pedum* à spina quadam infixâ illi dicitur.

**VVillisi in dicitur de causa dis Distorfronis.** *S. 7. VVillisi* *Pedis Distorfronem* contingere iudicat tum à causis externis tum ab internis. Ad externas refert casus, ictus, aut præpositam pedis positionem, quæ omnia efficiunt, ut ligamenta malleoli istius, in quem tota causæ vis prorumpit, validius extendantur, ossaque sibi appensa in proprio situ amplius continere nequeant : Eundem quoque affectum exurgere opimatur à convulsis alterius malleoli ligamenti, quæ partem oppositam vehementius ad se attrahentia, ejus ligamenta fortius extendunt, illiusque ossa è naturali situ educunt, & hæc altera ex causis internis, quam sequitur laxitas ligamentorum alterius ex malleolis, quam exoriri aut vel à spiritibus in iis deficientibus, vel ob obstructionem tum fibrarum ligamentorum, tum furculorum nerveorum in illis disseminatorum, aut tandem ob redundantem in istis humiditatem.

**Pernionis.** *Pernionum* originem adscribit succo nervoso in partibus nervis à frigore coagulato ac remoranti, & in iis accenti. Hinc avolatis spiritibus, massa reliqua stagnare incipit, induitque indolem corrosivam, ac pungit roditque, sicque inducit Perniones.

**Clavi.** *Clavum* produci existimat à coactis sub cute, atque aggestis recrementitiis feri particulis, per poros evaporati solitis, atque arcta interstitia tunc oppientibus, densitatemque ipsarum ac duritiem adaugentibus.

*Vnguis ex VVilliso* sub carne se defodit, quando vi quadam latus ejus in carnem suppositam retruditur, illiusque continuum solvit, & fibras ejus dilacerat ac discendit, ampliore tum spatio sub ungue existente, canales illius succo nutritio perpetim irrorati, & à nullo corpore ambiente compressi, magis ab ipso dilatantur, ac versus interiora extenduntur, quo fit ut Unguis profundius adhuc in carne designatur.

Calcem dolore infestari asserit à succo nerveo acidiorè & viscidiorè, in partium nervearum calcem subcipientium fibris remorante, easque pungente & irritante, vel à sero recrementitio aciorè per poros evaporando, sed ob eodem obstruatos retento, fibrarumque dictarum partium spermaticarum fibris infixo, & eas vellicante ac convellente.

**S. 8. Sylvius** *Distorfronis pedum* originem eandem existere concedit, quam Antecessores jam manifestarunt.

*Perniones* verò ortum suum debere arguit *Acido*, quoniam profligantur felicissimè alcalibus, ut sunt cineres quibus calidis fovendos pedes monet, certum enim esse dicit, cineres acidum imbibendo esse frugiferos : *Acida*, inquit *Hornius*, aciditate exuuntur per cines, calces corporum, &c. probatque Author per hæc, cum Perniones hyeme oboriantur, tum temporis acidum augeri, virescere acquirere majores, ut latus serpat, tempore æstatis è contra aerem alcalibus volatilibus scatere, id quod abundè satis in oratione sua demonstrat *Polybister noster Sylvius*, quæ itidem docet, ubi eruditè diversi tigonis causas, earumque originem inculcat. Particulæ ergo acidæ ab aere frigido se partibus insinuantibus, earum fibras vellicando, inque iis dilacerationem & dolorem & per consequens Perniones inducunt.

*Clavus*, juxta ipsum, oritur à Clavi, forti calcis compressione, hinc materia in istis canalibus inclusa fortiter comprimitur, quæ tandem

*Vnguis hallucis sub carne se defodit, eis.*

*Doloris calcis pedum.*

*Sylvii opi, nio de causa pedis Distorfronis. Pernionis.*

in talem abit duritiem *Clavum* constituentem.

*Unguis sub carne se defodientis.*

*Unguis sub carne se defodientis* causam esse dicit excrementum carnis nimiam à sanguine nimis laudabili indutam, & cum Unguis crescat, tunc necessario se in carnem hanc insinuare ac fibras dilacerare debet, unde dolor oritur intensus.

*Doloris calcis pedum.*

*Dolor verò calcis* oboritur vel à continui solutione, vel ab acrimonia partes nervas plantæ vel calcis vellicante & dolorem inducte.

*Cartilagineorum opisthionis.*

*Cartilagineorum opisthionis* sæpius contingere norunt ab incessu infelici, aut violento lapsu, concussione, ligamentorum laxatione, & aliquando, quamvis rarissime, ex musculorum ac Pedum debilitate, ob spirituum animalium parciorum influxum, quo fit, ut musculorum fibræ non sufficienter tendantur, sed flaccescunt ad levem quamcunque causam articulum pedis ex pristino suo loco excidere permittant.

*Pernionum.*

*Perniones* dicunt à frigore produci, quia illud ansam dat, quod succi in cute rardius circulentur, adeo ut plus affluxus quam transitus ipsis concedatur, propterea partes affectæ imprimis pedes intumescere solent. Quando incallescunt, & coagulata ac rigida factæ particula à materia subtili plus quam antea, durante sc. frigore, moventur, tunc pruriunt valde *Perniones*. Dum verò succi liberum non obtinent transitum, juxta ipsos particula rigida coagulata & inspissati succi instar muscarum inter se commoventur, hinc incallescunt & ardorem deducunt, & quoniam ejusmodi commotio fieri nequit absque aliquali quamvis blandiori tactu subtilium canalium ac fibrarum, hinc necessario pruritus exoriri debet.

Si verò motus succorum planè cesset in parte aliqua, partem illam mori necessum esse dicunt, quæ mortificatio observatur primò in superficie cutis, quæ tunc facillè à vera cute separatur. Si verò frigus fortius

admittitur, vera etiam emoritur cutis, & sic *Perniones* generari conrendunt.

*Clavus* oritur, juxta eos, à succo quodam lymphatico vel nervo inspissato. Dolor verò calcis oritur à particulis pungentibus.

§. 10. Nostra sententia *Causa Distorsionis* oritur à causa violenta externa, quando scilicet articulus è sua cavitate violenter incedendo moveatur, item sæpè malum est à nativitate, imprimis à lapsu matris, ceu plura novimus ex epla.

Causam quod concernit *Pernionum*, ex Oeconomia animali notum, & sæpius à nobis iculcatum est, omnes corporis nostri humores in statu incolumi tubulos partium solidarum, omnisque generis vasculum majora tum minora, torrentis instar & celerrimè persfluere, quod si eorumdem fluiditas imminuat, aut celerrimus ac continuus motus, à quacunque id tandem fiat causa, reverteretur ac sufflaminetur, pertinet hinc oriri obstructions, ipsosque succos in ossam crassam degenerare, uti id in gelatina C. C. calido & fluido, dein aeri exposito cernere licet, ut viscositati huic & plurium affectuum natales merito in acceptis ferantur, utpote è quorum sinu, tanquam ex equo Trojano, prodeunt agmina morborum, varique calamitates à tergo sequuntur, ut nulla ferè pars corporis nostri sit, quæ non pœnam pravagationis huius luere cogatur. Prælibatis his fontibus, *Pernionum* causam proximam & immediatam facillè eruere possumus, quam existimamus esse obstructionem inflammatoriam, dum fluidi & agiles humores ab externo frigore in motu suo præpediuntur, atque ab abeuntibus particulis volatilibus, inordinata quadam & confusa reliquarum intratubulos & extremitates vasculorum introducit mixtura, quæ inepta est ad circulandum, fibras circumiacentes premit, ipsisque spiritibus animalibus obicem ponit, ut pristino more insfluere nesciant. Quod etiam fieri potest quando

*Causa Distorsionis ex Nostra opinione.*

*Pernionum.*

quando ipsa vasa à frigore quasi coarctantur, corrugantur ac constringuntur, unde, & transitus humoribus denegatur, hinc semper formicationis sensus, tumor, aliaque apparent phænomena, humorum restagnationem, & spirituum inertiam haud obscure indicantia.

Tempore enim frigoris deficit in aere materia subtilis, quæ non sufficiens est ad succos fluidos conservandos, hinc necessario succi stagnare coguntur, sed non in totum stagnant, sed quoad partem. Quod enim cutis vel potius ipsius vasa constringantur, apparet ex eorum curatione, cum ol. Terbinth. in malo hoc quasi remedium specificum obstructions resolvit, fibrillas demulcet, reditque flexiles. De obstructione ergo vasorum nullum restat amplius dubium, quæ tamen duobus modis fieri solet; vel enim tubuli partis alicuius solidæ in totum obstruuntur, ut nec sanguinis nec reliquies circulantibus succis, imò ipsis spiritibus animalibus ingressus, & egressus concedatur, quæ pars necessario mori, & Gangræna vel Sphacelo corripitur, debet; aut tubuli in tantum obstruuntur ut alicuius succi concedatur ingressus, isque facilius quàm, egressus, unde cum plus inferatur, quàm egredi possit, tumores varii oriuntur. Quod si eousque augeatur obstructio, ut alia poros partis alicuius membranose in tantum obstruant, ut exigua saltem juxta se relinquant intervalla, soli materiei primi elementi pervia oritur obstructio *1. inflammatoria*, h. e. tunc ignis ibidem excitatur, dum rigidæ hæ partes perniciosissimo huius elementi nullibi inclusi, motu agitatae fibrillas divellunt, & dilacerant, quæ in cincinnos tesilientes, vicinato tubulos antea adhuc patulos comprimunt, unde brevi fit inflammatorius tumor, in abscessum tandem, aut etiam Gangrænam, nisi citius occurrat, abiens.

Hinc videmus Perniones circa mensem Februarii, & Martii exaspe-

rari: cum tunc temporis influxus materiei subtilis major est, & per consequens succi abundat, & cum vasa hæc nimis constricta sint, ea permeare nequeunt, hinc stagnare coguntur, & aliis à tergo venientibus viam seu transitum denegant. Et cum in inflammationis huius varii dentur gradus, fortè non errabimus, Perniones Inflammatione appellare, & ad ea referre, eadem enim hic apparent, phænomena, qualia in partibus inflammatis conspiciuntur, v. g. dolor, tumor, rubedo, calor &c.

Causa ergo mediata proxima est frigus, cuius essentia consistit in quiete & hoc quidem per se, & solitarie nullam inducit corruptionem, sed per accedens ipsam destruit partis alicuius texturem dum succorum transitum sistendo, mixturam eorundem turbat; qui enim volatiles, & agiles valde sunt, avolant, hinc reliqui acriores facti, ed potentiùs hæc ludunt dramata.

Clavum proigni existimamus à fibrillis, à duro quodam premente ac constringente corpore vel dilaceratis, vel arctius pressiusque sibi invicem adjunctis ac superimpositis, & à coacervatis sub ipsis atque aggestis recrementitiis seri particulis, per poros evaporari solitis, earumque arcta interstitia tunc opplentibus, densitatemque ipsarum ac duritiem adaugentibus.

Vnguis se defodit, quando vi quadam in carnem suppositam detruditur, illiusque continuum solvit, & fibræ ejus dilacerat ac discindit. Ampiores tunc tubuli existentes succo nutritio, magis irrorati faciunt, & carnem excrecentem, in quam tunc faciliùs se insinuat.

Dolor calcis, & palmarum oritur ab acerbis salinis succis, fibrillas calcis vehementer commoventibus, & dolorem inducentibus.

§. II. Antequam autem ipsam agrediamur curationem, necesse est, ut præexistimationem Medici cõferenda, Prognosticum introducamus,

Clavi.

Vnguis hallucis sub cute se defodit.

Doloris calcis, & palmarum.

Prognosis pedis distortionis.

quo eventum, & modum eventus scire liceat.

*Pedis Distorsio* inveterata, vel in Utero materno facta, vix curatur, nisi statim eo collimetur, ut idoneis ligamentis ad convenientem situm sensim deducatur, quod sæpius factum fuisse in tenellulis infantibus, sæpe observavimus. Ubi verò Distorsio pedis fuerit facta ex violèta luxatione pedis in junctura tibiz cum talo, tunc sæpe res periculi plena est, inde enim motus spæ modicus, extremorum totiusq; corporis refrigeratio, insolite anxietates, deliria, & sæpe mors sequi solent, ceu id constat exemplo *Eph. Germ. Decur. Ann. 6. Obs. 67.* Imò ipsam mortem à temerariè tentata luxati tali repositione notavit *Nicol. Tulpus l. 4. Obs. anat. c. 47.* Acri igitur, si ullibi, in hoc saltem articulo circumspeditione opus esse scribens, Hippocratisque testimonio periculum huius mali confirmans occultum enim esse nequit, quam late se turbatio regiminis animalis extendat, quamque interdum graviter nervosi generis affectiones luere vitæ cardines cogantur.

*Perniones* non exulcerati meliores sunt quàm *exulcerati*. Perniones non exulcerati nullum habent periculum, molestiam tamen maximam creant ægris.

Nisi statim ab initio radix mali extirpetur, postea Perniones difficillimè sanantur, ceu nos novimus exemplū in Principe quodam, quamvis optima, & egregia usurpata fuerint remedia, tamen usq; reccurrunt. Norū enim est, particulas acres paxillorum instar fibrarum poris infixas esse, & acutis suis extremitatibus scindendo continuitatem earum dissolvere, quæ inde chordarum instar in cincinnos resiliens, acres has particulas artèssimè cõplectuntur, in quorum interstitiis tam diu jacent consopitæ, donec à certa materia subtili commoveantur.

Hinc iam liquet ratio, cur hyeme potius pruritus, dolor, & rubedo sen-

tiatur quam æstate. Materia enim subtilissima non semper una eademq; versus hæc inferiora spargitur, sed pro diversitate locorum annique temporum nunc parcius nunc copiosius dispēsat, & nunc alia atq; alia ad nos accedit, prout sc. tellus vel proprius vel longius à Sole aliisque sideribus distat.

*Clavi* sunt affectus faciles curatu, modo non altas egerint radices, tunc enim sæpe Chirurgū spe sua frustrant, hinc etiam, præsertim si incautè excindatur, periculum maximum oboriri potest, ceu in Nobili novimus exemplum, qui inde in spasmus, convulsiones ac deliria incidit, quæ symptomata excepit mors atrox.

Affectus hic non vilipendendus est, sed sæpe atrociora inserit symptomata, sic Chirurgus quidam Norimbergensis Unguem hallucis sub carne se desodientem forcipe violèter nimis extraxit, à quo Patiens singulis diebus aliquid Convulsivi passus, quod duravit usque ad ipsius mortem, quæ inter unius anni spatium subsecuta est. Sicque Præses Cameræ *Zedlitius* præcidit sibi Ungues pedum, scitq; incisionem nimis profunda, accedit Gangræna, & moritur. Digitum læsum molliter haud traxit, sed potius irascens contra terram tutudit. Vide de his *Eph. Germ. Ann. 3. Obs. 350.* ob fibras enim nervosas ac tendinosas facilè quis damnum exinde accipere potest.

*Dolores calcis, & palme Pedum* inferunt sæpe Hæcticam, & sunt aliquando intolerabiles, & sæpe diu durant, adhibitis tamen congruis remediis facilè curari possunt, ceu nos aliquot exempla novimus.

§. 12. His in affectibus Pedum etiam ad ea quæ vel ore assumentur, vel externè ipsis accidunt respiciendum est, ut sanguis ac succi vividiores, hoc est, fluidiores serventur, ut sic melius ad dissipa hæc loca fluere, & calorem ipsis participare queant, ne affectus accersantur, vel jam præsentēs magis adaugeant.

*Prognosis Pernionum*

*Clavi*

*Hallucis sub carne se desodientis*

*Calcis doloris*

*Cura diætetica Pedum affectuum*

geantur. Ante omnia ergo frigus quātum possibile, arcendum est, ob frigus enim aeris afficitur sāguis cū reliquis succis in vasis valde exiguis, ac succi in tubulis suis subsistere coguntur, ac progressu temporis acorem quandam contrahunt, unde tumor inflammatorius, rubor ac dolor. Cibi etiam sint fluidiores ac laudabiles, succo sc. lacteo volatili gaudentes, vitentur verò crassi, terrestres, acidi, salini & saccharati. Potus sit potus Theæ vel Caffæ, singulis vel alternis diebus assumtus, vel vinum dulce Gallicum, vel Hispanicū. Acida verò vina angue pejus fugiantur: Motus, vigilix, animi pathemata sint iuxta leges Mediocritatis.

§. 13. Post Dietam ad ipsam properamus Phatmatiam, & Chirurgiam, & ut eò melius hoc fieri possit, aliorum quoque Medicinæ Antistitum consilia de curatione Pedum Affectuū feliciter instituenda percipiemus. Omnium verò primò *Galenicorum* scopus in *pedis Distorsionis* curatione eò collimat, ut primo statim tempore id quod exciderat, reposuerint, & quo facilius hoc obtinerent, partem affectam prius relaxant sctibus ex decocto malv. parietar. alth. sem. scœnigræc. & illinitio-nibus, hinc extēdūt pedem, quo spatium sit liberum, ubi articulus queat moveri, & in sedem pristinam cōpelli. Ad impediendā inflammationē V. S. imperant, & ingressū descendunt, dein pannum cerato liquido aut oleo rosaceo madidum imponunt. Tandem pede satis confirmato vinculi resolvunt articulum pedis soventes, & Medicamento quodam emolliente illinentes.

*Perniones Veteres* curant pediluvio facto ex decocto raparum, alii pedum in gelidam immersione curantur, non secus ac ova congelata à cōgelatione aqua frigida liberantur. Alii ex iis accipiunt mel, & sal aut sulphur, iisque commixtis manē, & vesperi fricant. Nonnulli illorum accipiunt sevu suillum, & cum succo limonum ad unguenti consistentiam agitant, mem-

brūq; ad hyemis initium eo illinunt: vel etiam liquefacto sevo cervino in aqua vitæ illinunt manus pedesque, quod si magna adsit inflāmatio hyosciami succum appositum, vel decoctū cyclaminis applicatum laudant: Vel marina tepida, vel betæ, aut lenticulæ, aut ervi, aut radicis asphodeli decocto perfundunt *Perniones*. Post perfusionem lenticulam vino incōctam tritā illinsit, aut ficus ex oleo levigatas imponunt, aut alumen, & farinam paribus portionibus in vino coctum adhibent. Myrrhæ quoque trientem, aluminis liquidi sextantem, aceti q. s. preparant, & *Pernionibus* non ulceratis, ac pruriginosis fervidis eruptionibus imponunt. Vel sequens.

℞ Succū væ acerbæ lbj.

sburis 3 iij.

cera 3 ij.

Coq. simul ad succi fermē consumptionem, deinde in mortario subigunt, & utuntur. Sequens valde dicunt insignē esse ad reliquas quoque inflammationes commodum.

℞. Cersuæ

spumæ argenti

aluminis liquid. aa. lbj

myrrh.

sburis aa. 3 ij.

ovorum assatorum vitel. n. xvj.

adipis suilli veteris lbj.

Acida cum aceto terunt, in quo malicorum decoctum est, & ubi strigementiam compagem habuerint, adipem adjiciunt, ac simul probè subigunt, & in plumbeo vase servant: usu verò postulante, rosaceo aut myrteo oleo diluunt, ac illinis. Ex alio cum oleo & cera emplastrū parant imponuntque, vel amurcā illinunt. Sequens *Perniones* imminentes arcere dicunt:

℞. atramenti sutorii.

flor. mali punici satini aa. 3 lb.

aluminis scissi 3 iij.

myrrhæ.

sburis aa. 3 ij.

cera 3 lb.

adipis suilli 3 j.

li 2 olei

Galenicorum  
cura  
phar-  
macen-  
tico-  
Chirurgia in  
pedis  
Distorsione

In Pernionibus.

olei Myrti q. l.  
Vel: Bx. *aluminis rotundi* 3. p.  
*calcis viue* 3 ij.  
*cera* 3 j.

*rosacei aut myrti olei* 3 iij. M.  
Ad Perniones ulceratos recipiunt olei  
omphacini, taurini adipis, succi hyo-  
sciami aa. lb. j. spumę argenti fescuncę,  
Colophoniz trientem, mellis fescun-  
cem, vel foveantur decocto corticum  
granatorum, cum aqua, & vino facto,  
cui quoque addit aliquid aluminis, vel  
excavant rapam, & implent unguen-  
to rosaceo, coquunt sub cineribus, &  
contusum, addito pulvere Cancrorũ  
fluvialium, applicant. Ad idem im-  
ponunt cutem halecis infumatę, vel  
talpę pellem: sequens Vnguentum  
dicunt esse probatissimum:

Bx. *Cimular. tritici sub nive vires-*  
*centis* q. f.  
Contunde in mortario, dein add.  
*Vngu. rosacei* vel  
*pingued. suille* q. f.

Bulliant ad ignem, fiat Vnguentum  
Cerebrum cornicis Emplastri modo  
applicatum Perniones infallibiliter  
curare asserunt.

*In Cla-*  
*vo.* *Clavum* vix absque cura recedere  
ajunt, hinc duplicem instituunt curã,  
vel Instrumentis vel Medicamentis.  
Balneum pedum ex herbis emollien-  
tibus paratum per aliquot dies usur-  
pandum commendant, dein laminatim  
cukello, quoad fieri potest, citra hæ-  
morrhagiam excindunt, & per osti-  
dum folia sempervivi, viridi pellicu-  
la exuta, bis de die applicant, reno-  
vantque. Vel apponunt picem Bur-  
gundicam, Vel sequeas.

4. *Resin. pini.*  
*colophon. aa.* 3 B.

M. bene ad ignem, & dum omnia  
fuerint liquefacta, per trahę linteola, &  
fac sparadrappum viridem.

Alii herbam nigellę cum aceto tri-  
tam applicant, vel lupinos exustos  
cum melle mixtos superponunt. Inci-  
sionem non volunt fieri prope nervos  
in unctione per caustica etiam cauē.

dam esse inflammationem per rotun-  
dum, & perforatum defensivum. Ad  
clavos quoque premittidos unam ali-  
quam ex corrodentibus compositioni-  
bus imponunt, aut eruginem rasam  
aut sandaracham, aut Fistulis dicatũ  
pulvillum siccum, aut fistulare colly-  
rium, gummi vice ammoniaco excep-  
tum lupinorum crudorum ustorum  
cinerem cum melle mysi pice liquida  
exceptum, melanthium cum puer im-  
puberis urina, fabę lomentum cum  
aceto costum applicant. Sequens pro  
experto exclamant.

4. *Cantharidum*  
*atramenti sutorii.*  
*castorei aa.* 3 ij.

Excipiantur terebinthina ad em-  
plastri formam, & clavo premundato  
imponunt.

Vel: 4. *Facis vini nlla*  
*calcis viue, visci aa.* 3 j.  
cum lixivio aut urina pueri impube-  
ris. Misc. atque applicant.

Ad *Vnguem in carnem se insinuan-* *In Hal-*  
*tem* vel cukello *Vnguem* a carne se- *lucis*  
parant, & dein excrescentem carnem *Vngue.*  
imposito alumine usto vel galla cum  
melle subsidere faciunt, & varia ano-  
dyna, & emollientia imponunt, vel in  
forma Cataplasmatũ, vel linimenti;  
vel olei chamomill. lini, sesami, amy-  
gd. &c.

*Dolorem vero in Calce, & Palma Pe-* *In Cal-*  
*dum urentem* tollunt internis anodinis *cis do-*  
& externis tum linimentis, tum Bal- *lore.*  
neis, tum fotibus, in quem casum se-  
quens commendant linimentum.

4. *Vngu. popul.*  
*refrig. Galen. aa.* 3 j. M.  
quo Vnguento illinunt Calcem, &  
Plantas pedum, quod, & somnum pro-  
mover. Vel Balneum quod sequitur  
laudent.

4. *sol. salici* M. ij. *malv.*  
*bismalv.*  
*fl. chamomill.*  
*nymphæ aa.* M j.  
*rad. alib.* 3 j.  
*sem lini* 3 i B.



*fenigræc. ℥℔.**bacc. Iuniper. ℥iii.*

Dentur incisi pro Balneo, in quo pedes mane & vespere immergantur.

*Paracelsi  
cura in  
pedis Di-  
storsione.*

§. 14. *Paracelsus* Pedis Distorsionem per restitutionem pedis articuli luxati curari posse asserit, & quo facilius curatio impetretur, partes emollit balsamo ex axungiis parato, ne verò pes restitutus denuò elabatur, ligamenta obfirmat emplastro suo oppodeltoch, quod etiam apponit, si ligamenta vel articulus pedis ab alia causa fuerit luxatus.

*In Pernio-  
nibus.*

Cura membrorum congelatorum ipsius est; ut unius Mumie per additionem conservetur altera, nempe debilitata hunc in modum qui sequitur.

*℞. Olei costi ℥℔.**sevi hircin. ℥iii.**cerae ℥iv℔.*

M. fiat Unguentum, quod singulis quaternis horis applicandum est, aut sæpius, quo locus melius humiditatem suam retinere valeat.

*℞. Olei ex laganis avium ℥v.**adipis cervi ℥i℔.**cerae**liquorum ex ovis aa. ℥iiii.*

Misc. simul & utere.

Hujusmodi Medicamentum ab initio curæ sufficiens esse dicitur in finem usque, nec opus alio, quod in comumia constituta sit, qua quidem frigoris congelationem curari asserit. Membrorum congelationes duplicia damna secum adferre scribit, ut *Paroxysmos* & tumefactiones. Paroxysmi, juxta ipsum, successu temporis nascuntur magis aucti; verò tumores in putrefactionem incidunt. Sequens Medicamentum certò certius expertum esse notat; *Oleum* nempe *urinae*, quod in proprio sale suo conservatur, congelationibus in aqua natis & similibus omnem Paroxysmum aufert. Quod inflationes concernit, sequens experimentum pro certissimo venditat. Urinam perungantur aut laventur optimè membra congelata, postmodum fodicationum emplastris ligentur, aut conservari

*Tomus II.*

poterunt, præsertim ubi mox ab initio remedium hoc fiat. Si tamen caro mortificata sit, post illa, fodicationum emplastris, aut similibus aliis vulnerariis Medicamentis mundificat. Animadvertendum quoque vult, ubi gelu tenderet ad interiora cor versus, ut Patientibus theriacam & aquam ardentem in potum, ambas commistas Medicus administret, ut calor in membro congelato restauretur. Quicquid oleo prædicto fuerit unctum, ante mortificationem, juxta ipsum, absque damno restitui potest in integrum.

Curationem Clavi sive porri quod attinet: ab incisionibus & corrosivis aquis abstinere, sequens verò maximè commendat.

*In Clavo  
& porro.*

*℞. Ol. & bacc. Iuniperi**besonne**agaric. aa. ℥i.*

*Fellis bovis* q. s. pro unguento: unge dies & noctes, quo magis triveris eo melius efficiuntur nigri siccanturque. Post hæc commendat suum Empl. oppodeltochad quatuorve quinque septimanas.

Vel:

*℞. Realgaris ℥i.**ol. vitell. ovor. ℥℔.**calcis extinctæ q. s.*

pro linimento.

Hoc porros reddit nigros ac putridos.

*Unguem sub carne se desodientem* curare satagit emollientibus.

Ad *Fatorem pedum* abigendum verò adhibet varia Arcana sudorifera, & chelidonium suadet calcis impo-  
nendum.

*Plantæ ac Calcis pedum dolorem* placat dolorem placantibus soporiferis Medicamentis.

*In Planta  
ac calcis  
pedum do-  
lore.*

§. 15. *Helmontius* Distortum ac semidislocatum pedem restituendum vult in locum pristinum, prout in se ipso comprobavit.

*Helmontii  
curandi  
methodus  
in pedis  
Distorsio-  
ne.*

In Pernionum Cura cum aliis Authoribus consentit, & nihil peculiare propinat, conglaciatis non vult statim à frigore ad hypo causa deferri.

*In Pernio-  
nibus.*

*Clavorum curationem fieri ait per*

*In Clavis*

fui mortificatione extinctionemque totalem atactu & impressione Medici agentis & mortificantis sympathetici & magnetici , ut lumen lunare frigidum in cono collectum unitumque per vitrum eos superradians , donec à frigore penetretur , suaviter , adeoque sic in radice mortificetur , ut deinceps sua sponte evanescant : idque Luna decrefcente , quia tùm defectus Lunæ crescentia aufcultant . Eundem effectum præstare dicit cadaveris humani manum impressione forti applicatam . Vel sudor agonalis immorientium imponatur , vel vomit transmissi pulpa interna affricetur *Clavis* donec putrescant .

*In Ungue  
hallucis  
sub carne  
se desodit.  
eo.  
Vulnifan-  
na Cura  
pedis Dis-  
tortionis.*

*Unguis hallucis sub carne se desodientis*, item *fatoris pedum ac doloris* curationem eandem instituendam vult ac reliqui Auctores faciunt .

§. 16. *Willisius Distorsio pedis* ligamenta corroborat decocto ex herb. betonice , chamom. ror. marin. summitat. hyperici , rad. symph. aristoloch. 10r. & sem. 4. calid. maj. in aqua & vino rubro coctis , parato , & deinceps Unguentum Comitisse ipsi illinendo , idoneisque fasciis illum constringendo . Si verò à convulsione ortum duxerit affectus , antispasmodica propinat , & externa nervina & antispasmodica applicat .

*Pernionibus.*

In *Pernionibus* petroleum illitum commendat , tum ad curam , tum ad præcautionem , quem effectum etiam edere ait okum pini : decoctum quoque ex rapis exsiccatis mirè laudat , ut & unguentum de rapis *Mynsichti* . Applicat etiam cum linteis multiplicatis partibus *Pernionibus* afflictiis mucilag. sem. cydon. cum aq. solan. extract. cui parum tutiz admisceat .

*Clavis.*

*Unguis sub  
carne se  
desodit.*

*Clavum* tollit applicatione emplastri de galbano *Mynsichti* , vel emplastri *Vigonis* de ranis cum Mercurio . *Unguis sub carne se desodientis* medetur parum linteis concepti cui momentum aluminis usti inspersum fuerit , in illud spatium , quod unguis excavavit , immittendo , ad carnem excrefcentem exedendam , ut

Unguis profundius delapsus forficibus tutò secari possit , & ad pristinum statum recrescentibus deinceps carnibus reduci valeat .

*Dolorem Calcis* Author curat per interna Diaphoretica anodynis admixta Partem verò dolorificam illinit sapone Veneto spir. vin. dissoluto , cum spiritu ceraforum nigrorum & liliorum convall. misto . Galbaneti Paracelsi spir. vin. dissolut. usum quoque laudat .

§. 17. *Sylvius Distorsionem Pedis* curat , articulum elapsum reponendo in locum & situm pristinum , quod manibus potissimum perficitur , deinde retinendo & corroborando illud ipsum , ne denuò excidat , quiete videlicet , abstinentia ab iugressu , pulvinis & fasciis , nec non emplastris subastringentibus ex mastiche , olibano , colophonia , resina & oleo myrtin. vel emplastro communi ad fracturas etiam hoc in casu appropriato .

In *Pernionibus* *Sylvius* , ut præserventur partes illæ extremæ alias facile obnoxie illi injuriæ , vult , ut prius benè muniatur antequam frigido committantur , manus Chirothecis ex animalium pellibus confatis defendantur , pedes verò , si tibialia & focci linei spiritu vini humectentur : vel juxta ipsum posunt foveri decocto ex herbis aromaticis alcali volatili abundantibus . Spiritus vini tum t. mporis liberaliori quoque manu intra corpus assumatur , ut ita spiritus aucti liberius per totum corpus ferantur , humoribusque majorem concilient motum , quo minùs coagulentur , eternum hostem aut planè non admittant , aut accedentem promptius ejiciant , aut saltem magis resistant , ne prorsus intertrecioni dentur .

Quando verò jam partes malo illo obfessæ sunt , operam dat ut non statim ad calida & ignem accedant agri , sed prius nive vel aqua frigida fricent : his peractis fovere jubet pedes cineribus calidis quibusvis , quo omni extracto frigore , quod cognoscitur ex dolore pun-

*Calcis do-  
loris .*

*Sylviana  
cura Pe-  
dis Distor-  
sionis .*

*Pernionibus .*

pungente sedato, sovet partes decocto aliquo, in quo plantæ aromaticæ sunt coctæ, aut lacte dulci tepido incocto iisdem plantis. Alcalibus quoque admiscet lenientia pinguis, quæ poros non nimium occludunt, sed simul discutitur, ut mel &c. ne inflammationem suppressis effluviis augeat. Medicamenta quoque interna discutientia aromatica & sudorifera non negligenda vult, utilia, quæ in roto corporis haberi sunt collecta ex frigido expellantur: commendat ergo varias mixturas hinc inde præscriptas, item decocta lignorum & salia volatilia ex animalium partibus parata hinc inde jam recensita. Si affectus degeneraverit in Ulcus, curat Author inter alia imposito Unguento diapompholygos, in quo præter alia ascalia est plumbum, quod insignem habet vim infringendi acidum, eoque nomine est proficiu sejus usus in Cancro, ut olim percepimus ex ore Authoris.

*Clavi.* In *Clavis* tollendo commendat varia gummata, imprimis de galbano, ammoniac. de Labdano, quæ imposita ut plurimum eum tollere perhibet.

*Unguis sub carne se defodit.* Ubi *unguis se sub carne defodit*, operam dat ut cultro vel instrumento separetur a cute, & dein lenientia imponantur ac mitigantia.

*Dolorem veru calis* fugat, internè sudorifera, silia volatilia anodynis mixta porrigendo, partem verò illinir sapone Veneto, vel in forma linimenti, vel emplastri, vel forum instituit, vel balneum ex emollientibus paratum.

*Cartesia- norum cu- ra in Pe- dis Distor- sione.* §. 18. *Cartesiani*, quod attinet *Pedis Distorsionem*, si sit à leviori causa, faciliè illam restitui posse contendunt, & quidem manu experti Chirurgi.

*la Pernionibus.* In *Pernionum Cura* eò respiciunt, ut ab initio peragatur frigidis, satius enim esse putant, quàm si partes admoveantur calidis, rationem, qua peragitur illa curatio à frigidis, vide apud *Cartes.* quod curatio, quæ per calida instituitur, in pejus ruat, putant inde fieri, quod acidi figu-

re ab igne immutentur, & curventur, sicque arctius implicantur sibi invicem, quominus easdem vias relegere queant, per quas intrarunt: adde quod ignis particulæ illis acidis junctæ abeat in novum acerrimum, quod conspirat in partium interitum, uti apparet ex pomis congelatis, quæ si immittuntur rei calidæ, sunt intus nigra, & sapor perit, alias illæ quoad illa phenomena, si solvantur frigidis. Conglaciatum virum liquescere dicunt sine jactura virium, si vas in aqua frigida suspendatur, sin verò calore ignis solvatur vires amittit. Medici Cartesiani venesectionem ac scarificationes hoc in morbo contemnunt. Si *Perniones* non fuerint exulcerati applicant crepitum lupi, qui partes calefacit & omne arcet frigus externum. Optimum remedium dicunt esse, pedes calidos conservare. Item suadent, ut pedes *Pernionibus* afflicti proximè igni admoveantur, donec frigus expulsum fuerit, item *Perniones* Oleum Terebenthinæ prius illinunt, vel imponuntur succo raparum tepfacto. Vel decoctum flor. Chamomillæ, absynthii, addita portione salis communis parare solent, eoque solvent pedes.

Vel: 3i. *Terebint.* 3ii. *boliarmen.* 3ß. *camph.* 3ii.

Coq. in consistent. emplastri.

Resinam quoque pini laudant, item Balsamum de *Poorden*. Magnificiunt quoque raptas & capas affatas *Pernionibus* impositas. Exulceratos tractant instar aliorum Ulcerum.

In *Clavis* eadem prodesse dicunt *la Clavis.* quæ capite de verrucis commendaverunt, imd onunt quotidie folia hederæ arboræ. Vel succum hederæ terr. chelidon. vel gum. Ammoniacum, vel resinam pini, vel Emplastrum Gratiæ Dei, vel galbanum, vel Emplastrum viride, succum tithymalli, diachylon, cum gum. de Ranis cum quadruplo Mercurii imponunt, item pedes *Clavis* affectos muris sæpius immergunt, & tanquam balneo utantur. Vel saponem communem *Pernionibus* affli-

gant. Alii ex ipsis linteum sanguine menstruo tinctum clavo impositum magni attolant.

*In Vngue  
sub carne  
se deso-  
diunt.*

*Vnguis ex Cartesianorum sententia se defodit sub carne*, à liquore nutritio in Unguim tubulos copiosius affluente, eosque supramodum inflante, sed quum tubuli ad Unguim latera constituti liberius extendi possint, abundantiorum succum nutritium excipiunt, à quo ultra requisitos fines excrecentes, subiectam carnem subeunt, & in ea se defodiunt.

*In dolore  
Calcei pa-  
dis.*

*Calcem & Plantam Pedum dolore affici* asserunt à succi nervi aliorumque particulis rigidis acutis, scindentibus ac pungentibus, quibus fecerit sanguis hæticorum, scorbuticorumque, quæ particulæ vel in sanguine, vel sero, vel succo nervo, vel nutritio hospites, & ad calcem & plantam Pedum delatæ partes fibrosas, partes has subingentes pungunt ac irritant, doloremque hunc ardentem inferunt.

*Nostre cu-  
ra in Pe-  
dis Distor-  
sione.*

§. 19. Visis sic Aliorum Curationibus Pedum Affectuum, ipsam tandem nostre sententiæ inmixtam aggredimur. In *Pedis Distorsione* curam maturandam esse monemus, ne cavitas repleatur viscidis humoribus, tum enim difficilius restituitur. Restitutum verò malleolum idoneis fasciis, imposito cerato de cumino & spir. vin. camphorato madefacto, & adhuc linteo eodem spiritu imbuto superimposito curare solemus. Ultimò spir. lumbicorum, bals. Uchiat. vel topico nostro sæpius partem ad corroborandos spiritus animales & tubulos obstructos aperiendos illini curamus. Si malum à convulsione originem duxerit, antispasmodicis & nervinis tum internis tum externis uti solemus. Si verò sit à nativitate, difficilius tum curatur, idoneis verò fasciis ac calceis in hunc finem adaptatis sæpius pedem ab ortu distortum feliciter curatum vidimus.

*In Pernio-  
nibus.*

*Pernionum* Curam quòd concernit, statim notandum est, an malum *recent* sit, an altas jam egerit radices. Quippe in recentibus Pernionibus ipsis frigidis curam rectius auspiciamur, quia frigoris lues frigore pel-

lenda est, calor enim subitaneus plus damni inferit, dum subito obstructio- nem solvit, & partes constrictas exagitat, quæ plus spatii occupantes, ipsam texturam destruant, quod quotidie experimur circa rapas & poma congelata, quæ igni statim altis, & postea corrumpuntur ac putrescunt, quod & pulchre ostendit *Cl. Dn. Robault in Physica sua*, in floribus congelatis. Imò si digiti fuerint à frigore quasi rigidi facti, & si tum igni propius admoveantur, sensum percipies, ac si mille aciculis pungeris, quod incommodum non senties, si prius cum aqua frigida vel ipsa nive fricentur membra congelata. Methodus hæc pluribus Paradoxum esse videbitur, cum in succorum stagnationibus frigida maxime noceant; sed si rursus hæc examinentur, & quidem rationis trutina pensitentur, facile te extricabis. Cura enim Pernionum frigidius his quidem inchoatur, sed non perficitur, & quòd frigida primò applicetur, ratio hæc est, quòd congelatæ partes, sensum resolvant, & postea ad priorem mixturam redigi debeat, quod præstat lenis frictio cum nive, vel aquæ frigide immersio, in qua adhuc antica fuit subtilissima materia, & quæ sine aliqua magna vi congelatis liquoribus aut succis fluiditatem suam ordinariam reddere potest, sine ulla læsione alicujus fibræ ad pristinum redeunt statim. Idem enim corpus nostrum experitur farum, quod pomis congelatis accidere solet, quæ aquæ calidæ injecta statim corrumpuntur, igne majori cum impetu in ea irruente, ut in putrilaginem, ceu jam diximus, abeant. Vulgus quidem causam hujus rei, querit, nescio in qua frigoris extractione, qualem verò nos haud admittimus, sed rectius fit id ob materiam subtilem succis nostris magis amicam, vel quòd poma congelata in majore constituta quiete, quàm aqua frigida, hinc quandam suæ quietis gradum communicent. Ex his abundè constat, quod æger Pernionibus vexatus è longinquo igni tantum apponendus sit, aut le-

ni primū frictione cū nīve frigus demulceatur, & sentim levique agitatione articuli vellicentur, ut instiruta frictione sanguis queat revocari, & sopitæ partes citius reviviscant. Sic etiam nix teste experientia, nostris in manibus soluta amicabilem succis nostris communicat calorem: item per frictionem & agitationem fibrillæ & particulæ sopitæ resuscitantur, & hinc motus succorum promovetur. Sed hæc curam in Pernionibus, ceu diximus, non absolvent, nec egrum à malo penitus liberant, sed ad potentiora deobstruentia transeundum est, quæ sunt spir. vin. camph. Elix. vite, spir. Matricar. ol. Terebinth. Juniperi, Philosoph. terebinth. spir. lumbricorum, tulginiis, eboris, fornicarum spir. sal. armoniaci cum bals. Ischiatico mixtus elegans remedium est, Balsamus quoque nervinus extern. ac intern. noster Tinct. Castor. Tinct. Balsamica Dekeri, ast. tectid. ol. Lullian. Cl. Dn. VVeidenfelsi quod mihi per literas maximè commendavit. ol. Guajac. ol. balsam. Peruvian. Camphor. spir. sinapi, convuls. noster liq. C. C. succ. sal. Tart. & sexcenta salia volatilia ex herbis, radicibus, & baccis aromaticis parata. Potum etiam externè magnificimus cū in Juniorum gratiam una acque altera formula.

*Re. Summ. roris mar.*

*herb. sal. v.*

*scordii*

*absynth.*

*fol. Nicotian. aa. M. iß.*

*Rad. bryon.*

*galang.*

*trifol. fibr. aa. ʒß.*

*sem. anis.*

*cumin. aa. ʒi.*

*eruca*

*urtic. aa. ʒii.*

*piper. ʒß.*

*sal. armoniaci*

*tart. aa. ʒiß.*

*Coq. in vino Gallico, adde*

*spir. vini ʒvi.*

pro pauperibus verò in sola vri. coqui possunt, & huic balneo immergantur vel manus vel pedes Pernionib. affecti.

Ol. Terebinthinæ tempore pruritus ad ignem sæpè illitum egregium in Pernionibus est remedium. Crocus cum spir. vin. membris frigore lassis applicatus à pluribus magni penditur. Sic quoque alii cum Veteribus extollunt decoctum raparum, vel aridarum, vel frigore congelatarum, alii rapas coctas calidè Pernionibus applicant. Plures sevyum cervinum, hircinum, caprinum & vaccinum laudant, quæ in eadum glacie liquida infundunt & dein applicant, vel nostræ experientia sapo Baravorum niger dict. vitell. ov. aa. P. æq. conquasi. invicem, corio illinatur & Pernionibus applicetur, ab initio vesiculæ excitantur, quæ aperiendæ sunt. Nonnulli ex recentioribus salivam propriam Pernionibus illigunt, & dein pedes igni admovent: vel

*Re. savi frument. filic. gross. modo parat. (pschrodene) subiungatur aqua frigidiss. & applicetur tepide ter vel quater de die, & dein inungantur Perniones sequenti linimento.*

*Re. Picis Martial. vel aq. Martial. f. c. cera alb. q. s. linimentum.*

Pinguedo anferis, quia subtilis est, præservare creditur contra frigus externum, si membra frigori exposita eo inungantur. Oleum Camphoræ verum ex India allatum nostræ experientia egregii usus est. Mutatio quoque aeris multum ad curationem facit, ex. gr. Si quis in Italia vel Germania Perniones acceperit, & dein ad Indos proficiscitur, vix aliquid incommodi sentiet, ceu prostant exempla nonnulla. Optimum verò remedium est ad recidivam arcendam procul à Frigore. Plures stercus ovillum cum butyro recenti tritum & colatum magni pendunt. Cataplasma alii ex pomis putridis confectum applicant. Alii suffitus laudant ex cinnabarinis, & balsamicis resinosis, præstat vapor ex accenso Spir. vin. progrediens, quod si dolor valdè urgat conveniunt Paregorica cum anodynis alth. malv. fl. cham. sambuc. sem. lini &c. sequens experientia & ratione approbatur.

*Re. Spir.*

℞. *Spir. vini* ʒ ii.Vel *Aq. Hung.* ʒ ii.℞ *Rroci* ʒ ii.*ol. terebinth. crass.* ʒ iii.*M. illinantur Perniones.*

Sic quoque Cineres Juniperi acedum aeris frigidi valde mortificant, si pedes iis calidis fuerint impositi. Sic quoque *ol. succini* pluribus solamen præstitit, aliis adeps expeditibus vitulin. vel hœdin. in aq. decoct. & refrigerat, qua Perniones inungunt. Sunt qui pro Præservatione Pernionum soleis vel soccis ex pelle pedum cervi paratis uti solent, quia in hac pelle pori contractissimi sunt, aerem frigidum ac crassum vix permittentes. Terra foliata tart. more Tachentiano parata in Pernionibus à pluribus magni æstimatur, ejus preparationem vide in *Apolog. contra Tachen. Zwölfer. p. m. 72.* Terra hæc liquida eternè illinatur Pernionibus, Petroleum, axungiacati filv. *ol. Pini*, Unguent. contra Perniones *Schræderi, Barbett, ex rapir. Myrsicht. Timæi à Guldenkleer*, & huius Cataplasma ex farina avenacea à pluribus magni penduntur. Sequenti in Serenissimo quodam Principe cum commodo usus sum.

℞. *Spir. vini Camphor.**matric. crocat.* aa. ʒ i.*lumbic.* ʒ iii.*Spir. arm. cum calc. viv. par.* ʒ i.*M. pro illinitione.*Vel: ℞. *Calc. viv. cum aq. salu. fiat liniment.* add:*ol. hypericon. n.* ʒ ii.*spicæ.**Juniperi* aa. ʒ ʒ.*M.*

Ubi nodi & tumores inflammatorii adsunt mercur. dulcis cum axungia Taxi misceatur, quo calidè nodi inflammatorii perungantur, & desuper Empl. de Ranis cum merc. Vigonis, vel cum quadruplo merc. imponatur, vel empl. de Læbdano, vel nostrum de Thea tantè in abigendis tumoribus efficaciz. Pro divitibus nihil excellentius est quàm lixivium cum Thea paratum, in quo infundantur pedes Pernionibus obsessi ac inflammati. Qui linimenta potius

amant sequens non erit contemnendi usus.

℞. *Medull. crur. boum rec. extr.*

ʒ ʒ.

*axung. Taxi* ʒ i.*viperar.* ʒ ii.*bals. saturni* ʒ i.*ol. Camphor.* ʒ ʒ.

*M. quo calidè Perniones illinantur sæpius. Si quis verò maiorem effectum ex emplastro expectat, sequens proderit.*

℞. *Picis**resinæ* aa. ʒ ʒ.*ol. bani* ʒ i ʒ.*axung. borvis**ovin.* aa. ʒ iii.*ol. lini**olivæ.* aa. ʒ ʒ.*cere* ʒ v.*sub finem add.**Cinnab. nat.* ʒ ʒ.*Camphor.* ʒ iii.*Minii* ʒ i.*M. f. ceratum.*Vel Empl. saponis ad ʒ. ii. malaxetur cum oleo tart. sæt. succin. aa. ʒ ʒ. *M.*

Sequens fuit Celeberrimi Faustii, Profess. Heidelbergensis remedium.

℞. *Ol. resinæ**pinia* aa. ʒ i.*M.*

Fœces quoque Cerevisiz, vel muria Harangum imposito à pluribus laudantur. Vel:

℞. *pingued. vulpis.**lupia* aa. ʒ ʒ.*M.*Vel: ℞. *ol. laurin.* ʒ ʒ.*med.* ʒ ʒ.*terebinth.* ʒ ii.*M.*

Singulare experimentum dicitur cerebellum, ex capite cervi vel lupi desumptum & Pernionibus appositum, alii extollunt sequens:

℞. *cere flavo.**pic. alb.**ol. olivæ.**lini.* aa. ʒ i ʒ.*seu. cervin.**vervecin.* aa. ʒ iii.*Thuris alb.**Minii**Saturni offic.* aa. ʒ i ʒ. *M.*

Om-



Omnia ea Medicamenta, quæ multum falis volatilis oleosi in se continent, hic proficua sunt, quæ acidum in sanguine ac succis stagnantibus corrigunt, sic etiam spermæ ceti supra ignem fufum, & calidè inunctum Pernionibus egregium, & à Celeberrimo *D. Muys* approbatum remedium.

*Exulceratis Pernionibus* imponatur Balsamus noster Divinus, quò nullum datur generosius, vel Terebinth. vel Empl. de creta, vel diachyl. s. Ung. Cancrinum; curantur enim instar aliorum Ulcerum, ex quorum capite reliqua possunt peti remedia, cineres quoque stercoris ovilli inspergantur Pernionibus exulceratis. Cæterum toto curationis tempore frigus externum quantum possibile arcendum erit, in quo totius curationis cardo vertitur, hinc pellis leporina vel cervina, vel charta emporctica cum spir. vin. madefacta, vel vesica bubula cum Terebinthina illita, vel charta quadruplicata pedibus Pernionibus vexatis applicata magni penduntur, quia frigus arcent. Nos ad præcavendum malum cucurbitulas aque sanguifugas partibus affectis applicatas tanquam noxias reiicimus, quoniam hoc modo obstructions vasculorum non tolluntur, sed potius augentur, & vascula distorta ad pristinum suum statum haud revertuntur, sed magis distorquentur.

In *Pernionibus* nec interna cura negligenda venit, hinc Celeberr. *Lorvener*, Medicus Anglus solis intetnis Martialibus exhibitis Perniones curare promittit. Nostra etiam ex sententia interponenda sunt varia volatilia, imprimis oleosa, quæ succos stagnantes fluidiores reddunt, spiritus ad impellendum & fores obferatas aperriendas incitant, omnemque stagnationem impediunt, hinc sudorifera omnia conveniunt, & commendamus seq.

℞. *Sal. volat. oleos. n.*  
*Elix. vite aa. ℥i.*  
*vin. calid. ℥ii.*

M. pro una vice & sudor exspecte-

tur, & inde magnum resultabit commodum. Vel sal. volat. C. C. ad ℥j. in mensa more solito assumantur.

Cur verò agri hoc affectu infecti semper hyberno tempore, & quidem vel in principio, vel in fine hyemis iterum recidivam patiantur, ratio hæc est, quoniam vasa à frigore sæpe contracta ac angustiora facta tempore æstivo succis quidem transitum concedunt, hyberno verò tempore accedente succi nostri aliquantum crassiores redduntur, tunc ipsi canales sunt nimis contracti, & permeare nequeunt, sed succi stagnare coguntur, eundem sic affectum producere debent. Tempore enim hyberno non insuit tanta copia materia subtilis, ut in æstate, in qua spirituosa, oleosa, & aquæ particulæ in succis nostris per continuum transfluxum materia subtilis expanduntur, & sic obstructionem vasorum ab externo aere minantem impedit. Hinc remedia sæpius etiam optima effectum non præstent, quamvis Celeberr. *Bartholin.* Act. Hassn *Vol. 3. Obs. 10.* infallibile dicat remedium adversus manuum Perniones, cruorem adhuc calentem ex bove recens mastato effusum, si eidem manus vel pedes imponantur, quod remedii genus sæpius tentavi at frustra effectum. Hinc videmus remedia etiam generosa nobis visa sæpius fallere Medicos & ægros, quod quilibet in praxi sua experietur.

*Guram Clavorum nostram* quod concernit, felicissimè eos curavimus solo illito ol. lini tepidè facti, prius tamen clavo profundius inciso, quod arcanum nobis hætenus fuit, vel imponi potest linteam oleo lini imbutum, quod te raro fallat. Podex recens galli junioris, inciso prius clavo, impositus plurimis magnum attulit commodum: vel

℞. *Gumm. Galban. ℥ii.*  
*Sal. armoniaci ℥ii.*  
*resin. ℥iii.*  
*picis ℥ii.*

M. f. l. a. Empl.

In Clavis sequens aqua calcis nostra egregia est ut in omnibus fun-

fungosis aliis excrefcenctis.

*R. Calc. non exſiſcēt. ℥iii.*

*Acet. vin. ℥iſſ.*

*Aq. commun. ℥ii.*

*M. f. calx exſuſcata, colat. add.*

*Merc. dulc. ℥ii. M.*

Emplaſtrum de raniſ cum quadruplo mercurii valde Clavos emollit diſcutitque. Sunt qui Empl. diachyl. ſimpl. cum ſale ſimi columbini magnificiunt. Empl. de Thea, de Labdano etiam hic praſtant commodum. Solum ſapē gummi galbani impoſitum juvat. Alii ad corroſiva accedunt, ad lapidem ſc. infernalem vel ol. antimonii, ol. vitrioli, butyrum antimonii, quibus tamen cautē mercandum eſſe exiſtimamus, ne fibrillæ nervæ non tantum ab his irritentur, ſed & planē diſcendantur, hinc omnia hæc cum arſenicalibus improbamus; ſunt qui cum effectu ſulph. citrin. in forma pulveris Clavis incifis imponunt munito prius loco gummi ammoniaci vel inſtrumento plumbeo, & deſuper bis vel ter accedunt, & dein Clavum cum radice eximunt.

*In Ungue  
ſub carne  
ſe deſo-  
diente.*

*Unguis ſub carne ſe deſodientē* medemur ſequenti modo, ſi caro prope unguem nimis propullulat, imponimus parū aluminis uſti vel Empl. ex Labdan. vel ſpir. mattrical. dein cultello ad hunc ſinem excogitato, unguem parū abſcindimus, & dein impoſitis variis baſſamicis curam abſolvimus. Sæpē inflammatio accedit, quæ abigenda eſt phlegmate vitrioli egregio remedio internè & externè uſurpato in inflammatione.

*In padis  
Calcis do-  
lore.*

*Color calcis ac Palma Pedum ardens* ſi fuerit ab Hæctica, ea curata facile ceſſat, alias & interna aque ac externa poſtulat remedia hic dolor: imprimis commendamus Diaphoretica cum anodynis mixta, & egregia R. noſtra opii volatilis, quæ paratur ex ſpit. C.C. volat. & opio, quæ ad guttas 20. & 30. uſque exhiberi poſteſt, imprimis circa veſperam: notandum enim eſt junioribus Præſticiis, quod ſemper eò refleſcant, ut

opiata ſemper veſperatinis horis ſuis agris in quocunque exhibeant morbo. Inter externa hic magnificimus ſaponem, vel Emplaſtrum ſaponis, vel oleum ſaponis calci ac plantæ pedum illitum. Sequens noſtrum Emplaſtrum Anodynum, ut in omnibus externis doloribus, ſic etiam in hoc magnum aſſerat commodum:

*R. Mini*

*ceruſſæ,*

*ſapon. Ven. aa. ℥ vi.*

*ol. olivar. ℥ iſſ.*

*axung. porc. ℥ iſſ.*

*Coq. ad conſiſtent. Emplaſtri add.*

*opii ℥ iv. ſpir. Anifolut.*

*Empl. diapalm. ℥ i. M.*

*Vel: R. Empl. diapalm. ℥ ii:*

*ſperm. ceti ℥ ſſ.*

*Camphor. ℥ ii.*

*croci ℥ i*

*M. f. Emplaſt.*

*Vel: R. Aq. vel decoct. cal. viv.*

*ſpir. R. ſambuc. ℥ iſſ.*

*M. calidè imponatur linteis.*

Quæ impoſita ægrum non deſerent: æni balnea, ſocus, linimenta varia in hunc ſinem inſtitui poſſunt.

In Fetore Pedum ab Indiſ maximè laudantur folia Pinacum Seribeæ, aut Aræ ſoliſ cum calce paratis, calceis impoſita, fetorem arcunt, uti in ore maſſicata omnem graveolentem arcunt anhelitum: nihil verò hoc in caſu magis juvat quàm mundities, quando ſcilicet pedes ſemper novis muniuntur ſoccis.

*In Pedum  
Fetore.*

Nunc ad Finem hujus Operi tandem pervenimus. Faxit Deus Ter-Optimus Maximus, ut quemadmodum hæc omnia ſuſcepimus, & abſolvimus, (certè inter maxima aq. Aulæ ac Præceos negotia,) animo candido in veritatem proclivi, & in publicum mortalium Bonum fervente; ita ſuccedant eadem in Divini Nominis gloriam, juniorum Medicorum informationem, conſummatorum verò Præceos confirmationem, ac Aegrorum quovis tempore obvencientium ſolacium & reſtitutionem.

FINIS TOTIVS OPERIS.









